


Closed
Stacks



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

598.2945

G36a


1889

v. 1

cop. 2

BIOLOGY

FEB 5 1968



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

598.2945

G36a

1889

v. 1
cop. 2

258

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA.

UFFICIO ORNITOLOGICO.

PRIMO RESOCCENTO

DEI RISULTATI DELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA IN ITALIA.

PARTE PRIMA

AVIFAUNA ITALICA

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE DI UCCELLI

STAZIONARIE O DI PASSAGGIO IN ITALIA

CON NUOVI NOMI VOLGARI E COLLE NOTIZIE SIN QUI FORNITE DAI COLLABORATORI
NELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA

COMPILATO DAL DOTTORE

ENRICO HILLYER GIGLIOLI

Professore ordinario di Zoologia e Anatomia dei Vertebrati
nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, Membro del Comitato ornitologico internazionale
e Direttore dell' Ufficio ornitologico.


CON UNA CARTA DELLE STAZIONI ORNITOLOGICHE IN ITALIA.



FIRENZE.

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MONNIER.

1889.



INCHIESTA ORNITOLOGICA IN ITALIA

Stazioni per le osservazioni ornitologiche
1885 - 87

N.B. Le stazioni ornitologiche sono indicate in rosso.

Enrico II. Giglioli



Scala 1:4.000.000.

Chilometri.

Greenwich

Stab. Id. L. Rolla, Roma.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELL' AGRICOLTURA.

UFFICIO ORNITOLOGICO.

*With best wishes of
Henry H. Giglioli*

PRIMO RESOCONTO

DEI RISULTATI DELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA IN ITALIA.

PARTE PRIMA

AVIFAUNA ITALICA

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE DI UCCELLI

STAZIONARIE O DI PASSAGGIO IN ITALIA

CON NUOVI NOMI VOLGARI E COLLE NOTIZIE SIN QUI FORNITE DAI COLLABORATORI
NELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA

COMPILATO DAL DOTTORE

ENRICO HILLYER GIGLIOLI

Professore ordinario di Zoologia e Anatomia dei Vertebrati
nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, Membro del Comitato ornitologico internazionale
e Direttore dell' Ufficio ornitologico.

CON UNA CARTA DELLE STAZIONI ORNITOLOGICHE IN ITALIA.



FIRENZE.

COI TIPI DEI SUCCESSORI LE MONNIER.

1889.

598.2743

G 36a

B. 1

1884

v. 1

SOMMARIO.

100. 2

INTRODUZIONE....	Pag. 1	<i>Bucanetes.....</i>	Pag. 89
ELENCO DEI COLLABORATORI		<i>Pyrrhula.....</i>	ivi
NELLA INCHIESTA ORNITO-		<i>Pinicola.....</i>	92
LOGICA.....	8	<i>Loxia.....</i>	ivi
ÆGITHOGNATHÆ.....	23	EMBERIZIDÆ:.....	96
PASSERES-OSCINES.....	ivi	<i>Euspiza.....</i>	ivi
CORVIDÆ:.....	ivi	<i>Miliaria.....</i>	97
<i>Corvus.....</i>	ivi	<i>Emberiza.....</i>	99
<i>Lycos.....</i>	32	<i>Calcarius.....</i>	114
<i>Colæus.....</i>	ivi	<i>Plectrophanes.....</i>	ivi
<i>Nucifraga.....</i>	34	<i>Plectrophenax.....</i>	115
<i>Pica.....</i>	36	ALAUDIDÆ:.....	116
<i>Garrulus.....</i>	38	<i>Melanocorypha.....</i>	ivi
<i>Pyrrhocorax.....</i>	41	<i>Pallasia.....</i>	119
STURNIDÆ:.....	43	<i>Pterocorys.....</i>	ivi
<i>Sturnus.....</i>	ivi	<i>Otocorys.....</i>	ivi
<i>Pastor.....</i>	48	<i>Calandrella.....</i>	120
ICTERIDÆ:.....	51	<i>Ammodramus.....</i>	122
<i>Agelaius.....</i>	ivi	<i>Alauda.....</i>	ivi
FRINGILLIDÆ:.....	52	<i>Lullula.....</i>	ivi
<i>Fringilla.....</i>	ivi	<i>Galerita.....</i>	127
<i>Montifringilla.....</i>	57	MOTACILLIDÆ:.....	130
<i>Petronia.....</i>	58	<i>Agrodroma.....</i>	ivi
<i>Passer.....</i>	61	<i>Corydalla.....</i>	132
<i>Coccothraustes.....</i>	67	<i>Anthus.....</i>	133
<i>Ligurinus.....</i>	70	<i>Budytes.....</i>	141
<i>Chloroptila.....</i>	72	<i>Motacilla.....</i>	149
<i>Chrysomitris.....</i>	74	<i>Calobates.....</i>	152
<i>Carduelis.....</i>	76	TURDIDÆ:.....	154
<i>Serinus.....</i>	79	<i>Saxicola.....</i>	ivi
<i>Cannabina.....</i>	82	<i>Dromolaea.....</i>	161
<i>Ægiothus.....</i>	85	<i>Monticola.....</i>	ivi
<i>Carpodacus.....</i>	88	<i>Merula.....</i>	166
		<i>Turdus.....</i>	178
		<i>Oreocincla.....</i>	186

<i>Aëdon</i>	Pag. 187
<i>Luscinia</i>	ivi
<i>Erethacus</i>	190
<i>Cyanocitta</i>	193
<i>Calliope</i>	196
<i>Nemura</i>	197
<i>Ianthia</i>	ivi
<i>Ruticilla</i>	ivi
<i>Pratincola</i>	202
SYLVIIDÆ:.....	207
<i>Sylvia</i>	ivi
<i>Monachus</i>	215
<i>Pyrophthalma</i>	220
<i>Melizophilus</i>	221
<i>Agrobates</i>	223
<i>Aedon</i>	ivi
<i>Phylloscopus</i>	224
<i>Hypolaïs</i>	233
<i>Acrocephalus</i>	236
<i>Calamodus</i>	240
<i>Luscinola</i>	242
<i>Locustella</i>	243
<i>Potamodus</i>	244
<i>Cettia</i>	245
DRYMOCIDÆ:.....	246
<i>Cisticola</i>	ivi
TROGLODYTIDÆ:.....	247
<i>Troglodytes</i>	ivi
CINCLIDÆ:.....	250
<i>Cinclus</i>	ivi
ACCENTORIDÆ:.....	253
<i>Accentor</i>	ivi
PARIDÆ:.....	258
<i>Regulus</i>	ivi
<i>Agithalus</i>	262
<i>Acredula</i>	263
<i>Panurus</i>	267
<i>Parus</i>	268
<i>Cyanistes</i>	273
<i>Poeile</i>	275
<i>Lophophanes</i>	278
SITTIDÆ:.....	279
<i>Sitta</i>	ivi
CERTHIDÆ:.....	282
<i>Certhia</i>	ivi
<i>Tichodroma</i>	285
ORIOIDÆ:.....	287
<i>Oriolus</i>	ivi
AMPELIDÆ:.....	291
<i>Ampelis</i>	ivi

LANIIDÆ:.....	Pag. 292
<i>Lanius</i>	ivi
MUSCICAPIDÆ:.....	303
<i>Muscicapa</i>	ivi
<i>Ficedula</i>	ivi
<i>Erythrosterina</i>	306
<i>Butalis</i>	307
HIRUNDINIDÆ:.....	309
<i>Hirundo</i>	ivi
<i>Chelidon</i>	313
<i>Clivicola</i>	317
<i>Cotile</i>	319
MACROCHIRES.....	322
CYPSELIDÆ:.....	ivi
<i>Cypselus</i>	ivi
CAPRIMULGIDÆ:.....	327
<i>Caprimulgus</i>	ivi
<i>Podager</i>	331, nota
SAUROGNATHÆ.....	332
PICIDÆ:.....	ivi
PICIDÆ:.....	ivi
<i>Drycopus</i>	ivi
<i>Picus</i>	333
<i>Dendrocopus</i>	ivi
<i>Picoïdes</i>	339
<i>Gecinus</i>	ivi
IYNGIDÆ:.....	342
<i>Iynx</i>	ivi
DESMOGNATHÆ.....	345
COCCYGES.....	ivi
CUCULIDÆ:.....	ivi
<i>Cuculus</i>	ivi
<i>Coccytes</i>	348
<i>Coccyzus</i>	349
ANISODACTYLÆ.....	350
ALCEDINIDÆ:.....	ivi
<i>Alcedo</i>	ivi
CORACHIDÆ:.....	352
<i>Coracias</i>	ivi
MEROPIDÆ:.....	354
<i>Merops</i>	ivi
UPUPIDÆ:.....	357
<i>Upupa</i>	ivi
STRIGES.....	361
STRIGIDÆ:.....	ivi
<i>Strix</i>	ivi

BUBONIDÆ:.....	Pag. 363	<i>Bubulcus</i>	Pag. 437
<i>Syrnium</i>	ivi	<i>Ardeola</i>	438
<i>Nyctala</i>	366	<i>Ardetta</i>	440
<i>Surnia</i>	ivi, nota	<i>Botaurus</i>	442
<i>Asio</i>	367	<i>Nycticorax</i>	444
<i>Glaucidium</i>	370	CICONIDÆ:.....	446
<i>Athene</i>	371	<i>Ciconia</i>	ivi
<i>Carine</i>	ivi	PLATALEIDÆ:.....	450
<i>Scops</i>	373	<i>Platalea</i>	ivi
<i>Bubo</i>	375	IBIDÆ:.....	451
ACCIPITRES.....	378	<i>Plegadis</i>	ivi
FALCONIDÆ:.....	ivi	ODONTOGLOSSÆ.....	454
<i>Circus</i>	ivi	PHÆNICOPTERIDÆ:.....	ivi
<i>Pandion</i>	384	<i>Phænicopterus</i>	ivi
<i>Circaëtus</i>	385	ANSERES.....	456
<i>Haliaëtus</i>	387	CYGNIDÆ:.....	ivi
<i>Aquila</i>	388	<i>Cygnus</i>	ivi
<i>Nisaëtus</i>	392	ANSERIDÆ:.....	458
<i>Hieractus</i>	ivi	<i>Bernicla</i>	ivi
<i>Archibuteo</i>	393	<i>Branta</i>	ivi
<i>Buteo</i>	394	<i>Anser</i>	460
<i>Pernis</i>	396	ANATIDÆ:.....	465
<i>Milvus</i>	398	<i>Dendrocygna</i>	ivi
<i>Gennaia</i>	401	<i>Casarca</i>	466
<i>Falco</i>	403	<i>Tadorna</i>	ivi
<i>Hypotriorchis</i>	405	<i>Anas</i>	467
<i>Æsalon</i>	408	<i>Chaulelasmus</i>	470
<i>Cerchneis</i>	410	<i>Spatula</i>	471
<i>Tinnunculus</i>	ivi	<i>Dafila</i>	473
<i>Erythropus</i>	413	<i>Mareca</i>	475
<i>Astur</i>	416	<i>Marmaronetta</i>	477
<i>Accipiter</i>	417	<i>Nettion</i>	ivi
VULTURIDÆ:.....	419	<i>Querquedula</i>	479
<i>Gypaëtus</i>	ivi	<i>Fuligula</i>	482
<i>Vultur</i>	420	<i>Callichen</i>	ivi
<i>Gyps</i>	421	<i>Fulix</i>	483
<i>Neophron</i>	422	<i>Aethya</i>	ivi
STEGANOPODES.....	423	<i>Nyroca</i>	487
PELECANIDÆ:.....	ivi	<i>Bucephala</i>	489
<i>Pelecanus</i>	ivi	<i>Clangula</i>	ivi
PHALACROCORACIDÆ:.....	425	<i>Harelda</i>	490
<i>Phalacrocorax</i>	ivi	<i>Edemia</i>	491
<i>Microcarbo</i>	427	<i>Somateria</i>	492
DYSPORIDÆ:.....	428	<i>Erismatura</i>	494
<i>Sula</i>	ivi	MERGIDÆ:.....	495
HERODIONES.....	429	<i>Mergus</i>	ivi
ARDEIDÆ:.....	ivi	<i>Mergellus</i>	497
<i>Ardea</i>	ivi	SCHIZOGNATHÆ.....	499
<i>Egretta</i>	433	COLUMBÆ.....	ivi
<i>Herodias</i>	ivi		

COLUMBIDÆ:.....	Pag. ivi	<i>Squatarola</i>	Pag. 567
<i>Columba</i>	ivi	<i>Eudromias</i>	569
<i>Turtur</i>	508	<i>Ægialitis</i>	570
PTEROCLETES.....	511	<i>Chettusia</i>	576
PTEROCLIDÆ:.....	ivi	<i>Hoplopterus</i>	ivi
<i>Pterocles</i>	ivi	<i>Vanellus</i>	ivi
<i>Syrnhaptes</i>	512	<i>Strepsilas</i>	579
GALLINÆ.....	515	<i>Hematopus</i>	580
PHASIANIDÆ:.....	ivi	SCOLOPACIDÆ:.....	581
<i>Phasianus</i>	ivi	<i>Recurvirostra</i>	ivi
PERDICIDÆ:.....	ivi	<i>Himantopus</i>	582
<i>Francolinus</i>	ivi	<i>Phalaropus</i>	584
<i>Perdix</i>	521	<i>Lobipes</i>	ivi
<i>Caccabis</i>	ivi	<i>Limicola</i>	585
<i>Starna</i>	525	<i>Pelidna</i>	ivi
<i>Coturnix</i>	527	<i>Arquatella</i>	ivi
<i>Synoicus</i>	528, nota	<i>Ancylocheilus</i>	586
TETRAONIDÆ:.....	532	<i>Actodromas</i>	589
<i>Tetrao</i>	ivi	<i>Tringa</i>	591
<i>Urogallus</i>	ivi	<i>Calidris</i>	592
<i>Lyrurus</i>	533	<i>Machetes</i>	593
<i>Bonasa</i>	534	<i>Bartramia</i>	595
<i>Lagopus</i>	536	<i>Tringoides</i>	ivi
HEMIPODII.....	537	<i>Totanus</i>	597
TURNICIDÆ:.....	ivi	<i>Helodromas</i>	ivi
<i>Turnix</i>	ivi	<i>Terekia</i>	606
FULICARIÆ.....	538	<i>Limosa</i>	607
RALLIDÆ:.....	ivi	<i>Scolopax</i>	609
<i>Rallus</i>	ivi	<i>Gallinago</i>	614
<i>Ortygometra</i>	540	<i>Limnocyrtus</i>	619
<i>Porzana</i>	ivi	<i>Numenius</i>	621
<i>Crex</i>	546	GLAREOLIDÆ:.....	625
<i>Gallinula</i>	548	<i>Glareola</i>	ivi
<i>Hydroornia</i>	550	GAVIÆ.....	627
<i>Jonocicca</i>	ivi	STERNIDÆ:.....	ivi
<i>Porphyrio</i>	551	<i>Sylochelidon</i>	ivi
<i>Fulica</i>	552	<i>Thalasseus</i>	628
ALECTORIDES.....	555	<i>Actochelidon</i>	ivi
GRUIDÆ:.....	ivi	<i>Gelochelidon</i>	629
<i>Grus</i>	ivi	<i>Onychoprion</i>	630
<i>Anthropoides</i>	557	<i>Sterna</i>	ivi
OTIDIDÆ:.....	ivi	<i>Sternula</i>	632
<i>Otis</i>	ivi	<i>Hydrochelidon</i>	634
<i>Houbara</i>	561	LARIDÆ:.....	638
LIMICOLÆ.....	562	<i>Chroocephalus</i>	ivi
EDICNEMIDÆ:.....	ivi	<i>Hydrocolaeus</i>	ivi
<i>Edicnemus</i>	ivi	<i>Adelarus</i>	638, nota
CHARADRIIDÆ:.....	564	<i>Gelastes</i>	642
<i>Cursorius</i>	ivi	<i>Rissa</i>	643
<i>Charadrius</i>	565	<i>Larus</i>	644

STERCORARIIDÆ :.....Pag.	648	<i>Mergulus</i> . . . Pag.	660, nota
<i>Megalestris</i>	ivi	COLYMBIDÆ :	661
<i>Stercorarius</i>	650	<i>Colymbus</i>	ivi
TUBINARES.....	652	PODICIPEDIDÆ :	664
PROCELLARIIDÆ :.....	ivi	<i>Podiceps</i>	ivi
<i>Puffinus</i>	ivi	<i>Podicipes</i>	ivi
<i>Procellaria</i>	655	<i>Tachybates</i>	669
<i>Cymochorea</i>	ivi	AGGIUNTE	673
OCEANITIDÆ :.....	656	ERRATA-CORRIGE	675
<i>Oceanites</i>	ivi	INDICE DEI NOMI SCIEN-	
PYGOPODES.....	ivi	TIFICI	677
ALCIDÆ :.....	ivi	INDICE DEI NOMI VOL-	
<i>Utamania</i>	ivi	GARI	685
<i>Alca</i>	ivi		
<i>Fratercula</i>	658		
<i>Lomvia</i>	659		

INTRODUZIONE.

Nel proemio alla mia AVIFAUNA ITALICA diedi notizia come, attuando le deliberazioni del primo Congresso Ornitologico internazionale, tenuto a Vienna nell'aprile 1884, S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio avesse impiantato un *Ufficio Ornitologico* con sede presso la Collezione Centrale degli Animali Vertebrati italiani nel Museo Zoologico del R. Istituto di Studi Superiori in Firenze; e come mi facesse l'onore di chiamarmi alla direzione di esso.

Il primo atto dell'Ufficio Ornitologico fu la pubblicazione appunto della AVIFAUNA ITALICA, ossia di un Elenco degli Uccelli sedentari, stazionari, di passaggio o di accidentale comparsa in Italia, dando a quel termine, *Italiana*, il suo completo significato geografico; e ciò per ragioni che è superfluo ripetere. La pubblicazione della mia AVIFAUNA ITALICA avveniva nel maggio del 1886, e nel frattempo si organizzava e si iniziava la *inchiesta ornitologica Italia*, scopo principale dell'Ufficio Ornitologico e della quale l'AVIFAUNA ITALICA doveva essere la base, o meglio punto di partenza.

Con ogni cura cercai di redigere un elenco il più possibile completo delle persone le quali interessandosi d'ornitologia potevano essere validi collaboratori nell'at-

tuazione della inchiesta ornitologica nel nostro paese. Fatta una prima lista, che andò poi sempre più completandosi, la comunicai al Ministero, ed allora venne diramata alle persone indicate la Circolare Ministeriale qui riprodotta:

Roma, 30 Luglio 1885.

Allo scopo di conoscere meglio le condizioni degli uccelli che vivono allo stato libero, per poter precisare i loro rapporti di utilità o di danno nell'interesse generale dell'Agricoltura e della Silvicoltura; questo Ministero, accogliendo i voti del Congresso Ornitologico internazionale tenuto a Vienna, ha deciso d'iniziare la raccolta di una serie di notizie intese a conseguire lo scopo di cui sopra. E ciò, seguendo anche l'esempio di altri Stati di Europa e di America.

Queste notizie si devono specialmente riferire: 1° Alle epoche della migrazione (passo e ripasso) e della nidificazione; 2° Alla direzione presa ed al numero relativo degli uccelli migranti; 3° Alle specie stazionarie estive ed invernali, a quelle sedentarie affatto; 4° Alla alimentazione, particolarmente nelle epoche del passo e della nidificazione.

Ad avviare queste ricerche con metodo uniforme saranno redatte istruzioni precise ed un elenco delle specie di uccelli sin ora registrate come italiane coi nomi scientifici, volgari e dei principali dialetti italiani; e saranno formulati moduli speciali, nei quali sotto ciascuna rubrica si potranno registrare le osservazioni fatte.

Il prof. Enrico H. Giglioli del R. Istituto di Studi Superiori, Direttore del Museo Zoologico dei Vertebrati a Firenze, il quale fu Delegato dal R. Governo al Congresso Ornitologico Internazionale di Vienna, e Membro del Comitato Ornitologico Internazionale permanente, è incaricato di raccogliere e coordinare le osservazioni fatte in Italia, e di redigere la Relazione annuale sui risultati ottenuti. In quella relazione i nomi dei vari collaboratori saranno citati colle notizie fornite, tanto

per autenticare queste, come per stabilire la contribuzione di ciascuno al lavoro comune.

Conoscendo la di Lei speciale competenza in questa materia, Le rivolgo preghiera di voler collaborare a questa inchiesta ornitologica, e confido che vorrà favorirmi l'annunzio della di Lei cortese adesione. In seguito a che saranno trasmesse alla S. V. le istruzioni, l'elenco ed i moduli da riempirsi, appena siano pronti.

La S. V. è inoltre pregata a volere indicare, qualora ve ne fossero, altre persone competenti, disposte a prendere parte a questo lavoro.

Gradisca frattanto gli attestati della mia stima.

Il Ministra

B. GRIMALDI.

Questa Circolare ministeriale indica in termini generali l'oggetto ed il modo della inchiesta ornitologica che si voleva iniziare. Dopo accurato studio avevo intanto preparato i *Moduli* a stampa che dovevano servire per annotare le osservazioni; e già nell'inverno del 1885-86 io ne faceva una prima distribuzione a quelle persone che avevano accettato di essere collaboratori nella indagine ornitologica. Debbo rammentare che nelle *Considerazioni generali* poste in fine della mia *AVIFAUNA ITALICA*, io ho tentato di far notare la importanza di alcuni dei problemi di natura generale riguardanti i nostri Uccelli, che sono anco ricordati nella Circolare ministeriale; inoltre, nella *Appendice* annessa al mio volume, ho dato le istruzioni che ritenevo più necessarie per l'attuazione della inchiesta ornitologica in Italia: e, nell'ordine prescelto, vi ho ripetuto i quesiti che erano stampati in testa ai *Moduli* da riempirsi, che vennero distribuiti. Al principio di quella mia *Appendice*, scrissi come e perchè il *questionario* distribuito fosse stato concordato e modellato su quello già in uso nella Germa-

nia e nell'Austria-Ungheria, giusta le deliberazioni del *Primo Congresso ornitologico internazionale* riunitosi a Vienna nel 1884; e questo allo scopo di una maggiore possibile uniformità nel coordinare i risultati di una indagine che ha non soltanto interesse per il paese nostro, ma anche un interesse internazionale per l'Europa e per i paesi della grande Regione zoo-geografica Eurastica almeno. Io non feci in quel *questionario* che alcune lievi modifiche ed aggiunte, allo scopo di rendere più chiara pei collaboratori la natura ed il significato dei quesiti posti. In questo mio intento pur troppo, come lo dimostra ampiamente l'esperienza venuta poi a mano a mano formandosi, mentre si andava attuando l'inchiesta, non sono sempre riuscito; e se per alcuni degli egregi miei collaboratori il lavoro fu assai più arduo di quanto avrei voluto, debbo confessare che il mio compito di riordinare, registrare, compulsare e stacciare le notizie e le osservazioni che mi furono inviate e di compilare in breve il *Resoconto* che ora vi presento, fu arduo e faticoso oltre ogni dire. E ciò dipese non soltanto dal fatto che non pochi tra i miei collaboratori non avevano sempre ben compreso la portata di certi quesiti; ma assai più dal non aver essi seguito in troppi casi l'ordine scientifico e la nomenclatura date nella mia AVIFAUNA ITALICA, malgrado le mie esplicite raccomandazioni. Basta; ora il lavoro è fatto e se mi è costato non poca fatica ed una larga quota del mio tempo, debbo pur dire che i risultati ottenuti, sebbene lontani ancora dall'essere completi, sono molto importanti, ed in alcuni casi di alto interesse; onde debbo sinceri e cordialissimi ringraziamenti a tutti coloro i quali hanno contribuito al lavoro inviandomi le loro osservazioni.

Quanto ho detto sopra spiega come il *Resoconto* dei risultati della inchiesta ornitologica non sia annuale come si desiderava allorquando venne distribuita la sopra riportata

Circolare ministeriale. E questo mi porta molto logicamente a dire qualche cosa sulla natura di questo *primo Resoconto*, che sarà, per le stesse ragioni, quella, in parte almeno, del secondo e del terzo, che spero gli faranno seguito. Nell'attuazione della inchiesta ornitologica in Italia importava anzitutto avere notizie precise sulle condizioni locali di ciascuna delle specie di uccelli nelle diverse nostre provincie, e queste le abbiamo nel presente *Resoconto* per non poche delle provincie italiane. Completate queste notizie per tutte le provincie, come confido poter fare nei due successivi *Resoconti*, avremo una solida base di cognizioni sullo stato reale delle singole specie in ognuna delle provincie italiane; ed allora il *Resoconto* ornitologico potrà diventare annuale e dare le notizie interessanti le singole specie nelle varie parti d'Italia, relative all'*annata precedente*. Per giungere a questo e per facilitare il compito ai collaboratori darò alcune nuove istruzioni nelle *Conclusioni* in fine a questo *Resoconto*.

Dirò ora due parole pei collaboratori egregi i quali hanno così gentilmente voluto lavorare meco a questa non piccola impresa; e spero che mi daranno venia se in qualità di compilatore io mi prendo tale licenza. Oltre a persone chiare e già ben note per studî ornitologici e anco per importanti pubblicazioni fatte intorno a quel ramo interessante della Zoologia, professori di Zoologia o di Scienze Naturali, dilettanti privati, tassidermisti ecc. ecc., un contingente non piccolo è stato dato da intelligenti cacciatori e proprietari di tese, nonchè dagli ispettori forestali dipendenti dal Ministero di Agricoltura. Industria e Commercio; ora, se mi è permesso esprimere un voto insieme ad una calda raccomandazione, io vorrei che potesse estendersi maggiormente tra i cacciatori e tra gl'ispettori forestali l'interesse nel lavoro della inchiesta, giacchè essi sono in posizione eccezionalmente buona per

fare osservazioni importantissime, e, in conseguenza, di dare notizie ornitologiche molto interessanti. Per ragioni facili a comprendersi, le persone che appartengono alle classi sopra rammentate, sia per conoscenza del soggetto, sia per stabilità di dimora, sono in posizione di fornire le notizie più estese e più complete; ho voluto perciò considerarle, come infatti sono, *collaboratori di prima categoria*.

Utili e talvolta importanti notizie, ma quasi assolutamente limitate ai problemi della migrazione degli uccelli e pur troppo nel più dei casi necessariamente d'indole molto generica, ponno esser raccolte dai semaforisti e dai fanalisti; sulle coste della Gran Bretagna e degli Stati Uniti d'America quel personale ha dimostrato coi fatti di essere in grado di fornire un interessante contributo alle indagini ornitologiche. Col consenso cordiale datomi dal Ministero dei Lavori Pubblici ed in seguito da quello della Marina dai quali dipendono quei servizi da noi, ho potuto avere la collaborazione dei fanalisti e semaforisti del nostro litorale. Anzi devo dire che questo fu il primo servizio per la inchiesta ornitologica che venne regolarmente a funzionare in Italia, e debbo per ciò speciali ringraziamenti alle Direzioni Generali dei Telegrafi e delle Opere Idrauliche. Già nell'autunno del 1885 ricevevo la prima mandata di *Moduli*, in questo caso speciali, colle osservazioni sul passaggio degli uccelli raccolte dai nostri semaforisti e fanalisti; e da quell'epoca mi pervennero regolarmente, malgrado il passaggio di uno di questi servizi ad altro Dicastero. Ho però deciso per varie ragioni, che non occorre qui dire, di serbare i risultati così ottenuti pel mio secondo Resoconto, quando potrò avere maggiori elementi e dati per coordinarli. Per la natura generica quasi sempre ed in ogni caso unilaterale delle notizie che ponno dare i semaforisti ed i fanalisti, ho creduto bene di riunirli come *collaboratori di seconda categoria*.

Di faccia al frontispizio di questo volume ho dato una carta geografica dell'Italia, sulla quale ho segnato in rosso le località ove abbiamo collaboratori, senza distinzione di categoria; si potrà così avere una esatta idea della distribuzione nel paese nostro delle *stazioni per le osservazioni ornitologiche*; alcune di queste vennero stabilite dopo la tiratura della suddetta carta, onde non vi figurano, ma sono poche. Uno sguardo a quella carta fa vedere quanto si avrebbe bisogno di accrescere il numero degli osservatori in alcune regioni, e specialmente nelle provincie peninsulari del mezzogiorno.

Passo ora a dare l'elenco, completo a tutt'oggi, dei collaboratori nella inchiesta ornitologica in Italia, disposti in ordine geografico nelle due categorie accennate: ho pure ricordato, come di dovere, alcuni pochi collaboratori di paesi limitrofi, non politicamente italici, ma che appartengono alla nostra regione zoo-geografica, i quali mi furono cortesi di notizie di speciale interessé per noi, per le quali sono ad essi cordialmente grato. Ho creduto utile il segnare con un asterisco i nomi di coloro i quali hanno anco dato notizie isolate citate in questo *Resoconto*, nonchè coloro i quali risposero in modo più completo, o completo del tutto, ai molti quesiti formulati; sono però in dovere di aggiungere che alcuni collaboratori, i cui nomi non sono così segnati, hanno già rinviato all'Ufficio ornitologico i *Moduli* colle osservazioni raccolte; ma questi mi pervennero troppo tardi per essere utilizzati in questo *Resoconto*, ordinato in modo, come è facile vedere, da non permettere sempre l'aggiunta di nuovo materiale. Le loro osservazioni saranno però pubblicate nel secondo *Resoconto* che seguirà, spero presto, il primo. Altri collaboratori aderirono da poco a prender parte alla inchiesta ornitologica, onde non ebbero ancora il tempo materiale per raccogliere e per registrare le loro osservazioni. Nel tempo scorso tra la con-

segna dei moduli e la stampa di questo Resoconto, cessarono di vivere alcuni dei miei collaboratori e sinceramente li rimpiango; una crocetta precede i loro nomi. Finalmente in questo elenco ho cercato di essere, per quanto mi fosse possibile esatto, e chieggo venia se qualche errore mi sia sfuggito nei nomi e nelle qualifiche delle persone citate; alcune qualifiche però sono intenzionalmente ommesse per brevità.

ELENCO DEI COLLABORATORI NELLA INCHIESTA ORNITOLOGICA

IN ITALIA.

A. Prima Categoria.

I. Sottoregione Continentale o Settentrionale.

Piemonte.

- Cuneo :** * Abre capitano Vincenzo. — *Cuneo*.
Natti Giuseppe, ispettore forestale. — *Cuneo*.
Manzoni Faustino. — *Brà*.
Liprandi Giuseppe, cancelliere. — *Alba*.
Sottero Adolfo. — *Alba*.
- Torino :** Derriard Maurizio. — *Aosta*.
Personnetaz Giuliano. — *Aosta*.
* Gasca Luigi. — *Torino*.
* Martorelli prof. Giacinto. — *Torino*.
De Antoni Felice, ispettore forestale. — *Torino*.
* Pezzi Luigi. — *Torino*.
* Marchisio Enrico. — *Torino*.
* Salvadori conte prof. Tommaso. — *Torino*.
* Bainotti Silverio. — *Torino*.
Balestro dott. Angelo. — *Torino*.
Comba prof. Benvenuto. — *Torino*.
Marcellino Giovanni. — *Villastellone*.

Alessandria: Monti Antonio, ispettore forestale. — *Alessandria*.

Barsanti Adelmo, ispettore forestale. — *Gavi*.

Fenelli dott. Mario. — *Gavi*.

* Camusso Nicolò, chimico farmacista. — *Vottaggio*.

Novara: † * Pertusi dott. cav. Alessandro. — *Domodossola*.

* Bazetta capitano Giulio. — *Domodossola*.

Pullè conte Giulio. — *Castelletto sopra Ticino*.

* Rodino cav. Giuseppe, ispettore forestale. — *Novara*.

* Guarinoni Giov. Andrea, sotto ispett. forest. — *Varallo*.

* Danisi Vito sotto ispett. forest. — *Piedimulera*.

* Demori Giuseppe, sotto ispett. forest. — *Crodo*.

Lombardia.

Sondrio: * Galli-Valerio Bruno. — *Sondrio*.

Cetti Giuseppe. — *Sondrio*.

Buzzi dott. Emilio. — *Bormio*.

Del Curto ing. Antonio. — *Piuro (Chiavenna)*.

Como: Marinelli Orazio. — *Como*.

* Nessi Carlo. — *Como*.

* Regazzoni prof. Innocenzo. — *Como*.

* Rosales Cigalini marchese Luigi. — *Como*.

* Bernasconi Giuseppe, parroco. — *Civiglio*.

* Cermenati, dott. Mario. — *Lecco*.

Vercelloni ragioniere Carlo. — *Lecco*.

* Ghizzoni capitano Giuseppe. — *Cesana, Brianza*.

* Senna Angelo. — *Colico*.

Bergamo: Stecchetti cav. ing. Filippo. — *Bergamo*.

* Stefanini Giovanni, preparatore. — *Bergamo*.

* Camozzi-Vertova conte G. B., senatore. — *Bergamo*.

Roncalli conte dott. Alessandro. — *Bergamo*.

Roncalli conte Francesco. — *Bergamo*.

Magretti dott. Paolo. — *Canonica d'Adda*.

Milano: * Bonomi Enrico, preparatore. — *Milano*.

Anderloni avv. Carlo. — *Milano*.

† * Borromeo conte Carlo. — *Milano*.

* Turati conte Ernesto. — *Milano*.

* Magni dott. Antonio. — *Milano*.

* Brambilla nob. Giuseppe. — *Castellanza (Gallarate)*.

Visconti conte Carlo. — *Milano*.

* Crespi Giovacchino. — *Besana Carate, Brianza*.

* Magretti Giuseppe. — *Paderno Dugnano, Monza*.

Pavia: * Pavesi prof. comm. Pietro. — *Pavia*.

Mazza dott. Felice. — *Varzi*.

Minelli cav. G. B., sindaco di *Corana*.

- Cremona:** * Ferragni Odoardo. — *Cremona*.
Santelli Carlo. — *Crema*.
Brescia: Bettoni dott. Eugenio. — *Brescia*.
Bettoni conte Lodovico. — *Brescia*.
Mantova: * Paglia prof. dott. Enrico. — *Mantova*.

Trentino.

- * Bonomi prof. Agostino. — *Rovereto*.

Veneto.

- Verona:** De Betta comm. Edoardo. — *Verona*.
* Mariacher prof. Giovanni. — *Verona*.
* Pellegrini Vittorio, ispett. forest. — *Caprino Veronese*.
Vicenza: * Molari Arturo, ispettore forestale. — *Vicenza*.
* Ferrari Gaetano, sotto ispettore forestale. — *Bassano*.
* Vittorelli nob. cav. dott. Andrea. — *Bassano*.
Trevisan dott. Roboamo. — *Altissimo*.
Belluno: * Tissi Enrico, sotto ispett. forest. — *Pieve di Cadore*.
Tomè Carlo. — *Agordo*.
Mosca Paolo. — *Frassené Agordo*.
* Delaito Valentino, sotto ispettore forestale. — *Feltre*.
* Soravia Pietro, ispettore forestale. — *Belluno*.
Udine: * Bayer Ruggero. — *Pontebba*.
Tacconi dott. Giuseppe. — *Pontebba*.
Pirona cav. prof. Giulio Andrea. — *Udine*.
Pecile prof. Domenico. — *Udine*.
* Vallon Graziano. — *Udine*.
Pincherle Edmondo. — *Udine*.
Cotta Angelo, sindaco di *Corno di Rosazzo*.
* Del Torre Francesco. — *Cividale*.
* Chiaradia onorevole Emidio. — *Sacile*.
Treviso: Castellani Vittorio. — *Treviso*.
Venezia: * Ninni conte dott. Alessandro P. — *Venezia*.
Berchet ing. Federigo. — *Fossalta di Pieve (Portogruaro)*.
Padova: * Arrigoni degli Oddi conte Ettore. — *Padova*.
Rovigo: * Dal Fiume Camillo. — *Badia Polesine*.

Istria.

- * Valle Antonio. — *Trieste*.

Dalmazia.

- * Kolombatovic prof. Giorgio. — *Spalato*.

Emilia.

Ferrara :

Ravenna : Betti comm. Gustavo, sindaco. — *Faenza*.

Morri Giuseppe. — *Faenza*.

Zorli dott. Alberto. — *Bagnacavallo*.

* Bacchi della Lega dott. Alberto. — *Bagnacavallo*.

Forlì : Manuzzi cav. ing. Ernesto. — *Forlì*.

Bologna : Sacenti Guglielmo. — *Bologna*.

Bolognini Pirro. — *Borgo Panigale, Bologna*.

Cominotti Giovanni. — *Bologna*.

* Bacchi Della Lega dott. Alberto. — *Bologna*.

Fiori prof. Andrea. — *R. Liceo, Bologna*.

* Lorenzini Demetrio. — *Bagni della Porretta*.

Pantaloni dott. Giuseppe. — *Casio Casola (Vergato)*.

Boldrini dott. Gaetano. — *Sala, Bolognese*.

Modena : * Picaglia dott. Luigi. — *Modena*.

Bertelli L. — *Montese (Pavullo)*.

Reggio :

Parma : * Del Prato dott. Alberto. — *Parma*.

Piacenza : Marazzani Visconti Terzi conte Lodovico. — *Piacenza*.

Marazzani conte Enrico. — *Piacenza*.

II. Sottoregione Peninsulare o Meridionale.

Nizzardo.

* Gal, fratelli. — *Nizza*.

Liguria.

Porto-Maurizio :

Genova : Maglioni marchese Marco. — *Andora*.

Lavagna cav. Giuseppe. — *Loano*.

Burone Lercari comm. Felice. — *Finalmarina*.

Baralis Ferdinando. — *Finalmarina*.

* Piccone cav. Enrico. — *Albissola Marina*.

Bormioli Severino. — *Altare*.

* Luciani dottor Costante. — *Arenzano*.

* Queirolo Salvatore. — *Cornegliano*.

* Doria marchese Giacomo. — *Genova*.

* Borgioli Brancalone. — *Genova*.

De Rossi Giuseppe. — *Genova*.

Pinelli-Gentile marchese Mino. — *Genova*.

- Genova :** Lagomaggiore cav. Giovanni. — *Chiavari*.
Repetto Giuseppe. — *Lavagna*.
* Carazzi dott. prof. Davide. — *Spezia*.
* De Lamotte Carlo. — *Sarzana*.

Toscana.

- Massa Carrara :** * De Stefani prof. Carlo. — *Garfagnana*.
Lucca : Minutoli conte Eugenio. — *Massaciuccoli, Massarosa*.
* Gragnani Raimondo. — *Quiesa, Massarosa*.
Spada-Cenami conti Luigi e Cesare. — *Lucca*.
* Martorelli prof. Giacinto. — *Lucca*.
* Fontebuoni cav. Angiolo. — *Lucca*.
Pisa : * Ott dott. Enrico. — *Fauglia*.
* Papasogli Giovanni. — *Lavajano, Lari*.
† * Degli Alessandri conte Cosimo. — *Cedri, Peccioli*.
* Venerosi Pesciolini conte Giuseppe. — *Ghizzano, Peccioli*.
Livorno : Castelli cav. dott. Federico. — *Livorno*.
Mantovani prof. Pio. — *Livorno*.
* De Lamotte Carlo. — *Livorno*.
Firenze : * Turchetti-Centofanti dott. Italo. — *Fucecchio*.
* Lenzi dott. Adolfo. — *Fucecchio*.
* Fucini dott. Davide. — *Dianella, Empoli*.
Del Vivo cav. dott. Emilio. — *Empoli*.
Biondi Antonio. — *Castelfalfi, Montaione*.
Forteguerri Niccolò. — *Pistoia*.
Niccoli ing. Raffaello. — *Castelfiorentino*.
Manzella Alberto. — *Prato*.
Amerighi nob. Amerigo. — *Casabianca (Mugello)*.
Liccioli cav. Filippo. — *Rufina (Pelago)*.
Tassinari cav. Alessandro. — *Rocca San Casciano*.
De' Pazzi nob. Pazzino. — *Firenze*.
* Ginori-Lisci march. Carlo. — *Doccia Sesto, Firenze*.
Rossi nob. Guido de'. — *Firenze*.
Tanari marchese Giuseppe. — *Firenze*.
Visani cav. Giuseppe. — *Firenze*.
Torrighiani march. Raffaello. — *Firenze*.
Caldini comm. avv. Raffaello. — *Firenze*.
* Gargioli Ugolino Desiderio. — *Fiesole, Firenze*.
* Roster Dante A. — *Firenze*.
* Fontebuoni cav. Angiolo. — *Sesto, Firenze*.
Fossi cav. Antonio. — *Firenze*.
Renault cav. Arturo. — *Firenze*.
* Pauer nob. Giuseppe. — *Firenze*.

- Firenze:** Niccolini march. Eugenio. — *Firenze*.
Grassi dott. Antonio. — *Firenze*.
Azzolino march. Piero. — *Firenze*.
Passerini conte Napoleone. — *Firenze*.
Cantagalli comm. Romeo. — *Firenze*.
* Paulucci march. Marianna. — *Novoli e Reggello, Firenze*.
Marzichi cav. Tedaldo. — *Firenze*.
Tanfani dott. Enrico. — *Firenze*.
Rosselli del Turco marchese Orazio. — *Firenze*.
Scaramucci cav. Francesco. — *Firenze*.
Municchi comm. Leopoldo. — *Firenze*.
Capponi march. Scipione. — *Firenze*.
* Magnelli Riccardo. — *Firenze*.
* Giglioli prof. Enrico H. — *Firenze*.
Arezzo: De S^t. Remy barone H. F. — *Bibbiena*.
* Fiorini Pietro. — *Camaldoli, Poppi*.
* Beni cav. avv. Carlo. — *Stia*.
* Pauer nob. Giuseppe. — *Casentino*.
Collacchioni cav. G. B., senatore. — *Borgo San Sepolcro*.
Brizzolari prof. Alessandro. — *Arezzo*.
De' Giudici Albergotti marchese Angiolo. — *Arezzo*.
* Gentili cav. Alessandro. — *Subbiano*.
* Dini D. Lorenzo. — *Subbiano*.
* Arrighi-Griffoli nob. Giacomo. — *Lucignano*.
Siena: * Dei prof. Apelle. — *Siena*.
Magni-Griffi nob. prof. Francesco. — *Siena*.
Pieri-Nerli march. Antonio. — *Siena*.
Brogi cav. Sigismondo. — *Siena*.
De Grolée Virville march. Leone. — *Montepulciano*.
* Pauer nob. Giuseppe. — *Montepulciano*.
* Paulucci marchesa Marianna. — *Monte a Puliciano San Gimignano*.
* Marri Ezio. — *San Gimignano*.
* Bargagli conte Piero. — *Sarteano*.
Grosseto: Rotondi dott. Felice. — *Castiglion della Pescaia*.
* Cambi notaro Elvidio. — *Gavorrano*.
* Ademollo cav. dott. Alfonso. — *Grosseto*.
* Bianchi dottore Onorato. — *Isola del Giglio*.
* Dei prof. Apelle.

Umbria.

- Perugia:** Moriniello cav. Giovanni ispett. forest. — *Perugia*.
Batelli prof. dott. Andrea. — *Perugia*.

Perugia : Patrizi march. Pietro. — *Castiglion del Lago*.
Pedoni Luca. — *Città di Castello*.

Marche.

Ascoli : Salvadori conte ing. Alfredo. — *Porto San Giorgio*.
Macerata : Baggi Giuseppe. — *Macerata*.
Ancona : * Paolucci prof. Luigi. — *Ancona*.
* Comizio Agrario. — *Fabriano*.
Boidi Secondo. — *Sinigallia*.
Pesaro : Bracardi Guglielmo. — *Pesaro*.
Mamiani conte Cesare. — *Pesaro*.
Speranzini rev. prof. Giuseppe. — *Urbino*.
* Di Carpegna conte Guido. — *Carpegna, Urbino*.

Lazio.

Roma : Caetani D. Onorato duca di Sermoneta. — *Roma*.
Saglione dott. comm. Carlo. — *Roma*.
Gherardini cav. Giovanni. — *Roma*.
Molaro cav. Luigi. — *Roma*.
Sani capitano Paolo. — *Roma*.
* Mimmi cav. Mario. — *Montefiascone, Viterbo*.
Pusalari Lodovico. — *Civitella di Agliano, Viterbo*.

Abruzzi.

Teramo : Delfico cav. Troiano, senatore. — *Montesilvano*.
Aquila : Angelini Luigi. — *Aquila*.
Chieti : Gambardella Giosuè. — *Chieti*.
Campobasso : * D'Amico Teodosio. — *Ielsi*.
Simirlo Vincenzo. — *Ielsi*.
Olivieri Carlo. — *Campobasso*.
Rossi Gennaro. — *Campodipietra, (Molise)*.
Ceva Grimaldi marchese Marcello. — *Montorio nei Frentani*.

Campania

Benevento :
Caserta : Avellino Giulio. — *Caserta*.
Napoli : Baracco barone Roberto. — *Napoli*.
* Monticelli nob. dott. Francesco S. — *Napoli*.
* Praus Franceschini Carlo. — *Napoli*.
* Cerio dott. Ignazio. — *Capri, isola di Capri*.
Sodano Antonio. — *S. Anastasia Vesuviana*.

- Avellino:** De Stefano dott. Annibale. — *Grottolella*.
Schenardi Andrea. — *Avellino*.
Anzani cav. Luigi. — *Ariano*.
Marino Clemente. — *Sant' Angelo dei Lombardi*.
Salerno: Grandino Alfonso. — *Salerno*.
Giordano prof. Matteo. — *Salerno*.

Puglie.

- Foggia:**
Bari: * De Romita prof. Vincenzo. — *Bari*.
Di Tullio Saverio. — *Bari*.
Müller prof. Domenico. — *Trani*.
Cacace Domenico. — *Monopoli*.
Lecce: Genovesi dott. Filippo. — *Genosa*.
Casavola Francesco Paolo. — *Martina Franca*.
Gigli Giovanni. — *Maruggio*.
Cavallo Francesco Paolo. — *San Marzano di S. Giuseppe*.
Tamborini Achille, senatore. — *Maglie Gallipoli*.

Basilicata.

- Potenza:** Salini Luigi. — *Potenza*.
Martuscelli dott. Luigi. — *Muro Lucano, Melfi*.

Calabrie.

- Cosenza:** Accattatis cav. Antonio. — *Cosenza*.
Catanzaro: Avellino Carlo. — *Catanzaro*.
* De Fiore Carlo. — *Maida*.
* Lucifero marchese Armando. — *Cotrone*.
Reggio: * Moschella Giuseppe. — *Reggio*.
* Moretti dott. Francesco Sofia. — *Radicina*.

III. Sottoregione Insulare.

Sicilia.

- Messina:** * Sole Nicola ispett. forest. — *Messina*.
* Angelini prof. Giovanni. — *Messina*.
* Ruggeri Antonio. — *Messina*.
* Pistone avv. Antonino. — *Messina*.
Catania: Grassi prof. G. B. — *Catania*.
Racah prof. dott. Vittorio. — *Catania*.
Siracusa: Baronello Iudico Gabriele. — *Palazzolo Acreide*.
* Bonfiglio prof. Giovanni. — *Lentini*.

- Siracusa:** Conti Vincenzo. — *Lentini*.
Italia dott. Giorgio. — *Buscemi*.
Avolio prof. Corrado. — *Noto*.
Grimaldi cav. Enrico. — *Modica*.
* Dellafonte cav. prof. Luigi. — *Modica*.
* Garofalo prof. Orazio. — *Modica*.
Rizzone Corrado. — *Modica*.
Caltanissetta: * Carvana nob. cav. Giuseppe. — *Terranova*.
Girgenti:
Palermo: Doderlein comm. prof. Pietro. — *Palermo*.
* Giannattasio Vincenzo ispett. forest. — *Palermo*.
* Minà Palumbo dott. Francesco. — *Castelbuono*.
* Morici Minà M. — *Castelbuono*.
Trapani: Valenza cav. dott. Francesco. — *Pantellaria (isola)*.

Malta.

- * Pulis G. Abela. — *Lavalletta*.
Gulia prof. Gavino (R. Università). — *Lavalletta*.

Sardegna.

- Sassari:** Fanzago prof. Filippo. — *Sassari*.
Cagliari: Lepori prof. Cesare. — *Cagliari*.
Meloni Stefano. — *Cagliari*.
* Bonomi Pietro. — *Cagliari*.
-

B. Seconda Categoria.

SEMAFORISTI E FANALISTI.

I. Sottoregione Continentale o Settentrionale.

Veneto.

- Venezia:** Galeppi Vitantonio, semaf. — *Torre dei Piloti, Alberoni*.
Rovigo: I Fanalisti di *Punta della Maestra*.

Emilia.

- Ferrara:** Montagnani Paolo, fanal. — *Po di Goro e Gorino*.
Ravenna: Ferilli Francesco, semaf. — *Po di Primaro*.

II. Sottoregione Peninsulare o Meridionale.

Liguria.

- Genova:** Ferrero Vincenzo, fanal. — *Capo Mele*.
Tubino Giov. Batt., semaf. — *San Benigno*.
Niesi Alfonso, semaf. — *Portofino*.
Calogero Romualdo, semaf. — *Portofino*.
Caffero Paolo, semaf. — *Isola di Palmaria*.
Canale Antonio, fanal. — *Isola del Tino*.

Toscana.

- Lucca:** Landucci Federico, fanal. — *Viareggio*.
Livorno: Delsordo Gaetano, semaf. — *Piombino*.
Corona Luigi, semaf. — *Piombino*.
Ghelardi Pasquale, fanal. — *Portoferraio*.
Rutigni Silvio, fanal. — *Isola di Pianosa*.
Grosseto: Cacace Luigi, semaf. — *Monte Argentario*.
Rispoli Gaetano, fanal. — *Port' Ercole*.
Bancalà Domenico, fanal. — *Isola del Giglio (N)*.
Petinelli, fanal. — *Isola del Giglio (S)*.
Zoi Pietro, fanal. — *Isola di Giannutri*.
Bartolommei Giuseppe, fanal. — *Scoglio Africa (Formica di Montecristo)*.
Retali Giuseppe, fanal. — *Scoglio Africa (Formica di Montecristo)*.

Marche.

- Ancona:** Papalini, fanal. — *Cappuccini (Ancona)*.
Vacca Paolo, semaf. — *Cappuccini (Ancona)*.
Abbate Emanuele, semaf. — *Monte Conero (Ancona)*.
Caucci Autero, semaf. — *Monte Conero (Ancona)*.
Nordio Pietro, semaf. — *Monte Conero (Ancona)*.

Lazio.

- Roma:** Salvati Alfonso, semaf. — *Torre Chiaruccia (Civitavecchia)*.

Campania.

- Caserta:** Montesanto Pasquale, semaf. — *Isola di Ponza*.
Cacace Salvatore, semaf. — *Isola di Ventotene*.
Rossi Prisco, fanal. — *Santa Caterina (Gaeta)*.

- Napoli:** Giudice Michele, semaf. — *Forio d'Ischia*.
 Cafiero Lorenzo, semaf. — *Isola di Procida*.
 Ferrante Gennaro, semaf. — *Isola di Capri*.
 Ferrara Giuseppe, semaf. — *Massa Lubrense*.
Salerno: Liguori Luigi, fanal. — *Capo d' Orso (Salerno)*.
 Albano Pasquale, fanal. — *Punta Citara (Vietri e Fuenti)*.
 Giordano Giuseppe, fanal. — *Salerno*.
 Montesanto Pietro, fanal. — *Capo Palinuro*.

Puglie.

- Foggia:** Montesanto Giuseppe, semaf. — *Isola di Tremiti*.
 De Filippis Matteo, semaf. — *Torre Mileto (Gargano)*.
 D'Amaro Luigi, semaf. — *Torre Mileto (Gargano)*.
 Maresca Davide, semaf. — *Viesti (Gargano)*.
 Deamicis Daniele, semaf. — *Viesti (Gargano)*.
 Cibelli Lorenzo, semaf. — *Monte Saraceno (Gargano)*.
Bari: Grassi Matteo, fanal. — *Molfetta*.
 Maldari Francesco Paolo, semaf. — *Bari*.
 Tortora Michele, fanal. — *Torre Penna, Capo Gallo (Brindisi)*.
 Lanzone Stanislao, fanal. — *Le Pedagne (Brindisi)*.
 Ferilli Andrèa, semaf. — *Brindisi*.
Lecce: Bartoloni Napoleone, fanal. — *Punta S. Cataldo*.
 Bertelli Ferdinando, fanal. — *Punta Palascia (Otranto)*.
 Monteduro Pasquale, semaf. — *Punta Palascia (Otranto)*.
 Calzolaro Francesco, fanal. — *Santa Maria di Leuca*.
 Zaccaro Giovanni, semaf. — *Santa Maria di Leuca*.
 Laurentaci Quintino, fanal. — *Isola Sant' Andrea (Gallipoli)*.
 Giungato Luigi, fanal. — *Porto di Gallipoli*.
 Pascucci Icilio, fanal. — *Capo S. Vito (Jonio)*.
 D'Andria Francesco, fanal. — *Isola S. Paolo (Taranto)*.
 Di Lauro Giuseppe, fanal. — *Isola S. Paolo (Taranto)*.

Calabrie.

- Reggio:** Incorpora Salvatore, semaf. — *Capo Spartivento*.
 Cacace Leopoldo, semaf. — *Capo Spartivento*.
 Caraffa Basilio, semaf. — *Capo Spartivento*.
 Barbara Giuseppe, semaf. — *Capo d' Armi*.
 Caraffa Basilio, semaf. — *Capo d' Armi*.

III. Sottoregione Insulare.

Sicilia.

- Messina:** Perelli Giovanni, fanal. — *Isola Salina*.
 Liello Domizio, fanal. — *Pignataro, Is. Lipari*.

- Messina:** Liello Giovanni, fanal. — *Isola Vulcano*.
Imbruglia Stefano, fanal. — *Capo Milazzo*.
Foti Paolo, fanal. — *Porto di Milazzo*.
Ursino Giuseppe, fanal. — *Capo Peloro*.
Aiello Rocco, fanal. — *Forte Campana S. Salvatore (Messina)*.
Scolarici Gaetano, fanal. — *S. Ranieri (Messina)*.
Ocello Giovanni, fanal. — *Punta Secca (Messina)*.
Panella Fortunato, semaf. — *Taormina*.
- Siracusa:** Avolio Platone, fanal. — *Punta Santa Croce (Augusta)*.
Belluso Domenico, fanal. — *Poggio Cantara (Augusta)*.
Napoli Rosario, fanal. — *Penisola Magnisi (Siracusa)*.
Bufarderi Vincenzo, fanal. — *Penisola Magnisi (Siracusa)*.
Ricupero Giuseppe, fanal. — *Forte Maniaci (Siracusa)*.
Alaimo Angelo, fanal. — *Capo Murro di Porco*.
Maisano Francesco Antonio, fanal. — *Capo Cozzo Spadaro*.
D'Urso Giuseppe, semaf. — *Capo Cozzo Spadaro*.
Miceli Francesco, fanal. — *Isola Capo Passaro*.
Maisano Carlo, fanal. — *Isola delle Correnti*.
Caccavone Epifanio, fanal. — *Capo Scalambri*.
- Palermo:** Lauro Francesco, semaf. — *Monte Pellegrino*.
- Trapani:** Ferrara Giuseppe, semaf. — *Isola Favignana*.
De Vita Gaspare, semaf. — *Isola Favignana*.
Deamicis Daniele, semaf. — *Isola Favignana*.
Canino Carlo, semaf. — *Isola Favignana*.

Sardegna.

- Cagliari:** Borrelli Carmine, semaf. — *Capo Spartivento*.
- Sassari:** Nieddu Pietro, semaf. — *Golfo Aranci (Capo Figari)*.

Debbo ora dire qualche cosa sul metodo che ho seguito nella compilazione di questo *Resoconto*; non fu davvero tanto facile la scelta, e soltanto in seguito a maturo esame dovetti convincermi che il modo più logico da seguirsi era quello di ripartire il grosso materiale raccolto in tre grandi capitoli. Nel primo dò un elenco in ordine scientifico delle specie di uccelli che fanno parte della *Avifauna Italiana*, intercalando al loro posto diverse nuove per l'Italia, scoperte cioè dopo la pubblicazione della mia AVIFAUNA, e collocando sotto la intestazione di ogni sin-

gola specie e dei nuovi nomi volgari per essa avuti, le notizie generali e più interessanti che la riguardano come risultano dalle osservazioni raccolte per la inchiesta, classificando poi queste notizie, volta per volta, in ordine geografico; così diventa facile il sapere in quali condizioni una data specie vive o si trova nelle varie provincie italiane. Nel capitolo che segue, ho riunito in ordine geografico i risultati della inchiesta nelle singole provincie e ho dato gli elenchi provinciali o distrettuali facendoli precedere dai cenni fisiografici sul distretto delle osservazioni tracciati da quasi tutti i collaboratori che hanno risposto complessivamente ai quesiti proposti. Consultando questo capitolo si avrà un quadro, in qualche caso molto completo, delle *Avifaune* delle singole provincie. Infine in un altro grande capitolo ho riunito tutte quelle notizie che sono d' indole generale, così quelle che riguardano la muta o le variazioni accidentali nel colore delle penne, le deformazioni, gli ibridismi, le migrazioni, la nidificazione, l'alimentazione, la statistica numerica ecc.; e qui ho mantenuto l'ordine seguito nel questionario dato nella mia AVIFAUNA ITALICA e nei *Moduli* distribuiti. Sebbene neppure la metà dei collaboratori abbia sinora risposto, tale è la quantità delle osservazioni raccolte che, prevedo, dovrò ripartirle in due volumi.

Un'ultima considerazione e poi finisco: non posso concludere questa mia introduzione senza far cenno di un'opera assai importante sulla Ornitologia italiana, che venne alla luce pochi mesi dopo la pubblicazione della mia AVIFAUNA ITALICA: intendo parlare dell'opera notevole del mio carissimo amico e collega conte Tommaso Salvadori, che ha per titolo *Elenco degli Uccelli italiani*, stampato negli *Annali* del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, volume III, della serie seconda con data del 1887. In questo suo lavoro il chiaro Ornitologo ha parole molto lusinghe

ghiere per me e per ciò che ho saputo e potuto fare nel cercare di completare la nostra conoscenza dell'*Ornis italica*; parole anche in parte dovute all'antica amicizia che ci unisce e che nessuna disparità di opinioni potrà mai menomare. Io sono perciò doppiamente grato all'amico e collega ed approfitto di questa occasione per rinnovargli i miei ringraziamenti. Dopo questo è ben naturale che io esprima sincero il dispiacere di non trovarmi sempre in accordo con lui: non solo la classazione seguita dal Salvadori è ben diversa da quella che io ho adottato nella mia AVIFAUNA ITALICA, e che, ritenendola sempre la migliore (non è poi tutta, del resto, farina del mio sacco), mantengo in questo *Resoconto*; ma non siamo del medesimo avviso intorno alla nomenclatura di non poche specie. Certamente questo non è bene, ma è inevitabile perchè dobbiamo pur troppo persuaderci che, per ora almeno, è una utopia il credere che si possa raggiungere una nomenclatura scientifica uniforme. Confesso che per qualche tempo fui sedotto dal sogno dorato di poter raggiungere od avvicinare almeno quella ideale uniformità, e quando compilai la mia AVIFAUNA ITALICA dedimai vari mesi ad una profonda indagine intorno alla nomenclatura delle nostre specie di uccelli; ma venne per me pure la disillusione colla comparsa dell'Elenco del Salvadori. Volli allora fare ancora un nuovo tentativo per giungere possibilmente, se non altro, ad una uniformità relativa, e dedimai non breve tempo ad una nuova indagine sulle specie per le quali Salvadori ed io avevamo adottato nomi differenti; ma dovetti convincermi che, nei pochi casi in cui per me v'era dubbio, le ragioni che mi avevano persuaso ad usare il nome adottato nella mia AVIFAUNA ITALICA valevano almeno quanto quelle che avevano indotto l'amico Salvadori ad adoperare un nome diverso nel suo lavoro. Onde ora, nel nuovo elenco che darò, meno qualche piccola eccezione, non ho

creduto di dover mutare nomenclatura. Ho pensato però che fosse utile, nei casi di divergenza, il dare anche il nome adottato dal Salvadori, e l'ho posto sotto quello che io ritengo migliore, come feci nella mia AVIFAUNA ITALICA pei nomi usati dai signori E. von Homeyer e V. Tchusi zu Schmidhoffen nel loro Elenco degli Uccelli dell' Austria-Ungheria, dato per modello al Congresso Ornitologico di Vienna.

Infine il Salvadori ha dato direi quasi il suo *veto*, ossia ha espresso un dubbio intorno alla convenienza di considerare come italiane alcune specie che io ho creduto di poter annoverare come tali, giunte accidentalmente in Italia; alle obbiezioni del collega ed amico ho risposto volta per volta, ove tratto delle specie in quistione onde qui non ho altro da aggiungere in proposito.

Passo ora senz'altro al primo capitolo del *Resoconto* dei risultati sinora ottenuti nella inchiesta ornitologica, cioè all'Elenco degli uccelli sedentarî, stazionarî o di passaggio in Italia, coi nuovi nomi volgari e le notizie raccolte dai vari collaboratori distribuiti in ordine geografico per sottoregioni e provincie.

I.—AVIFAUNA ITALICA.

AVES CARINATÆ.

ÆGITHOGNATHÆ.

PASSERES - OSCINES.

CORVIDÆ

(Corvi).

1. *Corvus Corax*, Linn. (ex Rzac.)

CORVO MAGGIORE.

Crouas, Cournajas real, Cornàgg, Crovu (*Basso-Piem.*) — Crovasc, Cornac, Scurlbat, Cheury, Courv, Croass (*Novara*) — Corv gross (*Valt.*) — Croff gros (*Bergamo*) — Cro, Corzh (*Feltre*) — Corvón de montagna (*Padova*) — Corvo da croda (*Cadore*) — Croat (*Sacile*) — Crovo (*Savona*) — Crovo imperiale (*Arenzano*) — Corvo, Crovo (*Spezia*) — Corvo marino (*Maremma*) — Corvo (*Campobasso*) — Cuervo (*Bari*) — Corbo reale (*Calabr.*) — Corvu imperiali (*Messina*) — Cruvacchiu (*Terranov. Sicil.*).

Piemonte: Scarso in montagna e sedentario nella prov. di Cuneo; nidifica in marzo e alleva una sola covata (*Libre*). Osservato una volta da me nella prov. di Torino, nella Valle di Viù (*Martorelli*). Nella prov. di Alessandria, di-

stretto di Voltaggio, vedesi irregolarmente e solo negli inverni più rigidi (*Camusso*). Nella prov. di Novara è raro sui monti di Ossola (*Bazetta*); non comune, ma sedentario e nidificante nei distretti di Varallo e Piedimulera (*Guarionni*, *Danisi*); di scarso passo autunnale nel distretto di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Nella prov. di Sondrio non è comune, vive sui monti e scende di rado al piano (*Galli*). Nella prov. di Bergamo è scarsissimo sugli alti monti (*Stefanini*). Comune ai monti in Lombardia (*Turati*), scarso e sedentario (*Borromeo*).

Veneto: Nel Trentino è specie rara che scende nelle valli solo nel forte dell'inverno (*A. Bonomi*). Sedentario e comune nel distretto di Caprino Verona, nidifica sul Monte Baldo (*Pellegrini*). Sedentario ai monti nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Scarso ed erratico nel Cadorè, Belluno, ove nidifica tra le rupi (*Tissi*); scarso ed erratico e soltanto invernale nel distretto di Feltre (*Delaito*). Scarso nella prov. di Udine, ove è erratico nell'autunno (*Vallon*); nel distretto di Cividale una coppia da anni nidifica su di una rupe presso Prestento, nel febbraio (*Del Torre*). Rarissimo nella prov. di Padova, uno ucciso il 19 gennaio 1886 sul monte Verde, colli Euganei, è nella raccolta del dott. Prosdocimi di Este (*Arrigoni*).

Liguria: Scarso e sedentario ai monti nel Nizzardo (*Gal.*). Avventizio d'inverno nel distretto di Savona (*Piccione*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Di rara comparsa nel distretto di Spezia; sedentario sulle Alpi Apuane (*Carazzi*).

Toscana: Sedentario, ma scarso sugli alti monti della prov. di Lucca (*Martorelli*). Raro, ma sedentario ai monti nel Casentino, Arezzo (*Fiorini*). Non raro d'inverno al piano nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Scarso, ma sedentario ai monti nella prov. di Grosseto (*Ademollo*). Sedentario sull'isola di Giglio (*Bianchi*). In Toscana è sedentario e scarso ai monti, nel 1883 vidi due nidiacei catturati presso Barberino di Mugello (*Roster*).

Marche: Raro, ma sedentario (*Comizio Agrario di Fabriano*). Sulle roccie del Sasso di Simone, Urbino, vive sedentaria una coppia di questa specie (*Carpegna*).

Abruzzi: Scarso, ma sedentario ai monti nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Sedentario, ma scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Stazionario e scarso nelle regioni elevate (*De Romita*).

Calabrie: Sedentario, ma scarso, sui monti nella prov. di Catanzaro, distretto di Maida (*De Fiore*). Così nella prov. di Reggio, ove ebbi i nidiatei nel giugno (*Moschella*).

Sicilia: Sedentario, più comune ai monti nella prov. di Messina, ove alleva una sola covata di 2 o 3 tra giugno e luglio (*Ruggeri*); tra gennaio e febbraio (*Pistone*). Frequente nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Sedentario e frequente ai monti ed al piano nel distretto di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Così in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente ovunque e sedentario nel distretto delle Madonie, Palermo; era una volta più abbondante, nidifica in maggio (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario, specialmente in luoghi paludosi, in tutta l'isola (*Bonomi*). Vive in colonie e sovente scende al piano (*Salvadori*). È così anche in Corsica (*Giglioli*).

2. *Corvus Corone*, Linn.

CORNACCHIA NERA

Corvo reale (*Aut. Ital.*) — Crôv, Crovâs, Cornágg, Crôvu Curnáj (*Basso-Piem.*) — Çòre (*Friuli*) — Crouas neigro (*Novara*) — Croff negher (*Berg.*) — Cornazh, Cornazha (*Feltre*) — Corniola (*Adore*) — Gróla, Córvo (*Padova*) — Graiglia (*Nizza*) — Crovo (*Spezia*) — Corvestrun (*Garf.*) — Córbo, Corvu (*Calabria*) — Crobu nieddu (*Sard.*).

Piemonte : Frequente in montagna ove nidifica in aprile, allevando una sola covata; d'inverno scende al piano, nella provincia di Cuneo (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*). Nella valle di Gressonay dove i fianchi della montagna si fanno più scoscesi un grandissimo numero di questi uccelli furono da me osservati nel luglio 1884. Potei catturarne uno, giovane ancora nidiaceo, e così ebbi certezza della nidificazione di questa specie in Piemonte (*Martorelli*). Nel territorio di Voltaggio compare soltanto negli inverni più crudi; raramente annida, agli alti monti (*Camusso*). Nidifica nella Valsesia in aprile, diventa erratica nell'inverno (*Guarinoni*).

Lombardia : Nella prov. di Bergamo è frequente sugli alti monti (*Stefanini*). Invernale e non comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune d'inverno in quella di Mantova (*Paglia*). In Lombardia è comune ai monti (*Turatti*); scarso, vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto : Valicando il Brennero il 29 agosto 1887, notai grossi stormi di questa specie nei prati, tanto sul lato italico che sul lato germanico di quel passo alpestre. Il professore A. Bonomi di Rovereto lo nota come invernale e comune nel Trentino (*Giglioli*). Nel Cadore, Belluno, è frequente, nidifica ai monti e diventa erratica nell'autunno (*Tissi*); invernale soltanto nel distretto di Feltre (*Delaito*). Abbastanza frequente nella prov. di Udine, nidifica sui monti della Carnia (*Vallon*); nidifica sul Matajur nel distretto di Cividale nei cespugli di quelle roccie scoscesi, in stormi innumerevoli; sverna al piano (*Del Torre*). Frequente d'inverno nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Erratica e poco frequente nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*).

Liguria : Sedentaria ai monti nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona passa dalla fine d'ottobre ai primi del dicembre e anche d'inverno col gran freddo; ripassa in marzo (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarsa d'autunno o d'inverno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Sedentaria sugli alti monti lucchesi, ne vidi presso Galliciano da luglio a settembre ed a Prato Fiorito in settembre (*Martorelli*). Accidentale nella prov. di Firenze, ove una fu uccisa a Calcinaia, Greve, nell'ottobre 1874 (*Giglioli*). Rara assai nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

Marche : Rara (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania : Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Calabrie : Sedentaria, ma scarsa nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Non rara nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sardegna : Invernale al piano, l'ho osservata ovunque frammista al *C. Corax* ed alla Taccola (*Bonomi*).

3. *Corvus Cornix* Linn. (ex Gesn.)

CORNACCHIA BIGIA.

Croas bianch, Crov, Crôvu, Cornágg (*Basso-Piem.*) — Scurbat, Cheury, Cornaja, Cornass bastone, Cornaja molinara (*Novara*) — Çòre, Cornila, Cornile (*Friuli*) — Cornagia grisa (*Berg.*) — Cornacchia (*Vicenza*) — Corf del mantel (*Bel-luno*) — Corvo biso o da bosch (*Cadore*) — Cornazh, Cornazha (*Feltre*) — Grôla, Córvo, Cornácia, Grola zenerina (*Padova*) — Graiglia (*Nizza*) — Crovo seneinn (*Arenzano*) — Corvo, Crovo (*Spezia*) — Cornaggia (*Savona*) — Ciavola (*Campobasso*) — Corbo ianco (*Calabr.*) — Corvu jancu (*Mess.*) — Ciàula matisa (*Lentini*) — Curnacciu (*Modica*) — Ciaula maltisa, Curnacchia (*Terran. Sicil.*) — Carroga (*Sard.*) —

Piemonte : Frequente ai monti, ove nidifica in aprile; e d'inverno al piano, nella prov. di Cuneo (*Abre*). Nella prov. di Torino è frequente (*Martorelli, Gasca*); uccisi nell'inverno 1879 un ibrido tra questa specie ed il *C. Corone* (*Gasca*). Prettamente invernale nel Basso Piemonte (*Camusso*). Rarissima nell'Ossola (*Bazetta*). Nidifica nella Valsesia in

aprile, diventa erratica nell'inverno (*Guarinoni*); rarissima di passo autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Comune nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa sui monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Scarsa in quella di Milano (*Brambilla*). Piuttosto frequente e sedentaria nella prov. di Cremona; ebbi due volte ibridi tra questa specie ed il *C. Corone* (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Specie invernale e comune nel Trentino (*A. Bonomi*). Comune nel distretto di Caprino nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, e sedentaria ai monti nella prov. di Vicenza (*Molvi*). Nel Cadore, Belluno, è frequente ovunque e nidificante (*Tissi*); è pure così e sedentaria nel distretto di Feltre (*Delaito*). Frequente ovunque nel Friuli (*Vallon*); ove è sedentaria (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova ove frequenta i luoghi aquitrinosi (*Arrigoni*). Scarsa, ma sedentaria nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Nidificante ed erratica nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Specialmente invernale nel Nizzardo (*Gal*). Di comparsa irregolare nell'autunno ed inverno nel distretto di Savona (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove però è frequente (*Luciani*). Scarsa, ma sedentaria nel distretto di Spezia (*Corazzi*).

Toscana : Comune e sedentaria al piano nel distretto di Massarosa (*Gragnani*); poco frequente nella prov. di Lucca (*Fontebuoni*). Di passo nel distretto di Fauglia (*Ott*); scarso e sedentario in quelli di Lavajano e Ghizzano. Pisa (*Papasogli*, *Venerosi*). Nella prov. di Firenze è frequente in marzo e ottobre-novembre nei distretti di Fiesole, Sesto fiorentino e Signa (*Gargioli*, *Fontebuoni*). Non rara e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Comune assai, sedentaria e di passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentaria nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano, ove è pure di passo in ottobre (*Paulucci*,

Marri). Comune e sedentaria nel Senese e nel Grossetano (*Dei, Ademollo, Cambi*). In Toscana è sedentaria ma scarsa; più comune d'inverno pei branchi d'individui immigranti (*Roster*).

Marche: Comune ai monti (*Paolucci*).

Lazio: Non abbondante, ma sedentaria e nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Scarsa ai monti nell'inverno nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D' Amico*).

Campania: Sedentaria e frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentaria e nidificante, ma non frequente (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria e abbastanza frequente nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Sedentaria ai monti nella prov. di Messina, specialmente abbondante in quel di Mistretta (*Ruggeri, Pistone*). Frequente nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Comune e sedentaria nel distretto di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Sedentaria, ma non abbondante, ai monti in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Sedentaria al piano, ma scarsa nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Sedentaria e comunissima ovunque al piano, frequenta le spiagge marine e si nutre di pesci e molluschi (*Bonomi*).

4. *Corvus frugilegus* Linn. (ex Aldrov.)

CORVO.

Crôv, Cornágg, Crôvu, Curnáj (*Basso-Piem.*) — Corv (*Valt.*) — Crovatt, Corvatt (*Friuli*) — Cro, Corzh (*Feltre*) — Scorbat, Cheurv, Quagnà, Cruasc (*Novara*) — Croff, Cornagia negra (*Berg.*) — Gröla (*Mantov.*) — Mnacia (*Ravenna*) — Córvengher (*Bologna*) — Graiglia (*Nizza*) — Goa (*Savona, Arenza-*

non — Corvo, Crovo (*Spezia*) — Corbo (*Pisa*) — Graccio (*Lucca*)
 — Cornacchia nera (*Campobasso*) — Ciaola, Craula (*Napoli*)
 — Ciavula, Cuorvu, Corbo (*Calab.*) — Corvu di passa (*Mess.*)
 — Cruvacchiu (*Lentini*) — Ciaula piemuntisa (*Spaccaforno*)
 — Ciaula (*Terran. Sicil.*) — Cuvettu, Cuvettu piemuntisi
 (*Modica*) — Paula, Ciaula, Ciavula, Curnacchia (*Terranova*
Sicilia) — Carroga (*Sard.*).

Piemonte: Frequente d'inverno al piano nella prov. di Cuneo; di passo in novembre (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Di tutti i Corvi è quello che più abbondantemente si mostra nell'inverno nel Basso Piemonte; agli alti monti credo nidifichi non raramente (*Camusso*). Comune di passo nell'Ossola (*Bazetta*). Di passaggio ed erratico nel distretto di Piedimulera (*Danisi*); sedentario in quello di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comunissimo nella prov. di Sondrio, vive al piano, ha nidificato in Valtellina nel 1885 (*Galli*). Frequente d'inverno al piano nella prov. di Bergamo; sembra essere anco specie sedentaria nella provincia (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Abbondante dall'ottobre al marzo nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Invernale e frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Mi ricordo fin da ragazzo che questa specie si vedeva soltanto dai primi di ottobre nelle Giudicarie (Trentino); saranno circa quattro anni che qualche coppia vi rimane a nidificare, così chè quando vado colà a passare le vacanze (agosto e settembre) ne vedo ora sempre in discreto numero, sinora però non potetti procurarmi il nido (*A. Bonomi*). Abbonda nel distretto di Caprino nella prov. di Verona, sembra esservi anco sedentario (*Pellegrini*). Frequente, erratico e nidificante nella prov. di Vicenza (*Molari*); di passo (*Ferrari*). Frequente al piano ed in collina nel Cadore, Belluno, vi nidifica (*Tissi*); è pure abbondante e sedentario nel distretto di Feltre, nidifica in giugno sugli abeti

in alto (*Delaito*). Invernale soltanto nel Friuli, ove vedesi a branchi (*Vallon*); assai scarso nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Abbondante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune nell'inverno al piano nelle prov. di Ravenna e Bologna, vi giunge in ottobre (*Bacchi della Lega*); poco frequente nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Comune nella prov. di Parma, sedentaria (?) (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona si vede dalla metà di ottobre a tutto novembre; ripassa in marzo (*Piccone*); così in quello d'Arenzano, ove è più frequente nell'autunno (*Luciani*). Scarso, invernale, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Di passo in autunno, divenuto scarso nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); comune nel distretto di Massarosa, ove lo vidi anche in settembre (*Gragnani*). Di passo con breve soggiorno nei distretti di Fauglia e Lavajano, Pisa, dal novembre in poi (*Ott*, *Papasogli*). Nella prov. di Firenze è scarso in ottobre nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); divenuto raro in quello di Empoli (*Fucini*); frequente in marzo e ottobre-novembre in quelli di Fiesole e Sesto fiorentino (*Gargioli*, *Fontebuoni*). Invernale nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*). Abbonda in grossi branchi alle due epoche del passo e durante l'inverno in Val di Chiana (*Griffoli*). Frequente d'inverno nel distretto di Sarteano, Siena; ma sembra che qualche individuo rimanga stazionario tutto l'anno nei monti (*Bargagli*). Autunnale ed invernale nel distretto di S. Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Abbonda da ottobre a marzo nel Senese ed in Maremma (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). In Toscana è invernale e comune ovunque (*Roster*).

Marche: Comune ai monti e sedentario (?) (*Paulucci*).

“ **Lazio**: Invernale a stormi nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente nel distretto di Ielsi, Campobasso; giunge in novembre e parte in marzo-aprile (*D'Amico*).

Campania: Comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comunissimo in branchi numerosi dai primi dell'ottobre al marzo (*De Romita*).

Calabrie: Invernale nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Così nella prov. di Reggio, ove è comune (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Di transito irregolare, qualche anno abbondante sullo stretto di Messina in marzo-aprile (*Ruggeri, Pistone*). Abbondante d'inverno nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Giunge in ottobre e parte in marzo ed è frequente nel distretto di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Così in quello di Terranova, Caltanissetta (*L'arvana*). Invernale e raro nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Invernale, abbonda più al capo settentrionale (*Bonomi*).

5. *Lycos Monedula* (Linn.) (ex Gesn.)

TACCOLA.

Coloeus monedula, Salvad.

Crôv peit, Crovin (*Basso-Piem.*) — Ciaula, Cournaja (*Norvara*) — Corvètt (*Mantova*) — Cornacia de Tore (*Ven.*) — Çòre (*Friuli*) — Cornacchia (*Marche, Viterbo*) — Ciola (*Bari*) — Ciavùla (*Calabr.*) — Ciavula (*Castell.*) — Pola, Ciaula di campanaru (*Terran. Sicil.*) — Carroga (*Sard.*).

Piemonte: Accidentale; il 12 settembre 1885 ne trovai uno sul mercato di Cuneo e non venne conosciuto neanche dai vecchi cacciatori (*Abre*). Un branco di 15 o 20 individui si fermò nell'inverno 1881 al seguito della caduta di gran quantità di neve sulle piante alte del giardino pubblico della Cittadella a Torino; è specie accidentale in provincia (*Gasca, Pezzi*). Accidentale affatto nel territorio di Voltaggio negli inverni rigidissimi; al monte qualche coppia annida

(*Camusso*). Sedentaria nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*); abbondante e sedentaria in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Accidentale nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così pure d'inverno in quella di Cremona (*Ferragni*). Poco comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Non comune nel Friuli, vedesi qua e là in piccoli branchi (*Vallon*); fui assicurato che nidifica sulla torre della chiesa di Aquileia¹ (*Del Torre*). Di comparsa irregolare nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Vi sono due colonie numerose stabilite a Rovigo ed a Lendinara, ma nel restante della provincia è scarsa (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Rara nel distretto di Arenzano e Cogoleto. Genova (*Luciani*); di casuale comparsa in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Rara nella prov. di Lucca, ne ebbi uno a Massaciuccoli nell'agosto 1883 (*Graguani*). Nel distretto di Lavajano, Pisa, ne vidi un solo (*Papasogli*), nidifica in quello di Cedri, Peccioli (*Degli Alessandri*). Di accidentale comparsa in Val di Chiana. Arezzo (*Griffoli*). Accidentale nel Senese (*Dei*); comune, sedentaria e di passo in ottobre nella Maremma (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*).

Marche: Comune ai monti e sedentaria (*Paolucci*).

Lazio: Abbondantissima e sedentaria nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Sedentaria, nidificante in colonie numerose, ma localizzate affatto (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria nel distretto di Maida Catanzaro (*De Fiore*), una volta comune e sedentaria a Ravagnese nella prov. di Reggio è ora scomparsa (*Moschella*).

¹ Io stesso l'ho trovata in piccola colonia sulla famosa torre di Aquileia, nel maggio 1884.

Sicilia: Sedentaria e abbondante nelle contrade orientali e meridionali della prov. di Messina; vi nidifica tra giugno e luglio, allevando una covata di 2 a 4 (*Ruggeri, Pistone*). Sedentaria e frequente nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Così in quello di Terranova Caltanissetta, ove però non è abbondante (*Carrara*). Sedentaria e comune nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Sedentaria e comune ovunque, specialmente al piano; è erratica (*Bonomi*).

6. Nucifraga Caryocatactes (Linn.) (ex Gesn.)

NOCCIOLAIA.

Verrou (*Piem.*) — Rompanco, Nicciolera (*Novara*) — Gaziolera (*Berg.*) — Cornacia de Tore (*Rovigo*) — Gaja da nosele, Gaja noselera, Gaja mata (*Cadore, Feltre*) — Snosoléra (*Padova*) — Eleva (*Nizza*) — Corvo marino (*Senese*) — Carrughedda giamulada (*Sard.*).

Parrebbe che a lunghi intervalli, forse in occasione d'inverni molto freddi, questa specie immigrasse in Italia dalle regioni d'oltre Alpe; allora giunge da noi in gran numero e si spinge sin nelle nostre provincie centrali e meridionali; a mia conoscenza l'ultima di tali immigrazioni ebbe luogo nell'autunno del 1868.

Piemonte: Scarsa, ma sedentaria in montagna nella prov. di Cuneo; vi nidifica in marzo ed in maggio, allevando due covate, le uova deposte sono 3 o 4, la incubazione dura da 15 a 18 giorni e vi prendono parte il maschio e la femmina (*Abre*). Tutti gli anni se ne trova qualche esemplare sul mercato di Torino (*Martorelli*). Di comparsa casuale nel Basso Piemonte; noto la cattura di un individuo a Voltaggio nell'autunno 1885; esso faceva parte di un branchetto di cinque o sei (*Camusso*). Non è comune, ma nidifica nell'Ossola (*Bazetta*); sedentaria nei

distretti di Varallo, Piedimura e Crodo, Novara (*Guarinoni, Danisi, Demori*); nella Valsesia fa due covate di 4 o 5 uova, il nido è costruito con vimini e poco fieno alla sommità di piante di alto fusto, faggio, abete e larice; l'incubazione dura 15 giorni (*Guarinoni*).

Lombardia: Non tanto comune nella prov. di Sondrio ove non si allontana dai monti (*Galli*). Rara ai monti e al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Accidentale in quella di Cremona (*Ferragni*). Non rara nella prov. di Mantova (*Paglia*). Rara ed accidentale in Lombardia (*Turati*); frequente e nidificante (*Borromeo*).

Veneto: Nel distretto di Caprino, Verona, è rara ed invernale (*Pellegrini*). Scarsa ai monti nel Cadore, Belluno, nei boschi resinosi e cedui, vi nidifica in maggio e giugno; colloca il nido sugli alberi resinosi a circa metà altezza, vi depone 6 uova di color celeste chiaro con striscie giallognole, le incuba da 15 a 20 giorni ed alleva una sola covata. In aprile e settembre fa un passaggio (*Tissi*). Così nel distretto di Feltre ove nidifica pure (*Delaito*). Nel Friuli nidifica in scarso numero nei boschi montuosi della Carnia; appare numerosa sulle colline in ottobre, per pochi giorni; nel 1885 questo passo fu eccezionalmente abbondante (*Vallon*). Vive certamente in abbondanza ancora nelle vallate del Fella e del But in Carnia, ove nidifica; solo durante l'inverno si avvicina all'abitato, ne uccisi il 15 novembre ad Albana sull'Iudrio, Cividale (*Del Torre*). Rarissima nella prov. di Padova, non so che di un solo individuo ucciso a Cà Oddo nell'ottobre 1869, è nella mia collezione (*Arrigoni*).

Emilia: Ai primi di ottobre 1887, due individui di questa specie furono colti nei pressi di San Felice nel Modenese (*Picaglia*).

Liguria: Di comparsa irregolare al mare nel Nizzardo, ma sedentaria ai monti, così a San Martino Lantosca (*Gal*). Avventizia nel distretto di Savona (*Piccone*). Rara nel distretto di Spezia, e solo nei rigidi inverni (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nel Casentino, Arezzo (*Beni*). È

così nel Senese, ma circa 30 anni fa, quasi ogni anno capitava (*Dei*).

Marche: Nel Gabinetto del Liceo di Urbino si conserva un individuo ucciso sul Monte Catria (*Carpegna*).

Campania: Di rarissima ed accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Calabrie: Ho ragione di credere che trovisi rarissima sui monti nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sardegna: Accidentale, specialmente al Capo meridionale (*Bonomi*).

7. *Pica rustica* (Scop.) ex Klein.)

GAZZA.

Lajàssa, Laja (*Basso-Piem.*) — Checa, Gaglia (*Novara*) — Gaza ladra (*Berg.*) — Checca, Gaza dla còla longa (*Mantov.*) — Gaza mora, Gaza ladra (*Vicenza*) — Gaza nera (*Bassano*) — Gazha, Gada, Chéca (*Feltre*) — Argáza (*Ravenna*) — Gaza (*Bologna*) — Cazzola (*Sacile*) — Chécca, Gáza chéca, Gáza da la còla longa (*Padova*) — Gaza mora (*Verona*) — Gaza da la coa longa (*Veneto*) — Gaza (*Spezia*) — Gazza, Gazzera (*Pisa*) — Gaggia (*Garf.*) — Pica, Gazella (*Viterbo*) — Pica (*Campobasso*) — Cola, Caiazza (*Napoli*) — Carca-razza (*Calabr.*).

Piemonte: Frequente e sedentaria al piano nella prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in marzo ed in maggio (*Albre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi*); e anche sui monti (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte è comunissima al piano dove soggiorna tutto l'anno; meno comune al basso colle, rara al monte e di comparsa casuale in autunno (*Camusso*). Accidentale nell'Ossola (*Bazetta*). Sedentaria nei distretti di Varallo e di Piedimulera, Novara (*Guarinoni, Danisi*).

Lombardia: Comunissima nella prov. di Sondrio, vive in pianura (*Galli*). Scarsa nella prov. di Bergamo (*Stefa-*

nini). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Comune e stazionaria nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Stazionaria, ma non comune nel distretto di Caprino nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Non frequente, sparsa e sedentaria nella prov. di Vicenza (*Molari*); comune e sedentaria nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Comune e sedentaria nei boschi d'alto fusto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissima e sedentaria nel Friuli; nidifica in aprile usualmente sugli alberi più alti, il 1° maggio 1884 trovai però un nido nel folto di un cespoglio di giunchi a 20 centimetri dall'acqua (*Vallon*); così nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Sedentaria nella prov. di Padova, ma più frequente al piano che in collina (*Arrigoni*). Comune e sedentaria nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune specialmente ai colli nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di comparsa autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Sedentaria, ma scarsa nel distretto di Savona, in collina (*Piccone*); rara in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarsa, ma sedentaria nel distretto di Spezia, più facile a vedersi alle Bocche di Magra (*Carazzi*).

Toscana: Sedentaria, ma scarsa nella prov. di Lucca, più frequente verso il mare (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Graguani*). Comune e sedentaria nei distretti di Fauglia, Lavajano e Cedri, Pisa (*Ott*, *Papasogli*, *Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è scarsa e sedentaria nei distretti di Fucecchio, Sesto fiorentino e Signa (*Turchetti*, *Ginori*, *Fontebuoni*); scomparsa da circa 30 anni in quello di Empoli (*Fucini*); scarsa in aprile ed ottobre in quello di Fiesole (*Gargioli*). Comune assai e sedentaria in Val di Chiana, Arezzo (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di San Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Abbondante e sedentaria nel Senese (*Dei*); così in Maremma, ma non è frequente

(*Ademollo, Cambi*). Abbondante e sedentaria in Toscana; ho veduto una coppia nidificare quattro anni di seguito sulla medesima pianta di noce; nel 1883 i piccoli uscirono dal nido il 21 marzo, nel 1885 il 27 di quel mese, erano quattro (*Roster*).

Marche: Sedentaria e comune ovunque; nidifica in maggio e giugno e diventa poi erratica (*Paolucci*).

Lazio: Comune e sedentaria al piano nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentaria e frequente ovunque (*De Romita*).

Calabrie: Comune ovunque e sedentaria nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Sedentaria e comune nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Nel giugno 1883 colsi uno di questi uccelli nell'atto di carpire, piombandovi sopra, come un Rapace, un pulcino di Gallo domestico, e lo vidi portarlo come pasto ai suoi nidiacei; da qualche tempo 2 o 3 pulcini erano mancati giornalmente al pollaio del colono vicino (*Garofalo*). Sedentaria e comune nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Poco frequente, nidificante e di passo nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

8. *Garrulus glandarius* Linn.) (ex Gesn.)

GHIANDAIA.

Gaj, Bert, Ghè, Garzann-a Garzan-na, Gheja (*Basso-Piem.*) — Gaza carnera (*Berg.*) — Gaza zucona (*Verona*) — Gaja, Gajola (*Cadore*) — Gaja (*Feltre*) — Gaza magiona (*Porigo*) — Ghandara (*Porretta*) — Gaja (*Sacile*) — Féra, Gáza

féra, Gáza rabiosa (*Padova*) — Argaza (*Bol.*) — Gaza (*Spezia*) — Go (*Garf.*) — Pica comune (*Nap.*) — Pica, Cissa (*Calab.*) — Giài (*Lentini*) — Caragianu (*Modica*) — Cicula (*Palermo*) — Carnagiadu (*Terran. Sicil.*) — Giai, Giau (*Castelb. Madonie*) — Marra pigia (*Sard.*).

Piemonte : Frequente e sedentaria al piano ed al monte nella prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in aprile ed in giugno (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Comunissima e stazionaria in tutto il Basso Piemonte, più frequente però al monte. All' avvicinarsi dell' inverno molte Ghiandaie partono verso regioni più temperate, mentre altre giungono a svernare da noi da regioni più settentrionali (*Camusso*). Comune e nidificante nell' Ossola, non oltre i 600 metri (*Bazetta, Pertusi*). Comune e nidificante in Valsesia e nei distretti di Piedimulera e Crodo, Novara (*Guarinoni, Danisi, Demori*).

Lombardia : Comune ma quasi confinata ai monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente ovunque nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Comune e stazionaria nella prov. di Cremona; molte giungono nell' autunno (*Ferragù*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissima nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Assai comune e sedentaria nei boschi del distretto di Caprino, prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante ed erratica nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune e sedentaria nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune ovunque e sedentaria nel Friuli, ove nidifica nel maggio (*Vallon*); così nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Sedentaria e comune ovunque nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissima ovunque e sedentaria nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria nella prov. di Parma; ebbi il nido con 2 uova il 10 giugno (*Del Prato*).

Liguria: Sedentaria e comune nel Nizzardo (*Gal*). Così ai monti nel distretto di Savona (*Piccone*); ed in quello di Arenzano (*Luciani*). Comune e sedentaria in collina nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Piuttosto scarsa e sedentaria nella prov. di Lucca, aumenta in autunno (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Sedentaria, più comune in collina nel distretto di Fauglia (*Utt*); piuttosto scarsa in quelli di Lavajano e Cedri, Pisa (*Papasogli, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è assai comune e sedentaria nei distretti di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*), di Fiesole, Sesto fiorentino e Signa (*Gargioli, Ginori, Fontebuoni*); assai diminuita in quello di Empoli (*Fucini*). Comune e sedentaria nel Casentino. Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comunissima e sedentaria in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentaria nel Senese (*Dei*); così nella Maremma, ma non è frequente (*Ademollo, Cambi*). In Toscana è sedentaria ed abbondante; non ritorna mai al medesimo nido (*Roster*).

Marche: Comune ovunque e sedentaria; nidifica in maggio e giugno (*Paolucci*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentaria, ma meno frequente della specie precedente (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria e comune ai monti nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Così nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune e sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica, ove è erratica nell'inverno (*Dellafonte, Garofalo*). Non abbondante, ma sedentaria ai monti nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente e sedentaria, più abbondante in primavera nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentaria ovunque, specialmente ai monti (*Bonomi*).

9. *Pyrrhocorax alpinus*, Vieill. (ex Gesn.)

GRACCHIO.

Cioja del bech giaun (*Cuneo*) — Scorbattin dal becch giald (*Lomb.*) — Pigion, Cola (*Novara*) — Mièrli di montàgne, Çorin (*Friuli*) — Zhurla, Zhorla dal bech zal, Paola (*Cadore, Feltre*) — Corvu cu i pedi russi (*Mess.*) — Carroghedda de' monti, Stacola (*Sard.*).

Piemonte: Frequente sui monti nella prov. di Cuneo, ove è sedentario e nidifica nel maggio allevando una sola covata (*Abre*). Molto scarso, anzi accidentale nel distretto di Torino (*Gasca*); comunissimo sulle Alpi Cozie e Graie in quella provincia (*Martorelli*). Comune e sedentario sui monti dell'Ossola, nei grandi freddi soltanto scende al piano (*Bazzetta*). Sedentario in Valsesia e nel distretto di Piedimulera, Novara; nidifica una sol volta in aprile e maggio (*Guarino-ni, Danisi*); scarso, ma sedentario in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Abbondantissimo nella prov. di Sondrio, ove vive sempre ai monti (*Galli*). Di comparsa accidentale in quella di Cremona (*Ferragni*). Raro ai monti in Lombardia (*Turati*); frequente e sedentario (*Borromeo*).

Veneto: Di passaggio nel distretto di Caprino. Verona, vedesi in grandi stormi sul Monte Baldo, ove probabilmente nidifica (*Pellegrini*). Frequente e sedentario ai monti nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune e sedentario nel Cadore, Belluno, nidifica sui monti tra le rocce in giugno e luglio e scende nelle campagne durante l'inverno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Nel Friuli è comune e sedentario ai monti, nidifica sopra Pontebba (*Vallon*). Nel novembre 1887 scese in abbondanza al piano nel distretto di Cividale; è sedentario e numeroso sul Matajur, ove e sui monti vicini nidifica tra i cespugli sulle rupi scoscese (*Del Torre*). È rarissimo nella prov. di Padova.

un individuo nella mia raccolta venne ucciso a Ca' Oddo nel gennaio 1883 (*Arrigoni*).

Liguria : Sedentario sulle alte montagne nel Nizzardo, scende al basso nell'inverno (*Gal*). Scarsissimo nel distretto di Spezia, sedentario sulle Alpi Apuane (*Carazzi*).

Toscana : Comune e sedentario sulle Alpi Apuane, specialmente al Pizzo d' Uccello, questa specie scende talvolta nei rigori invernali sul territorio lucchese (*Fontebuoni*). Accidentale nel Casentino, Arezzo; ebbi in dono per la collezione italiana dal cav. A. Gentili, una femmina giovane uccisa il 2 gennaio 1888 a Meriggio del Sacco, Alpe di Catenaia (*Giglioli*). In Toscana è sedentario, gregario ed abbondante su alcune delle vette delle Alpi Apuane; vive e nidifica in luoghi inaccessibili all' Uomo (*Roster*).

Marche : Rarissimo ai monti (*Paolucci*).

Puglie : Accidentale, il 24 dicembre 1880 ne fu ucciso uno presso Bari (*De Romita*).

Sardegna : Raro ed invernale sugli alti monti (*Bonomi*).

10. *Pyrrhocorax Graculus* Linn. ex Gesn.

GRACCHIO CORALLINO.

Cioja del bech rous (*Cuneo*) — Cola (*Novara*) — Zurla dal bech ross. Paola, Zhurla, Zhorla. Zhorla dal bech zal (*Cadore, Feltre, Belluno*) — Çorin (*Cividale*) — Corvo rosa (*Napoli*) — Ciavula cu pizzu russu (*Castell. Madonie*) — Staccola de' monti a peis arrubius. Carroghedda de' monti (*Sard.*).

Piemonte : Frequente sui monti nella prov. di Cuneo, ove è sedentario: vi nidifica nel maggio allevando una sola covata (*Abey*). Comune, ma meno numeroso della precedente specie sulle Alpi in prov. di Torino (*Martorelli*). Rarissimo sui monti di Ossola (*Bazetta*). Specie erratica nel distretto di Varallo (*Guarinoni*).

Lombardia : Comune, ma esclusivamente sui monti, nella prov. di Sondrio (*Galli*). Raro ed accidentale in Lom-

bardia (*Turati, Borromeo*); sedentario e nidificante (*Borromeo*).

Veneto: Erratico ai monti nel distretto di Bassano, Vicenza (*Ferrari*). Scarso e sedentario sui monti nel Cadore, Belluno, vi nidifica tra le rupi in giugno e luglio, depone 4 uova ed alleva una sola covata (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove nidifica in maggio (*Delaito*). Abbonda discretamente nella Carnia, Friuli, e nidifica in caverne sul Matajur (*Del Torre*).

Liguria: Sedentario sulle alte montagne nel Nizzardo, nell'inverno scende talvolta al mare (*Gal*). Di accidentale comparsa nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Marche: Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Sicilia: Sedentario ai monti, una volta più frequente, oggi scarso; nidifica alla Rocca Lupa e al balzo di Ciambra, deponendo 4 a 5 uova; nel distretto delle Madonie. Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Scarso sugli alti monti e specialmente a Perdugliana, nella Barbagia e sul Gennargentu (*Bonomi*).

STURNIDÆ

(*Storni*).

11. *Sturnus vulgaris*, Linn. ex Barr.

STORNO.

Storno, Sturn, Stóran, Stornello, Stronello (*Basso-Piem.*) — Stornin de tor, Stournel, Storin (*Nov.*) — Stüran (*Casteggio*) — Striolo (*Vicenza*) — Striolo, Stornèlo, Striulo (*Padova*) — Stòran (*Ravenna*) — Stourneu (*Nizza*) — Stornèlo (*Spezia*) — Sturno (*Campobasso*) — Sturno, Sturnejo, Stur-

niellu (*Calabr.*) — Sturnu di passa (*Messina*) — Sturnieddu di passa (*Modica*) — Struneddu (*Terran. Sicil.*) — Sturnieddu (*Castell. Madonie*) — Sturru gjajulan, Sturreddu (*Sard.*).

Piemonte: Frequente al piano nella prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in marzo ed in giugno (*Abre*). Ne ho visti più volte nei mesi di dicembre e gennaio frammi-schiati ai Corvi pascolare nei campi nella prov. di Torino; ove in altre stagioni è specie frequente. A Carmagnola mi venne portato anni fa un nido di Storno trovato sotto i tegoli di un basso torrione nel centro della città: quel nido conteneva cinque pulcini tutti color isabella chiarissimo; tre furono da me allevati e mantennero la vesta isabella sino alla primavera, quando presero l'abito ordinario dell'adulto. Chi mi portò il nido mi disse che uno dei genitori era color isabella. Ne ebbi uno, da me ucciso, col becco molto deforme (*Gasca*). Comunissimo nella prov. di Torino (*Martorelli*). Nel territorio di Voltaggio, Alessandria, noto da circa 10 anni un sensibile aumento nel numero degli Storni, i quali vi erano rari. Attribuisco tale aumento, che si verifica specialmente all'epoca della nidificazione, alla costruzione di alcune case con torri e chiese con campanili provvisti di fori nei quali questo uccello pone il nido; ed ancora per l'uso ora invalso delle tegole curve, mentre prima si adoperavano quelle piane di legno. Nel Basso Piemonte lo Storno è essenzialmente estivo: giunge a primavera prestissimo, annida al piano ed al monte, di qui però scomparire in agosto recandosi in pianura lungo le sponde dei fiumi; alla fine di settembre ricompare ai monti, ma col finire dell'ottobre tutti sono partiti (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, nidifica e capita in piccoli branchi alle due epoche del passo (*Bazetta*). In Valsesia fa due e anche tre covate, diventa poi erratica (*Guarisoni*); raro di di passo in primavera nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comunissimo al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Ancora

in quella di Milano (*Brambilla*). Comune e nidificante nella prov. di Cremona, pochi rimangono a svernare (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Assai comune nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente ovunque, nidificante ed erratico nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Scarso al piano nel Cadore, Belluno, ove non nidifica e passa in marzo ed ottobre; sembra essere in diminuzione (*Tissi*); abbondante, ma ancora soltanto di passo in marzo ed ottobre, nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune e stazionario nel Friuli, nidifica nel maggio (*Vallon*, *Del Torre*). Comunissimo ovunque nella prov. di Padova, in scarso numero anche sedentario (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo nelle prov. di Ravenna e di Bologna, ove nidifica sulle case di città e campagna; ci lascia nell'inverno (*Bacchi della Lega*). Sedentario e nidificante nella provincia di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Vedesi nel Nizzardo alle epoche del passo, particolarmente durante quella autunnale (*Gal*). Nel distretto di Savona passa numeroso dagli ultimi di settembre ai primi di novembre e dai primi di marzo alla metà di aprile; nidifica subito al di là della catena Appenninica (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Abbondante di doppio passaggio ed invernale, ma non nidificante nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comunissimo di doppio passo nella prov. di Lucca, ove non nidifica (*Martorelli*, *Fontebuoni*); ha nidificato nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Numeroso al passo in settembre ed ottobre, si ferma al piano, nei distretti di Fauglia, Lavajano, Ghizzano e Cedri, Pisa (*Utt*, *Papasogli*, *Venerosi*, *Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze abbonda al piano dall'ottobre al marzo (*Lenzi*, *Turchetti*, *Ginori*, *Fontebuoni*); negli inverni 1884-85 e 1885-86, dalla metà di novembre ai primi di febbraio in branchi innumerevoli albergarono nel mio parco di Novoli presso Firenze (*Paulucci*). Di passo in marzo ed ottobre nel

Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Abbonda alle due epoche del passo in Val di Chiana, qualche coppia rimane a nidificare presso i laghi di Montepulciano e Chiusi (*Griffoli*). Passa in autunno nel distretto di Sarteano, Siena, trattenendosi nei piani e negli uliveti (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Invernale e comune nel Senese ed in Maremma, più abbondante in ottobre, meno in primavera (*Dei, Ademollo, Cambi*); nel Senese qualche coppia rimane a nidificare (*Dei*). Di passo sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario in Toscana, ove però è abbondante solo all'epoca del passo; non l'ho mai veduto nidificare (*Roster*).

Marche: Comune ovunque; passa in settembre, novembre ed in febbraio, marzo (*Paolucci*).

Lazio: Comune di passo in ottobre e marzo; è anche sedentario e nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Scarso, ma nidificante nel distretto di Ielsi, Campobasso; vi fa poi passaggio in marzo, aprile ed in settembre (*D'Amico*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Si vede in colonne estese alle due epoche del passo, in ottobre e marzo; molti rimangono l'inverno (*De Romita*).

Calabrie: Comunissimo alle due epoche del passo, specialmente in pianura nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Frequente, specialmente in ottobre nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Giunge in settembre e parte in marzo nel distretto di Modica, ove è scarso (*Dellafonte, Garofalo*). Immensi stormi giungono alla fine di settembre e ai primi di ottobre nelle campagne di Terranova, Caltanissetta e vi rimangono circa un mese, non pochi però restano a svernare (*Carvana*). Comune al

piano a branchi in marzo-aprile nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*). Giunge dalla metà di ottobre a quella di novembre, parte dalla metà di marzo alla metà di aprile nel distretto di Palermo (*Giannattasio*).

Sardegna: Giunge in autunno e parte in primavera, frequenta i canneti e luoghi paludosi (*Bonomi*).

12. Sturnus unicolor, La Marm. in Temm.

STORNO NERO.

Struneddu niuru, Struneddu paisanu cu pizzu giarnu (*Terran. Sicil.*) — Sturnieddu niru (*Castelb. Madonie*) — Sturru nieddu (*Sard.*)

Liguria: Il Salvadori (*Ucc. ital.*, p. 183), ricorda altri due casi della cattura di questa specie in Liguria: uno presso Sestri Ponente il 16 gennaio 1867, un secondo il 18 gennaio dello stesso anno nel Bisagno, Genova (*Giglioli*). Di comparsa accidentale nel distretto di Spezia, giunge in tal caso assieme alla specie comune che si prende in copia colle reti; nella raccolta del prof. F. Magni-Griffi a Siena si conserva un individuo preso nella Val di Magra (*Carazzi*).

Toscana: Di comparsa accidentale nella prov. di Siena e nel Grossetano (*Dei*).

Sicilia: Comune, specialmente ai monti, e sedentario nella prov. di Messina; depone da 4 a 5 uova per covata (*Ruggeri, Pistone*). Frequente ovunque e sedentario nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comune, ma non abbondante e sedentario nel distretto di Terranova, Caltanissetta; abita e nidifica nei campanili e case di campagna, ha un canto non sgradevole (*Carvana*). Comune e sedentario ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comunissimo e sedentario ovunque, abita nei villaggi al piano e al monte, ma preferisce il piano e la vicinanza di stagni; ne ebbero varietà isabelline ed albino (*Bonomi*).

13. Pastor roseus (Linn.) (ex Aldrov.)

STORNO ROSEO.

Storn réusa, Merlo marin (*Basso-Piem.*) — Stórlo color de rosa (*Rovigo*) — Storan marén (*Ravenna*) — Sturnell maren (*Bol.*) — Merlo main (*Spezia*) — Mièrolo rosa (*Nap.*).

Piemonte: Accidentale; nella primavera del 1856 ve ne fu un passaggio abbondante nella prov. di Cuneo, ove quasi ogni anno se ne vede qualche esemplare (*Abre*). Raro ed accidentale in prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Nel luglio qualche rarissima volta capita nel territorio di Voltaggio (*Camusso*). Casuale nell' Ossola (*Bazetta*).

Lombardia: Raro nella prov. di Sondrio (*Galli*). Accidentale in quella di Bergamo, ove venne ucciso un esemplare nel marzo 1884 (*Stefanini*). Avuto il 25 agosto 1881 e nell'ottobre 1884, nella provincia di Cremona (*Ferragni*). Qualche anno abbonda nella prov. di Mantova, insieme alle cavallette a cui dà la caccia; nel 1860 comparve numeroso alle Grazie d'estate, ritornò nell'anno seguente poi non più, fino al 1875 in cui sostò vari mesi a Villafranca (*Paglia*). Accidentale in grossi branchi nella Lombardia (*Turati, Borromeo*); veduto così una sola volta nel giugno 1875, quando cioè una numerosa colonia si stabilì a Villafranca. Poche ore prima del loro arrivo le campagne e le strade furono coperte da cavallette in quantità così straordinaria, che le popolazioni si videro obbligate ad organizzare una caccia regolare con lenzuole per difendere i loro campi. Nel villaggio di Villafranca si era fermata la maggior quantità di Storni rosei; si vedevano numerosissimi in tutte le vie, per terra, sui tetti, sulle griglie; entravano nelle camere abitate e non abitate e si lasciavano avvicinare al punto da poterli quasi prendere colle mani. Gli abitanti del villaggio si divertirono a gettare per le strade paglia e fieno per vederli correre su-

bito a ghermire il materiale occorrente ai nidi. In detta epoca qualche esemplare fu osservato anche in alcuni dei villaggi lombardi limitrofi. Avendo fatto una corsa a Villafranca potei con molta facilità impossessarmi di esemplari adulti e giovani viventi; conservo tuttora (novembre 1886) una femmina viva che ha quasi assunto l'abito del maschio. Nidificarono nelle fessure dei muri, tra le griglie, nell'interno delle camere, sotto le tegole e nei fori degli alberi; costruiscono un nido concavo con erbe e radici e poche penne nel centro, non distinguibile da quello dello Storno comune. Depongono da 4 a 6 uova di un bellissimo azzurro, similissime a quelle dello Storno; sono covate tanto dal maschio che dalla femmina, i quali si dividono la cura di nutrire i pulcini, il che fanno esclusivamente con insetti (*Turati*).

Veneto: Avventizio nel Friuli, ebbi un giovane colto presso Udine il 21 settembre 1884 (*Vallon*); assai raro (*Del Torre*). Di comparsa casuale, ne conservo tre presi nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Di rarissima comparsa in maggio nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nelle prov. di Ravenna e di Bologna capita assai di raro, nel luglio 1885 diversi furono uccisi o presi vivi presso Faenza, mentre davano l'assalto alle more dei gelsi, di cui sono molto ghiotti (*Bacchi della Lega*). Nel maggio e giugno 1886, diversi esemplari di questa specie furono presi nel Modenese; ed in ultimo un giovane ai primi dell'ottobre 1887 (*Picaglia*). Accidentale nella prov. di Parma; ne ebbi uno il 12 gennaio 1884 (*Del Prato*).

Liguria: Quasi ogni anno se ne vedono in maggio e giugno nel Nizzardo (*Gab*). Nel circondario di Savona, Genova, il passaggio di questa specie è nullo il più degli anni, copioso in altri. Nel giugno 1869 se ne videro alcuni; nel giugno 1870 giunsero in gran numero nelle pianure di Albissola e di Vado, confidenti sul principio se ne uccidevano parecchi con una sola fucilata sugli alberi di ciliegio, ove si adunavano con grande schiamazzo e gran distruzione di quei frutti. I maschi erano in amore ed ho visto una

femmina coll' uovo già disceso nella cloaca. Ricomparvero nei luoghi stessi ed alla medesima epoca nel 1871, ma in numero alquanto minore. Nel 1875, anno in cui una colonia numerosa si stabilì a Villafranca, Verona, un certo numero di questi uccelli si fece vedere tra Voltri e Cogoleto; infine il 5 giugno 1885 due furono uccisi in Albissola. Le comparse di questa specie nel circondario di Savona ebbero luogo senza causa apparente, e non al seguito di Cavallette (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano non può dirsi raro, ma le sue comparse sono irregolari, passano anni senza che si lasci vedere, eppoi giunge in gran copia. Arriva sempre ai primi di giugno ed il passo dura una diecina di giorni, passa in branchi serrati, come lo Storno comune, velocemente da O. ad E.; si riposa pochissimo per prender cibo, e si mostra allora voracissimo di frutta. Negli anni 1882-83 e 84, il passo fu abbondante, massime il primo anno (*Luciani*). Di scarsa ed irregolare comparsa nel distretto di Spezia; anni fa il prof. F. Magni-Griffi ne trovò una coppia nidificante nel luglio a Camiciano presso Ameglia (*Carazzi*). Nel maggio 1882 ebbi due individui di questa specie, quasi sconosciuta nel distretto di Sarzana (*Lamotte*).

Toscana: Ne vidi uno a Coreglia, preso sull'Appennino lucchese nell'estate 1883 (*Martorelli*): accidentale nel distretto di Massarosa, ne ebbi due adulti nel 1882 e 1885, ed un giovane in agosto 1883 (*Gragnani*). Nella prov. di Firenze è apparso casualmente nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*); nella Collezione italiana conservo quattro individui uccisi nella provincia, tutti giovani: Firenze autunno 1836, Marradi gennaio 1874, Firenze 12 ottobre 1879 e Sesto fiorentino 21 agosto 1882; so infine di un quinto, ucciso presso Firenze il 4 settembre 1887 (*Giglioli*). Accidentale nel Senese e nel Grossetano; vari furono veduti e due presi presso Siena nel giugno 1885 (*Dei*). Di passo irregolare e scarso in Toscana; varie volte ho veduto giovani catturati in ottobre e novembre, mai gli adulti (*Roster*).

Marche: Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale, so di quattro catture soltanto; nel giugno 1879 venne ucciso presso Bari un giovane nel primo abito (*De Romita*).

Sicilia: Accidentale affatto nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Accidentale, capitò con invasioni di Cavallette (*Bonomi*).

ICTERIDÆ

(*Itteri*).

14. *Agelæus phoeniceus* (Linn.)

ITTERO A SPALLINE ROSSE.

Ittero dalle ali rosse (*Aut. Ital.*).

Noto con sorpresa come il Salvadori nell'ultima sua pubblicazione intorno all'avifauna dell'Italia, esprima il dubbio che l'individuo colto a Bellinzago nell'ottobre 1864 fosse fuggito di schiavitù (*Ucc. ital.* p. 182); cosa che non fece in pubblicazioni anteriori. L'8 ottobre 1887 visitai per la prima volta la bella collezione di uccelli del Conte Senatore G. B. Camozzi Vertova alla Ranica presso Bergamo, vi esaminai l'*A. phoeniceus* in questione, e debbo dire che esso non mostra tracce di essere stato in gabbia. Non v'ha però alcun dubbio che in avvenire bisognerà andar molto guardinghi nell'ammettere in collezioni europee individui di questa specie colti liberi, giacchè non solo i giardini zoologici si sono moltiplicati, ma in questi ultimi anni colla facilità dei trasporti transoceanici l'importazione in Europa di uccelli esotici viventi è di molto cresciuta. Dirò di più:

nello scorso autunno ho letto nel « *Times* » una lettera del Duca di Argyll in cui egli diceva di aver dato l'aire ad una quindicina d'individui dell'*A. phoeniceus* sulle sue terre nella Scozia!

FRINGILLIDÆ

(Fringille).

15. *Fringilla cœlebs*, Linn.

FRINGUELLO.

Frangùl, Franguèi, Franguèlo (*Basso-Piem.*) — Frangoul, Fringuell, Cinciuin, Ciui-cin (*Nov.*) — Quinsoun (*Canavese*) — Barbacerio (*Val Soana*) — Franguel (*Valt.*) — Zhavatol, Finco, Finch (*Cadore, Feltre*) — Sfranzell (*Cividale*) — Finco, Fringuèlo (*Padova*) — Frangvèll (*Rav. Bol.*) — Franguèo (*Spezia*) — Pincion (*Garf.*) — Filinguello (*Pisa*) — Filunguello (*Lucca*) — Frungillo (*Campobasso*) — Frongillo (*Nap.*) — Spinzu, Spinso, Spiugiuni (*Calabria*) — Fringuellu, Fringuellu muzzolinu (*Modica*) — Pinzuni (*Castell. Madonie*) — Passareddu, Cioni (*Cagliari*).

Piemonte: Frequente e sedentario al piano ed al monte nella prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in aprile ed in maggio (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). A proposito della migrazione di questa specie ho notato che maschi e femmine durante il passo autunnale viaggiano in branchi separati, e che i maschi giungono sempre circa dodici giorni prima delle femmine (*Gasca*). Comunissimo e sedentario nel Basso Piemonte. Un caso fu da me osservato nei pressi di Voltaggio di accoppiamento fra una *F. cœlebs* maschio ed una *F. Montifringilla* femmina; non

potei averne gli ibridi essendo stato il nido distrutto da pastori sei giorni dopo lo schiudimento delle uova (*Camusso*). Comune e nidificante nell' Ossola, ove però pochi rimangono stazionari (*Bazetta*). In Valsesia e nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara, è comune; diventa erratico nell' inverno (*Guarinoni, Demori, Danisi*).

Lombardia: Frequentissimo ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nel Comasco è sedentario e nidifica in scarso numero, diventa abbondantissimo all' epoca del passo (*Rosales*). Frequente ovunque nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Comune, stazionario e di copioso passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune, pochi svernano nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comunissimo nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune al piano nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo nella provincia di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente, nidificante e di doppio passaggio nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissimo e sedentario nel Friuli (*Vallon, Del Torre*). Sedentario e comune nella provincia di Padova; ho veduto un caso di ibridismo tra questa specie e la *F. Montifringilla*, individuo colto in provincia (*Arrigoni*). Comune e sedentario nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo e sedentario nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove giunge pure in branchi innumerevoli alle due epoche del passo (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario nel Nizzardo e di copioso passo autunnale (*Gal*). Comune e sedentario nel distretto di Savona, molti vi giungono pure per svernare (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*); ed in quello della Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario nella prov. di Lucca, ne cresce assai il numero in autunno e nell' inverno (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Sedentario e comune nei distretti di

Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa, ma assai più abbondante alle epoche del passo in ottobre-novembre e febbraio-marzo (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è comune assai, sedentario e di passo in ottobre-novembre e marzo (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente ovunque, sedentario e di passo in marzo ed ottobre nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comunissimo e sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune, sedentario e di passo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Sedentario, invernale e di passo abbondante in ottobre e marzo nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa in ottobre all'isola di Giglio (*Bianchi*). In Toscana è sedentario e comunissimo, ed abbonda durante il passo, talvolta le femmine giungono prima dei maschi; il nido è sempre fatto nel medesimo modo e coi medesimi materiali (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, sedentario e di passo in ottobre-novembre e febbraio-marzo; nidifica in maggio e giugno (*Paolucci*).

Lazio: Abbondante di passo in ottobre e marzo-aprile; molti svernano ed alcuni sono sedentari nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Comune e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Sedentario e frequente ovunque nella provincia di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Nidificante e sedentario all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Comunissimo, sedentario e nidificante; gli emigranti giungono in settembre e ripassano in aprile (*De Romita*).

Calabrie: Sedentario e comune, ma più abbondante nell'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comunissimo e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Modica, Siracusa; vi giunge in ottobre e parte in marzo-aprile (*Della-*

fonte, Garofalo). Abbondante da settembre ad aprile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrana*). Comune specialmente in autunno; qualche coppia rimane a nidificare nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*). Giunge dalla metà di ottobre alla fine di dicembre, parte dai primi di marzo alla metà di aprile nel distretto di Palermo (*Giannattasio*).

Sardegna: Comune, specialmente ai monti ed al Capo settentrionale ove nidifica; è pure invernale e di doppio passo regolare (*Bonomi*).

16. **Fringilla Montifringilla**, Linn. (ex Gesn.)

PEPPOLA.

Franguello montanaro (*Aut. Ital.*) — Fringuell muntagnin, Muntanin, Mountanel (*Basso-Piem.*) — Montanel (*Berg.*) — Mountân (*Milano*) — Chéch (*Feltre*) — Finco montân, Montanélo (*Padova*) — Franguel montan (*Vigezzo*) — Muntana (*Ravenna*) — Muntagnin (*Savona*) — Montanin (*Arenzano*) — Franguè de montagna (*Spezia*) — Tramontano (*Lucca*) — Frongillo spagnuolo (*Nap.*) — Spingiuni montagnolu (*Calabr.*) — Spunzuni barbariscu (*Mess.*).

Piemonte: Frequente nella prov. di Cuneo, d'estate sui monti, d'inverno al piano; nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Abre*). Ho più volte incontrato nell'inverno del 1886 grossi stormi di Peppole nel distretto di Torino; è però qualche anno scarsa, qualche altro frequente (*Gasca*); comune ai primi freddi in prov. di Torino (*Martorelli*). Invernale nel Basso Piemonte; non è rara la nidificazione di questa specie sui monti intorno a Voltaggio (*Camusso*). In Ossola giunge a branchi nell'autunno, non vi è constatata la nidificazione (*Bazetta*). Sarebbe specie sedentaria nel distretto di Piedimulera, Novara; nidifica una sol volta in maggio e giugno nella Valsesia (*Danisi, Guarinoni*); di passo autunnale in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comune sui monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passaggio nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Comune ovunque durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Invernale e non comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova, ove è però comune (*Paglia*). Abbondante nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Abbonda nell'autunno nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); piuttosto scarsa nel distretto di Bassano (*Ferrari*); vi fu un passo straordinario di questa specie nel distretto di Bassano nell'autunno 1887 (*Vittorelli*). Frequente di doppio passaggio nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa in novembre e febbraio (*Delaito*). Abbondantissima durante l'inverno nel Friuli; qualche coppia nidifica ai monti (*Vallon, Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rara in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nelle prov. di Ravenna e Bologna alle epoche del passo si vede di frequente, o solo, o mescolato coi Fringuelli (*Bacchi della Lega*). Poco frequente, ma nidificante nel distretto di Vergato. Bologna (*Lorenzini*). Abbastanza comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale ed invernale nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona, giunge numerosa dalla metà di ottobre a tutto novembre e anche d'inverno; parte in marzo (*Piccone*). Così in quello di Arenzano, passa da E. ad O. in autunno, da O. ad E. in primavera (*Luciani*). Poco frequente ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune di passo in ottobre e nell'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Frequente di passo nel distretto di Fauglia, Pisa, ove abbondarono nell'inverno 1886 (*Ott*); scarsa in ottobre nei distretti di Lavajano e Peccioli (*Papasogli, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è frequente di passo dal 25 ottobre al 10 novembre ed in marzo nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*); a branchi od alla spicciolata in novembre

e dicembre in quello di Empoli, ove fu straordinariamente abbondante nel dicembre 1886 (*Fucini*); abbondante di passo e nell'inverno nei distretti di Fiesole, Sesto e Signa (*Gargioli, Fontebuoni*). Comune ed invernale nel Casentino, Arezzo (*Fiorini, Pauer*); fors'anche sedentaria (*Boni*). Comune nel passo autunnale, meno in quello primaverile in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); comune al passo autunnale in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune da ottobre a febbraio nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). In Toscana è sedentaria e nidificante sui monti del Casentino e del Pistoiese; abbonda durante il passo (*Roster*).

Marche: Piuttosto scarsa ed erratica (*Paolucci*).

Campania: Di rara comparsa in ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di scarsa ed irregolare comparsa (*De Romita*).

Calabrie: Autunnale e poco frequente nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Rara nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

17. *Montifringilla nivalis* (Linn. ex Briss.)

FRINGUELLO ALPINO.

Franguel dla fiocca, Nevareul (*Cuneo*) — Freu, Franguel di al bianch, Franguel dla nev (*Nov.*) — Üsell de la nef, Bianchin (*Valt.*) — Chinsoun de li neo (*Nizza*).

Piemonte: Scarso in montagna nella prov. di Cuneo, ove è sedentario; vi nidifica nel maggio allevando una sola covata (*Abre*). Nel cuor dell'inverno qualche esemplare capita sul mercato di Torino, ma non tutti gli anni (*Martorelli*). È di comparsa rarissima e soltanto nei più rigidi inverni nel territorio di Valtaggio (*Camusso*). Sui monti dell'Ossola nidifica in prossimità dei ghiacciai, vive a branchi e di rado scende al piano nell'inverno (*Bazetta*). Sedentario

nei distretti di Varallo, Crodo e Piedimulera, Novara (*Guarironi, Danisi, Demori*).

Lombardia: Nella prov. di Sondrio abita i campi nevosi del versante meridionale delle Alpi, qualche volta scende nelle vigne; non teme l'Uomo. Talvolta si vede a branchi numerosi in dicembre e gennaio (*Galli*). Di comparsa accidentale nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Raro, preso a Castelgoffredo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Turati*).

Veneto: Si vede a piccoli branchi negl' inverni rigidi nella prov. di Vicenza, distretto di Bassano, ove nidifica ai monti (*Ferrari*). Frequente e sedentario ai monti nel Cadore, Belluno, vi nidifica tra le roccie in giugno e luglio, depone 4 uova ed alleva anche due covate (*Tissi*).

Liguria: Sedentario sulle alte montagne, nei rigidi inverni scende al basso. nel Nizzardo (*Gal*). Raro assai nel distretto di Savona, ne ebbi un solo il 19 gennaio 1866 (*Piccone*). Rarissimo in quello di Spezia, ne ebbe uno a Sarzana nel gennaio 1850 il prof. F. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Firenze, ne conservo uno ucciso a Marradi nel febbraio 1874 (*Giglioli*). Accidentale ai monti nel Casentino, Arezzo (*Beni*).

18. *Petronia stulta* (J. F. Gmel.) (ex Aldrov.)

PASSERA LAGIA.

Passra d'mountagna, Passuun (*Basso-Piem.*) — Selega foresta, Selega da la macia zala (*Padova*) — Maton da croda, Taloch rosso, Bevi-ojo, Piombin (*Cadore, Belluno*) — Passera bastarda (*Vergato*) — Passera forestiera (*Pisa*) — Passera ragia (*Lucca*) — Passera lăgera (*Garf.*) — Passera montanara (*Viterbo*) — Capotorto (*Campobasso*) — Passaràino (*Nap.*) — Sulitariu (*Milazzo*) — Passarieddu, Passarieddu di passa (*Modica*) — Passara muta (*Terran. Sicil.*) — Passaru di vuoscu (*Castellb. Madonie*) — Curculeu de monti (*Sard.*).

Piemonte: Frequente al monte ed al piano nella provincia di Cuneo; vi nidifica due volte, in aprile ed in giugno (*Abre*). Scarsa nella prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Questa specie nel territorio di Voltaggio da 15 anni va sensibilmente diminuendo; attribuisco ciò al soverchio atterramento di vecchie piante fruttifere ed in specie di castagni, sulle quali suole porre il nido. Giunge al monte a primavera avanzata; pone nido nei fori delle vecchie piante, specialmente in quelle da frutto, fa tre covate nello stesso nido, e vi ritorna per molti anni di seguito (*Camusso*).

Lombardia: Rara nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Molte prese nella prov. di Pavia nel febbraio 1875, secondo il dott. A. Maestri (*Pavesi*). Rara ed invernale in quella di Cremona (*Ferragni*). Scarsa nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarsa e sedentaria ai monti nel Cadore, Belluno, vi nidifica in giugno e luglio deponendo da 4 a 5 uova ed allevando due covate (*Tissi*). Non comune nel Friuli, ha nidificato presso Sacile (*Vallon*). Poco frequente, si tiene al colle nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Poco numerosa, ma nidificante tra i castagni nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Non rara nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specie invernale nel Nizzardo (*Gal*). Abbondante nell'inverno nel distretto di Savona, dicesi nidificante sui monti vicini (*Piccone*). Frequente di passaggio nel distretto di Arenzano, nell'autunno passa da E. ad O., nella primavera da O. ad E., (*Luciani*). Usualmente di scarso passo nel distretto di Spezia, ove sembra essere stata più comune in passato (*Carazzi*).

Toscana: Scarsa di passo in settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Graquani*). Invernale, numerosa al passo alcuni anni nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarsa in ottobre in quelli di Lavajano e Ghizzano (*Papasogli, Venerosi*); nidificante in quello di Cedri (*Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze si mostra ora più ora meno frequente in settembre-ottobre e febbraio-marzo nel distretto di Fucec-

chio (*Lenzi, Turchetti*); scarsa in quello di Empoli ove vedesi anche in novembre e dicembre (*Fucini*); frequente e anche sedentaria in quelli di Piesole e Signa, però vi abbonda più in ottobre (*Gargioli, Fontebuoni*). Nidificante e comune nel Casentino, Arezzo (*Beni*); anche sedentaria (*Pauci*). Comune e sedentaria in Val di Chiana, diventa gregaria nel settembre (*Griffoli*). Estiva nel distretto di Sarteano. Siena (*Bargagli*): comune al passo autunnale in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Sedentaria e di passo ora scarso, ora copioso in ottobre nel Senese (*Dei*); specialmente invernale in Maremma (*Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). In Toscana è sedentaria, ma abbonda durante il passo; i voli immensi che vengono da noi dalle Marche, mi fanno credere che nidifica in quelle regioni insieme ai Frosioni (*Roster*).

Marche: Scarsa ai monti, nidifica in maggio e giugno (*Paolucci*). Nidificante sui monti di Urbino (*Carpegna*).

Lazio: Frequente ai monti nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e nidificante nel distretto di Ielsi, Campobasso; passa in aprile ed in ottobre (*D'Amico*).

Campania: Comune ovunque nella provincia di Napoli, passa nella prima metà di marzo ed in quella di ottobre (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comune al doppio passo, non raro nell'inverno; molte nidificano ai monti (*De Romita*).

Sicilia: Comune e sedentaria, nidificante e di passo in ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, sedentaria ed invernale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comune, non abbondante e sedentaria in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Comune ai monti in primavera e nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e nidificante, ama i luoghi rocciosi tanto al piano che al monte, ma predilige le roccie a picco sul mare (*Bonomi*).

19. Passer montanus (Linn.) ex Aldrov.

PASSERA MATTUGIA.

Passarót muntagnin, Passuéta, Passarótu montagnin, Passuréta (*Basso-Piem.*) — Zip (*Novara*) — Pasera (*Berg.*) — Panegasseta (*Sacile*) — Passare minude (*Cividale*) — Sélega megiaróla, Megiaróla (*Padova*) — Pasara crautina (*Veron.*) — Zelegghetta megiarola (*Vicenza*) — Panegas da montagna (*Cadore*) — Zhiligheta (*Feltre*) — Zelega (*Vergato*) — Pasuëta (*Arenzano*) — Pàssua teracina (*Spezia*) — Ciaciarello (*Sarzana*) — Mattugia, Mattugino (*Pisa*) — Passera strega (*Fucecchio*) — Passerucchia (*S. Gimignano*) — Migliarina (*Lucca*) — Passeraca (*Ancona*) — Passeretto, Passerino (*Viterbo*) — Passera canzirro (*Napoli*) — Passaru di campagna (*Messina, Castell.*).

Piemonte: Frequente e sedentaria al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in aprile ed in maggio. Notai spesso casi di albinismo (*Abre*). Nella prov. di Torino ho veduto diversi individui bianchi ed uno color isabella (*Gasca*); a Torino ebbi il nido di questa specie con i piccoli il 10 ottobre 1886 (*Pezzi*); è sedentaria e comune in provincia (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Molto prolifica e comune nel Basso Piemonte; depone fino ad undici uova per covata, cosa da me verificata in Voltaggio la primavera del 1884 (*Camusso*). Comune nell'Ossola (*Bazetta*); erratica nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara (*Demori, Danisi*).

Lombardia: Comunissima nella prov. di Sondrio, vive in pianura (*Galli*). Di scarso passaggio primaverile e di abbonante passaggio nell'autunno nel Comasco (*Rosales*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Abbondante e stazionaria nella provincia di Cremona; il 10 gennaio 1886 uccisi un ibrido tra questa specie ed il *P. Italia* (*Ferragni*). Frequente in quella

di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: A S. Giorgio presso Rovereto si prendono quasi ogni anno delle Passere mattugie che differiscono dalle altre per avere una tinta generale molto più scura, quasi ardesiaca; in quella località se ne catturarono circa 100 nel novembre 1884; non giungono mai prima del novembre; nel 1886 se ne presero due soltanto ed una il 6 gennaio 1887. Sembra trattarsi di un melanismo, ma non so spiegare come si verifichi su tanti individui (*A. Bonomi*). Comune nel distretto di Caprino, prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante ed erratica nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente ed erratica nel Cadore, nidifica ai monti sulle rocce (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove è sedentaria (*Delaito*). Assai comune nel Friuli (*Vallon*). Comunissima e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima, sedentaria e parzialmente migrante nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Poco comune ed invernale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella provincia di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentaria, ma abbondante nell'autunno specialmente nel Nizzardo (*Gal*). Numerosa nel distretto di Savona dalla fine di settembre al principio di novembre e anche nell'inverno; riparte nel marzo (*Piccone*); così in quello di Arenzano; passa da E. ad O. nell'autunno, da O. ad E. nella primavera (*Luciani*). Frequente e stazionaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Sedentaria e frequente nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Comune e sedentaria nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*) nella prov. di Firenze è frequentissima, sedentaria e di passo specialmente in settembre (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Comune ovunque e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Abbondante e sedentaria in Val di Chiana; nidifica anco sui tetti (*Grif-*

foli). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano, ove abbonda nel passo autunnale (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*). In Toscana è sedentaria, abbondante e non di rado gregaria (*Roster*).

Marche: Sedentaria e comune ovunque; nidifica da maggio a luglio e diventa quindi erratica (*Paolucci*).

Lazio: Comune e sedentaria nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Sedentaria, ma scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Nidificante e di passo, alcuni anni copioso, nell'aprile ed al principio dell'autunno (*De Romita*).

Sicilia: Frequente al piano nel distretto delle Madonie, Palermo; vi nidifica sugli alberi, noci, aranci ecc. (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Accidentale, la notai insieme alla *P. coelebs* al Capo settentrionale (*Bonomi*).

20. *Passer hispaniolensis* (Temm.)

PASSERA SARDA.

Passer salicicola, Salvad.

Passerieddu (*Modica*) — Passiru (*Terran. Sicil.*) — Passaru sbirru (*Castellb. Madonie*) — Cruculeus (*Sard.*).

Sicilia: Comunissima ovunque e sedentaria nella provincia di Messina; alleva tre covate di 4 a 7 uova tra maggio ad agosto (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa, ove è divenuta davvero dannosa (*Bonfiglio*). Sedentaria e frequente ovunque nel distretto di Modica: fu notato che durante l'epidemia colèrica del 1867, questa specie scomparve affatto da Modica e dalle campagne intorno (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante in città ed in cam-

pagna presso l'alitato nel distretto di Terranova, Caltanissetta, ove è sedentaria (*Carvina*). Comune e sedentaria al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Frequente e sedentaria ovunque, in città sulle case e anche nidificante sugli alberi; ne ebbi affetti da albinismo ed isabellismo (*Bonomi*).

21. *Passer Italiæ* (Vieill.)

PASSERA.

Passarót, Passarin, Passera, Pássua (*Basso-Piem.*) — Passarot colombera (*Nor.*) — Pasera merder (*Berg.*) — Pàs-sare taliàne (*Friuli*) — Panegassa, Panegassot (*Sacile*) — Zelega grossa (*Vicenza*) — Becacopi (*Veneto*) — Pasara (*Veron.*) — Zhelega (*Adore*) — Zhiliga, Zhelèga, Zhiliga de razha granda, Zhiligót (*Feltre*) — Passara dal becc grues (*Cividale*) — Selegón, Selèga grossa (*Padova*) — Passra (*Rav., Bol.*) — Pássua muinàa, Pássua molinàa (*Spezia*) — Passera grossaia (*Pisa, Fucecchio, Empoli*) — Passera di tetto (*Fiesole*) — Passera casolina, Passerotto (*S. Gimignano*) — Passerotto (*I. di Giglio*) — Pássariello, Pàssero (*Nap.*) — Passaru (*Calabr.*) — Passaru du Distrettu (*Mess.*).

Piemonte: Frequente e sedentaria al piano nella prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in aprile ed in giugno (*Abre*). Sedentaria e comune nella prov. di Torino (*Martorelli, Gasca*); ho osservato diversi individui albi e rammento di aver veduto qualche anno fa un individuo che sembrava essere un ibrido tra questa specie ed il *P. montanus* (*Gasca*). È uccello stazionario nel Basso Piemonte; in autunno però radunasi in grandi branchi, parte dei quali si allontanano verso la riva del mare in cerca di clima più mite; ebbi una femmina quasi affatto albina (*Camusso*). Sedentaria o comunissima al piano, scarsa al monte nell'Ossola (*Bazetta*); così nei distretti di Varallo e

Piedimulera, Novara (*Guarinoni, Danisi*): scarsissima in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comunissima ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Ed in quella di Cremona (*Ferragni*). Ancora nella prov. di Mantova, ove sono frequenti gli individui isabellini, rari gli albini (*Pagliai*). Assai comune nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comunissima nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente e sedentaria ovunque nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente, nidificante, erratica e di passaggio in aprile ed ottobre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però è sedentaria (*Delaito*). Comunissima e sedentaria nel Friuli, ove nidifica due volte, in aprile ed alla fine di maggio (*Vallon*). Comunissima e sedentaria nella prov. di Padova; ebbi una femmina, vissuta sei anni in gabbia, che aveva assunto in parte l'abito del maschio (*Arrigoni*). Abbondante e sedentaria nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima, sedentaria e parzialmente migrante nelle prov. di Ravenna e Bologna; ebbi bellissimi casi di albinismo (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: È fors' anche sedentaria nel Nizzardo, ma vedesi più frequente nell'autunno e nell'inverno (*Gal*). Comune e sedentaria nel distretto di Savona (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*); ed in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Frequente e sedentaria nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune e sedentaria nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli. Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è abbondante e sedentaria, ma anco di passo nel settembre (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Abbondante e sedentaria nel Casentino (*Beni, Fiorini, Pauer*). Abbon-

dantissima, sedentaria e nociva ai raccolti in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano, ove sembra essere anche di passo in autunno (*Paulucci, Marri*). Abbondantissima e sedentaria nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Sedentaria e nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentaria e abbondantissima in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune ovunque e sedentaria, nidifica da maggio ad agosto (*Paolucci*).

Lazio: Comune e sedentaria nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sedentaria ovunque nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Sedentaria e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Nidificante e sedentaria all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Sedentaria e frequente ovunque e di passo copioso in settembre, ottobre ed in aprile (*De Romita*).

Calabrie: Comune ovunque e sedentaria nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Una piccola colonia isolata si è stabilita nei forti della cittadella a Messina, e vi è sedentaria (*Pistone*).¹

22. *Passer domesticus* (Linn.) ex Gesn.

PASSERA OLTREMONTANA.

Passera europea (*Aut. Ital.*). — *Pássua* (*Basso-Piem.*) — *Zelega* piccola (*Vicenza*) — *Panegas* nostran (*Cadore*) — *Pàssare*, *Passaròt*, il maschio (*Friuli*).

Piemonte: Molto più rara della specie precedente, nel distretto di Votaggio, ma come quella annida, e qualche

¹ Nel maggio 1887 ho potuto vedere in casa del signor Pistone a Messina un maschio adulto in abito nuziale di questa specie, colto appunto nella cittadella di Messina.

individuo rimane tutto l'anno (*Canusso*). Di passaggio in ottobre nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Scarsa (*Borromeo*).

Veneto : Frequente e sedentaria nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentaria nel Cadore, Belluno, ove sembra essere in aumento (*Tissi*). Comune e sedentaria nel Friuli, ove nidifica due volte, in aprile ed alla fine di maggio (*Vallon*). Accidentale nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria : Questa è la specie comune e sedentaria nel Nizzardo, certamente a Nizza (*Gal*). Rara nel distretto di Savona; so di due prese in Albissola nel 1867, una il 18 ottobre, l'altra il 20 dicembre (*Piccone*). Accidentale in quello di Spezia, ne ebbe uno a Sarzana il prof. F. Magni-Griffi (*Carazzi*).

23. *Coccothraustes vulgaris*, Pall. ex Willugh.

FROSONE.

Fruson, Sfrison, Frixioun (*Basso-Piem.*) — Frisù (*Berg.*) — Sfrisott (*Cividale*) — Becogrosso (*Rovigo*) — Sfrison (*Veneto*) — Frison (*Vergato*) — Farsón (*Bol.*) — Pessa-nos (*Nizza*) — Scosson, Scossa nuci (*Spezia*) — Nociotto (*Garf.*) — Frocione (*Viterbo*) — Fringieddone (*Bari*) — Spezza-fierr, Fringiddastra (*Puglie*) — Frosolone (*Nap.*) — Spinso imperiale, Frisuni, Pizzicafirru (*Calab.*) — Spunzuni imperiali (*Messina*) — Tistuni (*Lentini*) — Scaccia-miennuli (*Modica*) — Beccu-grossu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte : Si trovano quasi tutti gl'inverni esemplari di questa specie nei dintorni di Cuneo; in provincia è frequente e nidifica nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*); nella seconda quindicina di maggio del 1881 ebbi una femmina di questa specie che aveva già le uova formate, cosa che mi fa credere che qualche coppia rimanga tutto l'anno nel distretto di Torino. (*Gi-*

scu). Di passo irregolarissimo nel Basso Piemonte dalla metà di agosto fin oltre il novembre; qualcuno nidifica sugli alti monti del versante settentrionale dell'Appennino Ligure nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Non è accertata la sua nidificazione nell'Ossola, ove giunge più o meno numeroso in autunno (*Bazetta*); nidifica una sola volta nel maggio in Valsesia (*Guarimoni*); di passo autunnale nel distretto di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comune in collina nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Comune e stazionario nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo nella Lombardia in generale al piano ed in collina (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Comune verso la fine dell'autunno nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Frequente, nidificante, erratico e di doppio passo nel Cadore, Belluno, ove sembra essere in diminuzione (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune e nidificante nel Friuli, di dove emigra nell'inverno (*Tallon*); è divenuto più raro che nel passato nel distretto di Cividale, ove pare sedentario (*Del Torre*). Comune e anche sedentario nelle prov. di Padova (*Arri-goni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune e nidificante nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove rimane tutta la bella stagione; si prende in quantità grande ai canepai e all'acqua (*Bacchi della Lega*). Scarso, nidificante ed erratico nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Più o meno numeroso secondo gli anni nel distretto di Savona, ove è specialmente invernale; forse nidifica ai monti (*Piccone*). Frequente nel distretto di Arenzano, passa da E. ad O. in autunno, da O. ad E. in primavera (*Luciani*). Frequente e probabilmente anche sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune in ottobre, passa in abbondanza ogni due anni nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Forse sedentario nel distretto di Fauglia, ove ebbi i giovani in luglio; alcuni anni abbondante al passo autunnale, meno al ripasso in marzo (*Ott*); di passo in ottobre nei distretti di Lari e Peccioli, Pisa (*Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è frequente di passo in settembre-ottobre e marzo, qualcuno nidifica nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*); in quello d'Empoli si vede a brachi nell'autunno, gli ultimi in novembre (*Fucini*); comune di passo e anche nidificante nei distretti di Fiesole, Sesto-fiorentino e Signa (*Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente di doppio passo nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). In Val di Chiana non è ogni anno ugualmente abbondante; alcune coppie vi nidificano (*Griffoli*). Passa in ottobre, ma è anche nidificante nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); comune al passo autunnale che fu copioso nel 1884, scarso nel 1886, in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Sedentario, ma specialmente di passo irregolare in settembre, ottobre e marzo, nel Senese (*Dei*); invernale in Maremma (*Ademollo*). Sedentario e comune in Toscana, nel 1885 ha nidificato anco nei pressi di Firenze; i cacciatori chiamano i giovani « Frusoni scopini », li credono specie distinta e che passa prima degli altri Frosoni (*Roster*).

Marche: Comune ovunque ed erratico (*Paolucci*). Nidifica in scarso numero sui monti di Urbino (*Carpegna*).

Lazio: Scarso, ma anche sedentario e nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente, di passo nella prima metà di aprile ed in quella di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale, giunge alla metà di ottobre e parte in marzo ed in aprile (*De Romita*).

Calabrie: Comune in aprile e maggio nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Comune nel piano di Palmi (*Moretti*); scarso nei dintorni di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina, ove qualcuno si

vede tra ottobre e novembre (*Ruggeri*); forse vi è nidificante (*Pistone*). Scarso, di passo dal 15 ottobre al 15 novembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Non abbondante in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Poco frequente ai colli in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e nidificante, specialmente al Capo settentrionale, anche invernale e di doppio passaggio (*Bonomi*).

24. *Ligurinus Chloris* (Linn.) (ex Gesn.)

VERDONE.

Verdòn, Gialdòn (*Basso-Piem.*) — Verdér (*Mantov.*) — Zherant, Ferant (*Culore*) — Zharant (*Feltre*) — Çirànt, Semenzarul (*Friuli*) — Scerante (*Rovigo*) — Garziero, Schiarante, Scerante (*Ven.*) — Antón (*Ravenna*) — Vardón (*Bol.*) — Carenuolo, Calenzolo (*Pisa*) — Carenzolo (*Fucecchio*) — Calenzólo (*Casentino*) — Verdone (*Val di Chiana*) — Verdone (*I. di Giglio*) — Frosone (*Marche*) — Lucro (*Perugia*) — Vitaruolo (*Campobasso*) — Virdune, Virduni, Verdona (*Calabria*).

Piemonte: Frequente e sedentario al piano ed al monte in prov. di Cuneo; vi nidifica in aprile ed in giugno (*Abre*). Così in prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Uccello stazionario e fra i più comuni in tutto il Basso Piemonte: molti però al giunger dell'inverno partono in cerca di clima più temperato. (*Camusso*). Nidifica nell'Ossola ove molti ne giungono poi in autunno ed in primavera (*Bazetta*). Così nei distretti di Varallo e Piedimulera, Novara (*Guarinoni, Danisi*); è di scarso passo primaverile in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Frequente ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Estivo e di passaggio nel Comasco (*Rosales*). Scarso

nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Abbondante nella prov. di Cremona, ove pochi rimangono a svernare (*Ferragni*). Comunissimo in quella di Mantova (*Paglia*). Comune assai al piano ed in collina nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Sedentario nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Sparso nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente, nidificante e di doppio passo nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune e sedentario nel Friuli, vi nidifica in maggio e giugno (*Vallon*); specialmente sulle Prealpi (*Del Torre*). Sedentario e comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo e stazionario durante la bella stagione nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Comune, nidificante ed erratico nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passo autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Sedentario nel distretto di Savona, ma più specialmente invernale (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano, ove passa da E. ad O. in autunno e da O. ad E. in primavera (*Luciani*). Abbondante e sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario, più abbondante d'inverno, nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune e sedentario, più abbondante al passo in ottobre che non in quello di marzo ed aprile nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott. Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è frequentissimo, sedentario e di passo in settembre, ottobre e marzo, aprile (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Comune e anche sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Comune assai durante il passo autunnale e anche sedentario in Val di Chiana (*Girifoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune, sedentario e di passo nelle

prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario ed abbondante in Toscana; nel settembre 1885 trovai i giovani comuni sull'Appennino pistoiese (*Roster*).

Marche: Comune, di doppio passo e sedentario; nidifica in maggio e giugno (*Paolucci*).

Lazio: Scarso, ma sedentario e nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e nidificante in collina nel distretto di Ielsi, Campobasso; passa in maggio ed ottobre (*D'Amico*).

Campania: Sedentario e comune nella prov. di Napoli (*Fraanceschini, Monticelli*). Nidificante e sedentario all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Forse sedentario, giacchè in luglio ed agosto si sono presi i giovani nel primo abito, specialmente però invernale e di doppio passo in ottobre ed aprile (*De Romita*).

Calabrie: Comune al passo primaverile nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Invernale e comune di passo in settembre, ottobre nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune e sedentario al piano nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante dal settembre all'aprile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Di doppio passo, poco frequente al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Frequente e nidificante ovunque (*Bonomi*).

25. *Chloroptila Citrinella* (Linn.) ex Gesn.)

VENTURONE.

Canarin d'mountagna (*Cuneo*) — Fradelin (*Cadore*) — Lugaö còrso (*Savona*) — Canariu, Canarieddu de' monti (*Sard.*).

Piemonte: Scarso, ma sedentario in montagna, nella prov. di Cuneo (*Abre*). Molto scarso in prov. di Torino (*Gasca*). Ebbi in dono dal signor Carlo Bainotti per la Collezione italiana maschio e femmina giovani nel primo abito, colti a Prè S. Didier, Aosta, il 25 agosto 1887 (*Giglioli*). Il capitano Bazetta menziona con dubbio questa specie dall'Ossola; osservo però che il dott. Pertusi ne donò un maschio adulto in abito nuziale al R. Museo di Firenze, preso su quei monti, ove probabilmente nidifica, il 4 aprile 1877 (*Giglioli*). Sedentario nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*); rarissimo di passo autunnale, in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Raro al piano ed in collina (*Turati*). Un maschio venne preso alla Caima presso Pavia verso il 20 ottobre 1881 (*Pavesi*).

Veneto: Frequente nel Cadore, Belluno, vi nidifica una sola volta nel giugno sugli alberi di alto fusto, depone da 8 a 12 uova; passa in aprile ed ottobre (*Tissi*). Accidentale nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di passaggio regolare ed abbondante nell'autunno (settembre, ottobre) nel Nizzardo; è certamente sedentario ai monti (*Gal*). Di scarsa ed irregolare comparsa nel distretto di Savona (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano, ove si vede frammisto ai branchi di Lucarini nell'autunno (*Luciani*). Rarissimo al piano e scarso ai monti nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Un individuo di questa specie sarebbe stato preso colla « prodina » nel distretto di Fucecchio, prov. di Firenze; fu creduto un ibrido, ma è descritto con molta esattezza dal dott. A. Lenzi (*Giglioli*).

Sardegna: Da soli sei anni trovato comune e nidificante, abita i monti e specialmente quelli del Nuorese: furono scoperti i nidi presso la chiesa ed il convento di Nuoro e nelle vicinanze di Orune. Nei rigidi inverni scende al piano (*Bonomi*). Ebbi dal Bonomi per la Collezione italiana un maschio di questa specie, preso a Cagliari il 28 novembre 1887, che è notevole per la vivacità dei colori (*Giglioli*).

26. Chrysomitris Spinus (Linn.) (ex Aldrov.)

LUCARINO.

Lucarin, Lugaén (*Basso-Piem.*) — Rigolin, Rigorin (*Ossola*) — Logherì (*Berg.*) — Lugherin, Lugher (*Cadore*) — Lugherin (*Feltre*) — Lujer (*Cividale*) — Lügain (*Spezia*) — Lugaö (*Gen.*) — Lugarén (*Rav.*) — Lucherino (*Pisa*) — Lècura (*Nap.*) — Licuru (*Mess.*) — Cardillina groga (*Sard.*).

Piemonte: Frequente al monte ed al piano nella prov. di Cuneo, vi nidifica nel maggio; è però specie erratica (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*, *Martorelli*). Nel Basso Piemonte è solo di passo intermittente; incomincia a passare in ottobre, continuando a lasciarsi vedere per tutto l'inverno, scompare affatto a primavera (*Camusso*). Nell' Ossola nidifica ai monti e compare in branchi nell'autunno (*Bazetta*). Pare che nidifichi in Valsesia (*Guarimoni*); è abbondantissimo, sedentario e di passo autunnale nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara (*Demori*, *Danisi*).

Lombardia: Comunissimo ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passaggio nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Di passaggio copioso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio irregolare in autunno e primavera (*Magretti*). Di passo irregolare nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente d'autunno in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto: Ho potuto accertare la nidificazione di questa specie nelle abetine delle pendici dell'alta Val Sugana (*A. Bonomi*). Di passaggio nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*); scarso nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente ai monti nel

Cadore, Belluno, ove nidifica casualmente e passa in aprile, ottobre e novembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove talvolta nidifica e passa anco in marzo e settembre (*Delaito*). Comune dall'ottobre all'aprile nel Friuli, nel 1881 giunsero in straordinaria abbondanza; non so se vi nidifica (*Vallon*); nel distretto di Cividale qualcuno nidifica (*Del Torre*). Comune, più specialmente ai colli, nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Poco comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di solo passaggio irregolare nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona si vede dalla metà di settembre a quella di novembre, alcuni vi svernano; parte o ripassa dal marzo alla fine dell'aprile (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano, ove è comune (*Luciani*). Molto abbondante in alcuni anni e scarso in altri nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune di doppio passo, specialmente in settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). In taluni anni di passo copioso in ottobre, marzo ed aprile nei distretti di Fauglia e Ghizzano (*Ott, Venerosi*); scarso; dicesi che il passo abbondante in ottobre avvenga ogni tre anni nei distretti di Lavajano e Cedri, Pisa (*Papasogli, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è di scarso passaggio in marzo ed ottobre, nei distretti di Fucecchio ed Empoli ove in passato era più frequente assai (*Lenzi, Turchetti, Fucini*); abbondante, ma non ogni anno in quello di Fiesole, ove ne ho presi anco nell'estate (*Gargioli*); così nei distretti di Sesto fiorentino e Signa (*Giusti, Fontebuoni*). Scarso in ottobre nel Casentino, Arezzo (*Boni, Paner*). Di solo passo in Val di Chiana, una volta era abbondante durante quello autunnale, ora si è fatto scarso (*Griffoli*). Di passo autunnale, qualche anno abbondante nel distretto di Sarteano. Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano, ove sembra essere anco sedentario (*Paulucci, Marri*). Di passo

ora copioso, ora scarso in ottobre e novembre nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei*). In scarso numero sedentario in Toscana, ma in alcuni anni abbonda al passo; non credo manchi mai del tutto; nell'agosto ho veduto un giovane preso a Vallombrosa, evidentemente nato in quei pressi (*Roster*).

Marche: Scarso, passa in marzo, aprile ed in ottobre (*Paolucci*).

Campania: Frequente di passo in marzo ed ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale e di doppio passo, ma non tutti gli anni e non abbondante (*De Romita*).

Calabrie: Autunnale nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Di passo irregolare, talvolta abbondante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Accidentale al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Arriva in autunno e parte in primavera (*Bonomi*).

27. *Carduelis elegans*, Steph.

CARDELLINO.

Cardanin, Sganzlin, Cärzlin, Cardénn-a, Ciardoulina (*Basso-Piem.*) — Lavarin (*Valt.*) — Raari (*Berg.*) — Gardlén (*Ravenna*) — Gardlin (*Vergato*) — Cardouniera (*Nizza*) — Cardainhâ (*Arenzano*) — Cardain (*Spezia*) — Cardello, Cardillu, Cardijuzzu, Ramaci, il giov. (*Calabr.*) — Cardillinu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Frequente e sedentario al monte ed al piano nella prov. di Cuneo, vi nidifica in aprile e giugno (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Comune e stazionario nel Basso Piemonte (*Camusso*). Nell'Ossola è comune, nidifica di preferenza al piano e giunge di passo in branchi (*Bazetta*). Così nei distretti di Varallo e Piedi-

mulera, Novara (*Guarinoni, Danisi*); sedentario e scarso in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comunissimo, specialmente al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Estivo e di passaggio nel Comasco (*Rosales*). Frequente al piano, scarso ai monti nella prov. di Bergamo, ove è sedentario (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Abbondante e stazionario nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). E nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Sparso, nidificante, erratico e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune, nidificante e di doppio passaggio nel Cadore, Belluno; nell'inverno 1887, rimasero molti Cardellini nel Cadore, caso straordinario spiegato dalla abbondante fruttificazione di larici, dei cui semi questa specie è ghiotta. Si sono notati rari casi di ibridismo tra questa specie ed il Lucarino (*Tissi*). Frequente, sedentario e di passo in marzo ed ottobre nel distretto di Feltre (*Delaito*). Frequente nel Friuli, da dove non emigra negli inverni miti (*Vallon, Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo nella bella stagione e nidificante nelle prov. di Ravenna e Bologna, sparisce nell'inverno (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario e di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Nidifica ai colli nel distretto di Savona, ove è più abbondante nell'inverno (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Abbondante e sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune, sedentario e di passo nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Sedentario e di doppio passo copioso nei distretti di Fauglia, Lari e Pecioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella

prov. di Firenze è comune, sedentario e di passo in ottobre e marzo, aprile (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*); si distingue una razza più grossa detta « lombarda » (*Gargioli*). Abbondante e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune e sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario e di passo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*); col nome di « Cardellino montanaro » nel Senese si distingue una razza di dimensioni sensibilmente maggiori ed a colori più vivaci, che non è sedentaria, ma giunge alla metà di ottobre (*Dei*). Sedentario e nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario ed abbondantissimo in Toscana; i maschi immigranti che passano separati dalle femmine si distinguono come « Cardellini Lombardi » (*Roster*).~

Marche: Comune ovunque, di doppio passo e sedentario; nidifica in maggio, giugno e luglio (*Paulucci*).

Lazio: Frequente e sedentario in collina nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Sedentario e comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Nidificante e sedentario all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Sedentario e comune, dall'ottobre all'aprile molti giungono a svernare (*De Romita*).

Calabrie: Comunissimo e sedentario nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio, ove è più abbondante nell'inverno (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Sedentario e abbondante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Comune, sedentario, ma più abbondante nell'inverno in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente, sedentario e più abbondante in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario; questa specie presenta interessanti variazioni individuali nelle dimensioni e nella intensità dei colori (*Bonomi*).

28. *Serinus hortulanus*, Koch.

VERZELLINO.

Serin, Sirin, Saien (*Basso-Piem.*) — Sverzeri (*Berg.*) — Sgarzorin, Verdosiin (*Milano*) — Sfrisarin, Frisarin (*Veneto*) — Trementin (*Vicenza*) — Fraselin (*Feltre*) — Sfrisarin (*Ro-vigo*) — Varzlén (*Ravenna*) — Varzléin (*Bol.*) — Giallino, Cardarugiolo (*Vergato-Porretta*) — Rapalin (*Spezia*) — Sverzellino (*Fucecchio*) — Raperino (*Val di Chiana*) — Cardillo selvaggio (*Campobasso*) — Rapparello, Virdejuzzu (*Calabr.*).

Piemonte: Scarso in montagna nella prov. di Cuneo; di passo in ottobre (*Abre*). Non comune nella prov. di Torino, ove però nidifica; le spedisco due giovani maschi entrambi, ma assai diversi, uccisi il 21 giugno 1886 presso Moncalieri (*Bainotti*). Arriva in autunno contemporaneamente ai Luca-rini, ed in piccoli branchetti nel Basso Piemonte. Il suo passaggio è però irregolare, stando spesso alcuni anni senza lasciarsi vedere. Non annida da noi (*Camusso*). Nell' Ossola nidifica di preferenza al monte in scarso numero, giunge di passaggio in autunno e primavera (*Bazetta*). Nidifica in Val-sesia (*Guarinoni*).

Lombardia: Frequente ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso, di solo passaggio nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Di scarso pas-saggio in ottobre e novembre soltanto nella prov. di Cre-mona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Raro al piano ed in collina nella Lombardia (*Turati*); co-mune (*Borromeo*).

Veneto: Frequente nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso ai monti nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Scarso, nidificante e di passo in marzo e settem-

bre nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Raro nel Friuli, vi nidifica però ai monti (*Vallon*); rarissimo (*Del Torre*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non tanto comune e di passo nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Nidificante ed erratico nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passaggio autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona dai primi di ottobre alla metà di novembre e dai primi di aprile a quelli di maggio (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove passa da E. ad O. in autunno e da O. ad E. in primavera (*Luciani*). Abbondante, talvolta nidifica sui monti nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Solo di passo autunnale nella prov. di Lucca (*Martorelli*); comune assai e anche sedentario (*Fontebuoni*, *Gragnani*). Di doppio passaggio regolare e copioso nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); non frequente in ottobre in quelli di Lavajano, Ghizzano e Cedri (*Papasogli*, *Venerosi*, *Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è scarso di passo in agosto e settembre nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*, *Turchetti*); nidificante da circa 50 anni in quello di Empoli (*Fucini*), frequente e anche sedentario in quello di Fiesole (*Gargioli*); scarso, nidificante e di passo anche in ottobre e marzo in quello di Sesto fiorentino e Signa (*Ginori*, *Fontebuoni*). Frequente e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Comune, di passo e sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano, ove il passo autunnale è ora scarso or abbondante (*Paulucci*, *Marri*). Comune di passo e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario e comune in Toscana; nel 1884 notai un nido coi piccoli implumi il 21 agosto (*Roster*).

Marche: Comune al piano, passa in marzo ed aprile, quasi mai in autunno (*Paolucci*).

Lazio : Raro assai, ma nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi : Frequente e nidificante nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania : Comune ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Abbondante alle due epoche del passo e durante l'inverno; non consta che qualcuno rimanga a nidificare (*De Romita*).

Calabrie : Comune al passo primaverile nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Comune, specialmente da settembre a gennaio in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Invernale, da settembre all'aprile, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Si vede a branchetti nell'autunno ed in primavera nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Frequente ovunque e nidificante (*Bonomi*).

29. *Serinus Canarius* (Linn.) (ex Gesn.)

CANARIO.

Serinus canaria, Salvad.

Il Salvadori, senza però entrare nel merito della questione, non accoglie questa specie nell'ultimo suo elenco degli uccelli italiani. Io ho potuto confrontare l'unico esemplare che conosco preso in Italia, con uno proveniente dalle Azorre, e li trovai perfettamente identici, onde rimane affatto escluso il caso possibile di un ibridismo e direi ancora di un atavismo.

Devo aggiungere che da una nota data dal professore D. Carazzi nell'interessante suo lavoro sull'ornitologia della Liguria orientale,¹ apprendo che anni fa il prof. Magni-

¹ D. CARAZZI, *Materiali per una Avifauna del Golfo della Spezia e della Val di Magra*, p. 13, nota. SPEZIA, 1887.

Griffi ebbe a più riprese nella piana di Val di Magra, Canarî catturati colle reti, che non mostravano alcuna traccia di schiavitù.

30. *Cannabina Linota* (J. F. Gmel.)

MONTANELLO.

Fanel, Fanét (*Cuneo*) — Fanétto (*Voltag.*) — Monten, Brunel, Cini (*Nov.*) — Finett (*Valt.*) — Ocanell (*Berg.*) — Faganélo, Montanéla (*Padova*) — Faganel nostran (*Calore*) — Fanéll (*Ravenna, Bol.*) — Faneto (*Spezia*) — Faringuello (*Isola di Giglio*) — Ziinu, Ziinu d'erba janca, femm. e juv. (*Messina*) — Fanellu, Zuvinu, Chiochiò (*Terranova Sicil.*).

Piemonte: Frequente al monte e al piano nella prov. di Cuneo; vi nidifica una sola volta, nel maggio (*Abre*). Ebbi un esemplare col capo bianco (*Gasca*); è specie frequente in prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Nel Basso Piemonte è stazionario al monte, di solo passo autunnale al piano; spesso ho incontrato dei branchetti dall'aprile al luglio sui monti presso Voltaggio, composti di qualche diecina d'individui d'ambo i sessi, che mantengonsi uniti come sogliono fare in autunno ed inverno; opino che siano individui d'un anno che non annidano (*Camusso*). Nell'Ossola nidifica ai monti sin oltre i 2000 metri, giunge in branchi alle due epoche del passo (*Bazetta*). Sedentario nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*); scarso di passaggio autunnale in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comunissimo nella prov. di Sondrio, ove vive sui maggenghi e in pianura (*Galli*). Di passaggio abbondante soltanto nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio irregolare nella prima metà di aprile e ottobre (*Magretti*). Puramente invernale nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto: Comune assai sui monti nel distretto di Caprino, Verona, ove è anche sedentario (*Pellegrini*). Frequente nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente al piano nel Cadore, Belluno, vi nidifica e passa in aprile ed in ottobre e novembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa anco in marzo (*Delaito*). Assai comune nell'autunno nel Friuli, pochi svernano e non vi è constatata la nidificazione (*Vallon*); raro nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comunissimo nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune, ma soltanto di passo nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*); poco abbondante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Abbastanza frequente di passo nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio nel Nizzardo, più abbondante nell'autunno (*Gal*). Nidifica in collina nel distretto di Savona, abbonda nell'inverno, molti transitano (*Piccone*). Frequente di doppio passaggio nel distretto di Arenzano, passa da E. ad O. in autunno e da O. ad E. nella primavera (*Luciani*). Si vede a piccoli branchi all'epoca del passo nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Di solo passo autunnale nella prov. di Lucca (*Martorelli*); abbondante in settembre (*Fontebuoni*, *Graguani*). Sedentario e di passo copioso in ottobre e primavera nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli (*Ott*, *Papasogli*, *Degli Alessandri*); i grossi branchi immigranti svernano nei distretti di Lari e Peccioli, Pisa (*Papasogli*, *Venerosi*). Nella prov. di Firenze è frequente al poggio di passo in settembre-ottobre e marzo-aprile nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*, *Turchetti*); vedesi a branchi anche in novembre e dicembre in quello d'Empoli (*Fucini*); comune di passo e anco sedentario in quello di Fiesole (*Gargioli*); piuttosto scarso di passo in quelli di Sesto fiorentino e Signa (*Ginori*, *Fontebuoni*). Frequente ovunque nel Casentino, di doppio passo e nidificante (*Beni*, *Fiorini*); è anche sedentario (*Pauer*). Comune nei due passi e sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo autunnale e nidificante nel distretto di Sarteano,

Siena (*Bargagli*); anco sedentario in quello di S. Gimignano, ove il passo autunnale fu copioso nel 1882 e 1884, scarso o nullo nel 1883 e 1886 (*Paulucci, Marri*). Sedentario ma assai più abbondante in autunno ed inverno nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei*); non tanto frequente in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Sedentario sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Forse sedentario, abbondante al passo in Toscana; credo nidifichi nell'Empolese (*Roster*).

Marche: Frequente ovunque; passa in marzo-aprile ed ottobre-novembre (*Paulucci*).

Lazio: Scarso, ma nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente, passa nella seconda metà di marzo e nella prima di ottobre, nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale e abbondante di passo in ottobre-novembre e marzo-aprile (*De Romita*).

Sicilia: Comune, sedentario e nidificante nella provincia di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Abbondante da settembre a marzo e scarsamente sedentario e nidificante nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Invernale e frequente nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune ovunque e nidificante, frequenta assai le spiagge marine (*Bonomi*).

31. *Cannabina flavirostris* (Linn.)

MONTANELLO FORESTIERO.

Fanello nordico (*Aut. Ital.*).

Lombardia: Rarissimo (*Turati*).

Veneto: Posseggo un individuo morto in gabbia dopo due anni di prigionia; so che fu preso nel distretto di Rovereto, ma ignoro la data precisa della sua cattura (*A. Bonomi*).

Liguria : Di accidentale comparsa invernale nel Nizzardo (*Gal*). Casuale e raro assai nel distretto di Spezia; ne ebbe uno anni fa a Sarzana il prof. F. Magni-Griffi, lo conserva nella sua raccolta (*Carazzi*).

32. *Ægiothus Linarius* (Linn.) (ex Gesn.)¹

ORGANETTO.

Ægiothus linaria, Salvad.

Tarin (*Piem.*) — Cardinali (*Berg.*) — Organin (*Vicenza*) — Congolit, Conghlit (*Cadore*) — Cecè, Cercè (*Belluno*) — Lughérin todesco (*Feltre*) — Faganèlo foresto (*Padova*) — Fanèll d'la Regenna (*Parm.*).

Piemonte : Scarso in montagna nella prov. di Cuneo; di passaggio in ottobre (*Abre*). Molto scarso in prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*).

Lombardia : Scarsissimo e di solo passaggio nella provincia di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano, ove a Castellanza, Gallarate, nella mia uccellanda se ne presero 6 nel 1830, e 20 dal 7 al 9 novembre 1882 (*Brambilla*). Nella prov. di Cremona ebbi un solo esemplare nell'ottobre 1881 (*Ferragni*). Quando passa in Lombardia è abbondante; ma in venti anni due sole volte vidi un tale passaggio: questa specie vi ha però nidificato (*Turati*).

Veneto : Da un branchetto di passaggio il 10 ottobre 1885 a Volano, Trentino, ne furono presi tre; ne ebbi uno colto a Primiero il 19 novembre 1886, e so di altri recati in vendita sul mercato di Rovereto entro quel mese. In certi anni non è raro (*A. Bonomi*). Non raro nel distretto di Caprino, Verona, ma di comparsa irregolare (*Pellegrini*).

¹ Rammento che è facilissimo il confondere questa specie colla seguente, onde le notizie riguardanti l'una e l'altra vanno talvolta accolte con riserva.

Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Da circa 20 anni questa specie sembra essere scomparsa dal Cadore, Belluno (*Tissi*). Di scarso passaggio in novembre nel distretto di Feltre; passano in novembre, soltanto un anno su 12, ma allora giungono numerosi e svernano nei boschi di Ontano, dei cui semi si nutrono (*Delaito*). Di accidentale ed irregolare comparsa nella prov. di Padova, in autunno (*Arrigoni*).

Emilia : Una femmina fu presa presso Parma l' 11 novembre 1887; è l'unico individuo osservato (*Del Prato*).

Liguria : Giunge irregolarmente nel tardo autunno o nell'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Raro e di comparsa irregolare nel distretto di Savona (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano, ove si vede frammisto ai branchi di Lucarini nell'autunno (*Luciani*). Rarissimo nel distretto di Spezia; il prof. F. Magni-Griffi ne conserva due presi a Chiavari molti anni fa (*Carazzi*).

33. *Ægiothus rufescens* (Vieill.)

ORGANETTO MINORE.

Tarin d' mar peit (*Piem.*) — Fanin dla Regina (*Novara*) — Cecciarin (*Como*) — Svèrzul (*Friuli*) — Congolit, Conghlit, Conghlic (*Cadore*) — Cecè grande (*Belluno*) — Cecè (*Feltre*) — Faganèlo foresto (*Padova*) — Tarin (*Nizza*).

Lo Stejneger, il quale poco tempo fa non vedeva in questa specie che una varietà o tutto al più una razza della specie precedente, più tardi (« *Auk*, » 1887, p. 30) non solo la considerava specie ben distinta dall'*Æ. Linarius*, ma si era avviato a fare due specie di Organetto minore: l'*Æ. cabaret* delle isole Britanniche, e l'*Æ. rufescens* delle Alpi; fu specialmente indotto a questo dall'esame di un esemplare italiano che ebbe per mezzo mio. Pochi mesi dopo nel ricevere alcuni esemplari dall'Austria ha dovuto però ricredersi e per ora sembra che ritenga identiche l'*Æ. rufescens* e la

A. cabaret (« *Auk*, » 1887, p. 144). Temo invero di non poter sempre seguire l'illustre Ornitologo di Washington nei voli che si è messo a fare attraverso un'Ornitologia soverchiamente aerea e *Brehmiana*!

Piemonte: Accidentale, il 22 dicembre 1873 ne trovai uno sul mercato di Cuneo; nel marzo 1879 ne ebbi alcuni esemplari presi colle reti nelle vigne (*Abre*). Eccezionalmente raro e di comparsa accidentale nella prov. di Alessandria; io non ne vidi che un solo individuo, femmina, da me ucciso a Voltaggio il 16 novembre 1885 (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, nidifica ai monti e giunge di passo frammisto coi Fanelli comuni (*Bazetta*). Rarissimo, di passaggio dal 15 ottobre al 15 novembre nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune nella prov. di Sondrio, specialmente sui monti (*Galli*). Giunge in aprile nel Comasco e vi nidifica (*Rosales*). Dalle osservazioni di molti anni al Roccolo Lorla vicino a Colico, Como, risulta che in quella località l'*A. rufescens* fa un passaggio annuale quasi regolare tra il 15 ottobre (primi arrivi) ed il 15 dicembre (ultime partenze); non sempre giunge in abbondanza, ma in buone annate se ne sono presi sino a 600 (*Senna*). Scarso nella prov. di Milano (*Brambilla*). Raro in quella di Mantova (*Paglia*). Comune nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*); vi ha nidificato (*Borromeo*).

Veneto: Di passaggio accidentale nel distretto di Bassano, Vicenza (*Ferrari*). Frequente e nidificante ai monti nel Cadore, Belluno; pone il nido sugli alberi agati e frascati, depone 10 a 15 uova ed alleva due covate nel maggio e giugno; si è notato raramente il caso di ibridismo tra questa specie ed il *Chrysomitris Spinus*. L'Organetto minore fa passaggio poi in aprile, novembre e dicembre (*Tissi*). Raro al piano nel Friuli, ove giunge irregolarmente in novembre e dicembre; l'ho veduto in giugno, presso il lago di Cavazzo, Carnia, onde molto probabilmente nidifica ai monti (*Vallon*). Di irregolare comparsa nell'autunno nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di passaggio autunnale quasi regolare nel Nizzardo (*Gal.*). Rarissimo nella prov. di Genova, distretto di Spezia: il prof. F. Magni-Griffi ne ebbe un esemplare da Chiavari (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Firenze, distretto di Fiesole (*Gargioli*): ne conservo due, presi entrambi in ottobre (*Giglioli*). Accidentale nel Senese, uno fu preso in Val d'Arbia in ottobre 1864 (*Dei*).

Puglie: Accidentale affatto: uno venne preso alle reti nel dicembre 1886 presso Monopoli (*De Romita*).

34. *Carpodacus erythrinus* (Pall.)

VERDONE BASTARDO.

Piemonte: Ebbi un solo esemplare di questa specie nel territorio di Voltaggio, è una femmina e venne da me uccisa il 1 novembre 1886; si conserva nella Collezione italiana centrale di Firenze alla quale lo donai (*Camusso*).

Lombardia: Scarso assai (*Borromeo*).

Veneto: Il 28 ottobre 1887 venne colto vivente un individuo di questa specie lungo l'Adige presso Rovereto, che sembra essere una femmina giovane (*A. Bonomi*). Nell'ottobre 1882 un esemplare di questa specie venne preso al roccolo nei pressi di Monselice, Padova, dal signor Simonetto (*Arrigoni*).

Liguria: Di comparsa accidentale nel Nizzardo in autunno (*Gal.*). Così nel distretto di Savona, ove ebbi un maschio il 15 ottobre 1878, ed una femmina il 23 settembre 1882 (*Piccone*). Rarissimo nel distretto di Spezia; ne ebbe uno a Castelnovo-Magra il prof. Magni-Griffi, preso nel maggio 1861 (*Carazzi*).

Toscana: Non tanto di rado capita d'autunno nella prov. di Firenze, nella Collezione italiana ne conservo quattro colti nella provincia, cioè: Firenze agosto 1840, Mugello 25 settembre 1882, Empoli settembre 1884 e Campi-Bisenzio ottobre 1885. Il 29 settembre 1887 il signor Gino Cajani acqui-

stò un giovane di questa specie preso alle reti nei pressi di Firenze, insieme ad un branchetto di Verdoni; ed il 13 ottobre seguente potè acquistarne un secondo pure preso da un tenditore nelle vicinanze della nostra città (*Giglioli*). Di passo scarso ed irregolare in Toscana; pure ritengo che ogni anno qualche individuo giovane giunga da noi nel settembre od ottobre (*Roster*).

Puglie: Accidentale, ma non rarissimo; dall'agosto del 1874 ho notizia di *nove* catture, l'ultima fu il 27 gennaio 1888; tutti erano giovani (*De Romita*).

35. *Bucanetes githagineus* Licht.

TROMBETTIERE.

Il signor G. Abela Pulis, mi scrive da Malta di aver avuto un individuo di questa specie preso colle reti nell'ottobre 1887; egli lo conserva in gabbia.

36. *Pyrrhula europæa*, Vieill.

CIUFFOLOTTO.

Cifulót, Cifulón, Cifulotto, Seiguun (*Basso-Piem.*) — Buvreul (*Novara*) — Gemon (*Valt.*) — Siglot (*Berg.*) — Subiot (*Calore*) — Finch subiot (*Feltre*) — Stufflòtt (*Romagna*) — Zuflótt (*Bol.*) — Sbruttùn (*Ravenna*) — Franguèc main (*Spezia*) — Fringuello marino (*Garf.*) — Zufolotto (*Fiesole*) — Becotto (*Signa*).

Il Salvadori sembra inclinato a ritenere come distinta la *P. major*, Brehm, ma non l'ammette tra le specie italiane (*Ucc. ital.* p. 179); mi pare di avere chiaramente dimostrato (*Avif. Ital.* p. 40) che facendo ciò si commetterebbe un doppio errore.

Piemonte: Scarso in montagna, d'inverno scende al piano nella provincia di Cuneo, nidifica nel maggio (*Abre*).

Così in prov. di Torino (*Gasca*); piuttosto abbondante in certi inverni, non ho potuto constatare la sua nidificazione in provincia (*Martorelli*). Compare nel Basso Piemonte nel tardo autunno protraendo il suo passaggio fino a tutto il febbraio; dopo scomparire totalmente, qualche rara coppia soltanto fermandosi a nidificare sugli alti monti; al piano scende soltanto con abbondanti nevi (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, nidifica e giunge di passo (*Bazetta*). Nidifica in Valsesia ed è specie erratica in quel distretto ed in quello di Piedimulera, Novara (*Guirironi*, *Danisi*); abbondante e sedentario in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comune in montagna nella provincia di Sondrio (*Galli*). Scarso e di solo passaggio nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); ove è di passaggio soltanto nella seconda quindicina di novembre (*Magretti*). Molti comparvero nella prov. di Pavia nell'inverno 1879-80 nei boschi verso la foce del Ticino (*Pavesi*). Invernale e non comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Invernale e poco frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Comune nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*); vi ha nidificato (*Borromeo*).

Veneto: Non comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarso ed erratico nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*); vi nidifica (*Ferrari*). Frequente e nidificante nei boschi resinosi ai monti nel Cadore, Belluno; alleva due covate in aprile e giugno e fa passaggio in marzo e novembre; nel 1887 non pochi svernarono nel Cadore, forse per l'abbondanza di semi di larice (*Tissi*). Così nel distretto di Feltre, ove passa anco in febbraio (*Delaito*). Comune nel Friuli, ove nidifica ai monti in maggio, scende al piano in ottobre per emigrare e torna in aprile (*Vallon*). Io ritengo che vi siano le due razze nel distretto di Cividale; la più piccola si vede da noi soltanto nell'inverno ed ha il becco sudicio di resina, la più grande si vede anche in primavera (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nella prov. di Bologna nidifica sugli alti monti,

di dove scende al piano nell'inverno (*Bacchi della Lega*). Raro nel distretto di Vergato, Bologna, vi nidifica tra i faggi ed i castagni e diventa erratico nell'inverno (*Lorenzini*). Nella prov. di Parma è scarso, ma sedentario; nidifica sull'Appennino e diventa erratico nell'inverno (*Del Prato*).

Liguria : Sedentario nel Nizzardo, nell'inverno scende al piano (*Gal*). Nel distretto di Savona nidifica sull'Appennino, è comune, ma non abbondante al piano nell'inverno (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Spezia, ove nidifica sui monti (*Carazzi*).

Toscana : Di passo in novembre, qualche anno abbondante, nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Scarso e di passo irregolare in ottobre e novembre nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*). Nidificante ai monti nel Casentino, di passo in aprile ed ottobre (*Beni, Pauer*); anche sedentario (*Fiorini*). Giunge in novembre in Val di Chiana, ma non sempre numeroso, vi è assai raro in primavera (*Griffoli*). Di scarso passo autunnale e nidificante ai monti nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); in quello di S. Gimignano avanti l'esteso diboscamento era assai comune e sedentario; ora è scarso ed invernale (*Marri*). Scarso in ottobre e novembre al piano nel Senese, sedentario ai monti, così sull'Amiata e su quello di Cetona (*Dei*; erratico d'inverno in Maremma (*Ademollo*). Sedentario e comune in Toscana, ove nidifica ai monti (*Roster*).

Marche : Scarso ai monti, erratico nell'inverno (*Paolucci*). Nidifica nelle faggete del Sasso di Simone, Urbino (*Carpegna*).

Campania : Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Di accidentale comparsa nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Poco frequente, difficilmente abbandona i boschi delle Murge, ove sarebbe sedentario, per venire al piano del litorale (*De Romita*).

Sicilia : Rarissimo nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*).

Sardegna: Di comparsa accidentale nell'inverno, autunno e primavera al Capo settentrionale (*Bonomi*).

37. *Pinicola Enucleator* (Linn.)

CARDINALE.

Nell'agosto 1887 ho potuto vedere nel Museo Civico di Rovereto, Trentino, l'esemplare di questa specie già da me citato (*Avif. Ital.* p. 41); è un maschio adulto, ma non potetti avere notizie più precise intorno alla sua provenienza di quelle già da me date.

38. *Loxia Pityopsittacus*, Bechst.

CROCIERE MAGGIORE.

Becco storto, Crosnobel grande, Osel tedesco (*Cadore*).

Veneto: Searso in montagna nei folti boschi resinosi nel Cadore, Belluno; vi nidifica due volte in gennaio e febbraio, depone da 4 a 5 uova di color roseo chiaro in un nido costruito in alto sugli alberi di alto fusto; fa un passaggio in luglio ed un altro in novembre e dicembre (*Tissi*).

Liguria: Ebbi dai fratelli Gal un maschio ucciso nei pressi di Nizza nel gennaio 1887 (*Giglioli*). Rarissimo nel distretto di Spezia, prov. di Genova; un maschio ed una femmina colti nella pineta di Chiavari nell'inverno 1851, si conservano nella raccolta del prof. F. Magni-Griffi a Siena (*Carazzi*).

39. *Loxia Curvirostra*, Linn. ex Gesn.

CROCIERE.

Becch stort, Bec-stort, Bec in cros, Beccotorto (*Basso-Piem.*) — Becc in crus (*Berg.*) — Becch in crous (*Milano*) — Crosnobel piccolo (*Cadore*) — Osel tedesco (*Belluno*) —

Crosnobel (*Vicenza*) — Crosnòbl (*Friuli*) — Becc in crós (*Ravenna, Bol.*) — Béco storto (*Spezia*) — Becco-n'-croce, Becco-ingrociato (*Nap.*) — Beccu in cruci. Pappaiaddiscu (*Mess.*) — Pizzu-tortu (*Sard.*).

Piemonte : Scarso al monte ed al piano nella prov. di Cuneo; di passaggio in ottobre e novembre ogni cinque o sei anni (*Abre*). Accidentale nella prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Di solo passo estivo, intermittenemente e di raro si lascia vedere nel Basso Piemonte. Nei monti Liguri è credenza popolare che il Crociere passi solo in quegli anni nei quali inferisce il Colèra (*Camusso*). Nell' Ossola non ebbi mai il nido di questa specie, che vedesi alcuni anni abbondante in ogni stagione, in altri scompare affatto (*Bazetta*). Sedentario e comune nei distretti di Crodo e Piedimulera. Novara (*Demori, Danisi*). Nel distretto di Varallo. Valsesia, è da notarsi che dal 1834, anno in cui questa specie vi fece dal 15 luglio alla metà del settembre copiosissimo passaggio, la sua comparsa si è fatta sempre più rara, ed ora è accidentale affatto; un branco di circa 20 individui apparve nei boschi di Carcoforo nell' ottobre 1878, poi non si è più fatto vedere; è indubitato che la sorte di questa bella specie seguì e segue quella delle abetaie e delle foreste resinose in genere, e che perciò l' essersi resa infrequente in quel distretto può attribuirsi alla distruzione colà avvenuta di siffatti boschi (*Guarinoni*).

Lombardia : Comune nella prov. di Sondrio, ma soltanto ai monti (*Galli*). Di passo irregolare ai monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Scarso in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio irregolare nella prima metà di agosto (*Magretti*). Avventizio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Poco comune in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo, quando passa, in Lombardia (*Turati, Borromeo*); compare in piccoli branchi nelle estati molto calde (*Turati*); vi ha nidificato (*Borromeo*).

Veneto : Di passaggio irregolare nel distretto di Caprino, Verona; pochi nidificano ai monti (*Pellegrini*). Accidentale

nella prov. di Vicenza (*Molari*); di passaggio nel distretto di Bassano, ove è anche nidificante (*Ferrari*). Frequente e nidificante ai monti dei boschi di larici nel Cadore, Belluno; fa due covate, deponendo 4 uova di un roseo chiaro in gennaio e marzo; fa passaggio in luglio ed in dicembre (*Tissi*). Scarso ai monti nel distretto di Feltre, ove è incerta la sua nidificazione ed ove passa anche in giugno; usualmente comparisce di passaggio ogni 5 o 6 anni (*De-laito*). Nel Friuli è abbastanza comune nei boschetti al piano ed in collina nel dicembre (*Vallon*); al dire del signor R. Milesi, nidifica nella Carnia; ne ebbi i giovani a Gorizia (*Del Torre*); nel circondario di Sacile giunge nel luglio, ma il suo passaggio è saltuario ed irregolare (*Chiaradia*). Accidentale nella prov. di Padova, ove dicesi capitì in autunno (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di casuale comparsa in primavera nella prov. di Bologna (*Bacchi della Lega*). Accidentale nella prov. di Parma; si vidèro nel 1879 e nel 1887 in agosto (*Del Prato*).

Liguria: Di irregolare comparsa nell'autunno nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona per anni non si vede, poi giunge in gran numero; durante il passo anteriore a quello del 1875 e di cui non ricordo la data, una coppia di questi uccelli dicono abbia nidificato nel foro di un pero in una mia villa a Zinola (*Vado*); era sul finire dell'inverno (*Piccone*). Di comparsa irregolare, ma copiosa in luglio ed agosto nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Raro e di comparsa irregolare d'estate nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Avventizio nella prov. di Lucca, ne ebbi uno nell'aprile 1880 (*Gragnani*). Di comparsa irregolare in estate ed autunno nella prov. di Firenze (*Turchetti*, *Fontebuoni*); avrebbe anche nidificato nel distretto di Fiesole (*Gargioli*). Raro nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*). Poco frequente e di comparsa irregolare in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo irregolare in autunno, talvolta in gran numero nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di

S. Gimignano (*Paulucci*). Accidentale in ottobre e novembre nel Senese (*Dei*). Di passo irregolare in Toscana, ora più, ora meno abbondante (*Roster*).

Marche: Raro al piano (*Paolucci*). Il 15 settembre 1883 due individui in abito giovanile furono presi nel distretto di Carpegna, Urbino (*Carpegna*).

Campania: Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli; una mattina 13 furono uccisi ad Ischia (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di apparizione irregolare ed estiva, da qualche anno abbondante, ma solo di individui in livrea giovanile (*De Romita*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Pistone*); vi comparve abbondante nel 1838 e 1864, dopo alluvioni (*Ruggeri*). Rarissimo ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di rara comparsa nell'inverno (*Bonomi*).

40. *Loxia bifasciata*, C. L. Brehm.

CROCIERE FASCIATO.

In una gita attraverso i musei principali della Germania e della Scandinavia, fatta nell'autunno 1887, ho avuto occasione di fare un più esteso confronto tra esemplari del Crociere fasciato eurasico e di quello boreo-americano, ed il risultato è che ho dovuto ricredermi sulla presunta loro identità specifica: sta in fatto che gli esemplari boreo-americani hanno sempre un becco assai più esile, oltre altre differenze di minor rilievo. Sono dunque venuto ora alla conclusione che conviene tenerli separati, onde quello eurasico riprende anche per me il nome di *L. bifasciata*. Nella bella collezione del conte senatore G. B. Camozzi-Vertova alla Ranica presso a Bergamo, da me visitata per la prima volta nell'ottobre 1887, ho veduto quattro bellissimi esemplari di questa specie, due maschi e due femmine; il conte Camozzi mi assicurò che erano stati presi nello

vicinanze di Bergamo nell'ottobre 1864 e volle generosamente donarne un paio alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo Zoologico di Firenze.

EMBERIZIDÆ

(Zigoli).

41. *Euspiza melanocephala* (Scop.)

ZIGOLO CAPINERO.

Sia d'Africa (*Savona*) — Notoan de Provenza (*Arenzano*) — Silo testa negra (*Spezia*) — Ziulu testa-nira, Ziulu svariù (*Messina*).

Piemonte: So di una sola cattura di questa specie nella provincia di Torino, avvenuta d'inverno (*Gasca*).

Veneto: Il 28 agosto 1887 potetti esaminare un maschio adulto preso nei pressi di Rovereto e che si conserva nel Museo Civico di quella città (*Giglioli*). Nel Friuli è piuttosto raro, nidifica nel maggio e parte in settembre (*Vallon, Del Torre*). Di comparsa dubbiosa nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Raro nel Nizzardo, ove capita in settembre; ne ebbimo tre nel biennio 1886-87 (*Gal*). Accidentale nel distretto di Savona; ebbi un maschio preso a Savona nella primavera del 1872, e so di un altro preso a Voltri nella primavera del 1873 (*Piccone*). Raro nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Accidentale in quello di Spezia; ne ebbe uno da questa località il prof. Magni-Griffi, e lo conserva nella sua raccolta (*Carazzi*).

Marche: Raro; nidifica in luglio ed agosto (*Paolucci*).

Puglie: Non raro; giunge quasi tutti gli anni ora in maggiore ora in minor numero, ordinariamente verso la

fine d'aprile e in maggio; nel luglio 1873 ne ebbi due giovani (*De Romita*).

Sicilia: Rarissimo nella prov. di Messina (*Ruggeri*; l'ebbi due volte, il 29 dicembre 1882 ed il 10 maggio 1884 (*Pistone*).

42. *Euspiza aureola* (Pall.)

ZIGOLO DAL COLLARE.

Liguria: Accidentalissima nel Nizzardo (*Gal*). Ebbi una femmina di questa specie presa alla pania il 17 settembre 1881, nel piano di Albissola Marina, distretto di Savona; la conservo nella mia raccolta (*Piccone*). Rarissima nel distretto di Spezia; un bel maschio nella raccolta del prof. F. Magni-Griffi a Siena fu preso a Sarzana nel 1878 (*Carazzi*).

43. *Miliaria Projer* (P. L. S. Müll.) (ex Bellon).

STRILLOZZO.

Cantabari, Ciattarón (*Basso-Piem.*) — Tētā-raiss (*Bergamo*). — Pravôun (*Milano*) — Pióch (*Feltre*) — Srdunal, Trentacingliris (*Cividale*) — Fiston, Strilózo (*Veneto*) — Pardir (*Bol.*) — Mätan, Ciataròn (*Gen.*) — Ciattarùn, Silun de montagna (*Spezia*) — Stiaccione (*Lucca*) — Schiattaione, Braviere (*Firenze*) — Sermollo (*Casentino*) — Sturlacchio, Storlacchio, Struacchio (*Nap.*) — Stridulu (*Calabria*).

Piemonte: Scarso in montagna nella prov. di Cuneo ove nidifica nel maggio (*Abre*). Frequente e sedentario in prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Giunge nel Basso Piemonte verso la fine di febbraio in alcuni anni abbondantissimo, in altri più scarso; nidifica ovunque; emigra in autunno (*Camusso*). Scarso di passaggio primaverile nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Nella prov. di Como è di passaggio in settembre e ottobre (*Rosales*). Scarso di solo passaggio al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio irregolare nella seconda metà di novembre (*Magretti*). Stazionario, ma più abbondante d'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Raro nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente al piano, nidificante e di passaggio in aprile, agosto e settembre nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Sedentario nel Friuli, ove è abundantissimo nell'estate e scarso nell'inverno; nidifica in aprile (*Vallon*); comunissimo anche d'inverno (*Del Torre*). Frequente e sedentario nella prov. di Padova, specialmente nei luoghi palustri (*Arrigoni*). Usualmente scarso nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passaggio in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune ed erratico nel distretto di Savona (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove è sedentario (*Luciani*). Invernale e piuttosto scarso nel distretto di Spezia (*Carazzi*). Nel distretto di Sarzana vi fu un copioso passo alla metà di ottobre 1886 (*Lamotte*).

Toscana: Poco frequente, ma sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Graguani*). Sedentario, comune e di copioso doppio passaggio, specialmente in ottobre nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa, (*Ott*, *Papasogli*, *Venerosi*). Sedentario e frequente nella prov. di Firenze, ove è anco di passo in ottobre e marzo (*Lenzi*, *Turchetti*, *Gargioli*, *Ginori*, *Fontebuoni*), scarso, ma sedentario nel distretto di Empoli (*Fucini*). Comune, di passo in aprile e settembre, nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*). Non frequente, ma sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nella Val d'Orcia, Siena (*Bargagli*); comune al passo autunnale nel distretto di S. Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Invernale

e comune ed in scarso numero anche sedentario nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario in Toscana, comune al piano ove nidifica in aprile (*Roster*).

Marche: Frequente e sedentario, nidifica in maggio e giugno, diventa poi erratico (*Paolucci*).

Lazio: Comune al piano, ove nidifica, nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente di passo nella prima metà di aprile ed in quella di ottobre nella prov. di Napoli; alcuni rimangono a nidificare (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentario e comune nelle Murge; molti immigrano pure e in qualche anno, in grande abbondanza (*De Romita*).

Calabrie: Sedentario, ma più frequente nell'inverno nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune ovunque e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, nidificante e di passo in settembre ed in aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Così in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente, sedentario e di passo in primavera nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Frequente ovunque e sedentario (*Bonomi*).

44. **Emberiza Citrinella**, Linn.

ZIGOLO GIALLO.

Pajarina, Giauné, Sia pajéra, Sia pagéa, Pagéa, Spagéa (*Basso-Piem.*) — Amer (*Pinerolo*) — Majarda janna (*Nov.*) — Pajarana (*Berg.*) — Farásaga (*Feltre*) — Squajardola (*Vicenza, Rovigo*) — Fiotto (*Bassano*) — Verda bella (*Cadore*) — Smiardo (*Sacile*) — Ortolan zalo, Squaiandóla (*Padova*) — Pajariz (*Vergato*) — Sia giana (*Arenzano*) — Silo (*Spezia*) — Zirla gialla (*Lucca*) — Ziulu giallu, Ziulu gialinu (*Mess.*) — Zizi, Ziò (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Frequente, al monte d'estate ed al piano d'inverno nella prov. di Cuneo; nidifica in maggio e giugno (*Abbr.*). In prov. di Torino è sedentario e frequente (*Gasca, Pezzi*); lo osservai nidificante in maggio e giugno (*Martorelli*). Comune e nidificante nel distretto di Valtaggio, Alesandria (*Camusso*). Comune e anche stazionario nell'Ossola, vi giunge poi in branchi alle due epoche del passo (*Bazetta*). Così nei distretti di Varallo, Crodo e Piedimulera, Novara; nidifica in Valsesia (*Guarinoni, Demori, Danisi*).

Lombardia: Frequente sui maggenghi ed in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passo copioso nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Stazionario, ma più comune d'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune sui monti nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Nel Cadore, Belluno, è frequente, nidificante e di doppio passaggio in aprile ed ottobre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissimo nel Friuli in autunno, vi è anche sedentario; verso Pontebba nidificano in massa alla fine di maggio (*Vallon*); comune e sedentario nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Frequente e sedentario in collina nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nidificante ed erratico nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Abbastanza frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Numeroso dalla metà di ottobre a tutto novembre e anche d'inverno nel distretto di Savona; riparte nel marzo e nella prima metà di aprile (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente, invernale e di doppio passaggio regolare nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Di passo non abbondante in ottobre nella prov. di Lucca (*Gragnani*); vi è anche sedentario e nidifica

sui monti nei boschi di Faggio a circa 1000 metri (*Martorelli, Fontebuoni*). Di scarso passaggio in ottobre nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Pupasogli, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è invernale e frequente di passo in novembre e marzo (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*); ho ragioni per credere che sia pure sedentario nell' Appennino pistoiese (*Giglioli*). Frequente, di passo in aprile e settembre-novembre e anco sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune nel passo autunnale, raro in quello primaverile in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); di passo autunnale in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Non molto abbondante da ottobre a marzo nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune in Toscana, sedentario ai monti, ove nidifica (*Roster*).

Marche: Scarso ed erratico ai monti, vedesi coi forti freddi (*Paolucci*).

Campania: Scarso ai monti nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale, conosco una sola cattura (*De Romita*).

Sicilia: Rarissimo nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Sedentario, ma non comune nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

45. *Emberiza Cirlus*, Linn. (ex Aldrov.)

ZIGOLO NERO.

Trasola grisa, Sia, Sia muntagninn-a (*Basso-Piem.*) — Majarda neigra (*Novara*) — Ortolan spajardaa, Zioin (*Milano*) — Zigolo (*Vicenza*) — Verda brutta (*Cadore*) — Zi (*Sacile*) — Cia, Zia, Sia, Pionsa mora (*Padova*) — Sirou (*Nizza*) — Sia nostrâ (*Arenzano*) — Silo (*Spezia*) — Zigolo, Zigolino (*Pisa*) — Zirla, Zirla nera (*Lucca*) — Zigolo, Nizzola (*Val di Chiana*) — Zul maren (*Bol.*) — Zivola (*Viterbo*) — Perruzza (*Calabr.*) — Zuinu (*Modica*) — Orgiali grogu, Macottu giammu (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al monte, di passo nella prima metà di novembre, nella prov. di Cuneo (*Abre*). Piuttosto scarso in prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Nel Basso Piemonte annida al monte, ove è molto comune nel tempo del passo autunnale, che protrae fino ad inverno avanzato; al piano scende solo nella stagione freddissima (*Camusso*). Nell' Ossola capita in piccoli branchi nell' autunno (*Bazetta*). Nidifica in Valsesia una sola volta dal maggio al giugno; è erratico nel distretto di Piedimulera (*Guarimoni, Danisi*).

Lombardia: Poco frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Invernale e non comune in quella di Cremona (*Ferragni*). Poco frequente nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non comune nel distretto di Caprino (*Pellegrini*). Frequente e nidificante nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente, nidificante e di passo in maggio ed ottobre nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Raro nel Friuli, ove compare irregolarmente nell' autunno (*Vallon*); raro assai nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Nidificante nel distretto di Savona e abbondante di passaggio e nell' inverno (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Più scarso della specie precedente, più facile a trovarsi d' inverno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non comune nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune e sedentario, ma più abbondante alle due epoche di passo nei distretti di Fauglia e Peccioli. Pisa (*Ott, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella provincia di Firenze è sedentario e frequente di passo in ottobre-novembre e marzo-aprile (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Comune e sedentario nel Casentino, Arezzo, ove è anche di passo in aprile e settembre-novembre (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune d' inverno, non in scarso numero anche sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gi-

mignano (*Paulucci, Marri*). Sedentario ed anche invernale nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Sedentario e nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario, ma meno abbondante della specie precedente in Toscana: nidifica in maggio, giugno e luglio; ho veduto i giovani alla Consuma il 17 luglio 1884 (*Roster*).

Marche: Frequente ovunque e sedentario; nidifica in maggio e giugno (*Paolucci*).

Lazio: Abbastanza frequente e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Scarso ai monti nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di passo regolare e piuttosto abbondante in novembre ed aprile; rimane l'inverno (*De Romita*).

Calabrie: Comune d'inverno nel distretto di Maida, Caltanzaro (*De Fiore*). Così nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune, specialmente ai monti, e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, nidificante e di passo in settembre e marzo, nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Sedentario ai monti, ma poco frequente nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Sedentario e frequente, nidifica ai monti e scende al piano l'inverno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Frequente, sedentario e di doppio passo, abita il piano e le vallate ovunque (*Bonomi*).

46. *Emberiza Hortulana*, Linn. (ex Gesn.)

ORTOLANO.

Liabèn (*Alba*) — Ortrán, Ortranin, Nottuán (*Basso-Piem.*) — Ortolà (*Berg.*) — Ortolanel (*Sacile*) — Ortolan, Duraldi (*Padova*) — Ourtoulan (*Nizza*) — Nuttuan (*Gen.*) — Ortolàn (*Spezia*) — Ortolano (*Napoli*).

Piemonte: Frequente in prov. di Cuneo (*Abbrè*). Scarso nella prov. di Torino, qualche coppia venne trovata nidificante a Collegno e Rivoli; ne ebbi uno colla testa bianca (*Gasca*); estivo e abbastanza frequente (*Martorelli*). Nel Basso-Piemonte è comunissimo e prettamente estivo, giunge in primavera, nidifica e scompare in ottobre; ebbi a notare un singolare caso di melanismo, seppure si può così chiamare, in questa specie; era un maschio, superbo cantatore, visse in gabbia tre anni e finì in bocca di una Donnola: aveva il petto del solito grigio rossastro, le ali di un castagno scuro e così la testa ed il collo. Nei due primi anni mantenne alla muta i caratteri indicati e al terzo anno il castagno si mostrò alquanto più chiaro (*Camusso*). Nell'Osola giunge in primavera ed in autunno; alcune coppie vi nidificano (*Bazetta*). Così nei distretti di Piedimulera e Crodo, Novara (*Demori, Danisi*).

Lombardia: Sparso, ma non comune nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nella prov. di Como giunge alla metà d'aprile e parte in agosto e settembre (*Regazzoni, Bernasconi*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passo abbondante nella prima quindicina di agosto (*Magretti*). Estivo e nidificante in abbondanza nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente d'estate in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Vive sui monti nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Comune in collina ove nidifica, nel distretto di Bassano, Vicenza (*Ferrari*). Frequente al piano, nidificante e di passo in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Nel Friuli è estivo ed abbondante, giunge in aprile e parte in ottobre, nidifica ovunque in maggio e giugno (*Vallon*); era una volta più comune nei pressi di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Poco comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune nella bella stagione nelle prov. di Ravenna e di Bologna (*Bacchi della Lega*). Scarso, nidificante ed estivo nel distretto di Vergato, Bologna (*Loren-*

zini). Estivo nella prov. di Parma; ebbi il nido con uova l'8 luglio (*Del Prato*).

Liguria: Estivo e comune nel Nizzardo (*Gal*). Abbondante in collina, ove nidifica nel distretto di Savona; vi giunge dalla metà di aprile a quella di maggio e parte tra la metà di agosto e quella di settembre (*I'iccone*). Frequente di passo in primavera (15 aprile al 15 maggio) nel distretto di Arenzano, ove alcune coppie nidificano ed è scarso il passo autunnale (*Luciani*). Frequente, di doppio passo (maggio ed agosto) ed estivo e nidificante nel distretto di Spezia (*Carazzi*). Nell'aprile 1887, fu scarso assai il passo nel distretto di Sarzana (*Lamotte*).

Toscana: Estivo, ma non comune, giunge in maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Estivo e comune assai nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in agosto in quelli di Lavajano e Peccioli (*Papasogli, Venerosi*). Nella prov. di Firenze è estivo e scarso di passo in maggio, luglio ed agosto-settembre nei distretti di Fucecchio e d'Empoli (*Turchetti, Fucini*); frequente d'estate in quelli di Fiesole, Sesto fiorentino e Signa (*Gargioli, Ginori, Fontebuoni*); in quel di Fiesole si distingue una razza piccola detta « scopina » (*Gargioli*). Estivo ai monti nel Casentino, Arezzo, ove è di passo in aprile ed agosto-settembre (*Beni, Fiorini, Pauer*). Estivo e frequente in Val di Chiana, abbonda più in agosto e settembre (*Griffoli*). Comune dall'aprile al settembre nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); estivo, ma non abbondante; scarso al passo autunnale in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune da marzo a settembre nel Senese (*Dei*); scarso in agosto nella Maremma (*Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo in Toscana e nidificante in gran copia ai monti (*Roster*).

Marche: Comune al piano; arriva in aprile e maggio. nidifica in maggio e giugno, parte in agosto-settembre (*Paolucci*).

Campania: Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Ora più ora meno abbondante si vede soltanto di passo alla fine di marzo ed in aprile (*De Romita*).

Sicilia: Estivo, ma scarso nella prov. di Messina; di passo in aprile-maggio (*Ruggeri, Pistone*). Scarso in collina nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

47. *Emberiza caesia*, Cretzsch.

ORTOLANO GRIGIO.

Sia, Sia muntagninn-a (*Basso-Piem.*) — Zigolo rugginoso (*Marche*) — Ziulu niru (*Mess.*).

Piemonte: Presi all'uccelliera una femmina di questa specie il 7 novembre 1883 nei pressi di Voltaggio, Alessandria (*Camusso*).

Veneto: Accidentale nel Friuli, uno l'ebbi nell'autunno 1880, e nel Museo di Udine se ne conserva un secondo (*Vallon*).

Liguria: Raro nel Nizzardo, ove capita irregolarmente nell'inverno (*Gal*). Rarissimo nella prov. di Genova distretto di Spezia; il prof. Magni-Griffi ne ebbe due a Sarzana in aprile (*Carazzi*).

Marche: Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Pistone*).

48. *Emberiza Cia*, Linn.

ZIGOLO MUCIATTO.

Sia, Sia nostrâ (*Basso-Piem.*) — Vinaccina (*Nov.*) — Spions (*Berg.*) — Zia (*Milano*) — Pionza (*Vicenza*) — Zhilgnóch (*Feltre*) — Zipp (*Cividale*) — Sia, Sióto (*Padova*) — Siga cendrova (*Nizza*) — Sia russa, Sia montagninna (*Gen.*) — Silo d'inverno (*Spezia*) — Mugiatto (*Pisa*) — Zirla, Zirla mucciata (*Lucca*) — Zigolo mugiatto (*Sesto fiorentino*) — Nizola cenerina (*Sarzano*) — Ziulu cinnirinu, Ziulu (*Mess.*).

Piemonte: Frequente ai monti nella prov. di Cuneo; vi nidifica in maggio (*Abre*). Scarso in prov. di Torino (*Gasca*); piuttosto frequente (*Martorelli*). Abbastanza comune al monte, nel distretto di Valtaggio, giunge a primavera, nidifica e parte al giunger dell' inverno (*Camusso*). Nell' Ossola è di passaggio in autunno e primavera, qualcuno rimane a nidificare (*Bazetta*). Erratico nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*); abbondante e sedentario in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comunissimo nella prov. di Sondrio, vive nelle vigne e sui maggenghi (*Galli*). Di passaggio nel Comasco in settembre ed ottobre (*Rosales*). Frequente, ma soltanto durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Di rara comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in collina ed ai monti in Lombardia (*Turati*); scarso (*Borromeo*).

Veneto: Comune in autunno nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente nella prov. di Vicenza (*Molari*); piuttosto scarso, ma nidificante in quel di Bassano (*Ferrari*). Frequente ai monti nel distretto di Feltre, Belluno, ove non nidifica e passa in marzo, ottobre e novembre (*Delaiton*). Comune assai nell' autunno nel Friuli, nidifica ai monti nel maggio (*Vallon*); abbonda tutto l' anno nei boschi ai monti nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Poco frequente, ai colli, nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Nidifica in collina nel distretto di Savona, ove abbonda più durante il passo e nell' inverno (*Piccone*); in quello di Arenzano è frequente nell' autunno e nell' inverno (*Luciani*). Nidifica ai colli e scende d' inverno al piano nel distretto di Spezia ove è comune (*Carazzi*).

Toscana: Sedentario, comune e di passo in ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune d' inverno ed alle epoche del passo nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in ottobre in quello di Lavajano (*Papassogli*). Nella prov. di Firenze è scarso in novembre e dicembre nei distretti di Fucecchio ed Empoli (*Turchetti*, *Fucini*);

comune di passo in quelli di Fiesole, Sesto fiorentino e Signa (*Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente e anche sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Comune durante il passo autunnale in Val di Chiana, scarso in altre stagioni (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Invernale e non tanto comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Sedentario e comune al passo in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso ai monti ed erratico (*Paolucci*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di accidentale comparsa in primavera (*De Romita*).

Calabrie: Non raro d'inverno nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune nella prov. di Messina, di passo dalla metà di ottobre a quella di novembre (*Ruggieri, Pistone*). Sedentario e frequente ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Accidentale, lo notai nel Sassarese (*Bonomi*).

49. *Emberiza leucocephala*, S. G. Gmel.

ZIGOLO GOLAROSSA.

Lombardia: Rarissimo (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nel Museo Civico di Rovereto ho esaminato un esemplare di questa specie colto nei pressi di quella città. Ho pure saputo che il 3 dicembre 1888 il signor M. Gianese di Lonigo ebbe un maschio di questa specie, preso vivo colle reti su quei colli (*Giglioli*).

Liguria: Accidentale nell'autunno ed inverno nel Nizzardo (*Gal*). Raro assai nel distretto di Savona, vi ebbi un maschio il 10 gennaio 1883 (*Picconeri*). Di casuale comparsa nel distretto di Spezia, ne ebbe uno a Sarzana nel novembre 1861 il prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana : Non tanto raro nella prov. di Firenze nell'autunno e nell'inverno, nella Collezione italiana ne conservo cinque presi a : Marradi febbraio 1874, Prato novembre 1868 e novembre 1878, Firenze 20 ottobre 1881 ed Impruneta 12 novembre 1882. Ai primi del novembre 1887 un branchetto di Zigoli golarossa apparve in provincia; uno dicesi sia stato preso a Prato e sette furono veduti da un tenditore di Montespertoli che ne catturò uno e lo mangiò! (*Giglioli*).

Puglie : Ne ebbi soltanto una femmina, presa alle reti nell'ottobre 1874 (*De Romita*).

50. *Emberiza rustica*, Pall.

ZIGOLO BOSCHERECCIO.

Lombardia : Assai scarso (*Borromeo*).

Veneto : Il signor G. Vallon ne ebbe uno, maschio, ucciso nei pressi di Udine, il 4 dicembre 1886, e gentilmente lo cedette alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani (*Giglioli*).

Liguria : Si prende ogni due o tre anni d'autunno, generalmente vivo colle reti, nel Nizzardo (*Gal*). Accidentale nel distretto di Savona, ebbi un maschio ad Albissola il 17 dicembre 1871, con tempo freddo, ma bello; era assai grasso (*Piccone*).

Marche : Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie : Ne ebbi uno nella primavera 1874, ed un altro nell'aprile 1881 (*De Romita*).

51. *Emberiza pusilla*, Pall.

ZIGOLO MINORE.

Strapassua (*Arenzano*) — Muciatto minore (*Marche*).

Piemonte : Accidentale; il 2 novembre 1876 ne trovai un esemplare a Cuneo assieme ad altri zigoli portati dalla

montagna (*Abre*). Ne ebbi uno a Torino nell'aprile 1874, lo conservai vivente per qualche mese o lo cedetti poi a quel R. Museo Zoologico (*Pezzi*); di comparsa accidentale affatto nella prov. di Torino (*Gasca*). Scarso di doppio passo e nidificante nell'Ossola (*Bazetta*); è stata notata la sua comparsa in Val Vigezzo, Novara (*Rodino*).¹

Veneto: Nel Museo Civico di Rovereto ne ho veduto tre individui, tutti presi in quei dintorni; il prof. A. Bonomi mi scrive di uno preso colle reti a S. Giorgio, Rovereto, il 7 dicembre 1886 e di un altro colto lungo l'Adige presso Rovereto il 28 ottobre 1887 (*Giglioli*). Accidentale nel Friuli, ove ne ebbi un solo preso il 7 ottobre 1880 (*Vallon*).

Liguria: Accidentale nel Nizzardo, ove capita nell'autunno ed inverno (*Gal*). Raro nel distretto di Savona; ebbi una femmina ad Albissola il 28 ottobre 1866 (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Accidentale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale in settembre nella prov. di Lucca, distretto di Massaròsa (*Gragnani*).

Marche: Scarso (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie: Uno venne preso colle reti nei pressi di Bari nel maggio 1880 (*De Romita*).

Sardegna: Ebbi dal signor P. Bonomi per la Collezione italiana un bell'individuo maschio adulto di questa specie ucciso alla Plaja presso Cagliari l'11 novembre 1887. Seppi inoltre dal Bonomi che un secondo individuo venne preso alle panie pure nei pressi di Cagliari ai primi di gennaio 1888; lo conservava vivo D. Amat di S. Filippo (*Giglioli*).

52. *Emberiza Schoenicius*, Linn.

MIGLIARINO.

Sia muntagninn-a, Strapàssua (*Basso-Piem.*) — Psi-Psi (*Nov.*) — Spions de la larga (*Berg.*) — Ziott (*Milano*) — Ciù

¹ Temo vi sia qui un equivoco nella determinazione della specie, preso da questi due osservatori.

(*Friuli*) — Peùca (*Feltre*) — Ciáto de palù (*Padova*) — Zol, Zul (*Bol., Rav.*) — Nizzola di padule (*Sen.*) — Ziulu di pantanu (*Mess.*) — Zivulu di pantanu (*Terran. Sicil.*) — Orgiali de is cannas, Orgiali de is cannissonis, Orgiali de is mustassus (*Sard.*).

Piemonte : Frequente al piano nella prov. di Cuneo; vi nidifica in maggio (*Abre*). Piuttosto frequente nella prov. di Torino, nell'inverno e sul principiare della primavera (*Martorelli*); lo trovai molto scarso nel distretto di Torino (*Gasca*). Di rara comparsa e solo durante l'autunno nel Basso Piemonte (*Camusso*). Raro nell'Ossola (*Bazetta*). Sedentario nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*); rarissimo, di passaggio autunnale, in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia : Non comune al piano in prov. di Sondrio (*Galli*). Poco frequente in pianura nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio non abbondante nella prima metà di aprile e di ottobre (*Magretti*). Abbondante tra ottobre e aprile nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune di passo e sedentario al piano nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente al piano di passaggio in ottobre, novembre e marzo nel distretto di Feltre, Belluno, ove non nidifica (*Delaito*). Assai comune e sedentario nel Friuli, ove nidifica in aprile (*Vallon*); in quel di Cividale si vede al piano, ove sarebbe sedentario (*Del Torre*). Comune nei luoghi paludosi nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissimo nella stagione dei passi e anche in quella della nidificazione nelle paludi nelle prov. di Ravenna e di Bologna (*Bacchi della Lega*). Abbastanza frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale ed invernale nel Nizzardo (*Gal*). Abbondante al piano nel distretto di Savona dalla metà di ottobre a tutto novembre e oltre, riparte nel marzo o nella prima metà di aprile (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Poco frequente, invernale e dubbiosamente nidificante nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune, di passo in ottobre ed invernale nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Graggiani*). Scarso in collina, abbondante al piano da ottobre a marzo, nel distretto di Fauglia, Lari e Cascina, Pisa (*Ott*). Nella prov. di Firenze è frequente al piano in marzo, ottobre e novembre nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); accidentale in quello di Fiesole (*Gargioli*). Scarso al piano nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune ai due passi, specialmente in piano in Val di Chiana (*Griffoli*). Di scarso passo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Invernale e non comune nel Senese (*Dei*); nidificante e sedentario in Maremma (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Comune e sedentario in alcuni luoghi della Toscana; nell'inverno capita sul mercato di Firenze a ceste di varie centinaia di individui, a cui sono uniti non pochi della forma distinta col nome di *E. intermedia*; vengono dai luoghi palustri (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Invernale e abbondante di passo nell'autunno ed in primavera (*De Romita*).

Sicilia: Raro al piano in novembre e dicembre nella prov. di Messina (*Ruggeri*); vi sarebbe anco nidificante (*Pistone*). Non abbondante nei luoghi palustri nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Comune e nidificante ovunque ove sono canneti (*Bonomi*).

53. *Emberiza pyrrhuloides*, Pall.

PASSERA DI PADULE.

Emberiza palustris, Salvad. ex Savi.

Pionza (Rovigo) — Zigolo (Lucca) — Passaru di acqua (Mess.).

Il Salvadori non ammette la identità specifica tra la *E. palustris* del Savi, che oltre in Italia si trova in Spagna e anco al Giappone, e l'*E. pyrrhuloides* di Pallas, che abita i delta del Danubio e del Volga, il Turkestan e la vallata dell'Irtisch in Siberia. Ho già detto come sono di parere contrario, visto la eccessiva variabilità di questa specie.

Lombardia : Di scarso passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Non rara in Lombardia (*Turati*); scarsa ma nidificante (*Borromeo*).

Veneto : Accidentale nel Friuli, ne ebbi una sola il 13 dicembre 1884 (*Vallon*). Comune e sedentaria nella provincia di Padova (*Arrigoni*). Scarsa, ma sedentaria in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Vedesi più facilmente in primavera nel Nizardo (*Gal*). Nel distretto di Savona giunge in ottobre, sverna e parte in marzo o nella prima metà di aprile; meno comune della specie precedente (*Piccone*). Scarsa ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune di passo in settembre nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Non frequente d'autunno e d'inverno nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Raro al piano nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Scarsa, ma probabilmente nidificante ai laghi in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale e non comune nel Senese (*Dei*); estiva, nidificante e forse sedentaria in Maremma (*Ademollo*). Comune e sedentaria; la

forma *E. intermedia* per me è rappresentata da individui di passo e non da ibridi ¹ (*Roster*).

Marche : Rara (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie : Assai scarsa, le poche catture avvennero in primavera (*De Romita*).

Sicilia : Non scarsa e nidificante dall'aprile al luglio nella prov. di Messina (*Pistone*).

54. *Calcarius lapponicus* (Linn.)

ZIGOLO DI LAPPONIA.

Plectrophanes lapponicus, Salvad.

Lombardia : Di comparsa accidentale nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Rarissimo in Lombardia (*Turati*, *Borro-meo*). Un esemplare venne preso colle reti insieme alle Lodoie nella prov. di Pavia alla fine dell'ottobre 1884 (*Pavesi*).

Veneto : Visitando il Museo Civico di Rovereto (Trentino) il 28 agosto 1887, vi ho potuto esaminare due esemplari di questa specie: uno è un maschio adulto quasi in completo abito nuziale, come quello da Nizza citato sotto; l'altro è una femmina. Furono entrambi presi nelle vicinanze di Rovereto. Inoltre il prof. A. Bonomi mi scrive di una femmina presa verso la fine del novembre 1886 pure nei pressi di Rovereto e tenuta viva dal dott. Keppel di quella città; e ne rammenta un altro individuo in suo possesso preso sul finire del novembre 1878 (*Giglioli*).

Liguria : Accidentale affatto nel Nizzardo (*Gal*). Ebbi da Nizza un maschio adulto in abito nuziale, catturato in quei pressi il 12 aprile 1886. Il 30 marzo precedente uno fu preso a Savona, si conserva nel Museo Civico di Genova, non riveste l'abito di nozze (*Giglioli*). Rarissimo nel distretto di Spezia; l'esemplare in abito nuziale esistente nella raccolta del prof. Magni-Griffi è citato nell'*Avifauna Italica*,

¹ Io non sarei di questo parere.

(pag. 56), venne preso nell' aprile 1861 e non nel dicembre di quell' anno (*Carazzi*).

Toscana : Accidentale nella prov. di Firenze, distretto di Fiesole (*Gargioli*); ne conservo due presi in provincia (*Avif. Ital.* p. 55); uno a Pistoia nel novembre 1875, l' altro a Firenze l' 11 ottobre 1881 (*Giglioli*).

Marche : Raro assai (*Comizio agrario Fabriano*).

55. *Calcarius nivalis* (Linn.)

ZIGOLO DELLA NEVE.

Plectrophenax nivalis, Salvad. ex Stejneger.

Ourtoulan bianch, Ambra dla fiocca (*Cuneo*) — Osel della neve (*Cadore*) — Taloch bianco (*Feltre*) — Ortolan de nev (*Friuli*).

Piemonte : Accidentale, nel crudo inverno 1868-69 ne furono portati alcuni a Cuneo sul mercato; nel dicembre 1871 qualche esemplare venne ucciso a Cartignano nella valle Macra (*Abre*). Ne ricordo uno ucciso nei pressi di Torino il 28 dicembre 1865 (*Pezzi*); accidentale in quel distretto (*Gasca*). Erratico e casuale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Di accidentale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Raro assai in quella di Cremona (*Ferragui*). Non comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Rarissimo nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Frequente e sedentario ai monti nel Cadore, Belluno, ove nidifica tra le roccie in giugno e luglio alle-
vando due covate¹ (*Tissi*). Scarso di passo in novembre e dicembre nel distretto di Feltre, ove fa comparsa circa ogni 10 anni (*Delaito*). Non tanto raro ed invernale nel Friuli

¹ Il signor Tissi pone un punto interrogativo al colore delle uova, io pongo assolutamente in dubbio la sua asserzione che questa specie sia sedentaria e nidificante nel Cadore !

(*Vallon*); assai raro nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Invernale e di comparsa irregolare nella prov. di Padova, ne ebbi uno colto nelle vicinanze della città, precisamente nell'agosto 1884 (*Arrigoni*).

Liguria: Non frequente ed invernale nel Nizzardo (*Gal*). Di comparsa irregolare nel distretto di Savona, sempre con venti freddi settentrionali; non l'ho più visto dal 1879 (*Piccone*). Raro assai e solo nei rigidi inverni nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Raro nel distretto di Spezia, ove qualcuno capita nei rigidi inverni (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Firenze, distretto di Fucecchio (*Turchetti*); ne ebbi diversi da S. Cresci e da Marradi tra il novembre ed il febbraio (*Giglioli*). Nel distretto di S. Gimignano, Siena, ebbi una femmina il 5 dicembre 1885; vi è affatto accidentale (*Paulucci*). Raro assai nel Senese, ne ebbi uno il 12 ottobre 1865 (*Dei*).

Marche: Accidentale, comparve a branchetti sulla spiaggia del mare nel rigido inverno del 1879 (*Paulucci*).

Puglie: Accidentale, ma non rarissimo nell'autunno ed inverno (*De Romita*).

ALA UDIDÆ

(*Lodole*).

56. Melanocorypha Calandra (Linn.) (ex Gesn.)

CALANDRA.

Calandra, Calandro, Lodlón (*Basso-Piem.*) — Lodola cantarina (*Feltre*) — Calandrón de Spagna, de Sipro, de Malaga, Filandrón de Spagna (*Padova*) — Ciurléna (*Ravenna*) — Calandria (*Nizza*) — Palandra (*Sarteano*) — Cucugghiata (*Calabr.*) — Carannulu (*Lentini*) — Carannula (*Modica*) — Calan-

dra (*Calabr. Messina*) — Calannira, Carannuluni, Calannaruni (*Terran. Sicil.*). — Calandria manna (*Sard.*).

Piemonte : Rarissima e di sola comparsa casuale, nella prov. di Alessandria, mentre nel finitimo Genovesato è in qualche anno comune nel passo di primavera (*Camusso*). Rara nell'Ossola, ove qualche individuo giunge di passo (*Bazetta*). Di passo autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Ebbi come rarità dal dott. M. Cermenati un individuo di questa specie ucciso nei dintorni di Lecco il 27 ottobre 1888 (*Giglioli*). Abbastanza frequente e sedentaria al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Rara al piano in Lombardia (*Turati*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto : Frequente e nidificante al piano nel distretto di Feltre, Belluno; vi fa passaggio in febbraio ed ottobre (*Delaito*). Piuttosto rara e di comparsa irregolare nel Friuli; la trovai abbondante nel dicembre 1884, e ne vidi in novembre e dicembre del 1885 (*Vallon*); nel distretto di Cividale si vede tutto l'anno in branchetti sulle colline, al piano è più frequente nell'inverno (*Del Torre*). Ebbi dal signor G. De Mitri un maschio ed una femmina di questa specie da lui uccisi ai Bottenighi, Mestre, Venezia, il 10 gennaio 1888; in quella località questa specie sembra essere stazionaria, almeno tra ottobre e gennaio (*Giglioli*). Di comparsa irregolare, ma non molto rara nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rara in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Non comune, ma nidificante nelle prov. di Ravenna e di Bologna (*Bacchi della Lega*).

Liguria : Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Avventizia nel distretto di Savona; ne ebbi un maschio il 16 marzo 1875 con grande abbondanza di neve e di uccelli (*Piccone*). Accidentale in quello di Arenzano (*Luciani*). Rara assai in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Scarsa, ma sedentaria nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Sedentaria, ma non comune nel distretto di Fausglia, Pisa (*Ott*); frequente al piano in quello di Lavajano,

ove da pochi anni è sedentaria, qualcuna passa in ottobre (*Papasogli*). Scarsa al piano nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Turchetti*). Di scarso passo autunnale in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo in ottobre ed invernale nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Sedentaria nella prov. di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Sedentaria in alcune località e di passo irregolare per la Toscana; ne vidi alcuni sopra Compiobbi nel maggio 1883 (*Roster*).

Marche: Scarsa al piano (*Paolucci*).

Lazio: Sedentaria ma non comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comunissima, sedentaria ed anche migrante (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria e comune al piano nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Rara; qualcuna passa in marzo-aprile per la prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente e sedentaria nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Sedentaria ed erratica in quello di Modica, ove è frequente al piano d'inverno (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondantissima e sedentaria nel distretto di Terranova, Caltanissetta; diventa gregaria d'autunno (*Carvana*). Comune e sedentaria nel distretto di Petralia, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Sedentaria e comunissima ovunque al piano ed in collina; ne ebbi una albina affatto (*Bonomi*).

57. *Melanocorypha yeltoniensis* (Forst.)

CALANDRA NERA.

Non ho nulla da aggiungere a quanto dissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie.

58. *Pallasia sibirica* (J. F. Gmel. ex Pall.)

CALANDRA SIBERIANA.

Pterocorys sibirica, Salvad.

Il Salvadori, oltre ad una innovazione inutile nel termine generico di questa Lodola, dà per l'individuo catturato a S. Lucia nei pressi di Verona una data diversa da quella che diedi io (*Avif. Ital.* p. 58), cioè 8 ottobre 1871; ho ragioni per mantenere la mia data del 2 ottobre. Trovandomi a Rovereto il 28 agosto 1887, rinvenni in quel Museo Civico un esemplare di questa specie rimasto sinora inosservato. È una femmina molto simile a quella presa nei pressi di Verona, ma forse un poco più giovane; fu presa alle reti nelle vicinanze di Rovereto nell'ottobre 1885. In questi giorni poi ho ricevuto dai fratelli Gal una femmina di questa specie, che pare esser stata uccisa in quei pressi nell'ottobre 1887. Questo sarebbe il quinto esemplare della Calandra siberiana di cui si avverte la cattura in Italia.

59. *Otocorys alpestris* (Linn.)

LODOLA GOLA GIALLA.

Lódla russa (*Romag.*) — Calandrini svariati (*Mess.*).

Lombardia : Ai primi del dicembre 1887 venne catturato un individuo di questa specie nei pressi di Bergamo (*Camozzi-Vertova*).

Veneto : Rara e di comparsa irregolare nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Varii individui di questa specie furono uccisi nei prati di Casanola, Romagna, il 28 ottobre 1874; viaggiavano con altre Lodole (*Bacchi della Lega*).

Liguria : Ho ricevuto dai fratelli Gal un bellissimo maschio di questa specie, ucciso nei pressi di Nizza nel gennaio 1888 (*Giglioli*). Raro ed accidentale nel distretto di

Savona. ebbi un maschio preso ai Cappuccini, Savona, il 28 novembre 1882 (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano, ove ebbi un maschio il 31 dicembre 1886; erano due gli individui che viaggiavano insieme (*Luciani*).

Puglie : Ne ebbi un solo, colto colle reti presso Bari nel maggio 1877 (*De Romita*).

Sicilia : Accidentale, due soli individui sono stati presi nella prov. di Messina (*Pistone*).

60. *Calandrella pispoletta* (Pall.)

CALANDRINO DEL PALLAS.

Malgrado le ampie prove da me date in contrario (*Avif. Ital.* pp. 59-63), il Salvadori ha voluto mantenere la distinzione specifica tra la *Calandrella pispoletta* (Pall.) e la *C. minor*, Cab., ed include le due specie tra le italiane (*Ucc. Ital.* p. 155). Io mantengo quanto ho già scritto in proposito, ma se fossi del parere dell'amico mio, avendo esaminato i due esemplari attribuiti alla *C. pispoletta* e l'unico riferito alla *C. minor*, dovrei concludere che questa specie e non la prima andrebbe accolta tra quelle avventizie in Italia.

Liguria : Un individuo di questa specie, ucciso nei pressi di Sarzana nel maggio 1862, trovasi nella collezione privata del prof. F. Magni-Griffi a Siena ¹ (*Carazzi*).

Puglie : Una femmina venne uccisa presso Bari il 27 marzo 1875 (*De Romita*).

61. *Calandrella brachydactyla* (Leisl.)

CALANDRINO.

Lodolin, Lodolin foresto, Calandrin, Berluáto (*Padova*) — Calandrina (*Feltre*) — Piciona Lauvetta (*Nizza*) — Rungnetta (*Savona*) — Grivein (*Arenzano*) — Lodola (*I. di Giglio*)

¹ D. CARAZZI, *Avifauna della Spezia e Val di Magra*, p. 17, SPERZIA, 1887. Io non ricordo affatto di aver veduto in quella raccolta, quando la visitai nel 1835, alcun esemplare di questa rarissima specie.

— Quagghiarina, Guagghiarina (*Mess.*) — Cacaviola, Calaniredde (*Terran. Sicil.*) — Calandriedda, Terrajola (*Sard.*).

Lombardia: Nella prov. di Sondrio questa specie è comune in alcuni anni, in altri no; vive sempre al piano (*Galli*). Avventizio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Raro, preso a Medole in quella di Mantova (*Paglia*). Scarso nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso, nidificante e di passaggio in marzo e novembre nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Di accidentale comparsa nel Friuli, ove ne vidi due individui (*Vallon*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria: Abbondante nel Nizzardo, specialmente durante il passo primaverile (*Gal*). Scarso in primavera, aprile e primi di maggio, e più raro assai al passo autunnale, ottobre, nel distretto di Savona (*Piccone*). Frequente in quello di Arenzano, ma solo durante il passo in aprile e maggio (*Luciani*). Scarsissimo nel distretto di Spezia, ove qualcuno capita in maggio (*Carazzi*).

Toscana: Comune di passo in aprile nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Accidentale nella prov. di Firenze, distretto di Fiesole (*Gargioli*); scarso in primavera ed in settembre in quello di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*). Di scarso passo in autunno in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune, di doppio passaggio nella prov. di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Scarso nella Toscana e di passo regolare in primavera; è gregario (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di passo copioso dalla fine di marzo alla metà di maggio; molti rimangono a nidificare, ed il passo autunnale incomincia verso la metà di agosto e dura tutto settembre; il 12 agosto 1886 ne ebbi uno giovane non ancora bene impennato (*De Romita*).

Sicilia: Comune, nidificante, e di passo in aprile-maggio e più scarsamente in settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Estivo e frequente nel distretto di Modica, Siracusa, giunge in marzo al piano e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante da marzo a novembre e nidificante nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Curran*). Comune ai monti nel distretto di Petralia, Palermo (*Palumbo Morici*).

Sardegna: Estivo e comune ovunque al piano, più abbondante al Capo meridionale; ne ebbi uno albino (*Bonomi*).

62. *Ammomanes cinctura* (Gould)

LODOLA DEL DESERTO.

Non ho nulla da aggiungere a quanto dissi su questa specie nella mia AVIFAUNA ITALICA.

63. *Alauda arborea*, Linn. ex Willugh.

TOTTAVILLA.

Lullula arborea, Salvad.

Loudnin (*Cuneo*) — Capliña (*Alba*) — Petronella, Lodrin (*Basso-Piem.*) — Odolin de crap (*Valt.*) — Lodoli (*Berg.*) — Antiola (*Feltre*) — Calandra nostrana (*Cadore*) — Beluato, Berluato, Barluato, Lodolin (*Padova*) — Barluato (*Rovigo*) — Calandra (*Ravenna*) — Lódla d' pré (*Bol.*) — Petronilla (*Arenzano*) — Collaeto (*Savona*) — Lodoìn (*Spezia*) — Piturlo (*Garf.*) — Lodolina (*Sesto fiorentino*) — Lodolicchio. Lodolino (*Sarteano*) — Lodola (*I. di Giglio*) — Allodolina, Coarella (*Viterbo*) — Cuvarella (*Napoli*) — Picchicchiera (*Bari*) — Calandrella (*Calab.*) — Cucugghiatula, Passaru di boscu (*Mess.*) — Tuvittula, Currintina (*Terran. Sicil.*) — Linguinetta surda (*Modica*) — Calandriedda, Chilandra (*Sard.*).

Piemonte: Frequente al piano ed al monte nella prov. di Cuneo, ove nidifica nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi*). Nel Basso Piemonte annida abbondantemente al colle ed al monte, dove trovasi comunissima nel tempo della migrazione autunnale; al piano è rara e di passo soltanto (*Camusso*). Sedentaria e nidificante ai monti nell'Ossola, ove giunge pure di doppio passaggio (*Bazetta*). Sedentaria nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*).

Lombardia: Nella prov. di Sondrio è comune al piano ed in collina (*Galli*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Sedentaria, nidifica al piano ed è abbondante alle epoche del passo nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Comune in quella di Mantova (*Pagliai*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune, di passo e sedentaria nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Sparsa, nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente, nidificante e di doppio passo, aprile ed ottobre, nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa in novembre e febbraio (*Delaiton*). Comune e sedentaria nel Friuli, ove nidifica nel maggio (*Vallon, Del Torre*). Frequente ovunque nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella in Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune in Romagna nelle stagioni di passo e di ripasso, e vi si piglia al « palmone; » assai più rara sul Bolognese (*Bacchi della Lega*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Numerosa nell'inverno e durante il passo nel distretto di Savona (*Piccone*); in quello di Arenzano è frequente alle due epoche del passo e anche sedentaria (*Luciani*). Sedentaria nidificante ai monti e abbondante di passaggio nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Abbondante di passo nella seconda metà di ottobre nella prov. di Lucca, ove pochi individui sono sedentari e nidificano ai monti (*Martorelli, Gragnani*). Comune e sedentaria nei distretti di Fauglia e Peccioli, Pisa, ove nidifica in collina ed è assai più abbondante alle epoche del passo (*Ott*).

Tenerosi); scarsa nel distretto di Lavajano, ove giunge in ottobre per svernare (*Papasogli*). Nella prov. di Firenze frequentissima al poggio di passo in marzo e settembre-ottobre nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*); scarsa in quello d'Empoli (*Fucini*); comune ed anco sedentaria in quelli di Fiesole e Signa; il passo è copioso in ottobre-novembre, scarso in marzo-aprile (*Gargioli, Fontebuoni*). Comune (*Beni*), e anche sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Fiorini, Pauer*). Comune e sedentaria, ma più frequente durante il passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena, ove abbonda al passo in ottobre (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano, ove però da qualche anno scarseggia (*Paulucci, Marri*). Comune, sedentaria e di passo nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Cambi*). Di passo abbondante in aprile all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentaria e abbondante in Toscana, nidifica ai monti (*Roster*).

Marche: Frequente ovunque (*Paolucci*).

Lazio: Abbondante, sedentaria e di passo in ottobre e marzo nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Comune ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Abbondante di passo in settembre-ottobre e marzo, anche invernale (*De Romita*).

Calabrie: Comune ovunque, specialmente nel passo autunnale nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Nidificante nella prov. di Messina e comune di passo in ottobre-novembre, più scarsa in marzo-aprile (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa nel distretto di Modica, Siracusa, ove passa in settembre ed in marzo-aprile (*Dellafonte, Garofalo*). Scarsa, giunge in marzo e parte in ottobre nidificando nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Comune ai colli d'ottobre, di rado nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentaria ovunque ed anche di doppio passo (*Bonomi*).

64. *Alauda arvensis*, Linn. ex Frisch.

LODOLA.

Lodoula, Lodua, Lodra, Grivéa (*Basso-Piem.*)—Alòdola, Calandron, Odola (*Padova*) — Ciattarùn (*Savona*) — Mignarda (*Spezia*) — Lodola reale, Lodola di passo, in collina, Lodola buona panterana, al piano (*Pisa*) — Lodracchio (*Lucca*) — Lodola vera (*Fucecchio*) — Starlaca (*Ravenna*) — Sterlacca (*Ancona*) — Allodola (*Viterbo*) — Calandrella (*Ielsi*) — Cucciarda (*Campobasso, Calabrie*) — Lonora, Lodina (*Terran. Sicil.*) — Lodula (*Modica*) — Calandriedda (*Sard.*).

Piemonte: Frequente e sedentaria al piano in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Martorelli, Gasca*); ho veduto diversi individui di color isabellino (*Gasca*). Nel Basso Piemonte è comunissima e stazionaria al piano; di passaggio e non frequente al monte, ove ben di rado nidifica (*Camusso*). Sedentaria e nidificante nell'Ossola, ove è anche di doppio passo (*Bazetta*). Sedentaria nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*); di passo autunnale in quello di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Assai frequente in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Sedentaria e abbondante alle epoche del passo nel Comasco (*Rosales*). Comune e stazionaria nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio più o meno abbondante nella prima metà di novembre (*Magretti*). Abbondante, stazionaria e di passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissima nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune, nidificante e di passaggio in aprile

e settembre nel Cadore, Belluno, ove sverna di rado (*Tissi*); Così nel distretto di Feltre, ove passa in marzo o novembre (*Delaito*). Comunissima e sedentaria nel Friuli; abbonda per immigranti dal nord nell'autunno, ottobre; nidifica dal marzo al luglio (*Vallon*); così nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Sedentaria e comunissima nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune e sedentaria nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove passa a milioni in marzo-aprile e ottobre-novembre (*Bacchi della Lega*). Nidificante ed erratica nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Vedesi specialmente nell'autunno e nell'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Comune durante il passo e nell'inverno nel distretto di Savona (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Sedentaria e abbondante di passo, specialmente in primavera, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentaria nella prov. di Lucca, ove abbonda di passo in ottobre ed in primavera (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune, sedentaria e di passo copioso in ottobre-novembre e marzo, nidifica al piano, nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Comune, sedentaria e di passo in branchi enormi in ottobre-novembre e marzo-aprile nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Abbondante, di passo in marzo ed ottobre (*Beni*); anche sedentaria, nel Casentino, Arezzo (*Fiorini, Pauer*). Comunissima sedentaria, e abundantissima alle epoche del passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentaria e di passo in ottobre nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Abbondante da ottobre a marzo, ma non nidificante nel Senese (*Dei*). Comune e anche sedentaria in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Di passo abbondante in aprile all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentaria abbondante in Toscana; durante i passi è la specie più comune; vi è chi distingue la forma stazionaria più piccola, più colorita e con canto più modulato, dalla

forma immigrante e gregaria; credo che ciò dipenda dal fatto che tra le stazionarie si odono e si uccidono specialmente i giovani (*Roster*).

Marche: Comune ovunque; di doppio passo e sedentaria; nidifica in maggio e luglio (*Paolucci*).

Lazio: Abbondante, sedentaria e di passo in ottobre e marzo nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentaria, ma più abbondante di passo in marzo e settembre ed ottobre; molti svernano (*De Romita*).

Calabrie: Comune, specialmente durante il passo autunnale nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune e sedentaria in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune nella prov. di Messina, di passo in ottobre-novembre ed in marzo (*Ruggeri, Pistone*). Frequente al piano, di passo in settembre e marzo-aprile, nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante da settembre ad aprile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente ovunque in ottobre nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Sedentaria, frequente e anche di doppio passaggio, predilige i piani e colli verso il mare (*Bonomi*).

65. *Galerita cristata* (Linn. ex Aldrov.)

CAPPELLACCIA.

Capussîna, Capelluun-a, Lodra capussîna (*Basso-Piem.*)
— Calandra col capèus (*Berg.*) — Lodola col zhuf (*Cadore*)
— Capelúda, Capilúa (*Padova*) — Lodi chapelate (*Friuli*)
— Lodla (*Ravenna*) — Coupada (*Nizza*) — Lodoa (*Savona, Arenzano, Spezia*) — Lodola nostrale (*Pisa*) — Cappellaccio (*Lucca*) — Ciuffetta, Pantiera (*Sarteano*) — Lodola cappellana (*Grosseto*) — Calandra (*Garf.*) — Ciuffa, Merdara (*Viterbo*)

— Tapputa, Calandrella (*Campobasso*) — Cucciàrda monnez-
zàra (*Nap.*) — Ciciarune, Cucugghiata (*Calabr.*) — Cuccia
(*Terran. Sicil.*) — Capuzieddu, Cuccuciuta (*Modica*) — Ca-
lannira (*Castelb. Madonie*).

Piemonte : Ne ebbi un esemplare da Saluzzo affatto nero ;
è specie frequente al piano in prov. di Cuneo ove nidifica
in aprile ed in giugno (*Abre*). Scarsa, ma sedentaria in
prov. di Torino (*Gasca, Pezzi*) ; piuttosto comune (*Martorelli*).
È comune assai al piano nel Basso Piemonte, e vi soggiorna
permanentemente ; è rara e di solo passo al monte (*Camusso*).
Giunge di passaggio nell' Ossola, ove non pare abbia nidi-
ficato (*Bazetta*). Sedentaria nel distretto di Piedimulera, No-
vara (*Danisi*) ; rara e di passo autunnale in quello di Crodo
(*Demori*) ; nidifica in Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia : Scarsa in pianura nella provincia di Ber-
gamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*).
Ridiventata meno rara sui forti che circondano la città di
Pavia e lungo le arginature ferroviarie (*Pavesi*). Stazionaria,
divenuta scarsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune
in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in ge-
nerale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune assai ovunque nel distretto di Caprino,
Verona, ove è sedentaria (*Pellegrini*). Sedentaria al piano
nella prov. di Vicenza (*Molari*) ; frequente al piano ed ai
colli nel distretto di Bassano, ove nidifica (*Ferrari*). Assai
rara nel Cadore, Belluno, di passo in aprile e settembre
(*Tissi*) ; così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune e se-
dentaria nel Friuli, nidifica in aprile (*Vallon, Del Torre*).
Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così
in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comune e sedentaria nella prov. di Ravenna e
di Bologna (*Bacchi della Lega*). Poco frequente, ma nidi-
ficante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Seden-
taria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Vedesi specialmente in autunno nel Nizzardo
(*Gal*). Sedentaria nel distretto di Savona ; da tempi remoti

una piccola colonia di questa specie è stabilita nel piano tra le due Albissola, e si mantiene senza aumento o diminuzione; in primavera questi uccelli salgono a nidificare nelle colline circostanti. Una simile colonia esiste nel piano di Albenga (*Piccone*). Rara nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Frequente e sedentaria in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentaria nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Abbondante e sedentaria ovunque nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Sedentaria e frequente nella prov. di Firenze, diventa erratica in settembre, ma non fa passo (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Comune e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune e sedentaria affatto in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Sedentaria e comunissima nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune e sedentaria ovunque in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano, di doppio passo e sedentaria; nidifica in maggio, giugno e luglio (*Paolucci*).

Lazio: Comune e sedentaria nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente ovunque e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Sedentaria e comune al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentaria e comune, non sembra essere gregaria (*De Romita*).

Calabrie: Comunissima ovunque e sedentaria nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così al piano in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune e sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Sedentaria e frequente al piano nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Così in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrano*). Sedentaria e comune nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: La ritengo di comparsa accidentale nell'isola, coi branchi della specie precedente alle due epoche del passo, ma non mi fu ancora dato di averne (*Bonomi*).

MOTACILLIDÆ

(*Pispole, Cutrettole*).

66. *Agrodroma campestris* (Linn. ex Briss.)

CALANDRO.

Anthus campestris, Salvad.

Spippoletta, Pispoletta (*Aut. Ital.*) — Curetin, Terénna, Lodrin (*Bassò-Piem.*) — Sguisetù (*Berg.*) — Calandròn (?) (*Friuli*) — Tordina foresta (*Padova*) — Terreina (*Arenzano*) — Grivea (*Savona*) — Spia di Ortuàn (*Spezia*) — Ciurlodi (*Sesto fiorentino*) — Sarlodi (*Signa*) — Lodolino, Re di Lodole (*Casentino*) — Lodolicchio (*I. di Giglio*) — Strellacchino (*Ancona*) — Cepollàro (*Nap.*) — Curintinu (*Modica*) — Pispoledda (*Sard.*).

Piemonte: Scarso in montagna nella prov. di Cuneo, di solo passaggio dalla metà di ottobre a quella di novembre (*Abre*). Scarso in prov. di Torino (*Gasca*). Nel Basso Piemonte arriva a primavera inoltrata, annida al piano e riparte nell'agosto; al monte è piuttosto raro e di sola passata in autunno (*Camusso*). Giunge di passaggio nell'Ossola (*Bazetta*).

Lombardia: Scarso al piano durante il passo nella provincia di Bergamo (*Stefanini*). Scarso, di passo in autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Raro nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso, ma nidificante nel Friuli; nidifica in

maggio e parte in ottobre (*Vallon*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Nidifica ai monti nel distretto di Savona, ove giunge in aprile o ai primi di maggio, parte tra la fine d'agosto e la metà di settembre; è piuttosto scarso (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è frequente durante il passo primaverile, scarso in quello autunnale (*Luciani*); così in quello di Spezia, ove abbonda in aprile (*Carazzi*).

Toscana : Non comune nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Scarso, più abbondante al passo in alcuni anni, nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); estivo e nidificante in quello di Peccioli (*Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è scarso al piano in settembre nel distretto di Fiesole (*Gargioli*); poco frequente o di irregolare comparsa in quelli di Sesto fiorentino e Signa (*Fontebuoni*). Comune e nidificante nel Casentino, Arezzo, ove passa in marzo ed ottobre (*Beni, Fiorini*). Poco frequente nel passo autunnale e meno in quello primaverile in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo, ma non comune nel distretto di S. Gimignano, Siena, ove nidifica soltanto sul Cornocchio ai Sodi di Pignano (*Marri*). Comune sulle crete nel Senese da agosto ad ottobre (*Dei*); erratico in Maremma (*Ademollo*). Passa in settembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Specie estiva abbondante per la Toscana; è irregolarissima nelle migrazioni; giunge in aprile ed anco nel marzo, alleva due covate e la massa parte in agosto; ne ho ucciso uno il 17 novembre; nel 1884 fu abbondante, scarsa nel 1885 e 1886 (*Roster*).

Marche : Comune al piano: arriva in aprile-maggio, nidifica in giugno, e parte in agosto-settembre (*Paolucci*). Sembra essere nidificante nei monti di Urbino, Pesaro (*Carpegna*).

Campania : Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Si vede solitario od in branchetti in agosto ed in aprile (*De Romita*).

Sicilia : Di passo in aprile e maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente al piano nel distretto di Modica, Siracusa; giunge in aprile-maggio e parte in settembre-ottobre (*Dellafonte, Garofalo*). Scarso al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Estivo al piano in tutta l' isola (*Bonomi*).

67. *Corydalla Richardi* (Vieill.)

CALANDRO FORESTIERO.

Anthus Richardi, Salvad.

Gambalonga, Fiston foresto (*Padova*) — Cepollàro gruoso, Sitolò montagnuolo, Sitolone (*Nap.*) — Calandria, Calandriedda a biceu fini (*Sard.*).

Piemonte : Rarissimo nel territorio di Voltaggio, Alessandria; ne uccisi io stesso un maschio giovane il 27 agosto 1885 (*Camusso*).

Lombardia : Accidentale nella prov. di Mantova, un esemplare si conserva nella Collezione del conte D'Arco (*Paglia*). Rarissimo in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Molto raro nel Friuli; ebbi un nido con 4 uova trovato il 12 maggio 1884 presso Pordenone; alcuni se ne vedono in settembre, non però ogni anno (*Vallon*). Rarissimo nella prov. di Padova, ove dicesi siano stati presi due individui, che si conservano nel Museo universitario (*Arrigoni*).

Liguria : Di rara comparsa nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana : Accidentale nella prov. di Firenze, ove furono presi nel 1830 e nel 1843 (*Avif. Ital.* p. 70), due individui che conservo nella Collezione italiana (*Giglioli*). Accidentale nel Senese; ne ebbi uno il 20 ottobre 1863 (*Dei*).

Marche : Raro assai (*Comizio agrario Fabriano*).

Sicilia : Accidentale al piano nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna : Raro, forse nidificante; giunge in primavera (*Bonomi*).

68. Anthus pratensis (Linn. ex Charlet.)

PISPOLA.

Ouvina, Vainetta, Sisi, Sisi da pra, Sisi da prou (*Basso-Piem.*) — Sguiseta (*Berg.*) — Sgusetta (*Veron.*) — Fista piccola (*Cadore*) — Zhit (*Feltre*) — Spéppula (*Ravenna*) — Si-si de monte (*Arenzano*) — Sbi-Sbi (*Savona*) — Spia dee quagie. Fifina (*Spezia*) — Prispolino, Mangia botte (*Pisa*) — Pispolino (*Sesto fiorentino*) — Pispola, Babbusso, Tordina (*Val di Chiana*) — Pispolo (*S. Gimignano*) — Prispola (*Garf.*) — Calandrella e Chianu (*Calab.*) — Zivedda (*Mess.*) — Vispi-sedda (*Modica*).

Piemonte: Frequente al monte ed al piano nelle provincia di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio e giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*); comune d'inverno (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte abbonda assai nel passo autunnale che incomincia verso la metà di ottobre e si protrae fino oltre la metà di novembre; dopo scomparire affatto. A primavera pochissimi individui lasciarsi vedere, ma nessuna coppia fermasi a nidificare (*Cumusso*). Nell'Ossola nidifica sui monti sin presso i 2000 metri, scende al piano nell'autunno ed alcuni individui rimangono l'inverno (*Bazetta*). Abbondante nel passo autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demorì*).

Lombardia: Comunissima sui maggenghi ed in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di copioso passaggio nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Frequente al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio in aprile e ottobre (*Magretti*). Abbondante tra settembre e aprile nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati* (*Borromeo*)).

Veneto: Abbondantissima al piano in autunno nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente di passaggio nella

prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*); vi nidifica (*Ferrari*). Frequente, nidificante e di passaggio in aprile e settembre nel Cadore. Belluno (*Tissi*); abbondante, ma di solo passaggio in marzo, ottobre e novembre nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissima e sedentaria nel Friuli; nidifica in maggio e molti individui vengono a svernare (*Vallon*). La trovasi abbondante nel luglio 1887 sui monti sopra Paluzza, Carnia (*Del Torre*). Comunissima nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima nelle prov. di Ravenna e di Bologna nelle stagioni del passo, in ottobre specialmente; famose sono le caccie che se ne fanno in Romagna al « pal-mone » (*Bacchi della Lega*). Frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto abbondante al piano nel distretto di Savona, dalla metà di ottobre a tutto novembre e nell'inverno; forse è sedentaria (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano, ove è però rara in primavera (*Luciani*). Non molto frequente nel distretto di Spezia ove giunge in ottobre e ove qualcuna sverna (*Carazzi*).

Toscana: Invernale e di doppio passo, abbondante in ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune alle due epoche del passo e specialmente in quella autunnale, fine settembre ed ottobre, nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Pupasogli, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è frequentissima di passo in agosto-settembre, primi d'ottobre e marzo nei distretti di Fucecchio, Fiesole, Sesto fiorentino e Signa (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*); vedesi a branchi anche in novembre e dicembre in quello d'Empoli (*Fucini*). Nel Casentino, Arezzo, è frequente assai al passo in aprile, scarsa in quello d'ottobre (*Beni, Fiorini Pauer*). Invernale ed abbondante alle due epoche del passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Sverna e passa in aprile e settembre nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); comune al passo autunnale in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Invernale e co-

mune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Abbondante nel passo autunnale in Toscana (*Roster*).

Marche: Frequente ovunque, passa in ottobre-novembre e marzo-aprile (*Paolucci*).

Lazio: Comune di passo in settembre ed aprile nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale, giunge in grande abbondanza verso la metà di ottobre, parte in aprile; nell'autunno 1888 il passo fu straordinariamente copioso (*De Romita*).

Calabrie: Comune specialmente in ottobre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Abbondante in ottobre-novembre e marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente di passo in aprile ed in settembre-ottobre, nel distretto di Modica. Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comune al piano in ottobre nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Invernale al piano ovunque; ne ebbi uno isabellino (*Bonomi*).

69. *Anthus cervinus* (Pall.)

PISPOLA GOLA ROSSA.

Guizzetta bastarda (*Cremona*) — Fista, Fista foresto (*Padova*) — Pioulin (*Nizza*) — Pispola (*Fior.*).

Lombardia: Scarsa, avuta in ottobre 1882; nella prov. di Cremona sarebbe però di comparsa regolare, almeno in autunno (*Ferragni*).

Veneto: Un maschio preso a Padova il 5 aprile 1885 è nella mia Collezione; mi mancano dati per precisare se questa specie sia veramente rara o confusa colla precedente (*Arrigoni*). Il signor M. Gianese di Lonigo scrive al *Boll.*

del *Naturalista* (IX, 1 e 2 p. 18) di aver avuto nell'ottobre 1888 un individuo di questa specie, che dice trovarsi ogni anno nelle praterie e risaie di quel distretto (*Giglioli*).

Liguria: Di casuale comparsa in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Scarsissima tanto in autunno come in primavera nel distretto di Spezia, Genova (*Carazzi*).

Toscana: Ho saputo dal signor G. Damiani che nel marzo 1888, questa specie, che giunge ordinariamente alla spicciolata, comparve di passo in branchi numerosi all'isola d'Elba (*Giglioli*). Scarsa nella prov. di Firenze, distretto di Fiesole (*Gargioli*); non la credo tanto rara e ne conservo sei esemplari presi in provincia, cioè: Firenze aprile 1870, aprile 1876, 16 maggio 1882; Sesto fiorentino maggio 1875, 28 aprile 1885 ed Empoli 10 novembre 1881; e ne ho veduto altri (*Giglioli*). Rara nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Rara di passo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Scarsa, ma forse di passo regolare in Toscana, giacchè ogni anno se ne vedono (*Roster*).

Marche: Rara al piano (*Paolucci*).

Puglie: Scarsa al passo autunnale, di regolare passaggio, qualche anno in buon numero, in aprile e nella prima metà di maggio (*De Romita*).

Sicilia: Rara assai nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

70. *Anthus trivialis* (Linn.)

PRISPOLONE.

Ouvina, Vainetta, Grassetta, Turdin, Titro, Spia da nottuan (*Basso-Piem.*) — Guina (*Berg.*) — Tordina (*Feltre, Belluno*) — Pitarola (*Cudore*) — Dordine (*Cividale*) — Turdèna (*Ravenna*) — Spipola (*Vergato*) — Pagaissa (*Spezia*) — Pispolone (*S. Gimignano*) — Tordino (*Viterbo*) — Ficecola (*Campobasso*).

Piemonte: Frequente ovunque nella prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in maggio e giugno (*Abre*). Scarso

in quella di Torino (*Gasca*); di solo passo (*Martorelli*). Trovasi nel Basso Piemonte solo nel tempo della migrazione, dalla fine del luglio al principio dell' ottobre; raramente si vede di primavera (*Camusso*). Nell' Ossola giunge di passo; alcune coppie nidificano ai monti (*Bazetta*). Non comune, di passaggio autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comunissimo nella prov. di Sondrio, vive sui maggenghi e in pianura (*Galli*). Nella prov. di Como nidifica, giunge ai primi di maggio e parte in settembre (*Regazzoni*, *Bernasconi*); nel Comasco è specialmente però uccello di passo in primavera e alla fine dell' estate, quando se ne fa strage colle reti (*Rosales*). Frequente durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio irregolare nella prima quindicina di settembre (*Magretti*). Di passaggio in aprile e autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Non raro nel distretto di Caprino, Verona; vi è anche sedentario (*Pellegrini*). Frequente ovunque, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Comune, nidificante e di passo in aprile e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre ove passa anco in agosto (*Delaito*). Comunissimo di passo nel Friuli, in marzo ed agosto; vi nidifica pure ai monti nel maggio (*Vallon*); nidificante, ma non comune nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune, forse più in collina, nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nelle prov. di Ravenna e Bologna comparisce in agosto e parte in ottobre (*Bacchi della Lega*). Nidificante ed erratico nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Poco numeroso nel distretto di Savona alle epoche del passo: fine settembre a metà novembre, primi d' aprile ai primi

di maggio (*Piccone*); in quello di Arenzano è frequente in primavera, raro nell'autunno (*Luciani*). Frequente in agosto e settembre: alcuni svernano nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Osservato di solo passo autunnale nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); passa anche in aprile nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Comune specialmente all'epoca del passo autunnale, agosto e settembre, nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott*, *Papasogli*, *Venerosi*); il 21 novembre 1882 ne ebbi due (*Ott*). Nella prov. di Firenze è frequentissimo di passo in agosto-settembre-ottobre e marzo (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fucini*, *Gargioli*, *Ginori*, *Fontebuoni*). Comune nel Casentino, Arezzo, ove passa in aprile e settembre (*Beni*, *Pauer*). Comune assai alla fine d'agosto e nel settembre, scarso in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Passa sulla fine dell'estate nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); scarso in autunno in quello di S. Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Abbondante di passo dal luglio al settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*). Estivo e comunissimo in Toscana, nidifica sui monti e scende al piano in agosto e settembre (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, passa in settembre-ottobre ed aprile-maggio (*Paolucci*).

Lazio: Comune di passo in aprile ed ottobre nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sparso nel distretto di Ielsi, Campobasso; vi nidifica e vi fa passaggio in maggio e settembre (*D'Amico*).

Campania: Comune al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Invernale, ma specialmente di doppio passo regolare e talvolta copioso (*De Romita*).

Sicilia: Comune in aprile e settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Raro al piano in primavera nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

71. Anthus Spioletta (Linn.) (ex Ray)

SPIONCELLO.

Anthus Spioletta, Salvad.

Vainetta, Sisi d'acqua, Sisi d'aegua (*Basso-Piem.*) — Vitt-Vitt (*Ossola*) — Svit-Svit (*Nor.*) — Guzzettoun (*Milano*) — Sguseton (*Veron.*) — Zhitón (*Feltre*) — Fista granda (*Cadore*) — Fistázza (*Padova*) — Si-Sietta (*Arenzano*) — Sbi-Sbi (*Savona*) — Panigaèò (*Spezia*) — Spippulon (*Ravenna*) — Spiplina (*Vergato*) — Prispola (*Lucca*) — Fossacchia (*Fucecchio, Fiesole*) — Pispanta de riu (*Sard.*).

Piemonte: Frequente di passo in ottobre, d'inverno rimane al piano in prov. di Cuneo (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*); nell'inverno è abundantissimo lungo il Po nei pressi di Torino (*Martorelli*). Comune nel Basso Piemonte ove si vede dall'ottobre al marzo (*Camusso*). Nidifica sui monti di Ossola (*Bazetta*). Comune e sedentario nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune sui maggenghi e al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passaggio nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passaggio più o meno frequente in aprile e ottobre (*Magretti*). Invernale e non comune nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non comune nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Erratico e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente, nidificante e di passo in marzo ed ottobre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa anche in novembre (*Delaito*). Frequente nell'autunno nel Friuli, ove non è constatata la sua nidificazione (*Vallon*); nel distretto di Cividale si vede tutto l'anno (*Del Torre*). Comune, specialmente nei luoghi palustri, nella

prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non è molto comune nelle prov. di Ravenna e di Bologna, vi passa alla fine di ottobre ed in novembre mescolato colle Pispole, e ripassa in primavera (*Bacchi della Lega*). Nidifica in alto ed emigra nell'autunno nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Nidifica ai monti nel distretto di Savona, ove è numeroso al piano durante l'inverno (*Piccone*); frequente d'inverno in quello di Arenzano (*Luciani*); così pure in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non comune, di doppio passo, ma specialmente in ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli Gragnani*). Scarso nella prima metà di ottobre nel distretto di Lavajano, Pisa (*Papasogli*). Nella prov. di Firenze è invernale, frequente al piano nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); scarso in quelli di Fiesole e Sesto fiorentino (*Gargioli, Fontebuoni*). Non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*); sedentario (*Fiorini*). Comune di passo in marzo-aprile ed in ottobre in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarso ed invernale nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Comune alle due epoche del passo in Toscana; nell'inverno 1884 moltissimi furono presi in Mugello, ma è caso eccezionale (*Roster*).

Marche: Raro al piano (*Paolucci*). Nidifica sulla cima del Monte di Carpegna, Urbino (*Carpegna*).

Campania: Scarso al piano nelle prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Piuttosto raro, è stato preso in aprile e nel novembre (*De Romita*).

Sicilia: Raro al piano nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Raro, ma di doppio passaggio al piano (*Bonomi*).

72. *Anthus obscurus*, Lath.

SPIONCELLO MARINO

Il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 152) non ha saputo trovare differenze tra l'esemplare da Carmagnola (Torino) da me riferito a questa specie (*Avif. Ital.* p. 74) ed uno Spioncello comune, e su ciò esclude l'*A. obscurus* dal suo elenco di uccelli italiani. Mi dispiace di essere ancora di parere contrario affatto a quello dell'amico ed illustre Collega, ma un confronto minuzioso ed accurato fatto con esemplari inglesi e tipici dell'*A. obscurus* mi ha convinto che l'esemplare di Carmagnola appartiene a quest'ultima specie.

73. *Budytes flavus* (Linn. ex Gesn.)

CUTTI.

Balarina, Buarin-na, Buarinn-a giàna, Gianétta, Bavarin-na gialda, Balènn-a giàna (*Basso-Piem.*) — Vaccherina (*Nov.*) — Boarì (*Berg.*) — Boarola zhala (*Belluno*) — Codascasola (*Sacile*) — Pacéeh (*Feltre*) — Coacassola zhala, Coacassola bella (*Cadore*) — Boarina (*Padova, Rovigo*) — Peracia giauna (*Nizza*) — Boarina (*Spezia*) — Strisciaiuola (*Pisa*) — Strisciajola (*Casentino*) — Codazzinzola, Boarina (*Val di Chiana*) — Codazinzera, Batticoda (*Sarteano*) — Prispola (*I. di Giglio*) — Ballerina gialla (*Garf., Lucca*) — Curissola (*Capri*) — Gialinedda (*Mess.*) — Vispisa di primavera (*Modica*) — Vispisa giarna (*Castell. Madonie*) — Merisceda (*Sard.*) — Culisalida (*Logudoro*) — Curisarida (*Sassari*).

Piemonte : Frequente al piano nella prov. di Cuneo vi nidifica due volte, in aprile e giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*); non comune (*Martorelli*). Nidifica comunemente nel distretto di Voltaggio, Alessandria, tanto al piano che al monte; rimane da noi dal marzo all'ottobre

(*Camusso*). Nell'Ossola alcuni nidificano; giunge numeroso in settembre (*Bazetta*). Abbondante di passo in primavera nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passaggio abbondante nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Frequente durante il passo al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Di passaggio in primavera e più abbondante in autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Nel 1866 il passo di questa specie in Lombardia fu abbondante, ed il 29 settembre successe il ripasso in massa nella Brianza (*Magni*). Comunissima in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*); vi nidifica da aprile a tutto giugno nei prati umidi e lungo i fossati con acqua, alleva spesso due covate; il nido di forma concava intrecciato con erbe finissime e con molte penne all'interno e peli, è collocato a terra in un incavo e sempre ben nascosto; le uova, da 4 a 6 sono covate a vicenda dal maschio e dalla femmina, che si dividono anche l'allevamento dei pulcini (*Turati*).

Veneto: Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Erratico e di passaggio in quella di Vicenza (*Molari*). Frequente al piano, nidificante e di passo in aprile e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); abbondante, ma di solo passaggio in aprile, agosto e settembre nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune e nidificante nel Friuli; giunge in aprile, nidifica nel maggio e parte in autunno (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio nel Nizzardo, ma più abbondante in primavera (*Gal*). Numeroso durante il passo primaverile, dal principio di aprile alla metà di maggio, nel distretto di Savona; scarso in autunno (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Comune di primavera, aprile, quando giunge in branchetti, scarso in autunno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Scarso di doppio passo nella prov. di Lucca (*Martorelli*); forse nidifica nel distretto di Massaciuccoli (*Gragnani*). Comune al passo in pianura nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Nella prov. di Firenze è frequente di passo al piano in aprile e maggio, più scarso in agosto (*Turchetti*, *Fontebuoni*). Estivo e nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune di passo al piano in marzo-aprile ed in agosto-settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Di scarso passaggio in aprile ed agosto nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). In Toscana è assai più abbondante al passo primaverile che non in quello autunnale (*Roster*).

Marche: Comune al piano, passa soltanto dalla metà di marzo alla metà di maggio (*Paolucci*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*). Autunnale all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Di passaggio copioso dalla seconda metà di marzo a tutto maggio, e abbondante dalla seconda metà di agosto alla metà di ottobre; è delle varie *Budytes* la più frequente, nell'autunno sono assai rari gli individui in abito perfetto (*De Romita*).

Sicilia: Abbondante di passo in marzo-aprile nella prov. di Messina, scarso nel settembre (*Ruggeri*, *Pistone*). Nel passo primaverile nel distretto di Messina, questa è la forma di gran lunga prevalente (*Angelini*). Scarso al piano e di passo in aprile ed in ottobre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte*, *Garofalo*). Di doppio passaggio e frequente nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Non pochi rimangono, nidificando anche sui tetti e specialmente nel Sassarese (*Bonomi*).

74. *Budytes cinereocapillus* (Savi)

STRISCIATOLA.

Buarin-na, Buarinn-a giana, Gianetta, Bavarin-na gialda, Bâlènn-a giâna (*Basso-Piem.*) — Gialdirola, Piss-

Piss (*Ossola*) — Coacassola, Cassola (*Cadore*) — Boarina (*Padova, Rovigo*) — Buvarena (*Ravenna*) — Buaréina (*Bol.*) — Peracia gialla (*Nizza*) — Giannetta (*Gen.*) — Boarina (*Spezia*) — Strisciajola (*Lucca*) — Codazzinzola, Boarina (*Val di Chiana*) — Prispola (*I. di Giglio*) — Coetta, Mandiscdda, Meriscdda (*Sard.*) — Curisarida (*Sassari*).

Piemonte: Scarsa, al piano, nella prov. di Cuneo, ove è di passaggio nella seconda quindicina d'aprile e nella prima del maggio (*Albre*). Frequente e nidificante in prov. di Torino (*Gasca*); assai più abbondante della specie precedente (*Martorelli*). Di tutte le Ballerine è la meno comune nel Basso Piemonte; nidifica al piano ed in autunno scompare (*Camusso*). Nell'Ossola è meno comune della specie precedente (*Bazetta*).

Lombardia: Comune in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Estiva e nidificante in maggiore o minore abbondanza nella prov. di Cremona; giunge in aprile e parte tra il settembre e la prima metà del novembre (*Ferragni*).

Veneto: Frequente al piano, nidificante e di passo in aprile e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Più rara della specie precedente nel Friuli, ove giunge in aprile e parte in settembre; non so se vi nidifica, ma è probabile assai (*Vallon*). Comune nei luoghi aquitrinosi nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima nelle stagioni del passo nelle prov. di Ravenna e di Bologna; sono famose le caccie che se ne fanno in Romagna colle reti, in agosto (*Bacchi della Lega*).¹ Estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Abbondante, specialmente durante il passo primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune in primavera, dai primi di aprile alla metà di maggio, scarsa in autunno, nel distretto di Savona (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Passa in marzo ed aprile, scarsamente in autun-

¹ Qui, oltre la precedente, sono probabilmente confuse anche alcune delle specie seguenti.

no, nel distretto di Spezia, ove è meno frequente della precedente (*Carazzi*).

Toscana: Scarsa di doppio passo (*Martorelli*); comune nella prov. di Lucca (*Fontebuoni*); nidificante nel distretto di Massaciuccoli (*Gragnani*). Comune al passo, specialmente in primavera nel distretto di Peccioli (*Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è frequente di passo al piano in aprile e maggio; meno in agosto (*Turchetti, Fontebuoni*). Di doppio passo e forse estiva nel Casentino, Arezzo (*Beni*); vi nidifica (*Pauer*). Meno frequente della specie precedente e anche di passo in marzo-aprile ed agosto-settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Di scarso passaggio in aprile ed agosto-settembre nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei, Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*).

Marche: Piuttosto scarsa di passo al piano (*Paolucci*).

Campania: Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Assai meno frequente della specie precedente, passa alle stesse epoche, riferendo a questa ed alla specie seguente i giovani di autunno che mancano di fascie sovraccigliari (*De Romita*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Nel passo primaverile nel distretto di Messina ho trovato questa specie piuttosto scarsa (*Angelini*). Frequente al piano, specialmente in settembre nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Nidifica nell'isola, ed anco sul tetto della R. Università in Sassari (*Bonomi*).

75. *Budytes borealis* (Sundev.)

STRISCIATOLA CAPO-SCURO.

Cutrettola boreale (*Aut. Ital.*) — ? Coacassola, Boarola (*Belluno*) — ? Boarina, Boarinato (*Veneto*).

Veneto: Questa specie è citata dal Cadore nella prov. di Belluno, ma ritengo per erronea determinazione, come

senza dubbio era il caso per le due specie seguenti ed il *C. campestris* pure ricordate dal signor Tissi con nomi volgari! Del resto ritengo più che probabile che ogni anno il *B. borealis* passi pel Veneto frammisto e confuso colle due specie antecedenti (*Giglioli*).

Toscana: Non rara in primavera nel distretto di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*); ogni anno ne vedo qualcuna presa nella prov. di Firenze in aprile e maggio (*Giglioli*).

Marche: Conservo nella Collezione italiana un maschio adulto tipico, ucciso a Fano, Pesaro, l'8 maggio 1886, ed un secondo dalla stessa località preso l'8 maggio 1887 (*Giglioli*).

Puglie: Più frequente della specie precedente, ma assai meno abbondante del *B. flavus*; giunge di passo alle medesime epoche (*De Romita*).

Sicilia: Ebbi un individuo maschio di questa specie a Messina il 24 aprile 1888,¹ ed ho potuto constatare che durante il passo primaverile questa forma vi è frequente (*Angelini*).

76. *Budytes melanocephalus* (Licht.)

CUTTI CAPO-NERO.

Budytes Feldeggi, Salvad.

Cutrettola capinera (*Aut. Ital.*) — Ballerina (*Garf.*) — Giallinedda testa nira (*Mess.*) — Vispisa di sciuni (*Castell. Madonie*).

Liguria: Scarsissimo e forse di passo irregolare nel distretto di Spezia, Genova (*Carazzi*).

Toscana: Conservo nella Collezione italiana un maschio colto a Sesto fiorentino, Firenze, l'11 maggio 1877 (*Giglioli*).

Marche: Raro al piano (*Paulucci*).

Puglie: Apparisce regolarmente tutti gli anni all'epoca

¹ Inviato in dono al R. Museo Zoologico di Firenze.

del passo primaverile, misto alle specie precedenti, e non può dirsi scarso; non si vede in autunno (*De Romita*).

Sicilia: Scarso, si vedono pochi individui confusi colle due specie precedenti di passo in marzo-aprile, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Durante il passo primaverile nel distretto di Messina, ho notato che questa specie è rara, nella proporzione circa di 2 o 3 per cento con le tre specie precedenti (*Angelini*). Raro al piano in maggio nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

77. *Budytes paradoxus*, C. L. Brehm.

CUTTI CAPONERO A SOPRACCIGLIO BIANCO.

Puglie: Non raro; quasi ogni anno in primavera ne capita qualcuno (*De Romita*).

78. *Budytes xanthophrys* (Sharpe)

CUTTI CAPONERO A SOPRACCIGLIO GIALLO.

Il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 149) esclude il *B. xanthophrys* dall'elenco degli uccelli italiani; egli sembra però fare tale esclusione perchè è poco persuaso della bontà di questa specie, che egli inclina a ritenere per una varietà del *B. paradoxus*; io non sarei lontano dal suo avviso, tanto più che non di rado si vedono individui del *B. flavus* con fascie sopraccigliari tinte di giallo, ma attendo dati maggiori. Se però il *B. xanthophrys* risultasse essere una buona specie non può cader dubbio intorno alla sua inclusione tra quelle italiane: non solo pare essere non raro in Dalmazia, ma il Salvadori stesso ha verificato la esistenza di un esemplare nella Collezione del prof. De Romita a Bari, ove io mi rammentavo di averne veduto uno (*Avif. Ital.* p. 80); come si vede sotto, non è però di tal parere il possessore di esso.

Puglie: Fra i molti esemplari con fascia sopraccigliare e tratti suboculari gialli, raccolti, non parmi che alcuno possa con certezza riferirsi al *B. xanthophrys* tipico (*B. me-*

lanocephalus o meglio *B. paradoxus*, con fascia sopraccigliare e tratti suboculari gialli). Essi con graduali passaggi si ravvicinano alla forma *B. flavus* con sopraccigli gialli, quantunque ordinariamente presentino nella colorazione del pileo e della cervice una certa differenza. Ben è vero però che similmente per graduali passaggi si collegano intimamente tra loro le forme *B. cinereocapillus*, *B. borealis* e *B. melanocephalus*, in modo da trovarci spesso di fronte ad individui che non è possibile decidere a quale delle tre forme siano a riferirsi. Queste osservazioni sono tanto più degne di ponderazione per ragione della facilità con la quale i *Budytes* presentano nell'abito variazioni allocrostiche non attribuibili solo all'albinismo. Per quanto concerne la fascia sopraccigliare, ho esemplari riferibili alla *B. borealis* e alla *B. cinereocapillus* con detta fascia completa e nettamente distinta (*De Romita*).

Io non condivido tutti i dubbî espressi dal chiaro mio amico prof. De Romita, ma le sue interessanti osservazioni mostrano che il caso dei *Budytes* va ancora studiato con ricche serie d'individui dei due sessi, di diversa età e di varia provenienza.

79. *Budytes campestris* (Pall.)

CUTTI TESTA GIALLA.

Cutrettola testa gialla (*Aut. Ital.*).

Liguria: Di comparsa accidentale nel Nizzardo (*Gal*). Scarso assai nel distretto di Spezia (Val di Magra) *fide* Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Firenze, ebbi per la Collezione italiana un maschio ucciso il 9 settembre 1885 a S. Piero a Ponte, Firenze (*Giglioli*).

80. Motacilla alba, Linn. ex Gesn.

BALLERINA.

Balarina, Fournera (*Cuneo*) — Buarina, Buarin-na, Balarin-na, Buvarin-na, Bavarin-na, Bâlen-na (*Basso-Piem.*) — Balarotta (*Como*) — Balarota (*Berg., Milano*) — Tremacua, Tremacua dal cap neigro, Quattroecci (*Nov.*) — Coacassola negra, Coacassola brutta, (*Cadore*) — Boaróla (*Feltre*) — Squasseróto, Coalóna (*Padova*) — Cudazzéna (*Ravenna, Bol.*) — Guardianina (*Vergato*) — Paggiaetta (*Savona*) — Balaina gianca (*Spezia*) — Cuccustrettola, Batticoda bigia, Batticoda di tetto (*Fiesole*) — Batticodola nera (*Casentino*) — Coditremola (*Sarteano*) — Batticoda (*S. Gimignano*) — Codazinzola, Uccello del diavolo (*Viterbo*) — Cucciamanella, Cucciaccannella (*Campobasso*) — Monaca (*Bari*) — Codatrémola bianca (*Nap.*) — Coda janca (*Cipri*) — Sisicula, Pispisa, Abatti-cuda nigra (*Calabr.*) — Pispicia janca (*Mess.*) — Vispisa, Pispisa (*Lentini*) — Vispisa (*Terran. Sicil.*) — Cullisalida (*Logudoro Sard.*).

Piemonte: Sedentaria e frequente al piano nella prov. di Cuneo, vi nidifica in aprile e giugno; ebbi un individuo albino (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Nel Basso Piemonte è sedentaria; alcune però emigrano coi primi freddi (*Camusso*). Comune e nidificante nell'Ossola, ove molti giungono di passaggio (*Bazetta*). Così nei distretti di Varallo e Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia: Comunissima al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passaggio abbondante nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Frequente al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Sedentaria e comune, e di passaggio abbondante in quella di Cremona (*Ferragni*). Comunissima nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Assai comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*).

Frequente, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Mohari*). Frequente, nidificante e di passo in aprile e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltrina, ove passa anche in agosto (*Delaito*). Abbondante e sedentaria nel Friuli, nidifica dall'aprile al giugno (*Vallon, Del Torre*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima nelle prov. di Ravenna e Bologna ed in parte sedentaria; molte però ci lasciano in autunno (*Bacchi della Lega*). Comune e sedentaria nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Comune e sedentaria nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove è più abbondante però nell'inverno (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è frequente di passaggio nel marzo, rara in autunno (*Luciani*). Sedentaria e frequente nell'inverno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune, sedentaria e di doppio passo nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Abbondante e sedentaria nei distretti di Fauglia e Lari (*Ott, Pappasogli*); anche di passo alla metà di ottobre in quello di Peccioli, Pisa (*Venerosi, Degli Alessandri*). Sedentaria e generalmente comune nella prov. di Firenze, ove è anche di passo, abbondante in ottobre e novembre, scarsa in marzo-aprile (*Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Abbondante e sedentaria nel Casentino (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune e sedentaria in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena, ove è più frequente d'inverno (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comunissima e sedentaria nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Abbondante e sedentaria in Toscana; durante il passo non è gregaria, ma lo diventa quando si è stabilita in una località, per modo che la sera branchi di varie centinaia si riuniscono a pernottare (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre, anche sedentaria; nidifica in maggio e giugno (*Paulucci*).

Lazio : Sedentaria e comune al piano nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi : Frequente e nidificante nel distretto di Ielsi, Campobasso; vi fa passaggio in novembre-dicembre ed in maggio e giugno (*D'Amico*).

Campania : Comune al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sedentaria nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Invernale e di passo abbondante in settembre-ottobre e febbraio-marzo, ne ho avuto anche in maggio (*De Romita*).

Calabrie : Sedentaria e comune, ma più frequente nell'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Scarsa sedentaria, comune d'inverno in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Comune, sedentaria e di passo in ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Passa in aprile ed in settembre-ottobre ed è frequente in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). In quello di Terranova, Caltanissetta, è invernale ed abbondante, giunge in ottobre e parte in marzo (*Carvanti*). Frequente al piano, di passo in settembre-ottobre nel distretto delle Madonie (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Invernale, ma anche sedentaria, abbonda al piano; gli immigranti giungono al Capo meridionale in settembre (*Bonomi*).

81. *Motacilla lugubris*, Temm.

BALLERINA NERA.

Pispicia svara (*Mess.*).

Liguria : Di casuale comparsa nel Nizzardo, ove l'ultima venne presa il 14 marzo 1886 (*Gal*). Accidentale nel distretto di Spezia, Genova; il 21 febbraio 1888 un maschio adulto in perfetto abito nuziale venne ucciso da un cacciatore insieme ad alcune *M. alba*, sulla spiaggia del mare alle Case Rosse (Spezia) e fu da me donato alla Collezione

centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo Zoologico di Firenze (*Carazzi*).

Sicilia: Rarissima nella prov. di Messina e di casuale comparsa (*Ruggeri, Pistone*).

82. *Calobates melanope* (Pall.)

CUTRETTOLA.

Motacilla sulphurea, Salvad.

Buarin-na, Buarinn-a giàna, Gianétta, Buarin-na giàlda, Bavarinna giàlda, Balénn-a giàna (*Basso-Piem.*) — Gialdirola (*Ossola*) — Tremacua giana (*Nov.*) — Balerina (*Berg.*) — Boarina zala (*Vicenza*) — Passerin (*Feltre*) — Squassacóa, Batticóa zala (*Padova*) — Coacassola de montagna (*Cadore*) — Armentaresse (*Friuli*) — Guardianina gialla (*Vergato*) — Peracia (*Nizza*) — Cua lunga (*Arenzano*) — Balaina zala (*Spezia*) — Cuccustrettola, Batticoda gialla o di fosso (*Fiesole*) — Batticodola gialla (*Casentino*) — Boarina (*S. Gimignano*) — Coditremola gialla (*Senese*) — Codiz-zinzola (*Grosseto*) — Prispola (*I. di Giglio*) — Sisicula gialla, Abatti-cuda giallina (*Calabria*) — Pispicia di frischia, Pispicia gialla (*Messina*) — Vispisa (*Terran. Sicil.*).

Il Salvadori evidentemente non ammette l'identità specifica tra le Cutrettole occidentali e quelle orientali, onde ritiene per queste il nome dato dal Pallas: a me pare che dopo le dichiarazioni del Sharpe (*Cat. Birds, Brit. Mus.* X. p. 501), basate sul confronto di un grandissimo numero di esemplari europei ed asiatici, non si possa più essere in dubbio sulla convenienza di riunire le due forme.

Piemonte: Comune al piano nella prov. di Cuneo, ove fa passaggio nella prima metà di settembre (*Abre*). Così per la prov. di Torino, ove però sembra essere specie sedentaria (*Gasca*). Nel Basso Piemonte è sedentaria e comu-

ne, più al piano però che al monte (*Camusso*). Non comune, ma nidificante nell'Ossola, ove molti giungono poi di passo (*Bazetta*). Nidifica in Valsesia (*Guarinoni*); è di passaggio nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Invernale e non comune in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non rara nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Di passaggio in quella di Vicenza (*Molari*); sedentaria nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente, nidificante e di passaggio in marzo e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove è anche sedentaria (*Delaito*). Comune e sedentaria nel Friuli, nidifica in aprile; dal settembre al marzo scende al piano (*Vallon, Del Torre*). Frequente e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarsa, ma sedentaria nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentaria e frequente nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove abbonda di più durante l'inverno (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano nidifica ai monti e scende d'inverno alla spiaggia (*Luciani*); così in quello della Spezia, ove è sedentaria e poco abbondante (*Carazzi*).

Toscana: Non frequente, ma sedentaria nella prov. di Lucca (*Fontebuoni, Gragnani*). Non abbondante, ma sedentaria nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi*). Non è generalmente frequente nella prov. di Firenze, sedentaria ai colli e di passo in ottobre e marzo (*Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente ai monti e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Paueri*). Non comune, ma sedentaria nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano, ove è anche di scarso passo autunnale (*Paulucci, Marri*).

Sedentaria, ma scarsa nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentaria in Toscana, passa l'estate ai monti e scende nell'autunno al piano (*Roster*).

Marche : Comune al piano e sedentaria; nidifica in aprile, maggio e giugno (*Paolucci*).

Campania : Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Piuttosto scarsa, invernale e di doppio passo, settembre-ottobre e febbraio-marzo; sono rari gli individui in abito nuziale. ma nel marzo 1888 ne ebbi tre (*De Romita*).

Calabrie : Sedentaria, ma più abbondante d'inverno nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Così nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Scarsa, ma sedentaria e nidificante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Non tanto abbondante, giunge in ottobre e parte in marzo, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente al piano nell'autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo in autunno e primavera al piano (*Bonomi*).

TURDIDÆ

(*Tordi*).

83. Saxicola Oenanthe (Linn.) ex Gesn.

CULBIANCO.

Cul bianch, Cubiànc, Cugianco de téra, Picamoute (*Basso-Piem.*) — Culbianc, Ocel dei sas, Steinvoghel, Carcatepe (*Novara*) — Cubianco, Cubianc, Pavarin gran (*Cudore*) — Culbianc (*Feltre*) — Zoparólo (*Padova*) — Queu blanc (*Nizza*) — Martinicca, Marticca (*Savona*) — Cugianco de

bosco (*Arenzano*) — Cüogianco de monte (*Spezia*) — Codino, Culo bianco (*Pisa*) — Culbianco, Codibianco (*Fuorcchio, Empoli*) — Codibianco (*S. Gimignano, Giglio*) — Codabianca, Codetta (*Viterbo*) — Monacella, Pretarola, Fumata, Palombella, Coda-bianco, Coda-janco (*Nap.*) — Coabianca (*Sard.*).

Piemonte : Scarso sui monti nella prov. di Cuneo, ove nidifica in maggio e giugno (*Abre*). Comune in quella di Torino (*Gasca*); nidifica sulle Alpi e sui colli dell' Astigiano (*Martorelli*). Specie estiva nel Basso Piemonte; ci giunge a primavera inoltrata, nidifica e parte a settembre (*Camusso*). Nell'Ossola giunge in primavera e nidifica ai monti sin oltre i 2000 metri, scende al piano in autunno (*Bazetta*). Di passo nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Comune al piano ed ai monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nel Comasco se ne fa grande presa ai monti durante il passo in agosto e settembre (*Rosales*). Frequente durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio in discreta abbondanza nella prima metà di aprile e settembre (*Magretti*). Di scarso passo in primavera e di passaggio abbondante nell'autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Non comune in quella di Mantova (*Paglia*). Comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarso, nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari*); frequente ai monti nel distretto di Bassano ove nidifica (*Ferrari*). Frequente, nidificante e di passo in aprile, ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune nel Friuli, giunge in aprile, nidifica ai monti in maggio e giugno e parte in ottobre; allora e nel settembre abbonda (*Vallon*); abbonda sul Matajur e sui prati alpini nell'estate (*Del Torre*). Comune, specialmente in collina, nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Nelle prov. di Ravenna e Bologna in aprile va ai monti ove nidifica e ripassa in agosto per sparire in

settembre (*Bacchi della Lega*). Comune ed estivo nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo nel Nizzardo, ove è specialmente abbondante durante il passo primaverile (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove giunge dalla metà di marzo a tutto aprile, nidifica ai monti e parte in settembre ed ottobre (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è specialmente frequente durante il passo in aprile (*Luciani*). Estivo e frequente ai due passi, specialmente in quello primaverile che incomincia in marzo, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comunissimo da aprile ad ottobre nella prov. di Lucca; in settembre scende dai monti ove ha nidificato e si trattiene sui prati sino alla partenza (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune alle due epoche del passo, specialmente da agosto a tutto settembre, nel piano, nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi*); estivo e nidificante in quello di Cedri (*Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è estivo e frequente ai monti, passa in marzo-aprile ed in agosto-settembre (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Il 18 gennaio 1889 nei pressi di Barberino di Mugello venne uccisa una femmina di questa specie, fu trovata dal signor D. A. Roster sul mercato di Firenze in un mazzo di uccelletti tra i quali era un Rusignolo; la conservo nella Collezione italiana (*Giglioli*). Estivo o frequente ai monti nel Casentino, Arezzo (*Pauer*). Comune di passo in marzo-aprile ed agosto-settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo e comune nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Estivo, e comune in agosto, settembre ed ottobre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa abbondante in aprile ed in agosto-settembre nell'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo ed abbondante in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, arriva in aprile-maggio, nidifica in giugno e luglio, parte in settembre-ottobre (*Paulucci*).

Lazio: Pochi estivi e nidificanti, molti di passo dalla metà di marzo alla metà di aprile e dalla metà di agosto a quella di novembre, nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio ed in settembre all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Estivo e nidificante, giunge numeroso in aprile, ma è ancora più abbondante alla fine di agosto, quando emigra (*De Romita*).

Sicilia: Abbondante dalla metà di marzo a quella di maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente nel distretto di Modica, Siracusa, giunge in aprile e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Passa in aprile e ripassa in settembre, trattenendosi tutto ottobre nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Comune nel maggio e anco nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*). Giunge in marzo-aprile e parte in settembre nel distretto di Palermo (*Giannattasio*).

Sardegna: Di passo in autunno e primavera, si ferma sulle spiagge del mare e degli stagni (*Bonomi*).

84. *Saxicola albicollis*, Vieill.

MONACHELLA.

Saxicola stapazina, Salvad.

Mozzetto (*Vicenza*) — Cubianco de montagna (*Cadore*) — Culbianco, Culbianco foresto (*Padova*) — Scappaxin (*Arenzano*) — Cüogianco de monte (*Spezia*) — Codibianco (*I. di Giglio*) — Paghionica (*Bari*) — Curidda janca, Munachedda (*Modica*).

Piemonte: Rara assai; annida però qualche volta al monte, sconosciuta al piano, nel Basso Piemonte (*Camusso*).

Veneto: Nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente, nidificante e di passaggio in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Estiva e di doppio passaggio nel Nizzardo, abbonda di più in primavera (*Gal*). Scarsa, ma non rara nel distretto di Savona; giunge dalla metà di marzo a tutto aprile, nidifica sulle costiere dei contrafforti specialmente ove sono Pini; parte in settembre ed ottobre (*Piccone*). Frequente in aprile e anche durante l'estate nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarsissima in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Rara in aprile nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Scarsa di doppio passo nella prov. di Firenze, ho un maschio colto a Pistoia nel gennaio 1875 (*Avif. Ital.* p. 87), ed un secondo ucciso a Prato nell'aprile 1883 (*Giglioli*). Passa non scarsa in aprile all'isola di Giglio, Grosseto (*Bianchi*).

Marche: Raro al piano (*Paolucci*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio ed in settembre nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Non rara, ma scarsa: si vede in ogni stagione, ma più frequentemente nella primavera (*De Romita*).

Sicilia: Comune al piano nella prov. di Messina (*Pistone*). Scarsa, passa in aprile e settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte Garofalo*).

Sardegna: Ne ebbi raramente in settembre, framviste alla specie precedente (*Bonomi*).

85. *Saxicola Stapazina* Vieill. ex Linn. partim.)

MONACHELLA A GOLA NERA.

Saxicola occidentalis, Salvad.

Favreto (Vicenza) — Scappaxin (Arenzano) — Cüogianco de monte (Spezia) — Codibianco pietrino (Isola di Giglio) —

Mattaccinu cu l'ali niri, Monachedda (*Mess.*) — Curidda janca cu li ali niuri (*Modica*).

Piemonte: Scarsa sui monti in prov. di Cuneo; di passaggio dalla metà di settembre a quella di ottobre (*Abre*). Rara in quella di Torino (*Gasca*). Uccello raro quanto il precedente nella prov. di Alessandria; credo annidi al monte, ma non me ne sono accertato (*Camusso*).

Lombardia: Rara (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarsa nel Friuli, giunge in aprile; ne ebbi il nido colle uova il 12 maggio 1884 (*Vallon*).¹ Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Frequente ed estiva nel Nizzardo, è più comune durante il passo in primavera (*Gal*). Scarsa, ma non rara nel distretto di Savona; giunge dalla metà di marzo a tutto aprile, nidifica nelle stesse località della specie precedente alla quale si associa; parte in settembre ed ottobre (*Piccone*). Frequente in aprile ed anche estiva nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Poco frequente in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Rara, avuta una sola volta da Massaciuccoli nella prov. di Lucca (*Martorelli*); vi ebbi un adulto nel maggio 1881 (*Gragnani*). Assai rara in primavera nella prov. di Firenze (*Giglioli*). In Val di Chiana qualcuna si vede durante i passi della *S. Oenanthe* e con essa frammista (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Rara in Maremma, avuta da Orbetello il 4 maggio 1866 (*Dei*). Passa in aprile all'isola di Giglio (*Bianchi*). Scarsa al passo primaverile in Toscana, vedesi allora nei dintorni di Firenze (*Roster*).

Campania: Di comparsa accidentale in aprile nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*). Passa dalla fine di marzo alla metà di settembre nell'isola di Capri (*Cerio*).

¹ È molto probabile che la Monachella a gola nera che giunge nel Veneto sia non questa specie, ma la seguente; il fatto merita di essere precisato.

Sicilia: Comune di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina ¹ (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa, passa in aprile e settembre nel distretto di Modica, Siracusa ¹ (*Dellafonte, Garofalo*). Rara al piano nel distretto delle Madonie, Palermo ¹ (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Non tanto scarsa, arriva in settembre e riparte in primavera, non è sedentaria (*Bonomi*).

86. *Saxicola melanoleuca* (Güldst.)

MONACHELLA A COLLO NERO.

Monachella bianca e nera (*Aut. Ital.*) — Monachella a gola nera (*Firenze*) — Codibianco pietrino (*Isola di Giglio*) — Gastrica forestiera (*Marche*) — Monacheja (*Calabr.*).

Toscana: Forse meno rara di quanto appare, ne conservo due nella Collezione italiana, presi nella prov. di Firenze nei pressi di Prato, uno nell'aprile 1883 (*Avif. Ital.* p. 88), l'altro nell'aprile 1886 (*Giglioli*). Confusa colla precedente, rara di passo in primavera specialmente, nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Passa in aprile all'isola di Giglio (*Bianchi*).

Marche: Scarsa al piano (*Paolucci*).

Puglie: Non rara, ma scarsa, si vede in ogni stagione, ma più frequente in primavera. Nessuno degli esemplari colti nelle Puglie può riferirsi alla occidentale *S. Stapazina*, specie distinta che non sembra capitare da noi (*De Romita*).

Calabrie: Comune nella prov. di Reggio (*Moretti*).

87. *Saxicola leucomela* (Pall.)

MONACHELLA A DORSO NERO.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA riguardo a questa specie, rarissima per noi.

¹ È più che probabile che siano qui confusi individui appartenenti anche alla specie seguente.

88. Dromolæa leucura (J. F. Gmel. ex Lath.)

MONACHELLA NERA.

Queu-blanc pignatié (*Nizza*) — Merlou ciappà da cua gianca (*Arenzano*) — Mataccinu niru (*Mess.*).

Liguria: Abbastanza comune e sedentaria nel Nizzardo: nidifica ai monti e scende al piano nell'autunno (*Gal*). Rara, ma sedentaria nel distretto di Arenzano e Cogoleto; in una vallata sarebbe scomparsa affatto questa specie in seguito alla venuta del Falcone (*Luciani*). Rara nel distretto di Spezia, ove si trova sui monti tra Portovenere e le Cinque Terre; nel R. Museo di Pisa è un esemplare preso a Portovenere, ed il prof. F. Magni-Griffi mi disse che in settembre si trova regolarmente sui monti sopra Vernazza, e che ne uccise cinque un giorno a S. Bernardino (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale in Maremma (*Ademollo*); ne ebbi uno da Orbetello il 2 maggio 1865 (*Dei*).

Sicilia: Rara ai monti nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Scarsa, ma sedentaria sui monti, anco nei pressi di Cagliari (*Bonomi*).

89. Dromolæa leucopyga (C. L. Brehm)

MONACHELLA NERA A TESTA BIANCA.

Monachella testa bianca (*Aut. Ital.*).

Nulla ho da aggiungere a quanto dissi su questa specie nella mia AVIFAUNA ITALICA; sinora un solo individuo è stato preso nella regione nostra.

90. Monticola saxatilis (Linn. ex Gesp.)

CODIROSSONE.

Passra soulitaria roussa, Roussigneul, Cuorossón, Merlo ciappà, Merlo ciapón (*Basso-Piem.*) — Merl-rouss (*Nor.*) — Ca-

ròsol (*Berg.*) — Squarussolon de montagna (*Veron.*) — Coda-rosson (*Saile*) — Codarossion de montagna, Codaross salvarego (*Udore*) — Codarossón, Coarossion (*Feltre*) — Squarussolón foresto (*Padova*) — Coarossa de monte (*Rovigo*) — Meral sassèll (*Bol.*) — Merel sassar (*Vergato*) — Merlo russo (*Savona*) — Cuarossion (*Arenzano*) — Tordo cua rossa (*Spezia*) — Codirossone, Codirosso grosso (*Pisa*) — Codirosso reale (*I. di Giglio*) — Coda-rùsso gruòsso, Codarùsso bastardo, Merlo de rocca (*Nap.*) — Passeru sulitariu, Merlu petroli (*Reggio, Calabr.*) — Cuda di focu di livanti, Cuda di focu barbarisca (*Mess.*) — Beccaficu imperiali (*Modica*) — Codarussa (*Terran. Sicil.*) — Sulitariu coa de fogu, Cularrubiu (*Sard.*).

Piemonte: Scarso in montagna nella prov. di Cuneo; ove nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Abre*). Nella prov. di Torino è comune sui monti da maggio a settembre (*Martorelli*). Questa specie assume alla fine di giugno la veste dei giovani dell'anno, riuscendo da quell'epoca fino alla sua partenza difficilissimo il discernere i giovani dell'annata dagli adulti, e questi fra di loro pel sesso. Nel Basso Piemonte è molto comune sui monti; giunge alla fine d'aprile e nidifica, alla fine di luglio gli adulti sono già scomparsi, i giovani li seguono nell'agosto (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, nidifica sui monti sino ai 1000 metri, emigra (*Bazetta*). Nidifica in Valsesia; è di passo nel distretto di Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia: Comune in montagna nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nella prov. di Como arriva verso la metà di aprile e parte alla fine dell'agosto (*Regazzoni, Bernasconi*). Scarso sui monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Comune ai monti e scarso al piano nella prov. di Milano (*Brambilla*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune ai monti nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso e nidificante nella prov. di Vicenza (*Moleri, Ferrari*). Frequente, nidificante e di passo in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); scarso ai monti ove nidifica,

di passo in aprile ed agosto nel distretto di Feltre (*Delaito*). Non raro nel Friuli, ove giunge in aprile e nidifica ai monti verso la fine di maggio (*Vallon, Del Torre*). Poco frequente ai colli nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro assai nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Estivo e nidificante nella parte montuosa della prov. di Bologna (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, ove è poco numeroso (*Lorenzini*). Scarso, estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di regolare passaggio in primavera ed in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Nidifica nel distretto di Savona sui fianchi dei contrafforti tra le rupi ed i boschi cedui; giunge dai primi di aprile a quelli di maggio, parte alla fine d'agosto e in settembre (*Piccone*). Così nel distretto di Arenzano, ove si vede più frequente in aprile (*Luciani*). Estivo e di passo regolare nel distretto di Spezia, ove non è comune e nidifica sui monti dietro Sarzana (*Carazzi*).

Toscana : Comune ai monti da maggio a settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); scarso nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Scarso nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Nella prov. di Firenze questa specie è estiva e nidifica ai monti; nel distretto di Fucecchio è scarso (*Turchetti*); in quello d'Empoli vedesi specialmente di passo in aprile ed in settembre-ottobre (*Fucini*); in quelli di Fiesole e Sesto fiorentino è frequente ai monti (*Gargioli, Ginori*), scarso al piano (*Fontebuoni*). Frequente ai monti nel Casentino, Arezzo: giunge in aprile e parte in settembre (*Beni, Fiorini, Pauer*). Scarso in collina nel distretto di Val di Chiana (*Griffoli*). Non raro sui monti nel distretto di Sarteano, Siena; giunge in aprile-maggio e parte in settembre (*Bargagli*). Estivo, ora più, ora meno abbondante nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Passa nella prima metà di settembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo in Toscana, nidifica in abbondanza sui colli del Chianti e del Mugello (*Roster*).

Marche: Frequente, nidifica in giugno e luglio (*Paolucci*). Così nei monti di Urbino (*Carpegna*).

Campania : Di accidentale comparsa in aprile nella prov.

di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa dalla fine di marzo alla metà di maggio ed in settembre nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Poco frequente nell'aprile (*De Romita*).

Calabrie: Non comune nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Raro, si vede in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, passa in aprile e settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Di solo passo e non abbondante in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Scarso ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Molto scarso, ma sedentario sui più alti monti, lo presi d'inverno sulla piazza d'armi di Cagliari; è più frequente al Capo settentrionale, nella Nurra di Alghero, nonchè all'Asinara (*Bonomi*).

91. *Monticola Cyanus* (Linn.) (ex Gesn.)

PASSERA SOLITARIA.

Passra soulitaria bleu, Passera solitaria, Passua salutia, Merl ciapareù, Merlo ciapà (*Basso-Piem.*) — Passera, Passera solitaria (*Feltre*) — Pàsser solitari (*Friuli*) — Passra sulitèria (*Rav.*) — Passaro solitario (*Sacile*) — Pàssara, Merlo foresto (*Padova*) — Merlo casuengo, Merlo casengo (*Savona*) — Merlo rocaé (*Spezia*) — Merlo marino (*S. Terenzo*) — Merla tettaiuola (*Pisa*) — Merla (*I. di Giglio*) — Passaru solitariu (*Calab.*) — Passiru sulitario (*Modica*) — Mierru solitariu (*Castellb.*) — Sulitariu, Meurra de arrocca (*Sard.*).

Piemonte: Scarsa sui monti in prov. di Cuneo; ove nidifica una sola volta, in maggio (*Abre*). Nella prov. di Torino si vede facilmente nell'estate (*Martorelli*). Nel territorio di Voltaggio, Alessandria, è rara, ma fa una specie di passo in novembre (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, nidifica ai monti sino ai 1000 metri, emigra (*Bazetta*). Nidifica in

Valsesia; è di rara comparsa nel distretto di Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia : Comune in collina nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa sui monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Piuttosto rara in quella di Mantova (*Paglia*). Comune ai monti in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune assai, nidifica sulle roccie nel distretto di Caprino, Verona, ove è sedentaria (*Pellegrini*). Scarsa nella prov. di Vicenza (*Molari*); comune ai monti nel distretto di Bassano, ove nidifica (*Ferrari*). Scarsa in montagna, ove nidifica, di passo in aprile ed agosto, nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Scarsa ed estiva ai monti nel Friuli, ove giunge in aprile; nidifica tra le rupi inaccessibili in maggio e giugno (*Vallon*). Nel distretto di Cividale si vede ben di rado (*Del Torre*). Poco frequente ai colli nella prov. di Padova, abita la Rocca di Monselice (*Arrigoni*). Rarissima nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Constatato con vero rincrescimento la totale sparizione di questa specie da Bologna, e ciò data da 5 o 6 anni; per contrario essa è ancora piuttosto abbondante in molti paesi dell'Appennino Romagnolo, come Brisighella, Marradi, Tredozio ecc. Emigra nell'inverno (*Bacchi della Lega*). Scarsa, ma nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Un individuo venne ucciso a Frassinoro, Modena, nel dicembre 1883 (*Picaglia*).

Liguria : Specialmente estiva ed autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune, ma non abbondante nel distretto di Savona, nidifica anche fra le rupi sul mare (*Piccone*); sedentaria in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente e sedentaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune e sedentaria nella prov. di Lucca, ove scende al piano l'inverno (*Martorelli, Fontebuoni*); anche di passo in settembre nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Frequente e sedentaria, nidifica ai colli e scende al piano l'inverno nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarsa ma nidificante in Val d'Era (*Venerosi*). Scarsa, ma sedentaria, specialmente ai monti nella prov. di Firenze (*Turchetti, Gar-*

giolli, Ginori, Fontebuoni). Frequente ovunque e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune e sedentaria in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Comune e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Sedentaria e nidificante all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentaria e comune nei luoghi abitati in Toscana, fa sino a tre covate (*Roster*).

Marche: Comune e sedentaria, nidifica in maggio e giugno (*Paolucci*).

Lazio: Sedentaria, ma scarsa nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente e sedentaria nella prov. di Napoli, nidifica sugli alti edifizi della città di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sedentaria a Capri, ove nidifica tra le roccie inaccessibili (*Cerio*).

Puglie: Sedentaria, ma scarsa nella prov. di Bari, più comune in quella di Lecce; nidifica sulle torri (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria ai monti, ma scarsa nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Comune nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Sedentaria e comune nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Sedentaria e frequente ai monti nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Sedentaria ai monti, non abbondante ed erratica d'autunno nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrana*). Scarsa, ma sedentaria nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentaria, specialmente al Capo settentrionale e nel Nuorese; in settembre viene nelle città (*Bonomi*).

92. *Merula nigra*, Leach ex Schwenck.

MERLO.

Merlou, Merl, Merál (*Basso-Piem.*) — Merlo da bosco (*Cadore*) — Merli, Merlott, Miérli (*Friuli*) — Merlo terra-

gnolo, Merlo montagnolo (*Padova*) — Méral (*Bol., Rav.*) — Merel (*Vergato*) — Merlo (*Spezia*) — Merlo (*Nap.*) — Gogea pizzoverd (*Puglie*) — Miedduru, Merru, Merlu (*Calabr.*) — Merru di sipala (*Messina, Reggio, Calabr.*) — Merru, Merrra (*Lentini*) — Mierru niuru o di sciara (*Castell. Madonie*).

Piemonte: Frequente e sedentario ovunque nella prov. di Cuneo; nidifica due volte, in aprile ed in giugno (*Abr.*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Ho osservato nella prov. di Torino varî esemplari toppati di bianco, alcuni altri bianchi completamente ed uno di un bel color isabella (*Gasca*). Ebbi a Voltaggio un caso di albinismo ed uno di isabellismo; uccisi il 17 novembre 1883 un Merlo femmina, col becco incrociato con profonda intaccatura alla mandibola inferiore in quel punto. Nel Basso Piemonte è specie comune e sedentaria, non pochi però al giunger dell'inverno partono (*Canusso*). Comune e sedentario nell'Ossola, non sale oltre i 1500 metri (*Bazetta*). Così in Valsesia e nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara (*Guarionni, Demori, Danisi*).

Lombardia: Comunissimo ovunque in prov. di Sondrio; si notano casi di albinismo in questa specie (*Galli*). Nella prov. di Como la massa degli immigranti giunge verso la metà dell'ottobre (*Regazzoni*); nidifica nel Comasco, ove però fa un copiosissimo passo nell'ottobre (*Rosales, Bernasconi*). Frequente ovunque nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Sedentario e di passo abbondante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comunissimo anche d'inverno in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo ovunque in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Stazionario e comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente ovunque, nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune, nidificante, erratico e di passo in marzo e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però è anche sedentario (*Delaito*). Comunissimo e sedentario nel Friuli, ove le prime covate trovansi già nel marzo, le seconde in

giugno (*Vallon*); comune e sedentario nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comunissimo e sedentario nella prov. di Padova, non è raro trovare giovani con fascia chiara o bianca attraverso la coda, avanti la prima muta (*Arrigoni*). Abbondante e sedentario in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune e nidificante nelle prov. di Ravenna e Bologna, emigra nell'inverno (*Bacchi della Lega*). Frequente e sedentario nel distretto di Vergato (*Bologna*); nell'autunno vedesi una varietà detta « maremmana, » il cui maschio è di un nero grigiastro col becco scuro (*Lorenzini*). Sedentario in parte nella prov. di Parma; la varietà « montana » sono tutte femmine (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove è comune (*Piccone*); ed in quello di Arenzano, ove passa abbondante in febbraio e marzo e più scarsamente nell'autunno (*Luciani*). Frequente e sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Sedentario e comune, ma scemato in numero nella prov. di Lucca, ove molti giungono di passo in ottobre; questi, distinti pel becco scuro, vengono detti « maremmani » dai cacciatori (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune, sedentario ed abbondante alle due epoche del passo, ottobre-novembre e febbraio-marzo, nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è frequente e sedentario, anco di passo in ottobre e novembre (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*); nel distretto di Fucecchio tra il 17 e 18 ottobre 1886 vi fu un passo straordinario di Merli, ovunque si vedevano e rimasero un giorno ed una notte (*Lenzi*). Comune ovunque e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Così in Val di Chiana (*Griffoli*). Così ancora nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano, vi si distinguono come « merli forestieri » o « di montagna » quelli (sempre femmine) colle parti inferiori rossiccie, e, dicesi giungano tardi di passo (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentario, molti poi giungono a svernare nelle prov. di Siena e di Grosseto

(*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa abbondante in ottobre e novembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario e comunissimo in Toscana; all'epoca del passo giungono numerose femmine col petto di color ruggine, diconsi « Merle forestiere »; sono frequenti i casi di albinismo e di isabellismo (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, di passo in ottobre-novembre e febbraio-marzo; molti sedentari, nidificano in maggio e giugno, quindi diventano erratici (*Paolucci*).

Lazio: Frequente e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Comune e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Sedentario e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sedentario ed in scarso numero nidificante all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Scarsamente sedentario, abbondante dalla seconda metà di ottobre a tutto l'inverno per gli immigranti che giungono (*De Romita*).

Calabrie: Sedentario e abundantissimo nell'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente ai monti, sedentario e anco invernale, da ottobre a marzo, in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Sedentario, ma meno abbondante di una volta nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Comune e sedentario nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*). Giunge dalla metà di novembre a quella di dicembre e parte o ripassa in marzo-aprile, nel distretto di Palermo (*Giannattasio*).

Sardegna: Abbondante, sedentario ed invernale e di doppio passo; giungono in novembre coi Tordi; i sedentari scendono al piano col freddo (*Bonomi*).

93. *Merula torquata* (Linn.) ex Gesn.

MERLO COL COLLARE.

Griva magnina, Ciach-ciach (*Basso-Piem.*) — Merlo de montagna (*Valt.*) — Viscarda negra (*Como*) — Merla montana (*Berg.*) — Margon, Merla du cullarî, Merl de stomich bianch (*Novara*) — Merlo dal colaro (*Vicenza*) — Tordol, o Tordo dalla collaina (*Cadore*) — Tordo dalla collana, Tordo fassan (*Feltre*) — Merlo da la colana, Merlo da la piastra (*Padova*) — Merlo forestiero (*Pisa*) — Merlo col vezzo (*Casentino*) — Merlo col petto bianco (*Marche*) — Merru a collana (*Mess.*) — Marvizzu o Turdu di passa (*Castelb. Madonie*) — Meurru a cannacca, Merula giajulada (*Sard.*).

Recentemente (*Proc. U. S. Nat. Mus.* IX (1886), p. 365) lo Stejneger ha recisamente dichiarato che vi sono due specie di Merlo col collare in Europa, resuscitando due delle sei specie distinte dal vecchio Brehm coi nomi di *Merula torquata* (Linn.) e *Merula alpestris*, Brehm; la prima propria all'Europa boreale, la seconda confinata quasi e stazionaria sulle Alpi. In dodici esemplari di *M. torquata* colti in Italia in autunno, inverno e primavera trovo gli estremi delle due supposte specie, ma vi sono individui i quali collegano tali estremi, e a dire il vero guardandoli mi sembra che sia difficile il condividere la opinione dello Stejneger. In ogni modo sarà forse prudente di lasciare per ora la questione aperta, questione che solo un accurato esame di centinaia di esemplari colti nell'Europa settentrionale e sulle Alpi, dei due sessi, di ogni età ed in ogni stagione, potrebbe decidere. Del resto osservo che se lo Stejneger vuol rivangare le specie del Brehm si è preso a fare un lavoro erculeo davvero, e secondo me pericoloso e poco profittevole pel progresso della Ornitologia. Nel caso che vi fossero davvero due specie di Merlo col collare, esse potrebbero benissimo trovarsi entrambe in Italia, la *M. torquata* nordica come uccello inver-

nale, la *M. alpestris* come specie sedentaria. La maggiore differenza tra queste due forme sarebbe che nella prima durante la nidificazione le penne sono tutte nere eccetto il collare e le cuopratrici alari: mentre nella seconda le penne al disotto del collare e spesso quelle della gola conserverebbero *sempre* i loro margini chiari. Avevo già scritto quanto sopra quando lessi nell' « *Ibis* » 1888, p. 309, una breve memoria del signor Seeböhm su questo argomento; dopo aver esaminato moltissimi esemplari da varie provenienze, gliene mandai io pure, il Seeböhm conchiude che si potrebbero distinguere forse *tre* razze o sottospecie, ma esse sono indubbiamente connesse da forme intermedie. Due sono quelle citate sopra, la terza vivrebbe più specialmente nel Caucaso ed in Persia.

Piemonte: Sedentario nella provincia di Cuneo, e scarsa sui monti, ove nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Abre*). Lo trovai numeroso nelle Alpi Cozie nell'inverno, ed abbondante sul mercato di Torino (*Martorelli*). Rarissimo sul principio degli inverni freddissimi nel territorio di Valtaggio, Alessandria (*Canusso*). Nell'Ossola non è molto comune, nidifica negli alti boschi, non emigra e solo nei rigidi inverni scende al piano (*Bazetta*). Sedentario in Valsesia e nel distretto di Crodo, Novara, nidifica una sola volta dal maggio al luglio (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia: Comune nella prov. di Sondrio, ove vive sempre sui monti (*Galli*). Nel Comasco passa tra il settembre ed il dicembre (*Regazzoni*): è raro in provincia mentre è invece comunissimo nella Valtellina, ove nidifica nei pressi di Bormio ed in Val Furva (*Bernasconi*). Scarso, vive sui monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Avventizio in quella di Cremona (*Ferragui*). Non frequente nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comune ai monti in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non raro e sedentario sui monti nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Sedentario ai monti nella prov. di Vicenza (*Molari*); di passo in quel di Bassano (*Ferrari*). Frequente in montagna, nidificante e di passo in

aprile e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Scarso ai monti, ove nidifica in maggio e giugno sui larici e sugli abeti, allevando due covate; passa in aprile ed ottobre nel distretto di Feltre. Va notato che quelli che covano nel distretto passano regolarmente tenendosi alle massime altezze; ogni 8 anni circa si nota un passo straordinario di questi uccelli pei monti bassi, e questi si considerano immigranti dalle contrade nordiche (*Delaito*). Non raro sui monti nel Friuli, ove sarebbe sedentario; nel dicembre molti calano al piano (*Vallon*); manca nel distretto di Cividale, ma trovasi nella Carnia (*Del Torre*). Rarissimo nella prov. di Padova; nella mia raccolta è un individuo preso a Borgoricco il 21 maggio 1879 (*Arrigoni*). Raro assai nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Usualmente raro nel distretto di Vergato, ma nell'autunno 1866 ve ne fu abbondante passaggio ed a Bologna si vendevano col nome di « Merli della Porretta » (*Lorenzini*). Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Poco numeroso e qualche anno scarso nel distretto di Savona, vi giunge dalla fine di ottobre a tutto novembre, alcuni svernano; parte o ripassa nel marzo (*Piccone*); raro in quello di Arenzano (*Luciani*). Raro ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*). Nel marzo 1887 ebbi un maschio di questa specie, quasi sconosciuta nel distretto di Sarzana (*Lamotte*).

Toscana: Raro, l'ebbi una sola volta nella prov. di Lucca (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa ne ho veduti in maggio ed in ottobre, ed il 7 aprile 1888 ne furono uccisi tre presso il lago di Massaciuccoli (*Gragnani*). L'8 aprile 1888 vennero uccise due femmine di questa specie a Torre del Lago, Viareggio (*Papasogli*). Raro assai in collina nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Non tanto raro dall'ottobre al marzo nella prov. di Firenze, ne conservo parecchi, provenienti specialmente dal Mugello (*Giglioli*). Non frequente ai monti in ottobre nel Casentino, Arezzo, forse vi nidifica (*Beni, Pauer*); sedentario (*Fiorini*). Invernale e raro nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*);

avuto nel gennaio 1883 in quello di S. Gimignano (*Paolucci*). Scarso e di irregolare comparsa nel Senese (*Dei*). Scarsamente sedentario in Toscana, più abbondante nell'inverno associato col *T. pilaris* in branchi (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale ed assai raro (*De Romita*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Raro ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune, ma soltanto alle epoche del passo (*Bonomi*).

94. *Turdus atrigularis*, Temm.

TORDO DAL PETTO NERO.

Tordo di gola nera (*Aut. Ital.*).

Visitando il Museo Civico di Rovereto, Trentino, il 28 agosto 1887, ho potuto esaminare accuratamente il Tordo ucciso al Varone presso a Riva sul lago di Garda il 1° gennaio 1868, il quale, dietro esame di una figura colorata, io con altri ritenni essere una femmina di questa specie, mentre Salvadori e qualcun altro inclinavano a ritenerlo un *T. ruficollis* (Vedi AVIF. ITAL. p. 95. SALVAD. *Ucc. Ital.* p. 109). Da quell'esame risultò per me in modo sicuro che l'uccello in quistione è veramente un *T. atrigularis*, e femmina. Le timoniere esterne sono tinte di rossiccio appena appena e soltanto sulla superficie inferiore, questo carattere era stato esagerato assai nella figura mandatami dal prof. Bonomi. Le parti superiori sono bigie come nella femmina adulta di questa specie, e la gola, che è bianchiccia nel mezzo, mostra ai lati grosse macchie a gocciola nerastre. In conclusione quell'esemplare è perfettamente identico ad una femmina che sta ora innanzi a me, che venne colta dal dott. A. Anderson a Kooraoleo

nell'India il 20 gennaio 1876, e donata al R. Museo di Firenze da H. Seebohm. Come notizia posso aggiungere che nel R. Museo Zoologico di Dresda nella interessante raccolta illustrante la fauna locale ho veduto una femmina adulta del *T. atrigularis* molto simile a quella di Rovereto, che porta il nome di *T. ruficollis*; essa venne catturata in Sassonia.

Lombardia : Raro assai (*Turati, Borromeo*).

Toscana : Si dice che fossero presi tre individui di questa specie, anni sono ad un boschetto nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Accidentale nel Senese, ne ebbi un maschio da Belforte il 30 novembre 1863 (*Dei*).

95. *Turdus obscurus*, J. F. Gmel.

TORDO CHIARO.

Tordo oscuro (*Aut. Ital.*).

Il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 106, nota) ha potuto verificare che nel novembre del 1827 il Bonelli ebbe a Torino due esemplari del *T. obscurus*, uno dei quali venne donato al signor Alason; sarebbero dunque *cinque* e non quattro gli individui di questa specie catturati finora in Italia.

Toscana : Accidentale nel Senese, ove un individuo sarebbe stato preso alla metà del dicembre 1877 (*Dei*).

96. *Turdus fuscatus*, Pall.

TORDO OSCURO.

Cesena fosca (*Aut. Ital.*).

Lombardia : Un individuo di questa rarissima specie venne catturato nel Bresciano nell'ottobre 1888, è ora in mio possesso (*Ferragni*).

97. Turdus pilaris, Linn. ex Gesn.

TORDELA GAZZINA.

Cona-neira, Ciac-ciac, Tordeuia corsesca, Calandra (*Alba, Basso-Piem.*) — Calandar (*Ossola*) — Viscarda (*Como, Mil.*) — Viscera (*Berg.*) — Merlo ciach (*Sacile*) — Zenevon (*Civildale*) — Gazanéla (*Padova*) — Tordo (*Rovigo*) — Tordo dalla coa nera (*Feltre*) — Tordol, o Tordo negro o chach (*Cadore*) — Zizésca (*Ravenna*) — Colombella (*Vergato*) — Tourdou montagné (*Nizza*). — Griva, Còrso (*Savona*) — Sturlenga (*Spezia*) — Tordela forestiera, Sassellara (*Pisa*) — Colombella (*Garf.*) — Stordeola (*Lucca*) — Cegessa (*Casentino*) — Tordela, Cesena (*Val di Chiana*) — Gaggi (*Sarteano*) — Tordeca (*Bari*) — Marvizzu imperiali (*Terran. Sicil.*) — Re di Turdi (*Castellb.*) — Turdu culumbinu, Turdu colori de ceni-sciu (*Sard.*).

Piemonte: Ne ebbi a Cuneo una in parte albina; è specie frequente ovunque in provincia durante l'inverno; giunge nella seconda metà del novembre (*Abre*). Generalmente scarsa, ma qualche anno abbondante nella prov. di Torino (*Gasca*); abbondante (*Martorelli*). Di solo passo, questo Tordo si lascia vedere intermittenemente nel Basso Piemonte e sempre nella fredda stagione; viaggia in truppe, apparendo alcuni anni più abbondante, alcuni anni invece scarso assai (*Camusso*). Nell'Ossola nidifica sugli alti monti nei boschi di faggi; alcuni individui emigrano, altri rimangono nell'inverno (*Bazetta*). Dubbiosa la nidificazione in Valsesia (*Guarini*); pare essere mediocrementemente abbondante e sedentaria nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comunissima nella prov. di Sondrio, ove non discende al piano che durante l'inverno; nei mesi di novembre e dicembre 1887 vi fu in Valtellina un passo abundantissimo (*Galli*). Arriva nel Comasco dalla seconda metà di novembre a tutto dicembre: parte nel febbraio. Ni-

difica in Valtellina (*Regazzoni, Bernasconi*). Nidifica sulle Alpi a circa 2000 metri nelle foreste di Larici e di Cembri; nel Comasco è di doppio passaggio, in marzo ed in novembre e dicembre (*Rosales*). Frequente durante il passo nella provincia di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio più o meno abbondante nella seconda metà di marzo e novembre (*Magretti*). Invernale e non sempre abbondante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quello di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di passaggio nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Erratica e di passo in quella di Vicenza (*Molari, (Ferrari)*). Frequente nel Cadore, Belluno, ove nidifica una o due volte in giugno e luglio e fa passaggio in aprile e novembre (*Tissi*). Abbondante di solo passaggio in novembre, dicembre e febbraio nel distretto di Feltre (*Delaito*). Abbondante nel Friuli dal novembre al marzo (*Chiaradia, Vallon*); qualche coppia dicesi essere sedentaria ai monti nel distretto di Cividale; io la trovai abbondantissima sul Matajur ai primi del settembre (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non molto comune nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove passa nell'autunno inoltrato ed in primavera; più abbondante quando il freddo è più intenso (*Bacchi della Lega*). Di passo autunnale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Scarsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Invernale e abbondante ai monti nel distretto di Savona: giunge in novembre e dicembre, parte in marzo (*Piccone*). Comune nei rigidi inverni nel distretto di Arenzano; nell'inverno 1884 ne comparve un numero straordinario (*Luciani*). Poco abbondante e di comparsa irregolare nel distretto di Spezia, ove non ne vidi negli inverni 1885-86 e 1886-87, mentre capitò in quello 1887-88 (*Carazzi*).

Toscana: Scarsa e poco nota, di passo autunnale nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Comune all'epoca del passo nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Dalla metà di di-

cembre 1887 alla metà di febbraio 1888, le Cesene furono numerosissime nella R. tenuta di Tombolo, Livorno (*Papasogli*). Nella prov. di Firenze è generalmente frequente in collina nel novembre e scarsa al piano (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Non comune, di passo in ottobre nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Poco frequente nell'autunno ed inverno in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano, ove l'ebbi in dicembre (*Paulucci*). Invernale, ora più, ora meno abbondante nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*); dall'ottobre al marzo 1885, molte rimasero nei boschi di Val d'Orcia (*Dei*). Di scarso passaggio all'isola di Giglio (*Bianchi*). Invernale in Toscana, ove giunge alcuni anni copiosa altri no; nel 1884 fu oltremodo abbondante; tale è negli inverni rigidi (*Roster*).

Marche : Scarsa al piano (*Paulucci*).

Campania: Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Non giunge tutti gli anni, ma vedesi sempre d'inverno e per pochi giorni, in qualche anno abbondante (*De Romita*).

Sicilia : Scarsa di passo in ottobre e novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Di passo irregolare in ottobre-novembre e marzo, poco frequente nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Giunge in ottobre e rimane sino alla metà di marzo, ma è scarsa nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Accidentale; si vide un branco numeroso in Castelbuono Madonie, Palermo, nel 1846 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Non comune di passo invernale e specialmente nel Sassarese, al piano; fui il primo a notare in modo sicuro la comparsa di questa specie nell'isola; ne presi diversi individui ogni anno (*Bonomi*).

98. Turdus iliacus, Linn. ex Bell.

TORDO SASSELLO.

Tourd chilons, Turd cursin, Durd corsin, Corsin, Turdin, Durdin (*Basso-Piem.*) — Durd spinard (*Valt.*) — Sipa (*Nov.*) — Sdordi (*Berg.*) — Ziv (*Como*) — Tordo siselin (*Vicenza*) — Tordol, o Tordo zheselin (*Cadore*) — Tordo zhisilót (*Feltre*) — Tordo (*Rovigo*) — Susinèll (*Bol.*) — Susino, Susinello (*Vergato*) — China (*Nizza*) — Tordo corsin (*Arenzano*) — Turdo còrso (*Savona*) — Arpezin (*Spezia*) — Tordo marino, Zirlone, Fischione (*Garf.*) — Tordo piccolo (*Fiesole*) — Alpigino (*Sarteano*) — Cantarèll (*Ravenna*) — Tordo gaggiaro (*Ancona*) — Marvizza furestera (*Mess.*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in aprile e novembre; ne ebbi vari esemplari color isabella (*Abre*). Scarso in prov. di Torino (*Gasca*): meno numeroso della specie seguente (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte è comune nel tempo del passo, sì di primavera che d'autunno: molto più abbondante in quest'ultima stagione (*Camusso*). Nell'Ossola giunge di passo autunnale, non consta vi abbia nidificato (*Bazetta*). Scarso, di passaggio autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune nella prov. di Sondrio ove vive al monte e al piano (*Galli*). Di passaggio nel Comasco, giunge dal principio di ottobre al novembre; gli ultimi partono alla fine di febbraio (*Regazzoni, Bernasconi*); meno abbondante della specie precedente (*Rosales*). Frequente durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio più o meno abbondante in aprile ed ottobre (*Magretti*). Invernale e di scarso doppio passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di passo alla fine dell'autunno nella prov. di

Verona (*Pellegrini*). Di passaggio in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente di doppio passaggio in aprile e novembre nel Cadore, Belluno, ove non nidifica (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa in marzo ed ottobre (*Delaito*). Di passo copioso in novembre e marzo nel Friuli; non ho potuto trovarne il nido (*Valton*); forse anche sedentario ai monti nel distretto di Cividale, io ne ebbi i nidia-
cei (*Del Torre*). Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Di passaggio autunnale e primaverile nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Frequente sul finire dell'autunno nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune ed invernale nel distretto di Savona: giunge in novembre e parte in marzo (*Piccone*); in quello di Arenzano è più frequente in autunno (*Luciani*). Comune ed invernale nel distretto di Spezia; parte in marzo (*Carazzi*).

Toscana : Comune di passo in ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Invernale e abbondante alle due epoche del passo, giunge alla fine di ottobre ed in novembre nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Nella prov. di Firenze è frequente in collina in ottobre, novembre, dicembre e marzo (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente in ottobre e marzo nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune nei due passi e molto tardivo in quello autunnale in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena, ove si comincia a vedere alla fine d'ottobre (*Bargagli*); invernale in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Invernale e più abbondante della specie precedente nella prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Invernale e assai comune in Toscana, nel passo segue il Tordo comune (*Roster*).

Marche : Scarso al piano (*Paolucci*).

Campania : Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Frequente, ma non abbondante; giunge in novembre, sverna e parte in aprile (*De Romita*).

Sicilia : Raro assai d'autunno nella prov. di Messina (*Pistone*). Accidentale; venne preso nel dicembre 1886, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Abbondante al passo invernale e specialmente nel Sassarese (*Bonomi*).

99. *Turdus musicus*, Linn. ex Schwenck.

TORDO.

Durd, Griva, Turd, Turdo (*Basso-Piem.*) — Torod (*Nov.*) — Durt (*Berg.*) — Tordol, o Tordo zhit (*Cadore*) — Tordin (*Feltre*) — Dörde (*Friuli*) — Tord (*Rav., Bol.*) — Turdo (*Arenzano*) — Tordo (*Spezia*) — Tordo reale (*Pisa, Garf.*) — Tordo grosso (*Fiesole*) — Tordo, Tordo bottaio (*Casentino*) — Tordino (*Sarteano*) — Malvizzo (*Campobasso*) — Marvizza (*Calabr.*) — Malbizzu (*Lentini*) — Trudu, Murtiddus (*Sard.*) — Trudus (*Logudoro*) — Coiloro (*Fonni*) — Coilongo (*Mamajada*).

Piemonte : Ne ebbi diversi esemplari color isabella; è frequente in prov. di Cuneo, ove nidifica in maggio (*Abre*). Abbondante in prov. di Torino; notai diversi individui isabellini (*Gasca*); frequente, giunge ai primi di ottobre e verso la metà cessa il passo, pochissimi si trattengono; ripassa dai primi di febbraio a tutto marzo (*Martorelli*). Abbonda in ambedue i passi nella prov. di Alessandria, ma più in quello autunnale; nessuno sverna; al monte nel distretto di Valtaggio qualche rarissima volta ha posto il nido (*Camusso*). Nell'Ossola nidifica ai monti sino ai 1500 metri; emigra (*Bazetta*). In Valsesia fa spesso due covate tra l'aprile ed il luglio (*Guarinoni*); è sedentario e piuttosto comune nel distretto di Crodo (*Demori*); diviene erratico in quello di Piedimulera, Novara (*Danisi*).

Lombardia : Comunissimo ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passaggio nel Comasco dalla metà di set-

tembre alla fine di ottobre (*Regazzoni*; anche in primavera passa (*Rosales, Bernasconi*). Frequente nella prov. di Bergamo; vi nidifica (*Stefanini*). Comune in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio più o meno abbondante in aprile ed ottobre (*Magretti*). Invernale e di doppio passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Invernale e di passo in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di passo abbondantissimo nell'autunno, nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente ai monti nel Cadore, Belluno, ove nidifica due volte, ed ove fa passaggio in aprile e settembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove è sparso e fa passaggio in marzo, settembre ed ottobre (*Delaito*). Frequente nel Friuli, ove nidifica nel maggio ai monti e sui colli (*Vallon, Del Torre*). Più o meno comune, secondo le annate, nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di passaggio in primavera e in autunno, in branchi numerosissimi; più frequente assai nella prov. di Ravenna che in quella di Bologna; quivi alla Porretta ed a Vergato qualche coppia nidifica (*Bacchi della Lega, Lorenzini*). Frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Nidifica ai monti nel distretto di Savona, è più abbondante alle epoche del passo (*Piccone*). Frequente nel distretto di Arenzano, passa in ottobre e ripassa in marzo (*Luciani*). Abbondante durante il passo e d'inverno; non mi consta che nidifichi nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Abbondante di passo in settembre e nella prima metà di ottobre nella prov. di Lucca; pochi svernano ed il ripasso ha luogo in febbraio e marzo (*Martorelli, Gragnani*); forse alcune coppie nidificano sui monti lucchesi (*Fontebuoni*). Comune alle due epoche del passo, e specialmente in ottobre, nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli. Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è generalmente frequente in poggio al passo in

ottobre-novembre e febbraio-marzo (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*); scarso nel distretto di Empoli (*Fucini*). Comune di passo in ottobre e marzo ed anco nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comunissimo in autunno, inverno e primavera, ed in quest'epoca specialmente al piano, in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo in settembre-novembre e marzo nel distretto di Sarteano, Siena, ove qualche coppia nidifica sui monti (*Bargagli*); autunnale ed invernale in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Abbondante d'inverno ed in scarso numero sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo abbondante nella prima metà di marzo ed in ottobre-novembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario in Toscana e abundantissimo all'epoca del passo (*Roster*).

Marche : Comune ovunque, passa in ottobre-novembre e febbraio-aprile (*Paolucci*).

Abruzzi : Frequente di passo in settembre-ottobre ed in febbraio, nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania : Comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Abbondante assai, giunge ai primi di ottobre, molti svernano; parte o ripassa nel marzo (*De Romita*).

Calabrie : Abbondantissimo nell'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Abbondante di doppio passo e fors'anche nidificante ai monti, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente ovunque in ottobre, in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Piuttosto abbondante da ottobre a marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Comune; viene in settembre e rimane l'inverno nel distretto delle Madonie, Palermo; vi fu veduto anche il 7 maggio 1886 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Invernale ed abbondante: ne ebbi diversi in abito isabellino (*Bonomi*).

100. Turdus Swainsoni, Cab.

TORDO DELLO SWAINSON.

Veneto : Nell'agosto 1887 ho potuto esaminare nel Museo Civico di Rovereto (Trentino), ove mi fermai appositamente per vedere quella importante raccolta illustrante l'avifauna locale, l'esemplare di questa specie citato dal Bonomi e già da me rammentato (*Avifauna Italica*, p. 101). Esso è senza alcun dubbio un esemplare di questa e non già della specie seguente; somiglia assai all'individuo del marchese Durazzo, ora nella Collezione centrale dei Vertebrati italiani a Firenze, ma mostra tinte un poco più bigie sui fianchi (*Giglioli*).

Liguria : Il prof. F. Magni-Griffi possiede nella sua raccolta a Siena, un piccolo Tordo che ebbe in carne molti anni fa a Sarzana e che preparò egli stesso; egli lo riferisce a questa specie ¹ (*Carazzi*).

101. Turdus Pallasi, Cab.

TORDO DEL PALLAS.

Turdus nanus, Salvad.

Il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 104) adoperando un nome a significato assai più vago per questa specie, non l'ammette tra quelle che capitano accidentalmente in Italia, eppure nota anche lui come questo Tordo sia stato preso tre o quattro volte in Europa. In quanto all'unico esemplare italiano io non posso che confermare quanto scrissi già in proposito (*Anif. Ital.* p. 101).

¹ Io non vidi questo Tordo interessantissimo quando visitai la raccolta del prof. Magni-Griffi.

102. Turdus viscivorus, Linn. ex Gesn.

TORDELA.

Argaión, Regaggiun, Regaiùn, Tourdeuia (*Basso-Piem.*) — Drèsa (*Berg.*) — Dressoûn (*Mil.*) — Gazáro (*Padova*) — Tordo gajér o gazher, Tordo colombin (*Feltre, Belluno*) — Tordo gazan (*Vicenza*) — Tordol, o Tordo gaion (*Ladove*) — Giadule, Sgardule (*Cividale*) — Ragon (*Ravenna*) — Gherluda (*Bol.*) — Gesso (*Vergato*) — Grivea nostrâ (*Savona*) — Tordeja (*Arenzano*) — Tordèna (*Spezia*) — Stordeola (*Lucca*) — Stordeſca (*Garf.*) — Tordo guazzaio (*Val di Chiana*) — Tordessa (*I. di Giglio*) — Tordo (*Viterbo*) — Tordene, Tordella (*Marche*) — Tordea (*Campobasso*) — Turda, Turdulicia, Chiaracurdaca (*Calab.*) — Marvizzuni (*Mess.*) — Trudu culumbinu (*Sard.*)

Piemonte: Frequente e sedentaria al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in marzo ed in maggio (*Abre*). Frequente e sedentaria nella prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*); ebbi un nido coi piccini nati da qualche giorno l'8 marzo, e due individui isabellini (*Gasca*). Comune e sedentaria nel Basso Piemonte, di dove però non poche partono al giunger dell'inverno per ritornare poi a primavera prestissimo essendo il primo uccello che costruisce il nido da noi (*Camusso*). Nell'Ossola nidifica al piano ed ai monti sin oltre i 2000 metri; emigra (*Bazetta*). È abbondante e sedentaria in Valsesia e nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara (*Guarinoni, Demori, Danisi*).

Lombardia: Comunissima in montagna nella prov. di Sondrio; di rado nell'inverno scende al piano (*Galli*). Arriva nel Comasco in ottobre e novembre, parte nel marzo (*Regazzoni, Bernasconi*). Scarsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Sedentaria e di passo nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di

Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Rara nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); sedentaria in collina nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente e sedentaria ai monti nel Cadore, Belluno (*Tissi*); comune e nidificante nel distretto di Feltre, ove fa passaggio in marzo, ottobre e novembre (*Delaito*). Comunissima nel Friuli e nidificante; in ottobre giunge in grandi masse dal settentrione (*Vallon*). Nel distretto di Cividale, ove è sedentaria, se ne vedono delle più grosse a colori più sbiaditi (*Del Torre*). Frequente e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune e nidificante nelle prov. di Ravenna e Bologna, che lascia durante l'inverno (*Bacchi della Lega*). Frequente e sedentaria nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di comparsa autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune e sedentaria nel distretto di Savona, nidifica ai monti (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove è più comune d'inverno (*Luciani*). Frequente d'inverno ed anco nidificante nel distretto di Spezia: nel gennaio 1888 fu assai abbondante (*Carazzi*).

Toscana: Sedentaria ma non abbondante, nidifica ai monti nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Sedentaria e comune nei distretti di Fauglia e Peccioli, Pisa (*Ott*, *Degli Alessandri*); scarsa in quello di Lavajano (*Papasogli*). Nella prov. di Firenze è frequente, sedentaria, e di passo in ottobre e marzo (*Lenzi*, *Turchetti*, *Gargioli*, *Ginori*, *Fontebuoni*); assai diminuita nel distretto di Empoli (*Fucini*). Comune e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Sedentaria in Val di Chiana ove è diminuita (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Barbagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Scarsa, sedentaria, e abbondante d'autunno e d'inverno nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*). Passa dalla metà di

ottobre a quella di novembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentaria in Toscana, nidifica assai presto, ho veduto i giovani ai primi del marzo 1884 (*Roster*).

Marche: Frequente ovunque e sedentaria; nidifica da febbraio a giugno (*Paolucci*).

Lazio: Sedentaria, ma scarsa nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Comune e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Scarsa, ma sedentaria e nidificante (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria, ma più frequente in autunno ed inverno nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Comune nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Scarsa, ma sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, sedentaria, erratica d'inverno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo regolare, ma in agosto ne trovai nel Nuorese e nel Fonnesse dei branchetti, onde è probabile sia anco sedentaria e nidificante nell'isola (*Bonomi*).

103. *Oreocincla varia* (Pall.)

TORDO DORATO.

Veneto: Nell'agosto 1887 visitando il Museo Civico di Rovereto, ho finalmente potuto esaminare il bellissimo individuo di questa specie, colto il 7 ottobre 1854 in Val di Sella (Valsugana) e donato dall'ottimo dott. Ambrosi. Esso è perfettamente simile all'esemplare esistente nella Collezione italiana centrale del R. Museo di Firenze (*Avif. Ital.* p. 103) colta a Poggio Scali nel Casentino (*Giglioli*).

Liguria: Di rarissima comparsa nell'autunno e nell'inverno nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana: Accidentale nel Casentino (*Beni*). Un individuo di questa specie dicesi sia stato preso nell'autunno 1885,

presso Marciana nell' isola dell' Elba; visse pochi giorni in gabbia in possesso di un tal Daddi di Portoferraio e fu gettato via dopo morto non conoscendosene il valore; debbo questa notizia al giovane ed appassionato cultore dell' Ornitologia, sig. Giacomo Damiani (*Giglioli*).

104. Oreocincla dauma (Lath.)

TORDO DORATO INDIANO.

Confermo quanto scrissi anche a proposito di questa specie (*Avif. Ital.* p. 103), e aggiungo che se manca la sicurezza assoluta intorno alla cattura in Italia dell' esemplare da me citato, non si può assolutamente escludere il dubbio. Il Salvadori (*Ucc. Ital.* p. 111) non include questa specie tra le italiane.

105. Aëdon Luscinia (Linn.) (ex Gesn.)

RUSIGNOLO.

Luscinia vera, Salvad.

Rusgneu, Arsgneu, Ursgneu, Ursgnò, Ruscigneu (*Basso-Piem.*) — Rosigneol (*Berg.*) — Rossigneu (*Mil.*) — Lusignol (*Vergato*) — Rossignèò (*Spezia*) — Rosignolo (*Pisa*) — Usignuolo (*Viterbo, Campobasso*) — Risignuolo (*Calabr.*) — Rusignolu, Risignolu (*Mess.*) — Rusignuolo (*Modica*) — Riscignolu (*Terran. Sicil.*) — Russignuolo (*Castelb.*) — Russignolo (*Sard.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo; ove nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Abbonda in tutto il Basso Piemonte: giunge alla metà d'aprile o al principio di maggio; alla fine di settembre parte; ma quando l'autunno è temperato qualche individuo rimane tutto il novembre, come ho più volte constatato (*Amusso*). Nell' Ossola

giunge in aprile, nidifica e parte in settembre (*Bazetta*). Così in Valsesia (*Guarimoni*); è scarso nel distretto di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nella prov. di Como arriva nella seconda metà di aprile e parte tra l'agosto e il settembre (*Regazzoni*, *Rosales*, *Bernasconi*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Estivo e abbondante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissimo in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Non raro e nidificante nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*); estivo e comune in quel di Bassano (*Ferrari*). Scarso e nidificante nel Cadore, Belluno, ove fa passaggio in giugno e settembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove è abbondante e passa in maggio e luglio (*Delaito*). Estivo e comunissimo nel Friuli; giunge in aprile nidifica in maggio e giugno e parte in ottobre (*Vallon*, *Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Frequente e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo in tutta la bella stagione e nidificante nelle prov. di Ravenna e Bologna; parte in settembre (*Bacchi della Lega*). Scarso, ma nidificante nel distretto di Vergato Bologna (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo e frequente nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona nelle valli boschive; giunge in aprile e parte alla fine di agosto od in settembre (*Piccone*); così pure nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Comune dai primi d'aprile ai primi di ottobre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Abbondante ai due passi, aprile-maggio e settembre, nella prov. di Lucca, ove però non molti rimangono l'estate (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Estivo e comune, abbonda durante il passo in aprile, nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott*, *Papasogli*, *Degli Alessandri*); nel gennaio 1878 o 79, ne fu ucciso uno assai magro (*Ott*);

usualmente sono partiti alla fine di settembre (*Papasogli*). Frequente da aprile ad ottobre nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Il 18 gennaio 1889 venne uccisa a Barberino di Mugello una femmina di questa specie, e la conservo nella Collezione italiana; era in buone condizioni (*Giglioli*). Comune ed estivo nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune da aprile ad ottobre nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Marri*); ove ne ebbi due il 14 ottobre 1884 (*Paolucci*). Abbondante da marzo alla metà di settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa abbondante nella seconda metà di aprile all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e comune in Toscana, se non fosse per i gatti che ne fan strage, forse alcuni svernerebbero da noi, ne uccisi uno il 21 novembre presso Firenze, e so che in Val d'Ema fu visto in dicembre (*Roster*).

Marche : Estivo e frequente, giunge in aprile-maggio e parte in settembre-ottobre (*Paolucci*).

Lazio : Estivo e comune nel distretto di Montefiascone. Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi : Estivo e frequente nel distretto di Ielsi Campobasso; giunge in aprile e parte in ottobre (*D'Amico*).

Campania : Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa alla metà di aprile ed in settembre all'isola di Capri, ove qualche coppia rimane a nidificare (*Cerio*).

Puglie : Scarso assai, non è difficile vederlo dal novembre all'aprile, e più facilmente in quest'ultimo mese (*De Romita*).

Calabrie : Estivo, ma non comune nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*). Frequente nella provincia di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Estivo e comune nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Estivo e frequente ai monti in quello di Modica, giunge in aprile e parte in settembre (*Dallafonte, Garofalo*).

Abbondante: giunge in marzo-aprile e parte in settembre-ottobre, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Comune al piano in primavera e anco nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Giunge in aprile, nidifica e parte ai primi di ottobre, specialmente abbondante nel Sassarese: ne ebbi uno albino (*Bonomi*).

106. **Aëdon Philomela**, (Bechst.)

RUSIGNOLO ORIENTALE.

Luscinia philomela, Salvad.

Liguria: Di rarissima comparsa nel Nizzardo, frammi-
sto alla specie precedente (*Gal*). Accidentale nel distretto di
Spezia e Sarzana, Genova (*Carazzi*).

107. **Erithacus Rubecula** (Linn.)

PETTIROSSO.

Petross, Pettoross, Pecétto, Pice-ross, Picciuróss, Picétt
(*Basso-Piem.*) — Martinet, Magonet, Martinen (*Nov.*) — Pi-
cial (*Berg.*) — Pettaro, Pettorosso (*Vicenza*) — Pettiross (*Ci-
ridale*) — Bet, Betúzh, Betarél, Pitarél (*Adole, Feltre*) —
Petarélo, Petrisso, Petusséto (*Padova*) — Pettróss (*Bol.*) —
Pitarán (*Rav.*) — Pittiros (*Vergato*) — Rigau (*Nizza*) — Pic-
cetto (*Arenzano*) — Picèto (*Spezia*) — Pittiroso (*Pisa, Fucec-
chio*) — Picchieri (*Sartemo*) — Pittiero (*Garf.*) — Piettirussu,
Pittirussu (*Calab.*) — Pittuzzurussu (*Modica*) — Pett' arru-
viu (*Sard.*) — Chirisi (*Logudoro*).

Piemonte: Frequente al monte in prov. di Cuneo, ove
nidifica in maggio e giugno, allevando due covate; d'in-
verno scende al piano (*Abre*). Comune e sedentario nella
prov. di Torino (*Gasca, Pezzi*); il suo passo ha luogo prin-

cialmente nei primi di ottobre, il ripasso al principio di aprile; nidifica estesamente nella provincia (*Martorelli*). Anida in copia al monte nel distretto di Voltaggio, dove è stazionario; al giunger dell'inverno, molti Pettirossi scendono al piano, dove vivono solitari nelle siepi e nelle salicaie lungo il letto dei fiumi e dei torrenti (*Camusso*). Nell'Ossola nidifica; alcuni individui emigrano, altri vi rimangono l'inverno (*Bazetta*). Nidifica in Valsesia anco due volte (*Guarini*); è abbondante e sedentario nel distretto di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comune, specialmente ai monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nella prov. di Como il passo di questa specie avviene tra la metà del settembre e quella del novembre (*Regazzoni*); non nidifica nella provincia ove passa in marzo ed aprile: sul finir del settembre a migliaia ricompare sui colli del Lario ove se ne fa strage immensa con gli archetti (*Rosales, Bernasconi*). Assai frequente durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Invernale e abbondante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Assai comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*); nidifica da poco tempo nei boschi resinosi nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente e nidificante ai monti nel Cadore, Belluno; di passaggio in marzo e settembre, raramente rimane a svernare (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissimo e sedentario nel Friuli: nidifica in maggio e giugno ai monti e scende al piano dal settembre all'aprile (*Vallon, Del Torre*). Comune nella provincia di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Arriva in aprile nelle prov. di Ravenna e Bologna e passa a nidificare sulle alte montagne; ne trovasi in luglio nidificanti sul monte Avezano, Bologna. Ritorna in ottobre ed allora in grande copia; qualcuno rimane l'inverno (*Bacchi della Lega*). Comune, nidificante, erratico d'in-

verno nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario nel Nizzardo, nidifica ai monti e diventa erratico nell'inverno (*Gal*). Così nel distretto di Savona (*Piccone*); ed in quello di Arenzano, ove giunge pure d'oltre monte a svernare (*Luciani*). Abbondante nell'inverno, nidifica ai monti nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Sedentario, nidificante ai monti e di copioso passo in ottobre ed aprile nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Invernale e abbondante alle due epoche del passo, specialmente dalla metà di settembre a tutto ottobre nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi*); nidifica in Val d'Era (*Degli Alessandri*). Frequente assai nella prov. di Firenze; qualcuno nidifica ai monti, ma i più giungono in ottobre e passano in marzo (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente e anche sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune alle epoche del passo e nell'inverno in Val di Chiana, ove qualcuno rimane pure a nidificare nei boschi folti (*Griffoli*). Sedentario ai monti, invernale e di passo in ottobre e marzo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Scarsamente sedentario e abundantissimo da ottobre a marzo nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa abbondante ai primi di marzo ed in settembre-ottobre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario e comunissimo in Toscana; quelli che hanno nidificato sui nostri monti scendono i primi al piano, quasi vanguardia alle masse immigranti che giungono dopo (*Roster*).

Marche: Frequente ovunque durante i passi in marzo-aprile e settembre-novembre; sedentario ai monti (*Paolucci*).

Lazio: Comune e anche nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Invernale all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Comunissimo in autunno, inverno e primavera, ove sono macchie fitte (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante d'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune e anche sedentario ai monti, nella provincia di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica, ove giunge in settembre e parte in marzo (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante da ottobre a marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Sedentario e frequente, nidifica ai monti e scende d'autunno al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Nidifica ai monti e scende al piano d'inverno, ovunque comune (*Bonomi*).

108. *Cyanecula Wolfi* (C. L. Brehm)

PETT' AZZURRO A MACCHIA BIANCA.

Pett' azzurro occidentale (*Aut. Ital.*) — Stomi bléu, Icét dla steila (*Basso-Piem.*) — Gorzbleu (*Nov.*) — Morat de la stela (*Berg.*) — Pett' azur (*Mil.*) — Coárossa de Svezia (*Padova*) — Coarossa foresta o della regina (*Vicenza*) — Codaròs dal petto turchin (*Feltre*) — Coarosso foresto (*Ro- vigo*) — Gorgiu bleu (*Nizza*) — Peccetto da sorchi, Pêto bleu (*Savona*) — Cuarossa da Madonna (*Arenzano*) — Cua- rossa de palüde (*Spezia*) — Pettu brù (*Mess.*) — Cuda-russa a pettu blù, Pettu-blù, Pettu-azzurru (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Scarso al monte in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in maggio e settembre (*Abre*). Nel distretto di Torino questa specie ora anticipa ora ritarda notevolmente il passo primaverile che di solito avviene tra gli ultimi del marzo e la metà dell'aprile; nella primavera del 1886 non si videro affatto; è però specie in ogni modo scarsa e localizzata (*Gasca*); l'ho trovata spesso alle due epoche del passaggio nella prov. di Torino (*Martorelli*). Rarissimo in quel di Voltaggio, Alessandria, e soltanto in primavera (*Camusso*). In Ossola compare accidentalmente nel maggio

(*Bazetta*). Da taluni si asserisce che questa specie nidifichi in Valsesia (*Guarironi*).

Lombardia : Non molto comune nella prov. di Sondrio ove vive al piano; nella seconda metà dell'agosto e nei primi del settembre passano i maschi, alla fine del settembre le femmine (*Galli*). Assai raro nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Raro, di doppio passaggio, nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Scarso nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto : Da qualche anno è assai più raro che non era in passato nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso, di passaggio in marzo nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Scarso nel Friuli, ove non ho avuto che giovani alla fine di agosto ed in settembre (*Vallon*); assai raro (*Del Torre*). Poco frequente in collina nella prov. di Padova; il 26 gennaio 1888, due individui di questa specie vennero colti nei canneti di Piove di Sacco (*Arrigoni*). Rarissimo nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Di scarso passaggio in marzo, aprile e prima metà di ottobre, nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di doppio passaggio nel Nizzardo, è assai abbondante in quello primaverile (*Gal*). Di passaggio scarso in primavera e più scarso in autunno nel distretto di Savona; dalle mie osservazioni risulta che i maschi passano prima delle femmine; tutti i maschi presi in primavera lo furono nel marzo, le femmine in aprile. Nella seconda metà di marzo 1883 il passo fu relativamente abbondante ed io ebbi 12 maschi da Albissola e 6 da Savona, nessuna femmina; ho notato che queste sono sempre più scarse dei maschi. Nell'autunno pochi se ne vedono; ebbi una sola femmina, il 7 ottobre 1881 (*Piccone*). Raro in aprile nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Poco frequente in primavera in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Frequente di passo nella seconda metà di marzo ed in aprile, nella prov. di Lucca; ripassa in settembre (*Martorelli*, *Gragnani*). Accidentale o scarso di passaggio

in aprile nella prov. di Firenze (*Lenzi, Fontebuoni*); passa anche in settembre-ottobre (*Giglioli*); nel distretto di Sesto fiorentino si crede che questo sia un abito primaverile del Codirosso comune (*Fontebuoni*). Raro assai nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Scarso in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Raramente si vede intorno alle acque semi-termali e presso le gore dei molini d'inverno nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Raro nel Senese, ove l'ebbi in aprile ed ottobre (*Dei*). Specie non scarsa in Toscana al piano alle due epoche del passo (*Roster*).

Marche: Raro (*Paolucci*).

Campania: Di scarso ed irregolare passaggio in aprile nell'isola di Capri (*Cerio*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Ruggeri*); di passo in marzo-aprile ed in settembre (*Pistone*). Raro, di passo in aprile e settembre nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Avventizio, ebbi soltanto una femmina (*Bonomi*).

109. *Cyanecula suecica* (Linn.)

PETT' AZZURRO A MACCHIA ROSSA.

Pett' azzurro orientale (*Aut. Ital.*) -- Gorgiu bleu (*Nizza*) — Cuarossa da Madonna (*Arenzano*).

Piemonte: Ho spesso trovato anche questa specie alle due epoche del passo nella prov. di Torino (*Martorelli*).

Lombardia: Raro assai (*Turati*).

Veneto: Di dubbiosa comparsa nella prov. di Padova: mi venne riferito che il 2 aprile 1886 fu preso nelle vicinanze della città un Pett' azzurro a macchia rossigna, non so altro (*Arrigoni*).

Liguria: Non tanto raro nel Nizzardo, specialmente durante il passo primaverile (*Gal.*). Raro in aprile nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Assai

più scarso della specie precedente, e sempre in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Vidi anche questa specie alle epoche del passo in aprile e settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli*).

110. *Calliope camtschatkensis* (J. F. Gmel.)

CALLIOPE.

Calliope (*Aut. Ital.*).

Il 15 dicembre 1886, il conte Ettore Arrigoni degli Oddi, benemerito e appassionato cultore della scienza ornitologica, ebbe un maschio di questa splendida specie; lo trovò sul mercato di Padova infilzato in un vimine con pochi Pettiorossi; era stato ucciso col fucile da un contadino lungo una siepe di Triacanto la mattina medesima a Montecchia sui colli Euganei. Il Salvadori ne fa menzione nell'appendice al suo recente *Elenco degli Uccelli italiani* (p. 303). Ed il conte Arrigoni ne ha dato conto in una memoria che ha per titolo « *Notizie sopra un Uccello nuovo per l'Avifauna Italica* » colla data del febbraio 1887 (*Bull. Soc. Veneto-Trentina Sc. Nat.* IV. fasc. 1).

Questo è il primo caso autentico della cattura di un esemplare della *Calliope* in Italia; va però rammentato come il Savi (*Orn. Ital.* I, p. 410) affermasse che questa specie giungeva « fino in Italia, » basandosi erroneamente sopra una notizia data da Barthélemy-Lapommeraye e contraddicendo una sua asserzione sulla pagina precedente. La *Calliope* è abbondante nell'Asia orientale e centrale; giunge agli Urali e non sarebbe scarsa sul versante orientale di quei monti, ma ben di rado è stata incontrata anco nelle provincie orientali della Russia europea, e nell'Europa occidentale sembra essere stata presa due sole volte, in Francia: la prima nel dipartimento del Varo, dunque ai confini d'Italia, in agosto del 1829 (Gerbe, *Rev. Zool.* 1854, p. 10), quell'esemplare si conserva nel Museo di Draguignan; il

secondo venne colto presso Draguignan nell'aprile 1835, ed è quello citato da Jaubert e Barthélemy-Lapommeraye; si conserva nel Museo di Marsiglia, ove lo vidi nel 1882: entrambi erano maschi.

L'unico esemplare italico è stato gentilmente ceduto alla Collezione italiana centrale nel R. Museo Zoologico di Firenze dal conte E. Arrigoni degli Oddi. Esso è in buonissimo stato, il color roseo splendido della gola è mescolato di bianco, e vi sono tracce di macchie apicali chiare sulle penne alari, onde sono d'avviso che non sia un individuo perfettamente adulto.

111. *Nemura cyanura*, (Pall.)

COD'AZZURRO.

Ianthia cyanura, Salvad.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA riguardo a questa specie accidentalissima per noi.

112. *Ruticilla Phoenicurus* (Linn.)

CODIROSSO.

Culross, Couvaroussa, Cuarossa, Cuarossétta (*Basso-Piem.*) — Cuarossa cita, Farciola d'montagna (*Nov.*) — Morat (*Berg.*) — Coaroussa (*Mil.*) — Squerussolo (*Veron.*) — Codarós, Coaros (*Feltre*) — Squarússola (*Padova*) — Codirossola (*Vergato*) — Cuarussetta (*Arenzano*) — Cua russa (*Spezia*) — Codirossa (*Pisa*) — Curoso (*Lucca*) — Codirossino (*Fiesole*) — Codirossolo (*Casentino*) — Codorosso (*Viterbo*) — Codarussiello (*Nap.*) — Zéllécchia (*Capri*) — Curidda russa (*Modica*).

Piemonte : Frequente al monte in prov. di Cuneo; nidifica una sola volta, in maggio (*Abre*). Scarsa nel distretto di Torino (*Gasca*); piuttosto comune nella prov. di Torino

(*Martorelli*). Annida al monte, ma non in gran copia; è piuttosto abbondante nel Basso Piemonte nella migrazione autunnale, che protrae fino ad autunno avanzato (*Camusso*). Comune nell'Ossola, ove nidifica di preferenza ai monti sino ai 1200 metri; emigra, ma alcuni individui rimangono durante l'inverno (*Bazetta*). Abbondante e sedentario (?) nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Comunissimo ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passaggio nella prov. di Como dal principio di settembre al principio di ottobre (*Regazzoni, Bernasconi*); vi passa anche nel marzo quando si reca ai monti ove nidifica (*Rosales*). Frequentissimo durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio più o meno abbondante nella prima metà di aprile e in settembre (*Magretti*). Estivo e comune, nidifica in abbondanza al piano nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : A proposito della migrazione di questa specie ho notato nel Trentino che essa viaggia di notte specialmente durante il plenilunio; ne trovai più volte incappati nelle reti prima dell'alba (*A. Bonomi*). Comunissimo nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarso, nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari*); di passaggio e nidificante in quel di Bassano (*Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno, vi fa passaggio in aprile e settembre (*Tissi*): abbonda, ma non nidifica nel distretto di Feltre, ove passa in aprile, agosto e settembre (*Delaito*). Estivo e comune assai nel Friuli; giunge alla fine di marzo e parte in ottobre (*Vallon, Del Torre*). Più comune al colle che al piano nella prov. di Padova (*Arrigoni*). I due passi di questa specie nel Veneto sono molto brevi e ponno essere indicati nei limiti 25 aprile-5 maggio, e 25 settembre-3 ottobre (*Ninni*). Scarso nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissimo nelle prov. di Ravenna e di Bologna per tutta la bella stagione; nidifica per lo più nei muri antichi e cadenti (*Bacchi della Lega*); così nel distretto

di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Estivo nel Nizzardo, più abbondante durante il passo autunnale (*Gal*). Comune di passaggio nel distretto di Savona, cioè dal marzo al maggio ed in settembre ed ottobre (*Piccone*). Comune in marzo ed aprile, raro in autunno in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente nel distretto di Spezia, i primi giungono alla fine di marzo (*Carazzi*).

Toscana : Comune di doppio passo, giunge in marzo e forse nidifica ai monti nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune alle due epoche del passo nel distretto di Fauglia, Pisa, ove nel gennaio 1880 ne uccisi uno dopo una nevicata (*Ott*); scarso in collina nel passo autunnale nei distretti di Lavajano e Peccioli (*Papasogli, Venerosi*). Nella prov. di Firenze pochi rimangono a nidificare ai colli; è frequente di passo in marzo-aprile ed in agosto-settembre-ottobre (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente in maggio e settembre e anche nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune di passo in marzo e settembre; raro d'inverno in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo e frequente nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Marri*); l'ebbi anche in ottobre (*Paolucci*). Ora più, ora meno abbondante in marzo-aprile e settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*); qualche coppia rimane l'estate e nidifica sul M. Amiata ed alla Montagnola senese (*Dei*). Passa in maggio, abbondante all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e assai comune ai monti in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune ovunque, passa in marzo-aprile ed in settembre-ottobre (*Paolucci*).

Lazio : Comune in marzo-aprile ed in ottobre-novembre nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania : Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa all'isola di Capri dalla fine di marzo a quella di maggio, ed in settembre (*Cerio*).

Puglie : Abbondanti i giovani al principio dell'autunno, scarsi gli adulti nell'aprile; due volte ebbi i giovani nel luglio (*De Romita*).

Calabrie : Comune al passo primaverile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Scarso estivo e nidificante, e di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Assai scarso ai monti in primavera nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Di doppio passo, poco frequente ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune di doppio passo; qualche coppia rimane a nidificare (*Bonomi*).

113. *Ruticilla titys* (Scop.) (ex Linn.)

CODIROSSO SPAZZACAMMINO.

Couvaroussa, Bonciard, Piroulet, Fourneron, Cuarossa, Cuarossétta (*Basso-Piem.*) — Magnan, Fornarö (*Nov.*) — Morat carbuner (*Berg.*) — Coarossa mora, Spazzacamin (*Vicenza*) — Codarós negro, Codarós de montagna (*Feltre*) — Codaross spazzacamin (*Cadore*) — Codirossola di monte (*Ver-gato*) — Ciapusso (*Arenzano*) — Currosso (*Lucca*) — Codirosso (*Val di Chiana*) — Codarussiello (*Nap.*) — Cuda di focu pettu-niru, Cuda russu cinirusa (*Mess.*) — Curidda russa (*Modica*).

Piemonte : Scarso al monte in prov. di Cuneo; vi nidifica una sola volta in maggio (*Abre*). Raro in quella di Torino (*Gasca*); lo trovai nidificante sulle Alpi in buon numero (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte nidifica sui monti, è più comune però durante il passo autunnale; qualche individuo vi rimane a svernare (*Camusso*). Comune nell'Ossola, nidifica sui monti sin oltre i 2000 metri; pochi rimangono l'inverno (*Bazetta*). In Valsesia fa due covate fra l'aprile ed il luglio (*Guarinoni*); è abbondante e sedentario nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Comune specialmente sui monti dirupati nella prov. di Sondrio, ma scende anche al piano (*Galli*). Di passaggio nel Comasco in settembre e ottobre (*Rosales*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Raro, capita in autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune ai monti in Lombardia (*Turati*); scarso (*Borromeo*).

Veneto : Non raro sul Monte Baldo, ove è stazionario (*Pellegrini*). Nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e nidificante ai monti nel Cadore, Belluno, vi passa poi in marzo e novembre (*Tissi*); comune ai monti nel distretto di Feltre, non vi nidifica e passa in aprile ed agosto (*Delaito*). Non comune ed invernale, al piano almeno, nel Friuli (*Vallon*); nidifica ai monti ed è sedentario (*Del Torre*). Abbastanza frequente ai colli nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Poco frequente nel distretto di Vergato (Bologna); nidifica in alto, in autunno scende e rimane per qualche tempo nella regione delle Quercie, quindi cala al piano (*Lorenzini*). Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Nel Nizzardo si vede specialmente in autunno (*Gal*). Sedentario nel distretto di Savona, nidifica ai monti e scende col freddo al piano (*Piccone*); così in quello di Arenzano ove è comune (*Luciani*). Poco frequente nel distretto di Spezia; in un maschio coll'abito femminile avuto il 21 marzo 1887, i testicoli erano completamente sviluppati (*Carazzi*).

Toscana : Avuto in autunno (*Martorelli*); sedentario nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Nella prov. di Firenze non è raro e certamente sedentario ai monti; ne ho avuti e veduti molti e non comprendo come questa specie sia sfuggita agli osservatori (*Giglioli*). Non comune, vedesi in maggio e settembre, ma nidifica pure nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*). Più scarso della precedente in Val di Chiana, alle epoche del passo; raro d'inverno (*Griffoli*). Scarso in autunno nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Raro nel Senese (*Dei*). Non raro di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario ai monti, ma scarso in Toscana, scende al piano l'inverno cogli immigranti (*Roster*).

Marche : Raro (*Paolucci*).

Campania : Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa dai primi di marzo alla fine di maggio, ed in ottobre all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Non raro, più frequenti i giovani in autunno e nell'inverno (*De Romita*).

Sicilia : Non comune e sedentario ai monti nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, giunge in ottobre e parte in marzo nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Raro ai monti in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Scarso, ma di passo annuale (*Bonomi*).

114. **Pratincola Rubicola** (Linn. ex Charlet.)

SALTINPALO.

Cassalasou (*Alba*) — Simacusti, Simabuschi, Puntireu (*Basso-Piem.*) — Moreû, Moreûl, Scimareûl (*Ossola*) — Osel dei sas, Sasserö (*Nov.*) — Macheti de montagna (*Berg.*) — Picett (*Como*) — Machett (*Mil.*) — Pizzamei (*Lombardia*) — Zhimal, Zhimalét (*Feltre*) — Armentarutt, Porçhiarùte, Grisùtt, Grisùte (*Friuli*) — Occ e d'bo (*Rav. Bol.*) — Simmacusti (*Savona*) — Simacousti (*Arenzano*) — Fricialase (*Spezia*) — Scrocchetto, Frust'asino, Saltasecce, Spuntacalocchie (*Pisa*) — Saltampalo (*Lucca, Fucecchio*) — Saltanvette, Scrocchino (*Empoli*) — Salimpunta (*Fiesole*) — Saltimpunta (*Sarteano*) — Montagnino (*Garf.*) — Saltanselce (*S. Gimignano*) — Scoterzolo (*I. di Giglio*) — Saltabastoni (*Viterbo*) — Sputamaruggiu (*Modica*) — Trozzu (*Terran. Sicil.*) — Punta de canna (*Sard.*).

Piemonte : Frequente ovunque in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). Vedesi anche nei più rigidi inverni nei dintorni di Torino; è specie frequente e sedentaria in provincia (*Gasca, Martorelli*). Comunissimo nel Basso Piemonte, abbonda più in monta-

gna che al piano; al giunger dell'inverno molti individui emigrano, molti altri fermansi però a svernare (*Camusso*). Nell'Ossola preferisce i monti alti, vi nidifica e pochi rimangono l'inverno (*Bazetta*). Nidifica una sola volta in Valsesia (*Guarinoni*); è abbondante e sedentario nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Non molto comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Abbondante nel Comasco in agosto e settembre (*Rosales*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Sedentaria e più comune d'estate nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Frequente nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante ed erratico in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune e nidificante nel Cadore, Belluno, ove è di passaggio in marzo e novembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa in aprile ed agosto (*Delaito*). Comune e sedentario nel Friuli, nidifica in aprile ed in giugno (*Valton, Del Torre*). Comunissimo e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nelle prov. di Ravenna e Bologna non è comune, passa in aprile e va ai monti ove nidifica, ripassa in settembre (*Bacchi della Lega*). Poco frequente, ma nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passo regolare in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona nidifica nelle valli boschive e scende al litorale col freddo (*Piccone*); comune e sedentario in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente; qualcuno sverna, nidifica assai presto e ovunque nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario nella prov. di Lucca, ove è una delle prime specie a covare (*Martorelli, Fonteboni, Graquani*). Sedentario e comunissimo nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessan-*

dri). Frequente e sedentario nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Comune e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). E nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); e ancora in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Sedentario e comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa abbondante nella seconda metà di aprile all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario in Toscana, fa anche tre covate (*Roster*).

Marche: Sedentario e comunissimo; nidifica da aprile a luglio (*Paolucci*).

Lazio: Comune e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa all'isola di Capri dalla fine di febbraio a tutto maggio, ed in settembre (*Cerio*).

Puglie: Frequente nell'autunno, inverno e primavera (*De Romita*).

Calabrie: Comune dovunque e sedentario nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Frequente, sedentario e di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Comunissimo e sedentario nel distretto di Terranova, Caltanissetta; vi nidifica ai monti (*Carvana*). Comune e sedentario in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e nidificante, abita specialmente lungo il litorale (*Bonomi*).

115. Pratincola Rubetra (Linn. ex Briss.)

STIACCINO.

Simacusti, Simabuschi, Puntireu (*Basso-Piem.*) — Moreû, Moreûl, Scimareûl (*Ossola*) — Osel dei sas, Sasserö (*Nov.*) — Machet (*Berg.*) — Grisùtt (*Friuli*) — Favaréto, Ba-

tiále foresto (*Padova*) — Asta (*Ravenna*) — Pitèr (*Bol.*) — Simmacusti de primaveja (*Savona*) — Simacousti (*Arenzano*) — Fricialase (*Spezia*) — Siicè (*Garf.*) — Schiaccino (*Fucecchio*) — Salimpunta di poggio (*Fiesole*) — Saltimpalo (*Val di Chiana*) — Tomio, Tuina, Piagnucolone (*Sarteano*) — Miettempònta d'està (*Nap.*) — Cannicciàru (*Reggio Calabr.*) — Proscunculu (*Mess.*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Prettamente estivo, nessuno rimanendo a svernare, nel Basso Piemonte (*Camusso*). Nell'Ossola è meno comune della specie precedente (*Bazetta*). Nidifica in Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia: Comunissimo sui maggenghi ed in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Scarso, di doppio passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune ai monti nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non raro nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarso in quella di Vicenza (*Molari*). Frequente al piano e nidificante nel distretto di Belluno, ove passa in aprile, agosto ed ottobre (*Soravia*). Piuttosto scarso ed estivo nel Friuli; giunge in aprile, nidifica in giugno e parte in ottobre (*Vallon*); così pure nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nelle prov. di Ravenna e Bologna passa in primavera e ripassa in autunno, gli ultimi alla fine di ottobre (*Bacchi della Lega*). Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio regolare nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona durante i passi, cioè dal marzo al maggio e dalla metà di settembre a tutto ottobre (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove rimane pure per nidificare (*Luciani*). Frequente ed estivo nel distretto di Spezia, ove giunge in aprile e maggio (*Carazzi*).

Toscana: Specialmente di passo in aprile e settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Assai più comune all'epoca del passo in agosto al piano che in collina nei distretti di Fauglia e Lari (*Ott, Papasogli*). È scarso nella prov. di Firenze, giunge in marzo e parte in settembre (*Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*). Frequente, estivo e nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Di passo in marzo e settembre in Val di Chiana; qualcuno rimane l'estate; specie meno frequente della precedente (*Griffoli*). Comune da marzo a settembre nel distretto di Sarteano, Siena (*Barbagli*). Poco comune in aprile e da settembre a novembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Passa abbondante nella seconda metà di aprile ed in settembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*). Nidifica molto probabilmente sui monti di Urbino, Pesaro (*Carpegna*).

Campania: Scarso nelle prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa dalla fine di febbraio a tutto maggio ed in settembre all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Scarso, si vede in autunno, ma più facilmente in aprile (*De Romita*).

Calabrie: Non comune, ma nidificante nel distretto di Maida, Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune, nidificante e di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Raro al piano; uno lo donò al Museo di Sassari il prof. Martorelli, un altro lo diedi io a quello di Cagliari (*Bonomi*).

SYLVIIDÆ

(*Silvie*).

116. *Sylvia nisoria*, (Bechst.)

BIGIA PADOVANA.

Buscarin, Beccafigo, Fenugliá, Ciarletta, Ciarlettua (*Basso-Piem.*) — Ciccjarina (*Cremon.*) — Padvana (*Mantov.*) — Biancheton, Becafigo (*Verona*) — Rosignolo bastardo (*Rovigo*).

Piemonte: Specie rara e localizzata nella prov. di Torino; per quante e scrupolose ricerche io abbia fatte nel distretto, non mi venne dato di rinvenire questa specie che in una sola località, cioè nei Boschi delle Cascinette lungo la Stura, in luogo alquanto arido e cosparso di cespugli di Robinie, di prunbianco, di ontano e di poche piante di alto fusto. Rivenni due nidi di questa specie nel giugno, uno in un macchione di ontano, e l'altro in un macchione di prunbianco. Inidiacei moriron tutti per malattia alle gambe, quando già incominciavano a mangiar da sè (*Gasca*). È rara assai; incontrasi nel Basso Piemonte solo nel tempo delle migrazioni, più di primavera che d'autunno; non vi nidifica (*Camusso*).

Lombardia: Estiva, assai comune e nidificante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Rara, presa a Castelgoffredo nella prov. di Mantova (*Paglia*).

Veneto: Piuttosto abbondante nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Piuttosto scarsa nella prov. di Vicenza (*Molari*). Estiva e non rara nel Friuli; giunge in maggio. nidifica in maggio e giugno e parte in ottobre; vive così nascosta, che è più facile trovare il nido che vedere gli adulti (*Vallon*); scarsa nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Frequente, specialmente nei luoghi aquitrinosi nella prov.

di Padova (*Arrigoni*). Comune e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Scarsa, ma nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di rara comparsa, specialmente in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Assai rara nel distretto di Spezia, Genova; il prof. Magni-Griffi ne ebbe una nel maggio 1861 (*Carazzi*).

Marche : Scarsa (*Comizio agrario Fabriano*).

117. *Sylvia orphæa*, Temm.

BIGIA GROSSA.

Capneir d'mountagna o gross, Moretta, Beccafigh, Ciccibeu (*Basso-Piem.*) — Beccafig zenerin, Moneghella (*Lomb.*) — Bianchett (*Valt.*) — Beccafigon (*Vicenza*) — Caonero foresto (*Padova*) — Moratulòn (*Friuli*) — Bouscarlassa (*Nizza*) — Favâ, Giugo (*Arenzano*) — Bartinon (*Bol.*) — Bigione (*Lucca*) — Sepajola (*Casentino*) — Beccafico (*Val di Chiana*) — Beccaficone (*Sen.*) — Schieccià listata (*Reggio Calabr.*).

Piemonte : Scarsa al monte in prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta, nel maggio (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*). Nel Basso Piemonte arriva a primavera inoltrata, annida più abbondantemente al piano che al monte, e parte nel settembre, nessun individuo incontrandosi dopo quel tempo (*Camusso*).

Lombardia : Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Avventizia in quella di Cremona (*Ferragni*). Non comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comune in collina nella Lombardia (*Turati*); scarsa (*Borromeo*).

Veneto : Scarsa nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente al piano, ove nidifica, nel Cadore, Belluno; di passo in aprile ed agosto (*Tissi*). Piuttosto rara ed estiva nel Friuli; giunge ai primi di maggio, nidifica in giugno od alla fine di maggio e parte in settembre (*Vallon*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Scarsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Estiva e comune nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona: giunge dai primi di aprile alla metà di maggio, nidifica nelle valli boschive e parte dalla metà di agosto a tutto settembre (*Piccone*). Comune in aprile e maggio ed anche estiva e nidificante nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Non molto frequente da maggio a settembre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Estiva e assai comune nella prov. di Lucca, giunge in aprile e cova anche nel giugno (*Martorelli, Gragnani*). Frequente ed estiva nella prov. di Firenze (*Turchetti, Gargioli, Ginori*). Non comune nel Casentino. Arezzo (*Beni*). Rara in aprile in Val di Chiana, ove non nidifica (*Griffoli*). Estiva, ma non comune nel Senese (*Dei*). Estiva ed abbondante in Toscana, specialmente nei dintorni di Firenze e nel Mugello, ne ebbi da questa località anco in ottobre inoltrato (*Roster*).

Marche : Scarsa (*Comizio agrario Fabriano*). Nidifica certamente nel distretto di Carpegna, Urbino (*Carpegna*).

Puglie : Rara, so di sole due catture in aprile (*De Romita*).

Sicilia : Estiva, ma scarsa nella prov. di Messina (*Pistone*).

118. *Sylvia cinerea*, Bechst. (ex Briss.)

STERPAZZOLA.

Sylvia rufa, Salvad.

Tartavela (*Alba*) — Buscarin, Senrîna, Ciarlettua, Beccafigo (*Basso-Piem.*) — Bisbai (*Como*) — Fourmenten (*Cremona*) — Becafich bastard (*Mantov.*) — Sartagnola (*Lomb.*) — Bianchet da bosch (*Adore*) — Biancheta (*Padova*) — Bonclassiera (*Nizza*) — Canéto (*Savona*) — Ciarlettua, Ciarletta (*Arenzano*) — Pissa mue (*Spezia*) — Sterpagnola, Beccafichino (*Pisa*) — Beccafico (*Fiesole*) — Passera siepajola (*Sarteano*)

— Beccalico passerino (*Sen.*) — Cicerina, Cecerina (*Val di Chiavari*) — Gricciaiola (*L. di Giglio*) — Capoceciola (*Viterbo*) — Fucètola cannavale (*Napoli*). — Schieccià (*Regg. Calabr.*) — Biccafigu (*Sard.*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Nel Basso Piemonte è comune in tutta la pianura, rara al monte; annida ed emigra dopo l'agosto (*Camusso*).

Lombardia: Non comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nella prov. di Como giunge ai primi dell'aprile e parte nella seconda metà dell'ottobre (*Regazzoni*); vi nidifica ed è di passo non copioso in settembre (*Rosales, Bernasconi*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Estiva e comunissima nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Poco comune in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissima nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Assai comune in autunno nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente, nidificante e di passo in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Estiva e comunissima nel Friuli; arriva in aprile, nidifica dal maggio al luglio e parte in ottobre (*Vallon, Del Torre*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa, ma nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estiva, ma più abbondante durante il passaggio autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove giunge in aprile, nidifica e parte in settembre o ai primi di ottobre (*Piccone*). Comune in aprile e maggio in quello di Arenzano, ove è anche estiva (*Luciani*). Frequente da aprile ad ottobre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comunissima tra aprile ed ottobre nella

prov. di Lucca, nidificante specialmente ai monti (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Estiva e comune nei distretti di Fauglia e Peccioli, Pisa (*Ott, Degli Alessandri*). Estiva e frequente nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Estiva, ma non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Comune assai in aprile in Val di Chiana, ove pochi rimangono l'estate (*Griffoli*). Frequente dall'aprile al luglio nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Abbondante da aprile e settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*). Sedentaria e nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e comunissima in Toscana, alleva due covate usando lo stesso nido (*Roster*).

Marche: Comune al piano, passa in aprile-maggio e settembre-ottobre (*Paolucci*).

Lazio: Comune e nidificante nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Estiva e nidificante, passa in copia alla fine d'agosto e in settembre, si rivede nell'aprile (*De Romita*).

Sicilia: Comune, ma non frequente, e sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, sedentaria, ma specialmente estiva nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente e nidificante ai monti in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Non tanto comune, ma nidificante; scende al piano in settembre (*Bonomi*).

119. *Sylvia Curruca* (Linn.) (ex Gesn.)

BIGIARELLA.

Canivarola, Canavirola, Buscarin (*Basso-Piem.*) — Becamure (*Berg.*) — Becafich (*Mantov.*) — Beccafig zenerin (*Lomb.*) — Canevela rossa, Beccafigo zelega (*Vicenza*) — Chacarùte (*Friuli*) — Canéto (*Ven.*) — Bouscarla (*Nizza*) —

Bigione piccola (*Fiesole*) — Spuntascèbi, Monachedda, Beccaficu (*Terran. Sicil.*) — Biccafigu (*Sard.*).

Piemonte: Scarsa in prov. di Cuneo, ove è di passaggio nella seconda metà del settembre (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*); piuttosto abbondante (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte giunge verso l'aprile, annida, ed emigra al principio dell'autunno; allora è piuttosto comune al monte (*Camusso*). Abbondante di passo autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Non comune, vive in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Avventizia nell'autunno in quella di Cremona (*Ferragni*). Frequente nella prov. di Mantova (*Paglia*). Rara nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente, nidificante e di passaggio in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Piuttosto rara nel Friuli; giunge in aprile, nidifica in maggio e parte in ottobre (*Vallon, Del Torre*). Scarsa nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria: Estiva e più specialmente autunnale nel Nizardo (*Gal*). Piuttosto rara nel distretto di Savona, vi è forse estiva; ne ebbi soltanto tre in settembre (*Piccone*). Scarsa da maggio a settembre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Di doppio passo, ma scarsa nella prov. di Lucca, ove non la trovai nidificante (*Martorelli*); forse nidifica nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Scarsa, ma estiva e nidificante nel distretto di Fiesole, Firenze (*Gargioli*). Scarsa in Val di Chiana (*Griffoli*). Assai rara nel Senese, ne ebbi un solo nell'agosto 1857 da Radi (*Dei*). Estiva, ma assai scarsa in Toscana, ne ebbi soltanto tre individui, due dal Mugello, uno dai pressi di Firenze (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Sicilia: Non comune, passa in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Estiva e scarsa nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Accidentale affatto (*Bonomi*).

120. *Sylvia subalpina*, Bonelli in Temm.

STERPAZZOLINA.

Buscarin, Ciarlettunn-a (*Basso-Piem.*) — Rosseto (*Padova*) — Mujà (*Arenzano*) — Beccafichino, Beccafico piccolo (*Fiesole*) — Sepajola (*Casentino*) — Gricciaiola (*I. di Giglio*) — Caca-sipala (*Mess.*) — Spuntascebi, Pappamuschi (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Nel Basso Piemonte è piuttosto rara; anida al monte ed emigra verso la fine di settembre (*Camusso*).

Lombardia: Di comparsa dubbiosa nella prov. di Cremona (*Ferragni*).

Veneto: Scarsa, ma nidificante al piano nel Bellunese, passa in aprile ed ottobre (*Soravia*). Rarissima nella prov. di Padova; conosco due individui che vi furono presi: uno colto a Marendole Monselice, il 4 ottobre 1883, è un maschio e trovasi nella mia Collezione; l'altro, pure maschio, venne preso vicino a Padova nel 1884 e si conserva nel Museo universitario (*Arrigoni*).

Liguria: Sedentaria e abbastanza frequente nel Nizardo (*Gal*). Comune in aprile e maggio ed anche estiva e nidificante nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarsa da maggio a settembre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Osservata di solo passo in settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli*); comune e sedentaria nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Nella prov. di Firenze è sedentaria; scarsa nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); frequente in quello di Fiesole (*Gargioli*). Non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune da maggio ad ottobre

nel Senese (*Dei*); sedentaria in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Sedentaria e nidificante all' isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Rara (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Estiva e nidificante, frequente di passo in aprile (*De Romita*).

Sicilia: Comune e sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Estiva nel distretto di Terranova, Caltanissetta, giunge in marzo e parte in ottobre (*Carvana*). Rara in aprile in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Giunge in settembre e parte in primavera (*Bonomi*).

121. *Sylvia conspicillata*, La Marm.

STERPAZZOLA SARDÀ.

Ciarlettua, Giaretta (*Savona*) — Acidduzzu di fava (*Mess.*) — Auciduzzu di macchia, Occhijanchi (*Terran. Sicil.*).

Liguria: Piuttosto scarsa nel distretto di Savona, vi è forse sedentaria; io la vedo tutti gli anni nel settembre (*Piccone*). Assai scarsa in primavera nel distretto di Spezia, ove ne ebbe alcuni il prof. F. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana: Specie estiva, nidificante, ma assai scarsa (*Roster*).

Sicilia: Comune, sedentaria e di passo in aprile-maggio, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Abbondante e apparentemente estiva nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Giunge in agosto e rimane l'inverno; è pure sedentaria e nidificante ai monti; all'epoca del passo abbonda al litorale, ove non si trova nel giugno e luglio. Ne ebbi uno affetto da isabellismo, che mandai al R. Museo di Firenze (*Bonomi*).

122. *Sylvia nana* (Hempr. e Ehrenb.)

STERPAZZOLA DEL DESERTO.

Sterpazzola nana (Aut. Ital.).

Mercè la cortesia dell' egregio signore Odoardo Ferragni di Cremona, sono in grado di poter aggiungere alcune notizie intorno alla cattura dell' esemplare di questa interessantissima specie, e di rettificare un errore in proposito in cui ero incorso. La unica *Sylvia nana* presa sinora in Italia ed in Europa, venne « colta ai confini della provincia Cremonese dal conte Calini sui primi del novembre 1883, alle reti aperte; tenuta in gabbia qualche giorno e, morta, fu donata allo studente Italo Celli che me la inviò..... » Cito appunto quanto mi ha scritto in proposito il signor Ferragni, in data del 28 aprile 1886.

123. *Monachus Atricapillus* (Linn. ex Gesn.)

CAPINERA.

Sylvia atricapilla, Salvad.

Capinéir, Testa neigra, Capinera (Basso-Piem.) — Capneigro (Nov.) — Caponigher (Bergamo) — Capinero (Veron.) — Chepnegar (Ravenna) — Chepnéigher (Bol.) — Bouscarla testa roussa, la fem. (Nizza) — Testanegra (Spezia) — Capibigia, la fem. (Pisa) — Sepajola (Casentino) — Beccafico (Valdich.) — Gricciaiola (I. di Giglio) — Caponera (Viterbo) — Capanèra, Focètola capa-nèra (Nap.) — Capinera, Testanigra (Calabr.) — Testa nira (Mess.) — Testa nivireda (Modica) — Munachedda testa-niura (Terrac. Sicil.) — Testa-niura (Castell.) — Capinera, Conca niedda (Sard.).

Piemonte: Frequente e sedentaria al piano in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio ed in giugno (Abbr.). Così in quella di Torino (Gasca, Pozzi, Martorelli). Nel Basso

Piemonte giunge coll' aprile, annida e scompare nel settembre (*Camusso*). Nell' Ossola giunge in aprile, nidifica e poi emigra (*Bazetta*). Nidifica una sola volta in Valsesia (*Guarionni*): è scarsa, ma nidificante nel distretto di Crodo (*Demori*); erratica in quello di Piedimulera, Novara (*Danisi*).

Lombardia : Comune in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Estiva e nidificante nel Comasco, ove passa in abbondanza nel settembre (*Rosales*). Frequente ovunque nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Comune ed estiva nella prov. di Cremona (*Ferragù*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comune assai nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borrromeo*).

Veneto : Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari*); sedentaria in collina nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Scarsa, nidificante e di passaggio in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*), Comunissima nel Friuli, ove è forse sedentaria; in caso diverso vedesi già nel marzo; nidifica in aprile (*Vallon*). Nel distretto di Cividale, Friuli, è divenuta rara (*Del Torre*). Nella prov. di Padova è comune nell' estate, ma alcuni rimangono nell' inverno giacchè ne ebbi nel novembre 1878 e 1882, nel dicembre 1880 e 1886 e nel gennaio e febbraio 1885 (*Arrigoni*). Comune e nidificante nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissima, estiva e nidificante nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Frequente e nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Non rara e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Sedentaria e frequente nel Nizzardo (*Gal*). Comune e sedentaria nel distretto di Savona (*Piccome*); così in quello di Arenzano, ove è più abbondante durante il passo autunnale (*Luciani*). Frequente, specialmente nel marzo, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comunissima e sedentaria, abbonda più in collina nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Sedentaria e comune ovunque nei distretti di Fauglia e Lari,

Pisa (*Ott, Papasogli*). Sedentaria e frequente nella prov. di Firenze, ove è anco di passo in marzo-aprile ed ottobre (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Foutebuoni*). Frequente e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). E anche nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comunissima e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa in maggio all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentaria e comunissima in Toscana, fa tre covate, ma non sempre (*Roster*).

Marche: Comune ovunque (*Paolucci*).

Lazio: Abbastanza frequente e sedentaria nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sedentaria e nidificante all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Comune d'autunno e nell'inverno (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria, ma non comune nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune e sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*). Scarsa; giunge in settembre e parte in aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Non abbondante in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Non rara, giunge in aprile e parte in ottobre; poche coppie però nidificano nel distretto delle Madonie. Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e nidificante, abbonda nel Sassarese, specialmente ai monti (*Bonomi*).

124. *Monachus hortensis* (Bechst. ex J. F. Gmel.)

BECCAFICO.

Sylvia salicaria Salvad.

Canavirola, Beccafico, Buscarin (*Basso-Piem.*) — Pizzafighi (*Ossola*) — Becafic (*Berg.*) — Figarola, Becafico (*Veron.*) — Bartinon (*Ravenna*) — Beccafighi (*Bol.*) — Pittafico

(*Savona*) — Becafigo (*Spezia*) — Beccafico reale, Beccaficone (*Pisa*) — Beccafico reale (*Fiesole*) — Gricciaiola (*I. di Giglio*) — Focètola (*Nap.*) — Flabbettedda, Fravetta (*Calab.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). Scarso in quella di Torino (*Gasca*). Arriva nel Basso Piemonte qualche giorno innanzi la specie precedente e si sparge per tutta la regione boscosa del piano e del monte; parte al principio di autunno, nessun individuo fermandosi a svernare (*Camusso*). Nell'Ossola giunge in aprile, nidifica ed emigra; molti passano nel settembre (*Bazetta*). Così nel Novarese (*Rodino*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Estivo e non comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Raro, nidificante e di passaggio in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Non comune nel Friuli, ove giunge in aprile e parte ai primi del settembre (*Vallon, Del Torre*). Comunissimo, specialmente in collina nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nelle prov. di Ravenna e Bologna passa in primavera, ritorna in agosto e settembre e si trattiene per i filari fin verso l'ottobre, diventando grasso come una palla di burro. Si prende in quantità nella Romagna, nei roccoli, ove accorre al sentire il canto dei Fringuelli ciechi (*Bacchi della Lega*). Poco abbondante, ma nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo nel Nizzardo, abbondante nel passo autunnale (*Gal*). Comune nel distretto di Savona: giunge in aprile, nidifica e parte dalla metà di agosto a tutto settem-

bre (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Nel distretto di Spezia giunge alla fine d'aprile, al dire del professore Magni-Griffi vi nidifica; è più abbondante nell'autunno (*Carazzi*).

Toscana: Abbondante di passo alla fine di agosto ed in settembre; mai veduto in primavera nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comunissimo in agosto e settembre nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi*). Frequente, estivo e nidificante e di passo in aprile ed agosto-settembre, nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Fontebuoni*); seppi dal signor G. Pucci che questa specie ha nidificato alle falde del M. Morello in Comune di Sesto fiorentino nel giugno 1888; i nidiaci volati allora fuor dal nido furono presi il 1 luglio (*Giglioli*). Non comune nel Casentino, Arezzo, giunge in aprile e parte in settembre (*Beni, Fiorini, Paueri*). Comunissimo in settembre-ottobre, raro d'inverno in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Di passo regolare in settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Assai comune in Toscana all'epoca del passo; non vidi mai il nido, ma fui assicurato che nidifica non di rado in Mugello (*Roster*).

Marche: Frequente ovunque (*Paolucci*).

Lazio: Estivo e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e nidificante nel distretto di Ielsi, Campobasso; passa in maggio ed in settembre (*D'Amico*).

Campania: Comune ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Piuttosto comune nell'autunno (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante in settembre ed ottobre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Estivo e comune in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune in agosto-settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Estivo e frequente in quello di Modica, giunge in aprile e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*).

Passa in aprile ed in maggiore abbondanza in settembre nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Non comune, di passo irregolare: ne ebbi in primavera ed in agosto (*Bonomi*).

125. *Pyrophthalma melanocephala* (J. F. Gmel.)
(ex Cetti)

OCCHIO-ROSSO.

Sylvia melanocephala, Salvad.

Ciacia (*Nizza*) — Oxelo da sexi (*Arenzano*) — Cecca (*Pisa*) — Ceciora (*Lucca*) — Bigia (*Sarteano*) — Gricciaiola (*I. di Giglio*) — Capinera (*Garf.*) — Testa nera d'inverno (*Marche*) — Cicchitedda, Caca-sipala cu l'occhi russi (*Mess.*) — Occhiddi russi (*Modica*) — Munachedda, Spuntascebi, Occhipisciati (*Terran. Sicil.*) — Ogu de boi (*Sard.*).

Piemonte: Rarissimo nel Basso Piemonte (*Camusso*).

Lombardia: Raro nella prov. di Sondrio, ove vive in pianura (*Galli*).

Veneto: Rarissimo nella prov. di Padova; un individuo che è nella mia Collezione venne preso nell'agosto 1884, nei pressi della città; è un maschio (*Arrigoni*).

Emilia: Non so che di una femmina colta nel Parmense il 2 aprile 1888 (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario e specialmente invernale nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona (*Piccone*); comune e sedentario in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso, di passo regolare; qualcuno nidifica e qualcuno sverna nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e nidificante, ma scarso dopo il settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Sedentario e comune ovunque nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Nella prov. di Firenze è sedentario; frequente specialmente in ottobre nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti, Giglioli*). Sedentario, ma non frequente in Val di

Chiana (*Griffoli*). Vedesi dal gennaio al marzo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); è sedentario in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentario nella prov. di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario e comune in Toscana; nidifica abbondantemente nei nostri boschi, fa una sola covata, i giovani appena impennati lasciano i genitori che rimangono appaiati anco d'inverno (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Puglie: Invernale e abbondante (*De Romita*).

Sicilia: Scarso, ma sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Sedentario, ma scarso al piano nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante e sedentario in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvina*). Frequente e nidificante ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Sedentario e comunissimo (*Bonomi*).

126. *Melizophilus undatus* (Bodd.)

MAGNANINA.

Ciaccia (*Nizza*) — Mujâ (*Arenzano*) — Carcassico (*Spezia*) — Sterpazzola (*Lucca*) — ? Occhiorosso (*Val di Chiana*) — Occhiorossi (*Senese, Grosseto*) — Codetta (*Tosc.*) — Gricciaiola (*I. di Giglio*) — Strupparella di monte (*Ancona*) — Caca-sipala russo (*Mess.*) — Spuntascebi russo (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Rara nel Basso Piemonte, ove però opino che possa talvolta nidificare (*Camusso*).

Lombardia: Da me uccisa il 24 dicembre 1877 all'Isolone in faccia a Belvedere, prov. di Pavia (*Pavesi*).

Veneto: Rarissima nella prov. di Padova, ebbi un solo esemplare, maschio, colto a Marendole, Monselice, il 14 ottobre 1884 (*Arrigoni*).

Liguria: Sedentaria e abbastanza frequente alle due

epoche del passo nel Nizzardo (*Gal*). Scarsa e localizzata, ma sedentaria nel distretto di Savona (*Piccone*); così in in quello di Arenzano, ove è comune (*Luciani*). Scarsa, ma sedentaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Assai frequente nella buona stagione nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); sedentaria nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Non rara e sedentaria nella prov. di Firenze, distretti di Sesto fiorentino e Signa (*Fontebuoni*). Rara nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Sedentaria e comune nei boschi in Val di Chiana (*Griffoli*). Avuta in marzo nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Sedentaria e comune, ma più abbondante d'inverno nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*). Sedentaria sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentaria in Toscana; nidifica nei boschi e rimane tutto l'anno ove ha nidificato (*Roster*).

Marche: Scarsa ai monti (*Paolucci*).

Puglie: Molto rara; non so che di due sole catture (*De Romita*).

Sicilia: Frequente nella prov. di Messina (*Pistone*). Sedentaria e nidificante nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Comune e sedentaria, soltanto nell'inverno scende al piano (*Bonomi*).

127. *Melizophilus sardus* (La Marm.)

MAGNANINA SARDA.

Caca-sipala nira (*Mess.*) — Spuntascebi niuru (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Eccezionalmente rara nel territorio di Voltaggio, Alessandria (*Camusso*).

Liguria: Un terzo individuo è stato colto nella Riviera di ponente, prov. di Genova, a Borzoli presso Sestri-ponente; lo ebbe il marchese Giacomo Doria (*Giglioli*). Ra-

rissima nel distretto di Spezia, ne ebbe una presa alla Marinella presso Sarzana nel maggio 1860, il prof. F. Magni-Griffi, e la conserva nella sua raccolta (*Carazzi*).

Sicilia: Non abbondante, ma sedentaria e di passo in marzo-aprile e settembre-ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Sedentaria e frequente nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Comune e sedentaria, specialmente ai monti (*Bonomi*).

128. *Agrobates galactodes* (Temm.)

RUSIGNOLO AFRICANO.

Aedon galactodes, Salvad.

Rusignolo d'Africa (*Aut. Ital.*).

Veneto: Sul finire del 1886, ebbi in dono dal signor Angelo Senna un individuo maschio di questa specie, che venne catturato nel Veneto colle reti circa il maggio 1882, e fu tenuto per qualche tempo in gabbia. Il Senna lo acquistò già preparato in Milano, alla fiera detta di Sant'Ambrogio, e non poté sapere in quale località del Veneto era stato preso. Figura ora nella Collezione Centrale dei Vertebrati italiani N. 2829 Cat. degli Uccelli (*Giglioli*).

Liguria: Nel giugno 1887, venne preso un maschio bellissimo nei pressi di Nizza; si conserva in quel Museo Civico (*Gal*). Accidentale nel distretto di Spezia e Sarzana, una sola cattura nota (*Carazzi*).

129. *Agrobates familiaris* (Ménétr.)

RUSIGNOLO LEVANTINO.

Aedon familiaris, Salvad.

Non è per me ammissibile il dubbio che esprime il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 144) intorno alla provenienza degli

esemplari di questa specie, che ho ricevuto dal Nizzardo e che sono nella Collezione centrale italiana a Firenze (*Avif. Ital.* p. 126); e ne fui giustamente meravigliato.

Veneto : Nel settembre 1886 una femmina di questa specie venne colta nelle reti nei pressi di Udine, ed il signor Vallon lo acquistò vivente su quel mercato il 10 di detto mese. Egli tosto mi avvertiva di così interessante cattura, per me doppiamente interessante, giacchè un mese prima circa avevo ricevuto dal signor A. Senna di Milano l'individuo della specie precedente, citato sopra, e che era stato similmente colto alle reti nel Veneto. Anche il signor Vallon volle generosamente cedere il suo esemplare alla Collezione centrale degli Animali vertebrati italiani, ove porta nel Cat. degli Uccelli il numero 2924 (*Giglioli*).

Liguria : Piuttosto raro nel Nizzardo, ove capita nell'autunno e nell'inverno (*Gal*). Accidentale nel distretto di Spezia e Sarzana, Genova; una sola cattura nota (*Carazzi*).

130. *Phylloscopus superciliosus* (J. F. Gmel.) (ex Lath.)

LUI FORESTIERO.

Proregolo (*Aut. Ital.*).

In questi giorni mercè la cortesia dell'amico conte senatore G. B. Camozzi Vertova, ho potuto esaminare l'esemplare di questa specie, che fa parte della sua collezione alla Ranica presso Bergamo, e di cui feci cenno un anno fa (*Avif. Ital.* p. 130, nota). Non solo ho potuto convincermi che è un individuo maschio adulto in abito autunnale del *Phylloscopus superciliosus*, ma, grazie alle notizie fornitemi dall'ottimo conte Camozzi, ho potuto porre in sodo che è proprio l'esemplare menzionato dal Lanfossi, e basta vederlo per essere convinti che è stato preparato dal fresco e non da una pelle. Fu preso in una prateria non molto lungi da Milano il 27 settembre 1847, non già ai primi di ottobre, come scrisse il Lanfossi; il conte Camozzi lo ebbe

in carne ed in buono stato e lo fece preparare da Luigi Bonomi; lo stesso giorno egli inviò al compianto prof. Filippo de' Filippi un disegno dell'uccello ed una dettagliata descrizione.

Dopo ciò non rimane più alcun dubbio che il *Phylloscopus superciliosus*, che ebbe tra non pochi altri pure il nome di *Regulus modestus*, deve aggiungersi alle specie che sono capitate accidentalmente in Italia. Credo che l'individuo citato sia finora l'unico noto per cattura nella regione Italica, giacchè mancano notizie precise sull'esemplare rammentato dal Carrara, che sarebbe stato trovato dal barone Feldegg a Sinj in Dalmazia; anzi a proposito di questo uccello, descritto benissimo dal Temminck (*Man. d'Orn.*, IV, p. 618), debbo far notare che la figura data dal Gould del suo *Regulus modestus*, specie appunto fondata sull'esemplare suddetto, rappresenta l'affine, ma ben distinto *P. proregulus* (Pall.) V. Gould, *Birds Europe*, II, p. 149, specie che sinora non venne registrata dall'Europa. Il Salvadori ci ha detto come gli uccelli riferiti dal Perini a questa specie, molto comune nel Veronese al dire di quell'Autore, non erano altro che individui piccini del *Phylloscopus rufus*.

Del resto il *P. superciliosus*, che è abbondante in tutta l'Asia, nidificando a settentrione e svernando a mezzogiorno; è stato colto ben *trentadue* volte in Europa (esclusa la Russia) principalmente in Germania, ventisei individui almeno essendo stati presi nell'isola di Helgoland, il vero *rendez-vous* in Europa delle specie erratiche d'uccelli, ove il Gätke nel suo giornale ornitologico tra il 4 ottobre 1846 ed il 26 ottobre 1876 ha registrato 59 esemplari del *P. superciliosus*; anzi egli dichiara che quasi ogni anno dalla fine di settembre ai primi di novembre se ne vedono in quella piccola isola. Non sarebbe strano dunque che questo grazioso uccelletto si facesse vedere ancora nel paese nostro.

131. *Phylloscopus sibilator* Bechst.

LUI VERDE.

Touiou (*Alba*) — Cincia verd, Buscarin verd, Sisi, Boén, Ciarlettuin (*Basso-Piem.*) — Zuit-Zuit, Ciuit verdogn (*Nov.*) — Tui verd (*Berg.*) — Ciui (*Vicenza*) — Zaléte (*Padova*) — Çiu-çiau (*Friuli*) — Zhuit, Ciuit (*Cadore, Feltre*) — Lui, Caneto (*Rovigo*) — Boin de primaveja (*Savona*) — Boen (*Arenzano*) — Lui, Boain (*Spezia*) — Lui (*Pisa*) — Chiuino verde (*Lucca*) — Gualanèlla (*Nap.*) — Virdeddu, Virdidduni (*Mess.*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta, nel maggio (*Abre*). Poco frequente in quella di Torino (*Gasca*). Abbastanza comune nel Basso Piemonte dal principio di primavera ad autunno, dopo la quale stagione emigra (*Camusso*). Nell'Ossola giunge in aprile, nidifica e nell'autunno parte (*Bazetta*). Piuttosto frequente e nidificante in Valsesia e nel distretto di Crodo, Novara; fa una sola covata tra maggio e giugno (*Guarionni, Demori*).

Lombardia: Comune ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Comune di doppio passaggio e molto probabilmente nidificante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Scarso nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comunissimo nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passaggio in quella di Vicenza (*Molari*). Frequente, nidificante e di passaggio in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però si vede in marzo (*Delaito*). Abbastanza comune nel Friuli; giunge in aprile, nidifica ai monti e ridiscende in copia al piano in settembre ed ottobre per emigrare (*Valton*); nel distretto di Cividale nidifica nei saliceti lungo il

Iudrio (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Frequente alle due epoche del passo nel Niz-zardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, giunge in aprile, nidifica nelle valli boschive e parte dalla metà di agosto a quella di settembre (*Piccone*). Comune di passo in primavera nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Estivo e frequente nel distretto di Spezia, giunge in aprile e parte in settembre (*Carazzi*).

Toscana : Specialmente abbondante in agosto e settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa giunge in aprile e sembra essere nidificante (*Grag-nani*). Numeroso assai durante il passo primaverile soltanto, da marzo a metà aprile nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Frequente di doppio passo, estivo e nidificante nella prov. di Firenze (*Gargioli, Fontebuoni*); scarso nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*). Non comune di passo in aprile e settembre, ma anco nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Comunissimo di passo in aprile in Val di Chiana (*Grif-foli*). Giunge in ottobre e novembre e si trattiene sino all'aprile nella prov. di Grosseto (*Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Frequente, estivo e nidificante in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune al piano (*Paolucci*).

Campania : Frequente; passa nella seconda quindicina di aprile ed in quella di agosto nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Di scarso passaggio in agosto e ai primi di settembre (*De Romita*).

Calabrie : Abbondante in aprile e settembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Comune e anche sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente al piano in primavera nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

132. *Phylloscopus Trochilus* (Linn.) (ex Barr.)

LUI GIALLO.

Touiou (*Alba*) — Buscarin, Tuì, Lui, Boén, Sisi, Ciucin
giaun (*Basso-Piem.*) — Tuit, Ciuit giaun, Zuit (*Nov.*) — Tuì
zald (*Berg.*) — Ciui (*Vicenza*) — Fuin (*Bassano*) — Tuio,
Ocio de Bô (*Cadore*) — Zalète, Zalèto, Becafigo (*Padova*) —
Lui, Caneto (*Rovigo*) — Vardén (*Rav.*) — Reatin (*Bol.*) —
Boin (*Savona*) — Boain, Lui (*Spezia*) — Chiuina (*Garf.*) —
Luicchio, Lucherino (*Pisa*) — Chiuino giallo (*Lucca*) — Ciui
(*Marche*) — Uocchie de voje (*Nap.*) — Perciaruvetti (*Mess.*)
— Sperciaruvettu (*Lentini*).

Piemonte : Frequente ovunque in prov. di Cuneo; vi nidifica una volta, nel maggio (*Abre*). Poco frequente in quella di Torino (*Gasca*); vi nidifica (*Pezzi*). Comune nel Basso Piemonte in ambedue le passate: credo ponga il nido al monte, ma non mi risulta per osservazione diretta (*Canusso*). Nell' Ossola giunge in aprile, nidifica e poi emigra (*Bazetta*). Più abbondante della specie precedente e nidificante nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così ovunque in quella di Bergamo (*Stefanini*). Ed in quella di Milano (*Brambilla*). Raro, di passaggio soltanto nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Comune al piano ed in collina nella Lombardia in generale (*Turati*); scarso, ma nidificante (*Borromeo*).

Veneto: Nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); comune ai monti nel distretto di Bassano, ove nidifica (*Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno, ove è sedentario (*Tissi*). Abbondante nel Friuli; giunge in aprile, nidifica ai monti e parte in ottobre (*Valton*); nel distretto di Cividale nidifica sui salici (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Trovasi soltanto alle epoche del passo nelle provincie di Ravenna e Bologna, specialmente in agosto e settembre (*Bacchi della Lega*). Abbastanza frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Frequente in primavera e più ancora nell'autunno nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona si vede in marzo e nel settembre; è dubbioso se vi nidifichi (*Picccone*). Comune di passo in primavera nel distretto di Arenzano, giunge prima della specie precedente (*Luciani*). Estivo e frequente nel distretto di Spezia, più della specie precedente: giunge in aprile e parte in settembre (*Carazzi*).

Toscana: Frequente in ogni stagione,¹ in certi anni nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); giunge in aprile e nidifica nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Comune ovunque dalla metà di settembre al marzo, ¹ nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Generalmente comune alle due epoche del passo e nidificante ai monti nella prov. di Firenze (*Gargioli, Fontebuoni*); scarso nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*). Frequente di passo in aprile e settembre e nidificante nel Casentino Arezzo (*Beni, Pauer*). Di passo nell'aprile in Val di Chiana; meno comune della specie precedente (*Griffoli*). Giunge in aprile e parte in settembre nella prov. di Grosseto (*Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e nidificante in Toscana, ma meno frequente della specie precedente (*Roster*).

Marche : Scarso (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Sedentario e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Scarso, si vede soltanto in agosto (*De Romita*).

Sicilia : Comune di passo in marzo-aprile e settembre-ottobre e anche nidificante nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*¹).

Sardegna : Raro assai (*Bonomi*).

¹ Ciò si riferisce fors' anche al *P. rufus*.

133. Phylloscopus Bonellii (Vieill.)

LUÌ BIANCO.

Cincin bianch, Luì, Buscarin, Boenetto, Tui, Sisi (*Basso-Piem.*) — Tui bianc (*Berg.*) — Dalin (*Bell.*) — Tuio (*Cadore*) — Uitt, Ciu-ciàu (*Cividale*) — Boin gianco (*Savona*) — Boen gianco (*Arenzano*) — Chiuno bianco (*Lucca*) — Virdeddu jancu, 'Mmucca-muschi jancu (*Mess.*).

Piemonte : Scarso in provincia di Cuneo; vi nidifica una sola volta nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). È il più raro dei Luì nel Basso Piemonte; si rinviene soltanto in montagna nelle epoche delle migrazioni, ma per pochi giorni (*Camusso*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Bergamo al monte ed al piano (*Stefanini*). Estivo, ma non comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in collina nella Lombardia, ove nidifica (*Turati*); scarso (*Borromeo*).

Veneto : Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente, nidificante e di passaggio in aprile e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Non raro, estivo e nidificante nel distretto di Cividale, Friuli (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Raro assai nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Non tanto frequente nel Nizzardo, ove si vede più facilmente nell'autunno (*Gal*). Abbastanza comune nel distretto di Savona, giunge in aprile e sino alla metà di maggio nidifica nelle valli boschive e parte dalla metà di agosto alla metà di settembre (*Piccone*). Comune in agosto, raro in primavera nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarsissimo, ma estivo e nidificante nel distretto di Spezia (*Carrazzi*).

Toscana : Scarso in agosto e settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*). Piuttosto frequente, estivo e nidificante nei distretti di Fiesole e Signa, Firenze (*Gar-*

giolli, Fontebuoni : raro di passo soltanto in quello di Fucecchio (*Turchetti*). Non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Estivo e non comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Specie estiva e nidificante in Toscana, non rara nei dintorni di Firenze ed in Mugello; nel 1885 potei osservare una coppia nidificante sopra un alto albero lungo l'Ema, il nido era pronto alla fine d'aprile, i piccoli ne uscirono dopo 24 o 25 giorni, erano quattro; ne presi uno ma non fu possibile conservarlo; nel luglio scomparvero. Il fischio è diverso da quello delle specie affini, più esile e ripetuto varie volte (*Roster*).

Sicilia : Scarso, di passo in aprile-maggio e in minor numero in settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna : Non comune, ne trovai nel Sassarese lungo i fiumi, anche nel Cagliaritano; non so se rimane a nidificare (*Bonomi*).

134. *Phylloscopus rufus* (Bechst.)

Lui.

Phylloscopus collybista, Salvad.

Touiou (*Alba*) — Ciucin peit, Buscarin, Boenetto, Sisi, Lui. Tuì (*Basso-Piem.*) — Tuit-Tuit, Zuit, C'uit (*Nov.*) — Tuì (*Berg.*) — Zaléto (*Padova*) — Vardén d'invéran (*Rav.*) — Lui, Caneto (*Rovigo*) — Boin (*Savona*) — Boenetto (*Arenzano*) — Lui, Boain (*Spezia*) — Chiuiuo (*Lucca*) — Virdeddu, 'Mmucca-muschi (*Mess.*) — Beccamuschi, Riiddu, Zivineddu (*Terran. Sicil.*) — Beccaficu di cerza (*Modica*) — Papa muschitu (*Sard.*).

Piemonte : Frequente ovunque in prov. di Cuneo: vi nidifica due volte, in maggio ed in luglio (*Abre*). Poco frequente in quella di Torino (*Gasca*). Qualche volta annida ai più elevati monti del distretto di Valtaggio; giunge ad aprile e parte ad autunno. qualche raro individuo rimanendo

fino alle prime nevi; è sconosciuto al piano (*Camusso*). Non raro nel Novarese (*Rodino*).

Lombardia : Comunissimo ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Invernale e fors' anche sedentario nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Turati*).

Veneto : Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Piuttosto scarso nel Friuli ed apparentemente estivo ai monti; non ne trovai il nido (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Nelle prov. di Ravenna e di Bologna vedesi alle epoche del passo, ma rimane sino al novembre (*Bacchi della Lega*). Frequente più delle altre specie congeneri nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Abbondante specialmente in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Numeroso nell'estate ai monti, ove nidifica nel distretto di Savona; scende al litorale col freddo ed allora molti giungono dal settentrione (*Piccone*). Comune ed invernale nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Frequente e sedentario in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune e sedentario ai monti nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Scarso in ottobre e novembre nel distretto di Lari, Pisa (*Papasogli*). Sedentario nella prov. di Firenze, ma abbonda più nell'inverno (*Turchetti, Gargioli*). Non comune, ma nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*); vi è sedentario (*Fiorini*). Sedentario in Val di Chiana, ma più abbondante alle epoche del passo, specialmente in primavera (*Griffoli*). Sedentario nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Invernale e comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*); anche sedentario nel distretto di Gavorrano (*Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune in Toscana, specialmente nell'ottobre (*Roster*).

Marche : Scarso ed erratico (*Paolucci*).

Puglie : Abbonda tutto l'inverno, giunge in ottobre e parte coll'aprile (*De Romita*).

Sicilia: Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente nel distretto di Modica, Siracusa, giunge in agosto e parte in aprile (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante dall'ottobre a marzo nel distretto di Terzano, Caltanissetta (*Carvana*). Raro al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune nell'inverno e di passo regolare, ma anco sedentario e nidificante (*Bonomi*).

135. *Hypolais icterina* (Vieill.)

CANAPINO MAGGIORE.

Canepino maggiore (*Aut. Ital.*) — Ciaucin, Ciucin (*Basso-Piem.*) — Tuinot (*Bergamo*) — Canevarola (*Padova, Rovigo*) — Beccafigo, Papefig (*Friuli*) — Beccafico selvatico, Beccafico cannajolo (*Lucca*) — Beccafico giallo (*Fiesole*) — Lui, Beccafico (*Casentino*) — Volanàro (*Nap.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica in maggio ed in giugno, allevando due covate (*Abre*). Scarso nel distretto di Crodo, Novara, ove nidifica (*Demori*).

Lombardia: Scarso al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Di passaggio e non comune in quella di Cremona (*Ferragni*). Poco comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comune nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Non è comune nel Friuli; giunge in aprile, nidifica anche in luglio e parte in settembre (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo e abbondante al passo autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto scarso nel distretto di Savona, si

vede in aprile e a tutta la metà di maggio (*Piccone*): così in quello di Arenzano, ove è comune (*Luciani*). Estivo e poco frequente nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune dall'aprile alla fine di settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Estivo e frequente nel distretto di Fiesole, Firenze (*Gargioli*). Estivo e non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Estivo in Val di Chiana (*Griffoli*). Arriva in maggio e parte in settembre nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

Marche: Comune al piano, nidifica in giugno e luglio (*Paolucci*).

Campania: Frequente, passa nella prima metà di aprile ed in quella di settembre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di scarso passo alla fine d'agosto e ai primi di settembre (*De Romita*).

Sicilia: Scarso, di passo in agosto-settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Lo trovai scarso nel Sassarese (*Bonomi*).

136. *Hypolais polyglotta* (Vieill)

CANAPINO.

Canepino (*Aut. Ital.*) — Buscarin verd, Ciarletta, Ciarlettua (*Basso-Piem.*) — Canevarola, Zaléto (*Palova*) — Canevarola (*Rovigo*) — Canevaról (*Feltre*) — Uitt (*Friuli*) — Canvarén (*Ravenna*) — Canvaról (*Bol.*) — Ciarlettua (*Gen.*) — Beccafico giallino (*Pisa*) — Beccafico selvatico, Beccafico cannajolo (*Lucca*) — Beccafico giallo (*Fiesole*) — Lui, Beccafico (*Casentino*) — Beccamoro (*Sen.*) — Gialletto (*Marche*) — Volanàro (*Nap.*) — Facedua gialletta (*Bari*).

Piemonte: Localizzato, ma nidificante in prov. di Torino (*Gasca*). Comune assai nel Basso Piemonte; giunge nell'aprile e parte alla fine d'estate (*Camusso*).

Lombardia : Non comune; vive al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Estivo, ma non abbondante in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Frequente e nidificante nel distretto di Feltre, Belluno; giunge in marzo e parte o passa in agosto (*De-laïto*). Comune nel Friuli; giunge in aprile, nidifica in maggio e giugno e parte in ottobre (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Nidificante, ma scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Nelle prov. di Ravenna e Bologna passa nei canepai la bella stagione, emigra in autunno (*Bacchi della Lega*). Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Estivo e di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto scarso nel distretto di Savona, ove si vede solo in primavera, aprile e prima metà di maggio (*Piccone*); estivo e comune in agosto nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarso ed estivo in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Più abbondante della precedente, dall'aprile a tutto settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune dalla metà di marzo alla metà di ottobre nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Estivo e comune nei distretti di Fiesole e Signa, Firenze (*Gargioli, Fontebuoni*). Comune ed estivo nel Casentino, Arezzo (*Pauer*). Estivo in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Comune da marzo a settembre nel Senese (*Dei*). Non raro in Toscana nell'aprile e maggio, credo che poche coppie rimangono a nidificare (*Roster*).

Marche : Scarso (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie : Ne ebbi un solo nell'agosto 1873 (*De Romita*).

137. *Hypolais olivetorum* (Strickl. in Gould)

CANAPINO LEVANTINO.

Canepino (*Aut. Ital.*)

Liguria : Il prof. F. Magni-Griffi riferisce a questa

specie un Canapino preso a Sarzana nel 1862, e che egli conserva nella sua raccolta a Siena¹ (*Carazzi*).

Puglie: Un solo individuo, catturato il 3 maggio 1885 (*De Romita*).

138. Hypolais pallida (Hempr. e Ehrenb.)

CANAPINO CHIARO ELLENICO. •

Canepino pallido (*Aut. Ital.*).

Lombardia: Raro assai (*Turati*).

Liguria: Accidentale nel distretto di Spezia e Sarzana (*Avif. Ital.* p. 133), due soli individui vi furono presi sinora (*Carazzi*).

139. Hypolais opaca (Licht. in Cab.)

CANAPINO CHIARO IBERICO.

Canapino opaco (*Aut. Ital.*).

Liguria: Di accidentale comparsa nel Nizzardo (*Gal.*).

140. Acrocephalus palustris (Bechst.)

CANNAIOLA VERDOGNOLA.

Ransigneul dle cane peit (*Cuneo*) — Ciocheta (*Berg.*).

Piemonte: Scarsa al piano nella prov. di Cuneo, ove nidifica ai primi del giugno, allevando una sola covata (*Abre*). Così in quella di Torino, ove nidifica alla fine di maggio (*Gasca*).

Lombardia: Scarsa al piano nella prov. di Bergamo,

¹ Io non ho veduto questo uccello interessante quando visitai la raccolta del prof. Magni-Griffi circa quattro anni fa.

ove nidifica (*Stefanini*). Estiva e nidificante, ma scarsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune al piano ed in collina nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarsa, ma nidificante al piano nel Bellunese, ove passa in aprile e settembre; nidifica nei canneti in maggio, allevando una sola covata (*Soravia*). Estiva e piuttosto comune, nei luoghi adatti, nel Friuli; giunge in aprile e nidifica in giugno (*Vallon*). Assai rara, anzi di dubbiosa comparsa nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Non rara nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estiva e non tanto comune nel Nizzardo (*Gal*). Rara in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Sardegna: Di scarso passaggio, ne predai allo stagno di Sorso nel Sassarese (*Bonomi*).

141. *Acrocephalus streperus* (Vieill.)

CANNAIOLA.

Païarzin (*Basso-Piem.*) — Canaròla, Canéto (*Padova*) — Canevarola (*Rovigo*) — Roussignouloun (*Nizza*) — Canajolino (*Lucca*) — Sparacannelle (*Fucecchio*) — Becaficu di margiu (*Mess.*).

Piemonte: Scarsa in prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*); vi nidifica (*Pezzi*). Rara assai nel Basso Piemonte e affatto estiva; giunge sul principio di primavera e lungo i fiumi al piano annida, parte all'ottobre (*Camusso*).

Lombardia: Comune; vive al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Estiva e rara in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarsa nella prov. di Vicenza (*Molari*). Piuttosto rara nel Friuli; arriva in aprile, nidifica in giugno e parte in settembre (*Vallon*). Comune nei luoghi palustri nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Frequente e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non rara e nidificante nella prov. di Parma; ebbero il nido con uova il 27 maggio e ancora nella prima metà di luglio (*Del Prato*).

Liguria: Estiva nel Nizzardo, più abbondante durante il passo autunnale (*Gal*). Di solo passo nel distretto di Savona, poco numerosa in primavera, scarsa in autunno (ottobre); ne ebbero però una il 7 agosto 1877 (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è comune in aprile e maggio, e nell'agosto (*Luciani*). Scarsissima ed estiva nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Giunge in aprile ed è comune nell'estate ed al principio d'autunno, e allora frequenta le saggine, nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Rara in collina, frequente al piano nel distretto di Fauglia, Pisa, durante il passo in marzo ed aprile (*Ott*). Estiva e scarsa al piano nei distretti di Fucecchio e Sesto fiorentino, Firenze, (*Turchetti*, *Fontebuoni*). Estiva e comune ai laghi in Val di Chiana (*Griffoli*). Estiva, ma non comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*).

Marche: Rara (*Comizio agrario Fabriano*).

Sicilia: Rara al piano nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*).

142. *Acrocephalus arundinaceus* (Linn. ex Briss.)

CANNARECCIONE.

Re di Ransigneui, Rusgneu gross, Ruscigneu foesté (*Basso-Piem.*) — Palugàna, Frarétta, Canevarolón (*Padova*) — Beccafigo de palù, Canaról (*Feltre*) — Passara palugana (*Rovigo*) — Roussigneu aigaglié (*Nizza*) — Calandra, Ruscigneu cannajeu, Ruscigneu lombardon (*Gen.*) — Caneroncione (*Pisa*) — Cannajola (*Lucca*) — Cannajola grossa (*Fucecchio*) — Focetolone d'acqua, Ruscignuolo d'acqua (*Nap.*) — Rusignolu di margiu, Rusignuluni (*Mess.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, nidifica una sola volta nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino

(*Gasca*); è facile trovarlo in luoghi palustri presso il Po e suoi affluenti (*Martorelli*). Di casuale comparsa nel Basso Piemonte (*Camusso*).

Lombardia: Comune in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Estivo e comunissimo in quella di Cremona (*Ferragnì*). Così nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comune nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Piuttosto scarso nella prov. di Vicenza (*Molarni*). Frequente e nidificante al piano nel distretto di Feltre, Belluno, ove passa in aprile ed agosto (*Delaito*). Comune al piano nel Friuli: giunge in aprile, nidifica in maggio e giugno e parte in settembre (*Vallon*). Assai comune nei luoghi palustri nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nidificante ed estivo nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo nel Nizzardo, più frequente durante il passo autunnale (*Gal*). Nel distretto di Savona non è abbondante, giunge in aprile e ripassa dalla metà di agosto a tutto ottobre (*Piccone*). Comune in aprile e maggio e nell'agosto in quello di Arenzano (*Luciani*). Estivo e meno scarso della precedente, specialmente in primavera, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune dai primi d'aprile ai primi di ottobre nella prov. di Lucca; alle epoche del passo accade trovarlo anche lungi dai paduli (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Assai comune al passo in aprile al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Estivo e frequente al piano nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*): scarso in quello di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Comune assai in primavera e nell'estate ai laghi in Val di Chiana (*Griffoli*). Piuttosto raro nel Senese (*Dei*); estivo in Maremma (*Ademollo*).

Marche: Raro (*Paolucci*).

Campania: Frequente di passo in settembre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di doppio passaggio, ma scarso (*De Romita*).

Sicilia: Scarso nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*).

Scarso nel distretto di Modica, Siracusa, giunge in aprile, parte in settembre (*Dellafonte Garofalo*).

Sardegna: Di scarso passaggio, ne presi allo stagno di Sorso nel Sassarese (*Bonomi*).

143. *Calamodus schoenobænus* (Linn.)

FORAPAGLIE.

Paizarzin, Fenuggiá (*Basso-Piem.*) — Risen (*Cremona*) — Paiarolin (*Mantov.*) — Palughin (*Feltre*) — Risarólo, Canéto (*Padova*) — Canebuon (*Nizza*) — Quaggiu (*Arenzano*) — Boain (*Spezia*) — Calcapaglione (*Lucca*).

Piemonte: Scarso, ma nidificante in prov. di Torino (*Gasca*); in padule lo uccisi spesso dall'aprile al settembre (*Martorelli*). In provincia di Alessandria lungo il Po ed il Tanaro tra i canneti e le alte erbe palustri annida; al monte capita di rado nel passo autunnale (*Camusso*).

Lombardia: Estivo e di passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Giunge in aprile e parte in ottobre nella prov. di Mantova (*Paglia*). Raro nella Lombardia (*Turati*); nidificante e frequente al piano (*Borromeo*).

Veneto: Frequente e nidificante al piano nel distretto di Feltre, Belluno; giunge in aprile e parte o passa in agosto (*Delaito*). Non comune nel Friuli; l'ebbi a Codroipo l'8 luglio 1884 ed ancora il 22 ottobre 1884 (*Vallon*). Comune nei luoghi aquitrinosi nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Comune nelle risaie nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo e frequente nel Nizzardo, specialmente nell'autunno (*Gal*). Poco frequente nel distretto di Savona, ove si vede in aprile e poi in settembre ed ottobre (*Piccone*). Comune in aprile e maggio nel distretto di Arenzano, scarso nell'autunno (*Luciani*). Estivo e poco frequente nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Frequente da aprile a tutto settembre nella

prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune al piano, scarso in collina nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Accidentale nel distretto di Fiesole (*Gargioli*); scarso ed estivo in quello di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Scarso ai laghi in Val di Chiana (*Griffoli*). Raro nel Senese (*Dei*); sedentario in Maremma (*Ademollo*).

Marche: Scarso (*Comizio Agrario Fabriano*).

Puglie: Di scarso passo in aprile ed in ottobre (*De Romita*).

Sicilia: Scarso al piano nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Di scarso passaggio, ne predai nello stagno di Sorso nel Sassarese (*Bonomi*).

144. *Calamodus aquaticus* (J. F. Gmel. in Temm.)

PAGLIAROLO.

Paizarzin, Fenuggià (*Basso-Piem.*) — Risen (*Cremon.*) — Favin (*Mantov.*) — Beccafig de risera (*Lomb.*) — Caneboun (*Nizza*) — Paglierino (*Pisa*) — Calcapaglione (*Lucca*) — Beccaficu di margiu (*Mess.*) — Cacapalu, Amuraru (*Modica*).

Piemonte: Raro nella prov. di Torino (*Gasca*). Trovasi al piano soltanto nella prov. di Alessandria, come la specie precedente (*Camusso*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di doppio passaggio e forse nidificante in quella di Cremona (*Ferragni*). Estivo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comune al piano in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). È comune nel Friuli, ove giunge in aprile, nidifica in maggio e giugno e parte nell'ottobre (*Valloni*). Comune nei luoghi aquitrinosi nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Nidificante e comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Piuttosto raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo nel Nizzardo, ma più abbondante alle

due epoche del passo (*Gal*). Non è comune nel distretto di Savona, ove si vede in aprile ed in settembre ed ottobre (*Picconi*). Comune in aprile e maggio, scarso nell'autunno nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Estivo, ma più scarso della specie precedente nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Estivo e comune nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comunissimo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Scarso ed estivo nella prov. di Firenze, l'ebbi da Sesto fiorentino nell'agosto 1882 (*Giglioli*). Poco frequente ai laghi in Val di Chiana (*Griffoli*). Avuto in maggio e settembre nel Senese (*Dei*); vedesi da agosto ad ottobre in Maremma (*Ademollo*).

Sicilia: Scarso al piano nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente al piano, giunge in aprile e parte in ottobre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

145. *Lusciniola melanopogon* (Temm.)

FORAPAGLIE CASTAGNOLO.

Castagnolo (*Aut. Ital.*) — Calcapaglione (*Lucca*).

Veneto: Ebbi dal signor G. Vallon nel 1885, un nido con 3 uova trovato da lui a Codroipo il 19 giugno 1884 e riferito allora a questa specie; fui perciò sorpreso di vedere quel nido citato poi dal Vallon nelle sue « *Note sull'Avifauna del Friuli* » (p. 26, estratto), sotto il nome della *Potamodius* (*Locustella*) *fluviatilis*, specie che non è ancora stata presa in Italia e che neppure il signor Vallon, come lo dichiara egli stesso, ha mai veduto; è certamente avvenuto un equivoco, giacchè so per esperienza quanto sia accorto osservatore il signor Vallon (*Giglioli*). Non frequente nella provincia di Padova; però il 27 gennaio 1888 una cinquantina di questi uccelli, tutti catturati nei canneti delle Valli interrite dalle torbide del Brenta (*Inferno. Inferniolo ecc.*) in distretto di Piove di Sacco, furono da me trovati sul mercato di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Accidentale nella prov. di Parma (*Del Praton*).

Liguria: Sedentario, ma poco frequente nel Nizzardo (*Gal*). Raro ed accidentale nel distretto di Savona, ove ne ebbi un solo nel novembre 1886 (*Piccone*). Piuttosto raro e primaverile nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario al piano nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Scarso e localizzato, ma sedentario nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Trovasi ai laghi in Val di Chiana, ma è raro (*Griffoli*). Ne ebbi un solo il 25 dicembre 1863, da Grosseto (*Dei*).

Marche: Raro assai (*Paolucci*).

Puglie: Rarissimo, so di una sola cattura (*De Romita*).

Sicilia: Sedentario, ma non comune al piano nella provincia di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

146. *Locustella naevia* Bodd., ex Daubent.

FORAPAGLIE MACCHIETTATO.

Risarolo, Fistel (*Vicenza*) — Orbarolo (*Padova*).

Piemonte: Ebbi due bellissimi individui di questa specie dal signor Carlo Bainotti, uccisi nei pressi di Torino: il maschio il 15 e la femmina il 22 maggio 1887 (*Giglioli*).

Lombardia: Rarissimo nella prov. di Sondrio, ove s' incontra in pianura (*Galli*). Raro nella prov. di Cremona, ne uccisi uno a Cava Tigozzi il 23 settembre 1883 (*Ferragni*). Raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Ebbi nel Friuli un solo esemplare, colto nei pressi di Udine nell'autunno 1880 (*Vallon*). Non so se sia raro; ne ebbi uno solo nella prov. di Padova preso a Marendole, Monselice, il 14 settembre 1883 (*Arrigoni*).

Liguria: Abbastanza frequente di passaggio in primavera e nell'autunno nel Nizzardo (*Gal*). Passa in maggio e non è raro nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova; ne ho già uccisi parecchi e sempre in un piccolo prato

umido in mezzo alla pineta della marchesa Pallavicini: stanno nascosti nell'erba, bisogna farli alzare coi piedi ed allora volano pesantemente come le quaglie (*Luciani*). Raro assai nel distretto di Spezia (*Carazzi*).¹

Toscana: Osservato talvolta nel padule di Massaciucoli ed in quello di Monsummano, nella prima località ne uccisi uno; un secondo lo trovai sul mercato di Lucca in settembre (*Martorelli*). Accidentale nella prov. di Firenze, l'ebbi una sola volta in 20 anni, da Fiesole, il 10 settembre 1883 (*Giglioli*).

147. *Potamodus luscinioides* (Savi)

SALCIATOLA.

Lescarina, Pajarola (*Cuneo*) — Rosignolo di padule (*Lucca*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo; di passaggio nella prima quindicina di maggio; nel 1859 si dice abbia nidificato nella R. tenuta di Pollenzo (*Abre*). Nel Basso Piemonte raramente lasciarsi vedere, e solo nel tempo delle migrazioni, ne capita qualche individuo nella parte della provincia confinante colla Liguria (*Camusso*).

Veneto: Ne ebbi un solo esemplare nel Friuli, maschio, preso nelle vicinanze di Udine il 7 settembre 1884 (*Vallon*). Rara assai, anzi di dubbiosa comparsa nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di rara comparsa in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Primaverile e rara nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentaria nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Si vede da aprile ad ottobre nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

Marche: Rara (*Comizio agrario Fabriano*).

Sicilia: Rara assai nella prov. di Messina (*Pistone*).

¹ Il prof. Carazzi (*Avif. Spezia e Val di Magra*, p. 27) cita veramente la *Locustella lanceolata*, e ciò perchè il prof. Magni-Griffi riferisce a questa specie un esemplare preso a Sarzana nel maggio 1861, l'ho esaminato e per me non v'ha dubbio alcuno che sia una *L. naevia*.

148. Cettia Cettii (La Marm.)

RUSIGNOLO DI PADULE.

Rusignolo di fiume (*Aut. Ital.*) — Cia-cià (*Mantova*) — Ruscigneu d'egua (*Arenzano*) — Rosignolo di padule (*Pisa, Lucca*) — Rusignuluni di canmitu (*Mess.*) — Ricignuolo di fiumi (*Modica*).

Piemonte: Raro e soltanto di passo nel Basso Piemonte (*Camusso*).

Lombardia: Non comune ed estivo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Raro al piano nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Abbastanza comune e sedentario nel Friuli; nidifica già nell'aprile e depone 4 a 5 uova di un rosso-mattone (*Vallon*). Di accidentale comparsa nella prov. di Padova; ne ebbi uno su quel mercato il 27 gennaio 1888, era stato colto nei canneti di Piove di Sacco (*Arrigoni*).

Emilia: Non frequente, ma nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*).

Liguria: Sedentario, ma non molto frequente nel Nizzardo (*Gal*). Raro nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarso ed estivo nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune nel padule di Massaciuccoli, Lucca, ove giunge nel marzo ed ove nidifica (*Fontebuoni, Gragnani*). Comune al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Scarso ed estivo nel distretto di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Sedentario, ma poco frequente in Val di Chiana (*Griffoli*). Sembra essere sedentario in Maremma (*Dei, Ademollo*).

Marche: Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Sicilia: Sedentario, ma scarso nella prov. di Messina (*Pistone*). Comune e sedentario nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Raro al piano, ove nidifica in

maggio, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e nidificante al piano in luoghi palustri (*Bonomi*).

DRYMÆCIDÆ

(*Cisticole*).

149. Cisticola cursitans (Frankl.)

BECCAMOSCHINO.

Pittamuscin, Beccamuschin (*Basso-Piem.*) — Czin (*Mantov.*) — Canèto, Papamoschin (*Padova*) — Caneto (*Rovigo*) — Caneboun (*Nizza*) — Sizìn (*Spezia*) — Becca mosche (*Pisa*) — Martellino (*Lucca*) — Carrubbeddu (*Mess.*) — Carrabidduzza, Carrabedda (*Terran. Sicil.*) — Papa muschitu, Punta canna (*Sard.*).

Piemonte: Nel Basso Piemonte è di passo non costante e piuttosto raro: credo però che annidi al monte; al giunger dell' autunno scompare (*Camusso*).

Lombardia: Di dubbiosa comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Giunge in aprile e parte in settembre nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comune nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto: Sarebbe abbastanza frequente nei luoghi paludosi della prov. di Padova, ma io non ne ebbi (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo, ne ebbi uno nell' agosto 1887 (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo e di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Raro nel distretto di Savona, ne ebbi uno il 17 ottobre 1871 (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove si

vede in primavera (*Luciani*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non raro anche d'inverno negli stipeti in collina nella prov. di Lucca (*Martorelli*); sedentario nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Sedentario, ma meno frequente d'inverno nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott.*). Raro nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*); sedentario (*Giglioli*). Sedentario e comune nella prov. di Grosseto (*Dei*): specialmente estivo in Maremma (*Ademollo*). Frequentissimo nei luoghi paludosi in Toscana; alle bocche del Calambrone, Livorno, in pochi cespuglietti di canne ne avrò veduto una cinquantina (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Puglie: Sedentario e localizzato in Capitanata: di raro capita al litorale (*De Romita*).

Sicilia: Non abbondante, ma sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Non abbondante, ma sedentario nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Scarso al piano in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario (*Bonomi*).

TROGLODYTIDÆ

(*Scriccioli*).

150. *Troglodytes parvulus*, Koch

RE DI MACCHIA.

Re pcit (*Alba*) — Cincin, Cincin de néive, Reattin, Uslin da neiv, Centrubb (*Basso-Piem.*) — Ré-Ré (*Ossola*) — Re di beuce, Bo-gros, Re d'i usei, Santa-bouce, Reatel (*Nor.*) — Busaseze (*Berg.*) — Reottin (*Milano*) — Cercer, Imperatorin (*Veron.*) — Sgarèla (*Vicenza*) — Rusetto (*Rovigo*) —

Favite (*Friuli*) — Struzzet (*Sacile*) — Oselèt del bosch, Regüz, Galinazhèta (*Feltre*) — Reuz, S-ciaruzol, Tre-tre, Rosciuz (*Cadore*) — Rusèt, Galinazìn (*Ven.*) — Còccla (*Rav.*) — U'slein dal fredd, Papà d'la pizzacra (*Bol.*) — Ariattin (*Vergato*) — Petouva (*Nizza*) — Castagnetta (*Arenzano*) — Cra-Cra, Reatin (*Spezia*) — Re, Re cacchino (*Risa*) — Re-cacco (*Garf.*) — Beccaccino (*Sarteano*) — Re di uccelli (*Viterbo*) — Pèrcia-sepe (*Nap.*) — Aucidiluzzu musca, Percia-ruvettu (*Modica*).

Piemonte: Frequente al monte ove nidifica due volte, in aprile e giugno; erratico nell'inverno in prov. di Cuneo (*Abre*). Comune e sedentario in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Comunissimo e stazionario nel Basso Piemonte: in autunno però scende al piano dove si ferma fino a primavera: allora sale al monte e vi annida (*Camusso*). Comune, nidificante e sedentario nell'Ossola (*Bazetta*). Così in Valsesia e nel distretto di Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*); fa due covate tra l'aprile e l'agosto (*Guarinoni*).

Lombardia: Frequente ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Fa passaggio con varia abbondanza tra il settembre ed il novembre nel Comasco (*Senna*). Comune in prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Invernale e forse nidificante in quella di Cremona (*Ferragui*). Frequente d'inverno nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comunissimo in Lombardia ovunque (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune e stazionario ovunque nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante, erratico e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); sedentario in quel di Bassano (*Ferrari*). Frequente ovunque, nidificante e di passo in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa in marzo ed ottobre (*Delaito*). Comune e sedentario nel Friuli; nidifica nel maggio ai monti e sverna al piano (*Vallon, Del Torre*). Comunissimo nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo alle epoche del passo nelle prov.

di Ravenna e di Bologna, ma specialmente nell'inverno (*Bacchi della Lega*). Comune e sedentario nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario e specialmente autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove è sedentario; nidifica ai monti e scende al litorale col freddo; e allora vi sono molti immigranti (*Piccone*). Sedentario e comune nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Così in quello di Spezia, ove nidifica ai monti e scende al piano da ottobre ad aprile (*Carazzi*).

Toscana: Sedentario e frequente nella prov. di Lucca, ove nidifica ai monti e scende al piano l'inverno (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune e sedentario ovunque, ma specialmente invernale nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott*, *Papasogli*). Frequente e sedentario nella prov. di Firenze, ove però abbonda di più in novembre e marzo (*Lenzi*, *Turchetti*, *Gargioli*, *Ginori*, *Fontebuoni*). Comune e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). In Val di Chiana è comune d'inverno ed alle due epoche del passo (*Griffoli*). Sedentario, ma specialmente invernale nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Comune, autunnale ed invernale, ma anche sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario e abbondantissimo in Toscana, coi freddi scende al piano (*Roster*).

Marche: Comune ovunque (*Paolucci*).

Lazio: Scarso nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Sedentario e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Sedentario e nidificante, ma più comune nell'inverno (*De Romita*).

Calabrie: Scarso nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Frequente, sedentario ed invernale nel

distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comune, sedentario e nidificante ai monti nel distretto dello Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Scarso nel Cagliaritano, comune assai nel Sassarese, nidifica tra il Capel Venere (*Bonomi*).

CINCLIDÆ

(*Merli acquaioli*).

151. *Cinclus aquaticus*, Bechst. (ex Gesn.)

MERLO ACQUAIOLO.

Cinclus merula, Salvad.

Cinclus melanogaster, Salvad.

Merlo pescou, Merl d'acqua, Merl acquá, Merl acqua-reu, Pescamartin, Merlo ciapà (*Basso-Piem.*) — Foular, Merl pescadeur (*Nov.*) — Merla aquareola (*Berg.*) — Merlo da acqua (*Feltre*) — Merel aquar (*Vergato-Porretta*) — Merlou d'aiga (*Nizza*) — Merlou pescau (*Arenzano*) — Merlo d'aigua (*Spezia*) — Merlo acquaio (*Garf.*) — Merlacquaccio (*Lucca*) — Tordo d'acqua (*Marche*) — Merlo d'acqua (*Campobasso*) — Miedduru d'acqua (*Calabr.*) — Mierlo d'acqua (*Nap.*) — Gadduzzu d'acqua (*Castelbuono, Sicil.*) — Merra d'acqua (*Modica*).

Il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 101) ritiene distinta specificamente la forma a pancia nera (*C. melanogaster*), e l'annovera tra le specie italiane basandosi appunto sugli esemplari da me citati e conservati nel R. Museo Zoologico di Firenze; io però non sono del suo avviso, e per ora almeno mantengo quanto ho scritto in proposito nella mia *Avifauna* (p. 144, nota). E qui mi cade l'occasione di correggere una

omissione nella citata mia opera, che ha generato un non senso; alla linea 18 della p. 144 si deve leggere « appartenenti in qualche caso, *pare, alla medesima covata.* »

Posso aggiungere che ho avuto un altro esemplare della forma *melanogaster*, un maschio, ucciso nei pressi di Roma il 1 dicembre 1886.

Piemonte: Frequente al monte ed al piano, nella prov. di Cuneo; nidifica due volte, in aprile ed in giugno, poi diventa erratico (*Abre*). Scarso nel distretto di Torino (*Gasca*); piuttosto comune in quella provincia (*Martorelli*). Sedentario nel Basso Piemonte, annida nei luoghi montuosi e vi è comune tutto l'anno lungo i corsi d'acqua; è piuttosto raro al piano (*Camusso*). Nell'Ossola nidifica sui monti sino ai 2500 metri, scende al piano in autunno (*Bazetta*). In Valsesia fa anche due covate (*Guarinoni*); nel distretto di Crodo, Novara, è sedentario e piuttosto comune (*Demori*).

Lombardia: Comunissimo nella prov. di Sondrio, ove vive al piano e al monte; nel dicembre 1877 si ebbe in Valtellina una forte immigrazione di Merli acquaioli; infatti questa specie che nella primavera e nell'autunno precedenti era stata eccezionalmente scarsa, abbondò durante l'inverno sulle rive dei nostri fiumi (*Galli*). Scarso lungo il Brembo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Accidentale nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune sul lago di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale ai monti (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Piuttosto scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Frequente e sedentario nel Friuli; nidifica ai monti dal maggio all'agosto (*Vallon*). Sedentario lungo il Iudrio ed il Natisone nel distretto di Cividale: pone il nido in luoghi di difficile accesso, non vi va direttamente, ma si ferma a distanza e lo raggiunge nuotando o camminando (*Del Torre*). Assai raro nella prov. di Padova, ne ebbi uno solo il 22 settembre 1880 (*Arrigoni*).

Emilia: Nella prov. di Bologna vive e nidifica ai monti

lungo i torrenti, che segue talvolta al piano (*Bacchi della Lega*); sedentario e comune nel distretto di Vergato (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma, diventa erratico nell'inverno; non varia (*Del Prato*).

Liguria: Di passo autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Sedentario e abbastanza comune nel distretto di Savona, nidifica nelle valli lungo i corsi d'acqua: col freddo scende al mare e si vede sugli scogli; allora giungono pure immigranti per svernare (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Sedentario, ma poco frequente nel distretto di Spezia, lungo i torrenti ai monti, di rado scende al piano (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario nella prov. di Lucca, nidifica ai monti e col freddo scende al piano (*Martorelli*); non comune nel distretto di Massarosa (*Graggiani*). Non raro e sedentario ai monti nella prov. di Firenze (*Giglioli*); scarso nei distretti di Sesto e Signa (*Fontebuoni*). Comune nel Casentino, Arezzo (*Beni*); ove è sedentario (*Fiorini, Pauer*). Sedentario, ma poco frequente nel Cortonese (*Triffoli*). Così nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paolucci, Marri*). Sedentario, ma scarso nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Sedentario e abbondante lungo i corsi d'acqua di montagna in Toscana; per quanto io sappia non si è mai notato in questa specie tale aumento di individui da poter pensare ad una immigrazione d'oltre Alpe; i giovani presentano sempre una maggiore estensione del bianco verso l'addome (*Roster*).

Marche: Raro, ai monti (*Paolucci*). Comune e sedentario tra i monti di Urbino (*Carpegna*).

Abruzzi: Sedentario lungo i corsi d'acqua nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale; ne ebbi un solo, nel novembre 1882 (*De Romita*).

Calabrie: Alquanto raro, ma sedentario nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune e sedentario nella prov. di Messina

(*Ruggeri, Pistone*). Sedentario, ma scarso nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Non abbondante, ma sedentario in quello di Terranova, Caltanissetta (*Caravana*). Frequente e sedentario, nidifica ai monti e scende col freddo al piano, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Raro: in 18 anni non ne vidi che un solo lungo il fiume ai piedi del Gennargentu; fui assicurato che si trova lungo il fiume Luculla nel distretto di Nuoro (*Bonomi*).

ACCENTORIDÆ

(*Accentori*).

152. *Accentor collaris* (Scop.)

SORDONE.

Passra d' montagna, Franguel d' montagna (*Ossola*) — Mutuna, Stournin (*Nov.*) — Matelù (*Berg.*) — Talóch, Mosécca (*Feltre*) — Grison da croda (*Cadore*) — Passer solitari (*Civildale*) — Matona (*Sacile*) — Finco foresto (*Padova*) — Turdou sarvaegu (*Arenzano*) — Sia da coi (*Gen.*) — Mattachiano (*Lucca*) — Grottajone (*Casentino*) — Gogo (*Senese*) — Ferraru, Ferrareddu (*Mess.*) — Minutulu (*Lentini*) — Chiummaloru (*Castell. Madonie*).

Piemonte : Frequente e sedentario al monte in prov. di Cuneo: ove nidifica una sola volta nel maggio (*Abre*). Nella prov. di Torino è molto comune d'estate ai monti, d'inverno al piano (*Martorelli*). Raro nel Basso Piemonte ed esclusivo abitatore della montagna. Io non lo incontrai che sulle più alte roccie del versante sud dell'Appennino ligure, dove annida e staziona tutto l'anno. Il 30 gennaio 1886 dopo una fortissima nevicata, molti *A. collaris* scesero dagli alti monti

che circondano Voltaggio, sbandandosi lungo le sponde del torrente Lemmo: ne ebbi uno, maschio adulto, vivo, che si adattò subito alla gabbia e che conservo tuttora. In primavera ed in estate canta con canzone bellissima (*Camusso*). Nell'Ossola abita e nidifica sulle vette; nei rigidi inverni scende talvolta al piano (*Bazetta*). In Valsesia fa una sola covata dal maggio all'agosto (*Guarinoni*); nel distretto di Crodo. Novara. è frequente di passo primaverile (*Demori*).

Lombardia: Comune sulle alte montagne nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di comparsa accidentale nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Avventizia in quella di Cremona (*Ferragni*). Raro nella prov. di Mantova, preso a Castelgoffredo (*Paglia*). Raro nella Lombardia ai monti (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso, ma sedentario ai monti nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però è frequente; nidifica a terra ai monti in luoghi sassosi o tra le rocce in maggio e giugno; alleva due covate (*Delaito*). Frequente e sedentario nel Friuli; nidifica sugli alti monti e nell'inverno scende al piano (*Vallon*); scarso nel distretto di Cividale; se ne videro però molti nel marzo 1886; è sedentario ai monti (*Del Torre*). Raro nella prov. di Padova: ne ebbi uno il 15 gennaio 1881 a Monselice (*Arrigoni*).

Liguria: Abbastanza frequente e sedentario nel Nizzardo; durante l'inverno scende al piano (*Gal*). Scarso nel distretto di Savona, ove si vede soltauto nell'inverno: potrebbe anco essere sedentario ai monti (*Piccone*). Sedentario e comune nel distretto di Arenzano, abita le aride vette dell'Appennino, scende al mare coi grandi freddi (*Luciani*). Scarso e invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Coi massimi freddi si vede lungo il Serchio nella prov. di Lucca (*Martorelli*); di passo in novembre nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Sedentario nella prov. di Firenze, nidifica ai monti e scende col freddo al piano (*Giglioli*). Raro in novembre e dicembre nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini*). Poco comune e soltanto coi grandi freddi giunge in Val di Chiana (*Griffoli*). Raro nel distretto di S. Gimignano, Siena, ove l'ebbi in dicembre e gennaio (*Pau-*

lucci). Di casuale comparsa d'inverno nel Senese, nel 1878 molti si videro a Rocca Federighi (*Dei*). Vedesi in ottobre in Maremma (*Cambi*). Sedentario e comune in Toscana, nell'inverno scende al piano; nel 1881-82 ne ebbi 37 individui: 9 nel novembre, 13 nel dicembre, 10 nel gennaio, 5 nel febbraio; nel 1882-83 ne ebbi 13: 6 nel novembre, 5 nel dicembre e 2 nel febbraio; nel 1883-84 ne ebbi 4: 1 nel novembre e 3 nel dicembre; nel 1884-85 ne ebbi 23; 11 nel novembre, 2 nel dicembre, 7 nel gennaio e 3 nel febbraio; nel 1885-86 ne ebbi 19: 7 nel novembre, 1 nel dicembre, 7 nel gennaio e 4 nel febbraio; nel 1886-87 ne ebbi 31: 13 nel novembre, 7 nel dicembre, 8 nel gennaio e 3 in febbraio (*Röster*).

Marche: Raro assai, dopo burrasche autunnali (*Paolucci*).

Sicilia: Non scarso ai monti nella prov. di Messina (*Pistone*). Scarso, ma sedentario ai monti ed erratico d'inverno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

153. *Accentor modularis* (Linn.)

PASSERA SCOPAIOLA.

Buschin (*Basso-Piem.*) — Morat, Taranguel, Ucel d'jeux coulour ciel (*Nov.*) — Matela (*Berg.*) — Passare çharandine (*Friuli*) — Palugána, Sèlea palugána (*Padova*) — Pitanèlla (*Ravenna*) — Pàssara d' stopia (*Bol.*) — Passra d' macia (*Vergato*) — Rousenento (*Arenzano*) — Fournè, Senuella (*Gen.*) — Ferain, Ferao (*Spezia*) — Stipaiuola, Passerina, Passera di macchia (*Pisa*) — Stipajola (*Lucca*) — Passerina stipajola (*Fucecchio*) — Passera scoparina, sepajola e stipajola (*Fiesole*) — Scopajola, Scopina (*Casentino*) — Passera scopajola (*Sarteano*) — Scopina, Scopaiola (*S. Gimignano*) — Passera matta (*Garf.*) — Passera macchiaiola (*I. di Giglio*) — Passera fura-siepe (*Viterbo*) — Zicco d'inverno (*Nap.*) — Guadaruini (*Reggio Calab.*) — Ferrareddu (*Mess.*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo; ni-

difica due volte, in maggio ed in giugno, diventa erratica dopo l'estate (*Albre*). Scarsa in quella di Torino (*Gasca*). Rara nel Basso Piemonte, si rinviene soltanto agli alti monti dove annida e si ferma fino al principio d'inverno; allora scende a valle lungo i torrenti, dei quali frequenta le sponde, tenendosi appiattata fra le alte erbe ed i folti cespugli (*Camusso*). Di passaggio e molto probabilmente nidificante nella Valsesia (*Guarironi*).

Lombardia : Comunissima sui monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente durante il passo nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Invernale e rarissima nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comunissima ovunque nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Di passaggio nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Frequente, nidificante e di passaggio in marzo e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però non nidifica e passa in aprile ed ottobre (*Delaito*). Comune nel Friuli, ove nidifica ai monti in maggio e giugno (*Fallon*); comune e ovunque nidificante nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissima alle epoche del passo nella prov. di Ravenna, meno frequente in quella di Bologna (*Bacchi della Lega*). Poco comune, nidificante ed erratica nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Più frequente in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona è sedentaria, nidifica in abbondanza ai monti e si vede ovunque al piano durante l'inverno; allora molte giungono da fuori (*Piccone*). Così nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Frequente ed invernale in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Specialmente invernale e di doppio passo nella prov. di Lucca, ove ne ebbero in settembre (*Martorelli*); sedentaria nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Comune ovunque nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarsa in quelli di La-

vajano e Ghizzano (*Papasogli, Venerosi*); dalla metà di ottobre in poi fa un passo abbondante assai in quello di Cedri, onde si può dire che insieme ai Fringuelli costituisce il maggior numero degli uccelli catturati ai Paretai ed alle Brescianelle (*Degli Alessandri*). Frequente al poggio in ottobre-novembre e marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*). Frequente e nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*); vi è anche sedentaria (*Fiorini*). Invernale e comune ai due passi in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); sedentaria e di passo autunnale in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Comune d'autunno e d'inverno nel Senese (*Dei*: scarsa, ma sedentaria nella prov. di Grosseto (*Ademollo*); passa in ottobre nel distretto di Gavorrano (*Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentaria e comune in Toscana, nidifica sull'Appennino pistoiese (*Roster*).

Marche: Comune ovunque (*Paolucci*).

Lazio: Scarsa nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Frequente in autunno ed inverno (*De Romita*).

Calabrie: Comune al piano d'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune e anche sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa al piano da novembre al marzo nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Frequente e sedentaria ai monti, erratica nell'autunno, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

154. *Accentor montanellus* (Pall.)

SCOPAIOLA ASIATICA.

Passera scopajola asiatica (*Aut. Ital.*).

A proposito del supposto *A. montanellus* della collezione Perini a Verona, menzionato da me (*Avif. Ital.* p. 147

e nota, il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 102) c'informa, avendolo esaminato, che era un *Accentor atrigularis*, Brandt, ed il Beninati gli disse inoltre di averlo avuto da Vienna!

PARIDÆ

(Cincie).

155. *Regulus cristatus*, Koch ex Willugh.

REGOLO.

Testin d'or, Testin d'ou, Boenettin, Sisì, Reattin (*Basso-Piem.*) — Ugiö, Cent-rub, Giavanin, Uslin del testin giald, Usel dla Madonna (*Nor.*) — Papa moschin (*Cadore*) — Stèlin, Caodóro (*Feltre*) — Stèlin (*Friuli*) — Stlén (*Ravenna*) — Uslin dal fred (*Vergato*) — Rey (*Nizza*) — Reattin (*Sarona*) — Testin d'ou (*Arenzano*) — Fri-fri, Testin d'oo (*Spezia*) — Capigiallo (*Pisa*) — Fiorarancino, Arancino (*Fiesole*) — Capidoro (*Pisa, Garf.*) — Fiorino (*Lucca*) — Rampichino (*Marche*) — Radaicchio (*Viterbo*) — Riginièllo, Cardinalièllo, Scazzetta de cardinale (*Nap.*) — Riiddu tupputu (*Terran. Sicil.*) — Conca d'oro (*Sard.*).

Piemonte: Frequente in montagna ove nidifica due volte, in maggio e giugno; scende al piano nell'inverno nella prov. di Cuneo (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Nel Basso Piemonte è comune assai nel tempo della migrazione autunnale, che prolunga non raramente a tutto l'inverno. Qualche rarissima volta pose il nido nelle fitte boscaglie dei più alti monti (*Camusso*). Sedentario e nidificante nell'Ossola (*Bazetta*). Nidifica due volte in Valsesia (*Guarinoni*); scarso di passaggio autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Comune e sedentario sui monti nella prov. di Sondrio, scende al piano nell'inverno (*Galli*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Invernale e comune in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comunissimo ovunque in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*); trovato due volte in pianura nel luglio (*Turati*).

Veneto : Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante, erratico e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno, ove passa in aprile e settembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove nidifica in montagna e passa in marzo, ottobre e novembre (*Delaito*). Frequente e sedentario nel Friuli, nel marzo lascia il piano e va nei boschi alti della Carnia ove nidifica (*Vallon*); così nel distretto di Cividale, ove nidifica (*Del Torre*). Frequente più specialmente ai colli nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Nelle prov. di Ravenna e Bologna comparisce in ottobre e rimane tutto l'inverno (*Bacchi della Lega*). Scarso ed invernale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Specialmente invernale nel Nizzardo (*Gal*). Sedentario nel distretto di Savona, nidifica ai monti e scende col freddo al piano (*Piccone*). Comune d'inverno in quello di Arenzano (*Luciani*). Al piano nel distretto di Spezia si vede dall'ottobre all'aprile (*Carazzi*).

Toscana : Sedentario e comune d'inverno, specialmente nelle pinete, nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Gragnani*). Comune nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Frequente e sedentario nella prov. di Firenze, abbonda più nell'ottobre (*Turchetti*, *Gargioli*, *Fontebuoni*, *Giglioli*). Nidificante e frequente nel Casentino, Arezzo (*Beni*); anche sedentario (*Fiorini*). Invernale e di doppio passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paolucci*, *Marri*). Invernale nel Senese (*Dei*); sedentario in Maremma (*Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche : Piuttosto scarso (*Paolucci*).

Lazio : Comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania : Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Invernale e piuttosto scarso (*De Romita*).

Calabrie : Scarso ai monti nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Raro, ma sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Raro, ma sedentario ai monti in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune d'inverno, specialmente nel Nuorese, ma non abbondante (*Bonomi*).

156. *Regulus ignicapillus* (C. L. Brehm in Temm.)

FIORRANCINO.

Steila d'or, Regina, Reattin, Sisi, Boenettin, Testin d'ou, Testin d'or (*Basso-Piem.*) — Ugiö, Cent-rub, Giavannin (*Novara*) — Fiocchin (*Milano, Como*) — Stelin piccolo (*Vicenza*) — Stélin, Caodóro (*Feltre*) — Repipin (*Friuli*) — Uslin dal fred (*Vergato*) — Rey (*Nizza*) — Reattin (*Savona, Arenzano*) — Fri-Fri, Testin d'oo (*Spezia*) — Capigiallo (*Pisa*) — Fiorarancino, Arancino (*Fiesole*) — Capidoro (*Pisa, Garf.*) — Fiorino (*Lucca*) — Rampichino (*Marche*) — Conca d'oro (*Sard.*).

Piemonte : Frequente al monte in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte in maggio ed in giugno; nell'inverno scende al piano (*Abre*). Scarso in prov. di Torino (*Gasca*). Giunge nell'autunno nel Basso Piemonte e rimane l'inverno; rarissimamente nidifica sui monti più alti (*Camusso*). Nidificante e sedentario nell'Ossola (*Bazetta*).

Lombardia : Sedentario ai monti, scende d'inverno al piano; è meno comune della specie precedente nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nel Comasco, distretto di Colico, è di pas-

saggio abbondante tra il 15 settembre ed il 15 novembre (*Senna*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*); così in quella di Milano (*Brambilla*). Invernale e meno comune della precedente nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Comune nella Lombardia (*Turati*); scarso, ma nidificante (*Borromeo*).

Veneto : Comune assai sulla fine dell'autunno nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Erratico nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso e nidificante ai monti nel distretto di Feltrino, Belluno, ove fa passaggio in marzo, ottobre e novembre (*Delaito*). Nel Friuli è sedentario e forse più abbondante della specie precedente, nel marzo si reca pure sui monti della Carnia per nidificare (*Vallon, Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Scarso ed invernale nel distretto di Vergato prov. di Bologna (*Lorenzini*). Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Sedentario nel distretto di Savona, nidifica ai monti e scende col freddo al litorale (*Piccone*). Comune d'inverno in quello di Arenzano (*Luciani*). Autunnale ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Sedentario, comune d'inverno nelle pinete della prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Più comune della specie precedente e specialmente di passo in autunno nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi*). Sedentario e frequente nella prov. di Firenze, abbonda più in ottobre (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Fontebuoni, Giglioli*). Meno frequente della precedente e pure nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni*); vi è anche sedentario (*Fiorini, Pauer*). Invernale e di doppio passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); sedentario in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Invernale nel Senese (*Dei*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario e comune in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune (*Paolucci*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale e più frequente della specie precedente; l'ho avuto anche in luglio (*De Romita*).

Sicilia: Scarso, ma sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente e sedentario ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Più comune della specie precedente, anche nella parte meridionale dell'isola (*Bonomi*).

157. *Ægithalus pendulinus* (Linn. ex Titius)

PENDOLINO.

Pendolin (*Mantova*) — Fiaschetta (*Lucca*) — Codoncino, Fiaschetta (*Fucecchio*) — Vurzittulu (*Modica*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo; ove nidifica due volte, in aprile e giugno (*Abre*). Non comune e localizzato in prov. di Torino (*Gasca*); osservato nidificante sugli alti pioppi lungo il Po (*Martorelli*). Rarissimo nel Basso Piemonte, ove però ha nidificato lungo l'Orba presso Bosco Marengo e lungo la Bormida presso Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune da marzo ad ottobre in quella di Cremona (*Ferragni*). Poco frequente nella prov. di Mantova (*Paglia*). Scarso al piano in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Abbastanza frequente in località adatte nel Friuli durante l'estate; nidifica in aprile e maggio, ed ho trovato i nidi con una sola eccezione (su un alto pioppo) sempre appesi a giunchi che crescevano nell'acqua (*Vallon*). Frequente nei luoghi acquitrinosi nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro, ma nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Raro; ebbi il nido una volta soltanto nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Raro nel distretto di Savona, ne ebbi due da Albissola, una femmina il 30 ottobre 1881, ed un maschio il 15 aprile 1884 (*Piccone*). Scarso, ma pare essere sedentario al piano nel distretto di Spezia e Sarzana (*Carazzi*).

Toscana: Scarso, ma sembra essere sedentario nella prov. di Lucca, ove ne ebbi uno in febbraio (*Martorelli*); giunge numeroso al piano in marzo, nidifica e scompare prima della fine dell'estate (*Fontebuoni*); è sedentario nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Scarso da aprile ad ottobre nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Turchetti*). Nidifica ai laghi in Val di Chiana, ma è scarso (*Griffoli*). Scarso, ma nidificante nella prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*).

Puglie: Raro, una sola volta nell'agosto 1878 ne ebbi tre ed erano giovani appena impennati (*De Romita*).

Sicilia: Non raro, localizzato, nella prov. di Messina (*Pistone*). Frequente, sedentario ed estivo nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

158. *Acredula caudata* (Linn. ex Gesn.)

CODONA CAPO BIANCO.

Pintin (*Milan.*) — Codona, Coatimon (*Vicenza*) — Ocio de bo (*Veneto*) — Coéta a testa bianca (*Padova*) — Parùsule de còde lunghe (*Friuli*) — Ociò de bo (*Rovigo*).

Piemonte: Nell'Ossola questa specie abita le foreste di pini, ove non è comune; scende al piano nell'inverno (*Bazzetta*).

Lombardia: Non abbondante, vive al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa nella prov. di Milano (*Brambilla*). Rara ed invernale in quella di Cremona (*Ferragni*).

Veneto: Un esemplare di questa specie venne preso il 22 dicembre 1885 in Vallunga sopra Rovereto, Trentino, altre tre nel 1887, il 2, 3 e 10 novembre, nei pressi della città

A. Bonomi. Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Rara, quasi accidentale nel Friuli, ne ebbi una dal Vallon, colta presso Udine il 16 novembre ed un'altra dal Bayer, presa a Pontebba l'8 ottobre 1885. A me sembra che ciò che il Vallon dice nella sua *Avifauna del Friuli* (p. 23 estratto) sotto il nome di *A. Irbyi*, va invece riferito a questa specie; non mi risulta che la *A. Irbyi* sia stata presa nel Veneto (*Giglioli*). Mi fu detto che è di passaggio abbastanza regolare in autunno nella prov. di Padova, io però non la ebbi mai (*Arrigoni*). Rarissima nella prov. di Rovigo, ne uccisi una nell'inverno 1874 (*Dal Fiume*).

Liguria: Accidentale d'inverno nel Nizzardo (*Gal*).

159. *Acredula rosea* (Blyth)

CODONA.

Codibugnolo roseo (*Aut. Ital.*) — Puasèt (*Alba*) — Parisseua da a cua lunga, Parissuin (*Basso-Piem.*) — Pampua (*Nov.*) — Scoasi (*Berg.*) — Codona, Coatimon (*Vicenza*) — Perussola dalla coda longa (*Cadore*) — Muiniute (*Cividale*) — Ocio de bo (*Rovigo*) — Codazhin, Codazhil (*Belluno*) — Codonet (*Sacile*) — Ocièto de Bò, Coéta (*Padova*) — Pudalén da la manélla longa (*Ravenna*) — Pulzon (*Vergato*) — Lardeiroun (*Nizza*) — Berbexin de cua lunga (*Savona*) — Parissein cua lunga (*Arenzano*) — Codazzola (*Lucca*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo; diventa erratica dopo la nidificazione, che ha luogo due volte, in febbraio ed in aprile (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi*); osservata ed uccisa nella Valle di Lanzo ed in Val Soana nell'agosto e settembre (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte è abbastanza comune e nidificante, ma più al monte che al piano; incontrasi spesso nel passo autunnale, e qualche famiglia fermasi tutto l'inverno (*Camusso*). È sedentaria nell'Ossola e assai comune, nidifica anche al piano e vive in branchi (*Bazetta*). Nidifica una sola volta nella

Valsesia (*Guarini*); scarsa e di passo autunnale nel distretto di Crodo (*Demori*).

Lombardia: Comunissima in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Frequente nell'autunno ed inverno in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comunissima ovunque nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Non rara nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Piuttosto scarsa, erratica, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*); Sedentaria e comune in collina nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente, nidificante e di passaggio in aprile e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); comune e sedentaria nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissima e sedentaria nel Friuli, nidifica già in aprile (*Fallon*); fa il nido con bambagia di pioppo (*Del Torre*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nelle prov. di Ravenna e Bologna passa la bella stagione sui monti. discende al piano in autunno, ma l'inverno non si trattiene da noi (*Bacchi della Lega*). Sedentaria e comune nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona è comune, ma non copiosa, ai monti in estate, al mare nell'inverno ed allora è più abbondante. Nell'aprile 1870 una coppia fece il nido ed allevò i piccoli in numero di 8 in un filare di viti in una mia villa a Leggino, Savona, a pochissima distanza dal mare in luogo tutto coltivato ed abitato; l'anno seguente tornarono, ma poi scomparvero (*Piccone*). Rara nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarsa in quello di Spezia, ne ebbi due in gennaio (*Carazzi*).

Toscana: Scarsa e sedentaria ai monti nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Gragnani*). Accidentale nella prov. di Firenze, ne ebbi una dal Roster presa a Dicomano il 22 settembre 1881, *Avif. Ital.* p. 152 (*Giglioli*).

160. Acredula Irbyi, Sharpe e Dresser

CODIBUGNOLO.

Codibugnolo grigio (*Aut. Ital.*) — Scouasson, Couett (*Cremona*) — Padulén da la manélla longa (*Bol.*) — Lardeiroun (*Nizza*) — Carcassùco (*Spezia*) — Penninculo (*Pisa*) — Codazzola (*Lucca*) — Paglinculo (*Garfagnana*) — Fiaschetta (*Casentino*) — Codolo, Codoletto (*Fiorentino*) — Codibugno (*Fucecchio*) — Cotibugnolo (*S. Gimignano*) — Pajainculo, Sporca-painoni (*Viterbo*) — Parrelluccia a coda longa (*Napoli*) — Pinnazzola cuda longa (*Mess.*).

Piemonte: Scarso al monte in prov. di Cuneo; diventa erratico dopo la nidificazione, che ha luogo due volte, in febbraio ed in aprile ¹ (*Abre*).

Lombardia: Stazionario, ma più comune durante il passo nella prov. di Cremona (*Ferragni*).

Liguria: Sedentario, ma non comune nel Nizzardo (*Gal*). Comune e sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune ovunque e sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*); abbonda specialmente in ottobre ed aprile (*Fontebuoni*). Nella vicina Garfagnana, ho trovato fin quattro e cinque femmine in un nido, e ventidue pulcini vennero tolti dal medesimo nido (*De Stefani*). Comune specialmente in collina e sedentario nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Nella prov. di Firenze è frequente e sedentario al poggio nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*); scarso o di comparsa irregolare in autunno nei distretti di Fiesole, Sesto e Signa (*Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente ovunque e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Comune e sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena, ove nidifica sui monti (*Bargagli*); ed in quello

¹ Dubito che quanto l'egregio signor Abre dice di questa specie si riferisca invece all'*A. caudata*.

di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Sedentario e comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune e sedentario in Toscana, va sempre di valle in valle a piccoli branchetti di 7 o 8 individui, forse nidata per nidata (*Roster*).

Marche: Piuttosto scarso (*Comizio agrario Fabriano*).

Lazio: Scarso nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Di comparsa accidentale coi grandi freddi nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentario e non raro sulle Murge (*De Romita*).

Calabrie: Scarso, vedesi più facilmente in ottobre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Scarso nella prov. di Messina (*Pistone*). Sedentario e scarso ai monti, col freddo scende al piano, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

161. *Panurus biarmicus* (Linn.)

BASETTINO.

Todeschin, Ussarin, Ungaresin (*Milano*) — Organeto de la China (*Rovigo*).

Piemonte: Accidentale, un solo che io sappia venne preso in provincia colle reti, dal cav. Calcagno anni or sono, e si conserva nella raccolta del cav. Arrigo in Cuneo (*Abre*).

Lombardia: Di comparsa accidentale nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Comune nei canneti, ove nidifica, nella prov. di Mantova (*Pagliai*). Nidificante e frequente al piano, in Lombardia (*Borromeo*); scarso (*Turati*).

Veneto: È frequente in alcune località palustri nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria: Accidentale nel distretto di Spezia, il profes-

sore Magni-Griffi ne ebbe un solo a Marinella presso le foci di Magra (*Carazzi*).

Toscana: Vidi in Lucca diversi esemplari presi nei paduli vicini (*Martorelli*). Era una volta assai comune e nidificante ai laghi in Val di Chiana, ora è divenuto scarso (*Griffoli*). Scarso, ma nidificante nella prov. di Siena (*Dei*): sedentario in quella di Grosseto (*Cambi*).

Marche: Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale, so di due sole catture, una nell'aprile 1871 e l'altra il 15 ottobre 1886 (*De Romita*).

Sicilia: Scarso nella prov. di Messina (*Pistone*).

162. *Parus major*, Linn. ex Gesn.

CINCIALLEGRA.

Ciaret, Cinciaretta (*Alba*) — Prisèura, Parisinn-a, Parisseua, Parisceua, Parusin (*Basso-Piem.*) — Scinghèrna (*Alto Canavese*) — Paisòla (*Berg.*) — Peruzhola, Zherpignola (*Feltre*) — Perussola granda (*Cadore*) — Cinciàra, Beduina, Fuffignón, Finfignon (*Padova*) — Cinciribin (*Rovigo*) — Paranzino (*Vergato*) — Padulén (*Ravenna*) — Lardiera (*Nizza*) — Perissèa, (*Spezia*) — Puticchia grossa, Capinegra, Cincia (*Pisa*) — Potazzina, Perlina (*Val di Chiana*) — Perlonza capinera, Cingallina reale (*Sarteano*) — Cingallina (*S. Gimignano*) — Capinera (*Campobasso*) — Trentacinco (*Nap.*) — Cinciallegra, Capignora (*Bari*) — Pirruzzedda, Cicarella (*Calabria*) — Pinnazzola, Pirnizzola (*Mess.*) — Chiavitteri, Cirincià (*Terran. Sicil.*) — Papauzicu (*Modica*).

Piemonte: Frequente e sedentaria ovunque in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in aprile e giugno (*Abre*). Frequente e sedentaria nella prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*); ho veduto un individuo di questa specie preso col becco

molto deforme (*Gasca*). Comunissima, sedentaria e parzialmente migrante nel Basso Piemonte (*Camusso*). Comune e sedentaria nell'Ossola, ove molte giungono poi di passo (*Bazetta*). Così in Valsesia e nel distretto di Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia : Frequente ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Comune in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Sedentaria e comune, ma anche di passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comunissima ovunque nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune ovunque nella prov. di Verona (*Pellegriani*). Piuttosto scarsa, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*); sedentaria e frequente nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente, nidificante e di passaggio in maggio e settembre nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa in marzo ed ottobre (*Delaito*). Comune e sedentaria nel Friuli, fa la prima covata in aprile (*Vallon*); da vent'anni va decrescendo nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comunissima e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissima e sedentaria nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria nella prov. di Parma; il 12 giugno ebbi le uova in sviluppo (*Del Prato*).

Liguria : Sedentaria e comune nel Nizzardo (*Gial*). Così nel distretto di Savona, ove poi molti vengono a svernare (*Piccone*); ed in quello di Arenzano (*Luciani*); ed ancora in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Abbondante e sedentaria nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune ovunque e sedentaria nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Degli Alessandri*). Frequente e sedentaria nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Abbondante e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). Così pure nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello

di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune e sedentaria in Toscana; nel 1883 osservai una coppia che covò tre nidiate: la prima nel maggio di 5 o 6 individui; la seconda nel luglio di tre soli piccini; la terza in settembre di 5 uova; non potei io stesso seguirne lo sviluppo, ma seppi che tre soli piccini nacquero (*Roster*).

Marche: Comune ovunque e sedentaria; nidifica da marzo a luglio (*Paolucci*).

Abruzzi: Frequente e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune e sedentaria nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentaria e comunissima (*De Romita*).

Calabrie: Comune assai e sedentaria nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Sedentaria e comune nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente sedentaria ed invernale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Sedentaria e comune in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Comune e sedentaria, erratica nell'autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Frequente e sedentaria, nidifica ai monti e scende al piano nell'autunno (*Bonomi*).

163. *Parus ater*, Linn. ex Gesn.

CINCIA MORA.

Parisseura, Parissurin. Parissuin (*Basso-Piem.*) — Trentarola, Cavalonghia (*Nov.*) — Capnéggher (*Alto Canavese*) — Tuiccin (*Milano*) — Ciùñci (*Berg.*) — Ciuina (*Cremon.*) — Montagnola (*Vicenza*) — Perussola da cheba, Peruzzola todesca (*Cadore*) — Peruzhola negra, montagnazha o todesca (*Feltre*) — Cinciribin (*Rovigo*) — Lardeiroun negre (*Nizza*) — Mouneghetta (*Savona*) — Perissèa (*Spezia*) — Mattorella

(*Garf.*) — Cincina (*Lucca*) — Cincia nera (*Valdich.*) — Cilicchia greca (*Marche*) — Pinnazola, Pirnizzola (*Mess.*).

Piemonte: Scarsa in montagna, erratica nell'inverno nella prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in aprile ed in giugno (*Albre*). Scarsa nella prov. di Torino (*Gasca*); non rara (*Martorelli*). Specie piuttosto rara nel Basso Piemonte e che si lascia vedere più spesso d'autunno che di primavera; annida agli alti monti, e parte col giunger del verno (*Camusso*). Nell'Ossola è meno comune della specie precedente e sedentaria; nidifica ai monti e scende al piano nell'autunno (*Bazetta*). Nidifica nelle abetaie della Valsesia settentrionale dall'aprile al luglio, allevando più di una covata (*Guarinoni*); abbondante e sedentaria nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune in montagna nella prov. di Sondrio (*Galli*). Abbonda sui monti e anche al piano nella epoca del passo nella prov. di Bergamo; non tutti gli anni però giunge da noi e allora non si vedono che i pochi sedentari: ma quando arriva si vede straordinariamente numerosa¹ (*Stefanini*). Meno frequente della specie precedente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Invernale e rara in quella di Cremona (*Ferragni*). Comunissima ovunque in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Nella vallata dell'alto Adige tra il 10 e il 30 settembre 1883, questa Cincia passò in grande abbondanza; viaggiava in branchetti di 8 a 10, e l'ora del massimo passaggio, sempre col bel tempo, era dalle 9 alle 10 a. m. Trovandomi una mattina sull'orlo d'un bosco a circa 800 metri nelle Giudicarie, catturai colle panie 55 individui fra cui v'era un *C. ceruleus* e due *L. cristatus*; pel solo distretto di Stenico calcolai che per il corso di un mese venissero catturati non meno di 1000 individui al giorno (*A. Bonomi*).

¹ Ai primi di ottobre 1887 fui testimone io stesso a Bergamo ed a Lecco di uno di questi straordinari passaggi del *P. ater*; si vedevano ovunque gabbiate piene di questi agili e vivaci uccelletti, che si lasciano catturare con estrema facilità.

Scarsa, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente e nidificante ai monti nel Cadore, Belluno, ove passa in maggio e settembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa in marzo ed ottobre (*Delaito*). Piuttosto comune nel Friuli, nidifica ai monti, nell'autunno qualche anno abbonda al piano (*Vallon*); anche sedentaria (*Del Torre*). Frequente di passo ed in scarso numero sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa di passo in autunno nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Sedentaria, ma poco frequente nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Dal 1 novembre 1887 al febbraio 1888, furono numerosi nei dintorni di Parma, caso affatto straordinario (*Del Prato*). .

Liguria: Specialmente autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Scarsa ed abbondante secondo gli anni nel distretto di Savona, ove si vede durante il passo autunnale, dalla metà di settembre alla metà di novembre (*Piccone*). Così in quello di Arenzano, ove nell'autunno 1880 comparvero in straordinaria abbondanza (*Luciani*). Poco frequente nel distretto di Spezia, scende al piano alla fine di settembre (*Carazzi*).

Toscana: Piuttosto scarsa nella prov. di Lucca (*Martorelli*). Scarsa, ma sedentaria nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Non frequente, ma sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Di solo passo in Val di Chiana, in qualche anno abbondante in settembre, sempre scarsa in marzo (*Griffoli*). Avuta in ottobre e dicembre nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Invernale e scarsa nel Senese (*Dei*). Comune e sedentaria in Toscana, nidifica ai monti; nel 1884 vi fu una copiosissima immigrazione (*Roster*).

Marche: Scarsa (*Paolucci*).

Abruzzi: Comune e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Sicilia: Rara, ma sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Scarsa ai monti, più comune nel Nuorese e nel Sassarese; sedentaria (*Bonomi*).

164. Cyanistes cæruleus (Linn. ex Bell.)¹

CINCIARELLA.

Parus cæruleus, Salvad.

Prisola, Parisseura, Parissurin, Parissuin celeste (*Basso-Piem.*) — Parusciola molinera, P. quarantina (*Nor.*) — Monneghina (*Berg.*) — Perussola turchignola (*Cadore*) — Peruzholin (*Feltre*) — Parussoléta, Parussola montagnóla (*Padova*) — Celestin (*Rovigo*) — Paranzin piccol (*Vergato*) — Perisseta, Perissuin (*Spezia*) — Puticchia, Cincia, Cincino (*Pisa*) — Cincinina (*Lucca*) — Cincia turchina (*Fiesole*) — Capinera piccola, Cincina (*Casentino*) — Perlonzina, Cincia, Cingallina piccola (*Sarteano*) — Parrella blù (*Nap.*) — Cicarella (*Calab.*) — Mancialiva, Mancia-alivi (*Mess.*).

Piemonte : Frequente ovunque e sedentaria in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in aprile ed in giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Nel Basso Piemonte capita più di frequente della precedente specie, annida e spesso fermasi tutto l'anno; al piano però è con-

¹ A proposito della presunta comparsa in Italia della *Cyanistes cyanus* (Pall.) che fu già oggetto di una mia nota (*Avif. Ital.* p. 158), debbo ora aggiungere che, sebbene io non abbia ancora in mano le prove assolute, pare che tale comparsa si sia avverata. Recentemente ebbi positiva assicurazione di ciò dal nob. Francesco del Torre di Cividale (Friuli), il quale ne avrebbe più volte veduto catturate colla Civetta ed il vischio nei pressi di Cividale nell'autunno; anzi mi assicura che alcune vennero prese nell'ottobre 1887 ed una di esse fu tenuta viva in gabbia sino agli ultimi del gennaio 1888 dal signor G. B. Macor, il quale diede allora la libertà a quell'uccelletto, inconsapevole della sua rarità; seppi ciò dal signor Del Torre con lettera dell'11 febbraio 1888. Questo signore era positivo intorno alla specie, e trovandosi egli a Firenze gli feci anche vedere la bella tavola della *C. cyanus* che trovasi nell'opera del Dresser. In data poi del 7 febbraio 1888 ebbi, ancora da Cividale, una lettera del signor B. Mulloni, il quale scrive: « In quanto al *Parus cyanus* dichiaro d'averne presi, ma sono assai rari. » Ritengo dunque probabile che tra non molto potremo accogliere nella avifauna italiana anche questa bellissima specie di Cincia.

siderata uccello raro (*Canusso*). Comune e sedentaria nell'Ossola (*Bazetta*). Così nel distretto di Crodo ed in Valsesia, Novara (*Demori*, *Guarinoni*).

Lombardia: Comune ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune e sedentaria, ma anche di passo in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Frequente al piano ed in collina nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Comunissima in autunno nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarsa, erratica e di passaggio in quella di Vicenza (*Molari*). Frequente di passo in marzo e settembre nel Cadore, Belluno, ove non nidifica (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Piuttosto rara, ma sedentaria nel Friuli, ove sembra essere in diminuzione; nidifica in aprile (*Vallon*, *Del Torre*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima e sedentaria nelle prov. di Ravenna e Bologna; nell'ottobre ne cresce il numero a cagione degli immigranti (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale e frequente nel Nizzardo (*Gal*). Comune e sedentaria nel distretto di Savona; scende col freddo alla marina; alcuni anni è meno abbondante (*Piccone*). Comune in autunno in quello di Arenzano (*Luciani*). Poco frequente e sedentaria, più abbondante d'inverno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Abbondante e sedentaria, ma più scarsa d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune e sedentaria nei distretti di Fauglia e Peccioli, Pisa (*Ott*, *Degli Alessandri*). Scarsa, ma sedentaria nella prov. di Firenze, distretto di Fiesole (*Gargioli*). Abbondante e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Sedentaria, ma non frequente in Val di Chiana, più abbondante di passo (*Griffoli*). Frequente e sedentaria nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di

S. Gimignano (*Paulucci*). Comune e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comunissima e sedentaria in Toscana; nidifica in ammassi di borracina, al centro dei quali depone le uova (*Roster*).

Marche : Piuttosto scarsa (*Paolucci*).

Campania : Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Comune e sedentaria, abbonda in ottobre-novembre ed in aprile (*De Romita*).

Calabrie : Sedentaria, ma poco comune nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Rara, quasi scomparsa, ma sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, sedentaria ed invernale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comune e sedentaria, erratica nell'autunno in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune e sedentaria, nell'autunno scende al piano; abbonda nel Sassarese (*Bonomi*).

165. *Poecile palustris* (Linn. ex Gesn.)

CINCIA BIGIA.

Parus palustris, Salvad.

Testa neira (*Basso-Piem.*) — Parusciolina. Parusciolina grisa, Parusciolin (*Nov.*) — Ciben (*Cremon.*) — Cinciribin senarin (*Rovigo*) — Parússola mora, Parússola montagnóla, Parússola forésta, Cinciribin senarin (*Ven.*) — Parisuetta (*Arenzano*) — Cincina (*Lucca*).

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in aprile ed in giugno (*Abre*). Frequente in quella di Torino, ove, nei boschi delle Cascinette, lungo la Stura ed in quelli dei Correnti a Settimo Torinese ha pur nidificato (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Rarissima e di casuale comparsa lungo i corsi d'acqua nel Basso Piemonte (*C'a-*

musso). Abbondante e sedentaria nel distretto di Crodo (*Demori*); nidifica una o due volte dall'aprile al luglio nella Valsesia (*Guarironi*).

Lombardia : Meno abbondante della precedente, vive al piano e al monte nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Comune e stazionaria in quella di Cremona (*Ferragni*). Generalmente scarsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto : Frequente e nidificante nel Bellunese, alleva due covate in aprile e luglio, e passa in aprile e settembre (*Soravia*). Comune e nidificante ovunque nel Friuli; nel maggio i giovani sono già usciti dal nido (*Vallon, Del Torre*). Poco frequente, ma sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune e sedentaria nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Specialmente autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune e anche sedentaria nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Invernale e poco frequente in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Piuttosto scarsa, ma sedentaria nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Sedentaria nella prov. di Firenze (*Giglioli*); frequente nel distretto di Fiesole (*Gargioli*); piuttosto scarsa in quello di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*). Non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Avuta in novembre nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Poco frequente; cova alla Montagnola Senese (*Dei*); sedentaria in Maremma (*Ademollo*). Sedentaria, ma non abbondante in Toscana; ne osservai un solo nido in Mugello l'8 agosto 1884, che conteneva 5 piccoli (*Roster*).

Marche : Scarsa (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania : Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Sicilia : Rara nella prov. di Messina (*Pistone*).

166. Poecile borealis (Selys Longch.)

CINCIA ALPINA.

Parus borealis, Salvad.

Cincia boreale (*Aut. Ital.*) — Perussola moscona bianchizza, Perussola bianchizha, Perussola piccola (*Cadore*).

Piemonte : Rara assai nell'Ossola, ove ne ebbi un solo esemplare (*Buzetta*).

Veneto : Frequente in montagna, ove nidifica due volte in maggio e giugno, deponendo da 7 a 10 uova bianche con macchie viola, nel Cadore, Belluno, ove sembra essere sedentaria (*Tissi*).

Liguria : Accidentale d'inverno nel Nizzardo (*Gal.*) Rara, negli inverni molto rigidi nel distretto di Spezia e Sarzana; ne ebbe così due esemplari presso Sarzana il prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

167. Poecile lugubris (Natt. in Temm.)

CINCIA DALMATINA.

Parus lugubris, Salvad.

Non ha certamente bisogno di conferma la mia asserzione (*Avif. Ital.* p. 160) circa l'avvenuta cattura nel Nizzardo di un individuo di questa specie; ebbi quell'individuo fresco ancora e di provenienza sicura. Dico questo per rispondere al dubbio espresso in proposito dal Salvadori (*Ucc. ital.* p. 96).

Piemonte : Nella piccola, ma scelta collezione privata del prof. F. Magni-Griffi a Siena è un esemplare di questa specie che egli ebbe in pelle coll'assicurazione che era stata uccisa a Moncalieri (*Carazzi*).

Liguria : Accidentale d'inverno nel Nizzardo (*Gal.*)

168. Lophophanes cristatus (Linn. ex Gesn.)

CINCIA COL CIUFFO.

Perussola col zhuf o fuffo (*Cadore*) — Parussolin foresto (*Padova*) — Lardairoun (*Nizza*).

Piemonte : Ho potuto osservarla una sola volta in prov. di Torino, nelle Alpi Cozie sopra Oulx (*Martorelli*). Nell'Osola non può dirsi comune, ma nemmeno rara; abita e nidifica nei boschi di pini e scende di rado al piano anche nell'inverno (*Bazetta*). Scarsa e sedentaria nel distretto di Crodo (*Demori*); incontrata nelle foreste resinose alle Ferrate di Rimasco, Valsesia, a circa 1200 metri (*Guarinoni*).

Lombardia : Rara in collina (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Scarsa nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentaria nel Cadore, Belluno, ove nidifica nei boschi, ai monti, sui rami o nei cavi degli alberi; depone da 9 a 10 uova bianchiccie ed alleva due covate (*Tissi*). Piuttosto rara nel Friuli e sedentaria ai monti (*Vallon*). Rarissima nella prov. di Padova; ne ebbi una sola nel settembre 1881 (*Arrigoni*).

Liguria : Sedentaria in montagna nel Nizzardo; nell'inverno scende verso il piano (*Gal*). Accidentale nel distretto di Spezia, Genova; anni fa ne ebbe una a Sarzana il prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Campania : Di comparsa accidentale e dubbiosa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Recentemente (*Proc. U. S. National Museum*, XI, 1888, p. 113), anche a proposito di questa specie lo Stejneger ha ritenuto che l'Europa alberghi due forme distinte per diversità di tinta nel colore del dorso e dei fianchi; la prima, che sembra essere propria alla Scandinavia, dovrebbe conservare il nome linneano, la seconda, propria all'Europa centrale ed orientale andrebbe distinta col nome di *Lopho-*

phanes mitratus (C. L. Brehm). Nel caso che una tale diversità fosse confermata è probabile che gli esemplari italiani appartengano alla seconda forma.

SITTIDÆ

(*Picchiotti*).

169. Sitta caesia, Wolf

PICCHIOTTO.

Beghé, Rampeghin, Picunsin, Rampjn, Picatoun (*Basso-Piem.*) — Pichet pantoulon, Gring (*Nov.*) — Picot (*Berg.*) — Picozzin senerin (*Mil.*) — Çui (*Friuli*) — Rampeghin (*Veron.*) — Beccalegn medân, Beccalegn pizhol, Beccalegn curgiós (*Feltre*) — Ciò-Ciò, Rampeghin (*Rovigo*) — Roegantîn, Rovegantîn (*Padova*) — Cià-cià (*Ravenna*) — Brescandalo (*Vergato-Porretta*) — Picúnzetta senein (*Savona*) — Picazo (*Sarzana*) — Picchio muraiuolo (*Pisa*) — Muraiola (*Sarteano*) — Picchio bigio (*Senese*) — Picchio murajolo (*Viterbo*) — Picchio (*Campobasso*) — Pizzica ferru (*Reggio Calab.*).

Piemonte : Frequente e sedentario ovunque in prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta, nel maggio (*Albre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Comune e sedentario nel Basso Piemonte (*Camasso*). Comune e stazionario nell'Ossola (*Bazetta*). Nidifica una sola volta in Valsesia (*Guarinoni*); è scarso e sedentario nel distretto di Crodo, Novara (*Demorì*).

Lombardia: Comune ai monti nella prov. di Sondrio (*Gallì*). Frequente al piano in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Stazionario ma più

abbondante d'estate in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Sedentario e non raro nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Comune e nidificante nel Friuli, ove sembra essere anche sedentario (*Vallon, Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissimo e sedentario nelle prov. di Ravenna e Bologna; nel maggio 1876, ebbi dalle vicinanze di Bologna un individuo albino; era un giovane e fu colto vivente; le parti superiori erano cenerine, ma quelle inferiori bianche (*Bacchi della Lega*). Comune e sedentario nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Vedesi più facilmente in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Sembra essere sedentario nel distretto di Savona, ove è più comune ai monti (*Piccone*). Scarso ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Sedentario, ma non abbondante nella prov. di Lucca (*Martorelli*); raro assai nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Sedentario e molto frequente al piano, meno ai colli, nei distretti di Fauglia e Peccioli, Pisa (*Ott, Degli Alessandri*). Sedentario nella prov. di Firenze (*Giglioli*); scarso nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); frequente in quello di Sesto e Signa (*Fontebuoni*). Frequente e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Sedentario, ma meno comune d'una volta in Val di Chiana (*Griffoli*). Comunissimo e sedentario nei boschi di querce e cerri nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Sedentario e comune ovunque in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune e sedentario (*Comizio agrario Fabriano*).

Lazio : Comune e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Puglie: Sedentario nei boschi (*De Romita*).

Sicilia: Raro, sedentario e di passo in ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Comune e sedentario ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

170. Sitta Whiteheadi, Sharpe

PICCHIOTTO CORSO.

Picchio muratore corso (*Aut. Ital.*).

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi su questa specie nella mia AVIFAUNA ITALICA; nella supposizione che potesse trovarsi anco sugli alti monti della Sardegna feci fare ricerche, ma queste rimasero sinora senza alcun risultato positivo.

171. Sitta Neumayeri, Michah.

PICCHIOTTO RUPESTRE.

Picchio muratore dalmatino (*Aut. Ital.*).

Il Salvadori, non ammettendo che il litorale dalmato faccia parte della sottoregione italica, esclude naturalmente questa specie dal suo recente *Elenco degli uccelli italiani* (Cf. *Op. cit.* p. 97). Io non avrei nulla da aggiungere a quanto ho detto nella mia AVIFAUNA ITALICA in proposito.

CERTHIIDÆ

(Cerzie).

—

172. *Certhia familiaris*, Linn. ex Gesn.

RAMPICHINO ALPESTRE.

Rampignet, Picatin, Rampighin (*Cuneo*) — Pichet d'la rusca, Rampighet (*Nov.*) — Rampeghin piccolo (*Vicen.*) — Beccalégn (*Belluno*) — Beccalén (*Cadore*) — Beccalegnét (*Feltre*).

Piemonte : Nella provincia di Cuneo questa specie scende al piano nell'inverno; d'estate sta in montagna ove non è frequente; nidifica in marzo, allevando una sola covata (*Abre*). Comune e sedentario nell'Ossola (*Bazetta*). In Valsesia questa specie fa una o due covate tra l'aprile ed il luglio (*Guarinoni*); nel territorio di Crodo, Novara. è scarsa, ma sedentaria (*Demori*).

Lombardia : Comunissimo e sedentario sui monti nella prov. di Sondrio (*Galli*).

Veneto : Lo notai molto abbondante nelle Giudicarie, Trentino, durante il 1886 (*A. Bonomi*). Scarso e nidificante nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario nei boschi resinosi di montagna nel Cadore, Belluno; vi nidifica nei fienili o nei cavi degli alberi, depone 4 a 5 uova bianche con macchie rosse ed alleva due covate, la prima in aprile e la seconda nel giugno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*).

Liguria : Rarissimo nel distretto di Spezia: un esemplare, conservato in quel Museo Civico, venne ucciso agli Stagnoni a 2 chilom. da Spezia, il 29 novembre 1881 (*Carazzi*).

173. *Certhia brachydactyla*, C. L. Brehm

RAMPICHINO.

Rampjn, Rampghin, Rampeghin (*Basso-Piem.*) — Rampighin (*Nov.*) — Rampighi (*Berg.*) — Beccalegn piccolo (*Cadore*) — Beccalegnét (*Feltre*) — Roegantin macià (*Padova*) — Rampigin (*Friuli*) — Beccaragni (*Vergato*) — Lecaper-tus (*Nizza*) — Pitta furmigue (*Savona*) — Rampeghin (*Spezia*) — Montarino (*Lucca*) — Picchio rampichino (*Fiesole*) — Raparèn (*Bol. Rav.*) — Rampinello (*Marche*) — Picchio scorzolino (*Viterbo*) — Rre d'aceiji, Nerocca-sipàli (*Calab.*) — Brancicaloru (*Mess.*) — Pizzuddu-tuortu (*Modica*).

Piemonte: Sedentario ma poco frequente al piano nella prov. di Cuneo; vi nidifica una sola volta nel marzo (*Abre*). Così in prov. di Torino (*Gasca, Pezzi*); lo trovai spesso (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte è assai comune, alcuni emigrano, ma molti rimangono l'inverno; il 9 maggio 1886 nei pressi di Voltaggio e precisamente nella località detta « Bosco del Rozzo » rinvenni il caso interessante del collocamento straordinario del nido di una coppia di Rampichini: quel nido era posto in una ripa fra pochi sassi collocati a sostegno della ripa medesima a 45 centim. dal suolo; esso conteneva 4 pulcini di circa 15 giorni di età, i quali vennero ripetutamente osservati sino al giorno in cui abbandonarono il nido (*Camusso*). Più frequente della specie precedente nell'Ossola e più comune e sedentaria al piano (*Bazetta*). In Valsesia questa specie si associa colla precedente e ha gli stessi costumi (*Guarini*); nel distretto di Crodo, Novara, è scarsa e sedentaria (*Demori*).

Lombardia: Meno comune della specie precedente, vive al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso al piano in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Sedentario in quella di Cremona (*Ferragni*).

Comune nella prov. di Mantova, annida ne' fessi dei muri (*Paglia*). Nella Lombardia è frequente (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nel distretto di Caprino, Verona, arriva in primavera e nell'autunno, ma vi è anche sedentario (*Pellegrini*). Nidificante nella prov. di Vicenza (*Molari*); sedentario in collina nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno; fa il nido attaccato alla corteccia degli alberi vecchi, alleva due covate, una nel maggio l'altra nel giugno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Frequente, sedentario e nidificante nel Friuli (*Vallon*); nell'inverno viene nei coltivi nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Poco frequente e sedentario in collina nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune ovunque durante la buona stagione nelle prov. di Ravenna e Bologna, dalle quali emigra nell'inverno (*Bacchi della Lega*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Sedentario nel distretto di Savona e comune; nidifica in collina (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Comune ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario nella prov. di Lucca, ove nidifica assai presto (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune ovunque e sedentario nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in quegli di Lavajano, Ghizzano e Cedri (*Passasogli, Venerosi, Degli Alessandri*). Non abbondante, ma sedentario nella prov. di Firenze (*Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*). Comune e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Così in Val di Chiana (*Griffoli*). Frequente e sedentario nei boschi di querce nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano, ove sembra essere anco di passo autunnale (*Paulucci, Marri*). Comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune e sedentario in Toscana; passa pure in branchetti dalla metà di settembre ai primi d'ottobre; forse sono ni-

diate erranti; fissatosi in una località ed accoppiato questo uccello non se ne scosta (*Roster*).

Marche : Comune e sedentario al piano; nidifica in maggio (*Paolucci*).

Lazio : Frequente e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Minimi*).

Campania : Comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Non comune, ma più frequente al principio dell'autunno ed in primavera (*De Romita*).

Calabrie : Molto scarso ai monti nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Frequente in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Sedentario, ma scarso nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Sedentario, ma scarso nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comune e sedentario, scende al piano d'inverno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo accidentale: due individui vennero uccisi al Castello di S. Michele presso Cagliari, nell'inverno 1887-88 (*Bonomi*).

174. *Tichodroma muraria* (Linn.) (ex Gesn.)

MURAILO.

Rampegghin ross, Pittamon, Pitta-agni, Picatin di bauss (*Basso-Piem.*) — Gratasas. Pic di mur (*Nov.*) — Barbell de corna (*Berg.*) — Ragnàr (*Friuli*) — Ale de fògo (*Padova*) — Osel dall'oyo (*Cadore*) — Osel della Madonna, Beccamur (*Feltre*) — Becamuri (*Vicenza*) — Lecapertus (*Nizza*) — Rampegghin de muaggia (*Savona*) — Pitta muin (*Arenzano*) — Paparagno (*Spezia*) — Uccello muratore (*Isola di Giglio*) — Rampinello coll'ali rosse (*Ancona*) — Pizzicamuru (*Mess.*).

Piemonte : Frequente al monte in prov. di Cuneo, ove nidifica nel maggio, allevando una sola covata; d'inverno scende al piano (*Abre*). In prov. di Torino trovasi in ogni

stagione, ne uccisi uno sulle Alpi Graje a mezzo settembre (*Martorelli*). È abbastanza comune nel Basso Piemonte sui monti dove è stazionario; al piano è di casuale comparsa negli inverni più crudi; annida fra gli spacchi di nude e scoscese roccie (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, vive e nidifica sui monti sino a 1800 metri; nell'inverno scende al piano ed entra nell'abitato (*Bazetta*). Scarso e sedentario nella Valsesia e nel distretto di Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia : Non comune nella prov. di Sondrio, vive sulle rupi e nell'abitato in pianura (*Galli*). Scarso nelle alte montagne nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Invernale e assai raro in quella di Cremona (*Ferragni*). Accidentale nella prov. di Mantova, fu preso a Medole (*Paglia*). Generalmente raro, in montagna, nella Lombardia (*Turati, Borromeo*); nidifica da noi nelle fessure delle roccie, molto in alto in luoghi precipitosi e credo anche sul Duomo di Milano, ove spesso l'ho osservato. Il maschio e la femmina lavorano insieme al nido, e lo costruiscono con radici ed erbe; la femmina depone da 4 a 5 uova (*Turati*).

Veneto : Comune e sedentario sui monti rocciosi nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario ai monti nel Cadore, Belluno; nidifica sulle roccie precipitose e nei buchi dei muri delle chiese; alleva una sola covata (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però è scarso (*Delaito*). Scarso e nidificante ai monti nel Friuli (*Vallon*); frequente in Carnia (*Del Torre*). Poco frequente ai colli nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro in quella di Rovigo; ne uccisi uno a Badia Polesine il 22 ottobre 1877, altri due vennero presi nel settembre 1885 (*Dal Fiume*).

Emilia : Accidentale nell'inverno nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Non comune ed erratico nella prov. di Parma; vedesi più facilmente a Borgotaro (*Del Prato*).

Liguria : Sedentario nel Nizzardo, erratico in autunno e nell'inverno (*Gal*). Di comparsa irregolare nel distretto

di Savona, ove però non è raro (*Piccone*): raro in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Sedentario, ma scarso nella prov. di Lucca. nidifica sugli alti monti (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa ne ho veduto in ottobre al passo e ne ebbi uno nel gennaio 1886 (*Gragnani*). Non comune, ma sedentario nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Non comune, ma sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Scarso e solo nei rigidi inverni vedesi in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Non comune, ma sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Sedentario sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Raro in Toscana: ne ho veduto un solo individuo nel 1882, che si arrampicava in Firenze sulle mura di S. Lorenzo (*Roster*).

Marche: Raro (*Paolucci*).

Campania: Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Raro in febbraio sulle roccie di Anacapri, isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Accidentale; so di due catture una al Gargano nel 1829, citato dal Costa; l'altra a Putignano (*De Romita*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Raro e per quanto mi consta esclusivamente invernale (*Bonomi*).

ORIOOLIDÆ

(*Orioli*).

175. *Oriolus Galbula*, Linn. (ex Gesn.)

RIGOGOLO.

Garbé, Sgarbé, Sgherbé, Gentilòm (*Basso-Piem.*) — Merlo garbel (*Nov.*) — Lurli, Luri (*Friuli*) — Brusola (*Vicenza*) — Miliésa, Brúsola (*Padova*) — Melesia (*Rovigo*) —

Arghébul (*Ravenna*) — Argàib (*Bol.*) — Sgalbeder (*Vergato*) — Auriou (*Nizza*) — Sgarbèò, Garbèò (*Spezia*) — Garbiero (*Gen.*) — Ribobolo (*Pisa*) — Gobulo (*Lucca*) — Gogolo (*Val di Chiana*) — Gregorio (*I. di Giglio*) — Rubbiolo, Galbedro (*Garf.*) — Goro (*Viterbo*) — Gravolo, Ravolo (*Campobasso*) — Vil-lano, Vollarò (*Nap.*) — Galanu, Galinu, Aceddu giallu, Frusuleu, Crusulèò (*Calabr.*) — Rigocoli (*Brindisi*) — Aiula, Auberi, Galberi (*Terran. Sicil.*) — Lauriddiu, Aju l'aguggia cu lu filu (*Modica*) — Aggruppafilu, Naccaluoru (*Castelb.*) — Bicca mortus (*Cagliari*).

Piemonte : Frequente al piano in prov. di Cuneo; vi nidifica nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*); i maschi si riproducono prima di aver assunto l'abito degli adulti: ¹ (*Martorelli*). Nel Basso Piemonte è molto comune nei luoghi montuosi dall'aprile a tutto agosto, talvolta sino alla metà del settembre; al piano s'incontra solo nell'epoca del passo e più in quella autunnale (*Camusso*). Nell'Ossola giunge in maggio, nidifica e parte in settembre; non è comune (*Bazetta*). Così in Valsesia, ove nidifica una sola volta (*Guarinoni*).

Lombardia : Non comune ai monti e al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Estivo e comune nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comune al piano ed in collina nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Abbastanza comune al piano nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); nidificante nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Scarso, nidificante e di passaggio in maggio ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però giunge in aprile ed è frequente (*Delaito*).

¹ Forse a conferma di ciò posso aggiungere che all'arrivo in aprile e maggio si vedono spesso maschi ancora in abito giovanile, ne ebbi uno così, ucciso a Fano il 6 maggio 1887.

Abbastanza frequente nel Friuli; giunge in aprile, nidifica e parte in settembre (*Vallon*); comune ovunque nell'estate nel distretto di Cividale; pare che ritorni ai luoghi ove ha già nidificato, e per vari anni una coppia pose il nido nel mio orto (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Frequente e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune nelle prov. di Ravenna e di Bologna; nella Romagna è specialmente di passaggio in maggio, agosto e settembre, nel Bolognese nidifica (*Bacchi della Lega*). Estivo e nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma; l'8 luglio ebbi i nidiacei (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passaggio in aprile-maggio e nell'autunno, nel Nizzardo (*Gal*). Abbondante nel distretto di Savona, giunge dal principio d'aprile a quello di maggio e dalla metà di agosto a quella di settembre, non sembra nidificare nel distretto (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è comune dalla metà di aprile a quella di maggio, quando giunge in branchetti di 7 od 8; ripassa alla spicciolata in agosto (*Luciani*). Nel distretto di Spezia arriva alla fine di marzo, ma in numero soltanto in maggio: vi nidifica e parte poi al principio d'autunno (*Carazzi*).

Toscana: Giunge nella prov. di Lucca nella seconda metà di aprile o ai primi di maggio, poche coppie vi rimangono a nidificare; parte o ripassa nella prima metà di settembre (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Estivo, più frequente in collina nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso da maggio ad ottobre nei distretti di Lavajano e Peccioli (*Papasogli, Venerosi*). Nella prov. di Firenze è frequente alle due epoche del passo, aprile-maggio e agosto-settembre, ma è anche estivo e nidificante specialmente in collina (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Comune ed estivo al piano nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune d'estate in Val di Chiana, ove nidifica in copia nei boschi (*Griffoli*). Frequente da aprile ad ottobre nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*): così in

quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Estivo, più abbondante all'arrivo in aprile che non in settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*); ne vidi già nel mio orto di Siena il 20 marzo 1863 ed il 18 marzo 1875 (*Dei*). Passa in maggio all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e comunissimo in Toscana, giunge alla metà d'aprile e adulti e giovani partono alla fine di settembre (*Roster*).

Marche: Comune al piano, passa in aprile-maggio ed in agosto (*Paolucci*).

Lazio: Estivo e comune al piano nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Comune, giunge in aprile e parte in settembre od ai primi di ottobre nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sin dalla fine di marzo vedonsi poche doppie di passo, e così in settembre, all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Estivo, giunge in maggio e parte alla fine dell'estate; nidifica sulle Murge (*De Romita*).

Calabrie: Estivo e comune di passo in aprile ed in settembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Abbondante in aprile e maggio in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune, estivo e nidificante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Della-forte, Garofalo*). Giunge dal mare in aprile, rimane qualche giorno e ripassa in settembre nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrana*). Comune in primavera e anco nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Giunge in primavera, ma è dubbioso se nidifichi nell'isola (*Bonomi*).

AMPELIDÆ

(*Ampeli*).

176. *Ampelis Garrulus*, Linn. (ex Gesn.)

BECCOFRUSONE.

Dourin (*Basso-Piem.*) — Frison di fiochet (*Nov.*).

Piemonte : Accidentale; nell'inverno del 1878-79 ne furono catturati alcuni sui pini della villa del conte Torna-forte presso Cuneo (*Abre*). Accidentale nella prov. di Torino (*Gasca*). Nell'inverno 1876 vi fu una comparsa di questa specie nel distretto di Varallo, Novara (*Guarinoni*).

Lombardia : Capita di rado al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di comparsa accidentale nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Di comparsa accidentale nel Friuli; molti ci vennero nel 1876 (*Vallon*). Nel 1872 molti apparvero a Cormons e nei pressi di Cividale e se ne tennero vivi in gabbia; non mangiavano che Ginepro (*Del Torre*). Di comparsa accidentale nella prov. di Padova, ne ebbi un maschio nell'ottobre 1882 a Monselice (*Arrigoni*).

Emilia : Un solo individuo è stato preso nel distretto di Vergato, prov. di Bologna, e fu nel 1867 (*Lorenzini*).

Liguria : Di comparsa accidentale nell'inverno nel distretto di Spezia; il prof. Magni-Griffi n'ebbe qualcuno, ma sempre in dicembre (*Carazzi*).

Toscana : Accidentale d'inverno nella prov. di Firenze: ne conservo uno preso a Marradi (*Avif. Ital.* p. 170), nel febbraio 1873 (*Giglioli*).

Marche : Accidentale (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie : Accidentale affatto; non è ricordata che la cattura notata dal Costa, avvenuta sul Gargano nel 1829 (*De Romita*).

LANIIDÆ

(*Averle*).

177. *Lanius Excubitor*, Linn.

AVERLA MAGGIORE.

Gabiosna d' passage, Furghérion, Furghéra grossa, Frauéra, Gaviurna grôssa, Caiorno lombardo grosso, Gazanétta (*Basso-Piem.*) — Gaviourna ajassera (*Alba*) — Gazeola frizunera (*Berg.*) — Stragazzôun, Gasgetta mornera (*Milano*) — Gascieton (*Lomb.*) — Redestola (*Veron.*) — Regestolon (*Vicenza*) — Reiestola (*Bassano*) — Redéstol falconier (*Feltre*) — Regéstola lóra o falconiéra, Resestola falconiera, Redestolón (*Veneto*) — Farlotta grossa (*Ravenna*) — Buferla grossa (*Bologna*) — Cajorno terragno (*Savona*) — Cajurno loubardo (*Arenzano*) — Gazuèla (*Spezia*) — Verla marina (*Garf.*) — Averlia gazzarina (*Fucecchio*) — Querula (*Napoli*) — Gruara (*Calabr.*) — Tistuni, Testa-grossa (*Terzan. Sicil.*) — Pitigrussa (*Sard.*).

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove appare nei mesi di novembre e dicembre (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*); la trovai comune, isolata od in branchetti di 7 o 8 individui, lungo il Po; fui assicurato da un cacciatore che nidifica sulle Alpi Graie (*Martorelli*). Questa specie nidifica in discreta copia nella pianura di Alessandria e segnatamente nel distretto di Boscomarengo e lungo i fiumi Orba, Bormida, Tanaro e Po; non v' ha confusione col *L. minor*, ed accertai la cosa *in persona* moltissime volte, uccidendo gli adulti in luglio ed agosto, osservandoli in primavera ed estate ed avendone avuto i nidiacei (*Camusso*). Posso asserire che l'Averla maggiore nidifica nella Lomellina; a Sartirana, ove è abbondante, ne allevai

(*Pertusi*). Nell'Ossola giunge in autunno ed in primavera, non è comune, e non mi risulta che vi abbia nidificato (*Bazetta*). Erratica nel distretto di Piedimulera (*Danisi*); rara di passo in primavera in quello di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Scarsa al piano nella prov. di Bergamo, ove sembra però essere nidificante (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Non rara da ottobre a marzo nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Rara al piano ed in collina nella Lombardia, ove però nidifica (*Turati*); frequente (*Borromeo*).

Veneto : Nel Trentino è specie estiva ed anco sedentaria, giacchè non solamente nidifica comunemente nelle nostre alte valli, ma qualcuna rimane l'inverno e l'ho avuta in dicembre (*A. Bonomi*). Abbastanza comune in primavera nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarsa, di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); comune ai monti, ove nidifica, nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Scarsa nel distretto di Feltre, Belluno, ove nidifica tra il maggio ed il giugno, sugli alti pioppi e salci; alleva una sola covata di 5 a 7; fa passaggio in aprile ed agosto; un individuo di questa specie venne ucciso presso Feltre alla fine del novembre 1885 (*Delaito*). Nel Friuli non è rara, e si vede nell'autunno e nell'inverno; non pare vi abbia nidificato (*Valton*); invernale, ma fors'anche sedentaria nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Nella prov. di Padova io la credevo invernale, ma ne ho avute in tutte le stagioni (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Di scarso passaggio in ottobre ogni anno nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Scarsa in autunno nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di comparsa autunnale nel Nizzardo, ove non è comune (*Gal*). Scarsa nel circondario di Savona; confermo che questa specie fa preda di uccelletti; il 17 novembre 1869 una femmina ha ghermito nell'uccelliera uno zimbello d'*Emberizia Cya*, o fu presa (*Piccone*). Rara nel distretto di Arenzano e Cogoleto (*Luciani*). Scarsa e primaverile nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Scarsa in autunno nella prov. di Lucca (*Martorelli*); piuttosto comune nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Nella prov. di Firenze si vede da ottobre a gennaio (*Griglioli*); è scarsa nei distretti di Fucecchio e di Signa (*Lenzi*, *Fontebuoni*). Piuttosto rara d'inverno e nel marzo in Val di Chiana, Arezzo (*Griffoli*). Ebbi un maschio nel 1883 nel distretto di S. Gimignano, Siena, ove è scarsa (*Paulucci*). Non comune in primavera, autunno ed inverno nel Senese (*Dei*); scarsa in novembre e dicembre nella prov. di Grosseto (*Ademollo*). Scarsa ed invernale in Toscana; nel 1883-84 fu abbondantissima, specialmente in Mugello: l'anno dopo scarsa assai (*Roster*).

Marche: Rara; nidifica in giugno e luglio ¹ (*Paolucci*).

Campania: Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Sicilia: Rara nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Rara in autunno nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Di passo autunnale, la notai nel Nuorese (*Bonomi*).

178. *Lanius meridionalis*, Temm.

AVERLA FORESTIERA.

Averla meridionale (*Aut. Ital.*). — Darnega sparvié (*Nizz.*).

A proposito della osservazione che feci intorno alla presunta comparsa di questa specie sul litorale dalmato (*Avif. Ital.* p. 173), l'amico mio prof. G. Kolombatovic¹, mi scrive da Spalato in data del 3 luglio 1886: « Per lo passato tanto in primavera quanto in autunno, ho ucciso il *L. meridionalis*, specie che da qualche anno non riesco più a procurarmi »

Liguria: Capita quasi ogni anno nell'inverno nel Niz-

¹ Sarebbe importante poter comprovare l'asserita nidificazione di questa specie nelle Marche.

zardo (*Gal.*). Accidentale nel distretto di Spezia; l'esemplare posseduto dal prof. Magni-Griffi (*Avif. Ital.* p. 173) e preso nei pressi di Sarzana, sarebbe del maggio 1875 (*Carazzi*).

Marche: Rara assai (*Comizio agrario Fabriano*).

179. *Lanius minor*, J. F. Gmel. (ex Buff.)

AVERLA CENERINA.

Gaviourna grossa (*Alba*) — Gabiosna mesana, Furghéra, Fréghéra, Frauéra, Gaviurna, Gazanétta, Caiurno lombardo (*Basso-Piem.*) — Stragazza, Stragass (*Ossola*) — Gazzott flüval (*Valt.*) — Gazeola frizunera piccola (*Berg.*) — Gascetta del co negher (*Lomb.*) — Regestola falcona (*Vicenza*) — Revest da montagna (*Cadore*) — Redestolón (*Feltre*) — Resestola falconiera (*Rovigo*) — Farlótta duminicàna (*Ravenna*) — Bufferlot (*Bol.*) — Bufferla grossa (*Vergato*) — Cajurno lumbardo o terragno (*Gen.*) — Gazuèla (*Spezia*) — Averla grossa, Averla bigia, Averla gazzina, Averla gazzarina (*Pisa*) — Averla cenerina (*Lucca*) — Averlia bianca (*Fucecchio*) — Velia gazzina (*Fiesole*) — Vastrica (*Val di Chiana*) — Castrocchia (*Sarteano*) — Velia (*S. Gimignano*) — Gaggiot-tola, Verla biancona (*Garf.*) — Castrica palombina (*Viterbo*) — Castrapalomba (*Campobasso*) — Cràstica, Cràstola, Quèrola, Quèrola palommara (*Nap.*) — Caracefalo (*Reggio Calabria*) — Tistazza cinnirina, Tistazza rossa (*Mess.*) — Mulinaru grossu (*Modica*) — Testa grossa cinnirina (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica nel giugno (*Abbr.*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Strettamente estiva e comune nel Basso Piemonte; il 29 agosto 1874 uccisi un maschio giovane di questa specie col becco deforme: le due mandibole erano torte ed incrociate (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, giunge in primavera, nidifica e parte in settembre (*Bazetta*). Nidifica una volta in maggio e giugno nella Valsesia (*Guarini*):

nidifica ed è di passaggio abbondante nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa al piano in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune ed estiva nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Frequente, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarsa e nidificante nel Cadore, Belluno, ove fa passaggio in maggio ed agosto (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove giunge in aprile, ed è frequente (*Delaito*). Frequente nel Friuli; giunge in aprile, nidifica in maggio e parte dai 10 ai 20 ottobre (*Vallon*, *Del Torre*). Frequente ed estiva nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa, ma nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Non comune nelle prov. di Ravenna e di Bologna, ove è stazionaria dall'aprile al settembre; vi nidifica specialmente al piano (*Bacchi della Lega*). Estiva e nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Non abbondante, estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Comune ed estiva nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove giunge in aprile e prima metà di maggio e parte in settembre ed ottobre dopo aver nidificato (*Piccone*). Rara in primavera nel distretto di Arenzano (*Luciani*); così in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Numerosa al piano verso il litorale dalla metà di aprile alla metà di settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Estiva e comune ovunque nel distretto di Fauglia, Pisa; il 20 dicembre 1883, trovandomi a Castiglion della Pescaja, fui meravigliato di vedere in vendita un *L. minor*.¹ preso il giorno prima (*Ott*). Frequente dalla metà di maggio a tutto settembre nel distretto di Lavajano (*Papasogli*). Generalmente frequente da aprile a set-

¹ Secondo ogni probabilità era invece un esemplare del raro *L. meridionalis*.

tembre nella prov. di Firenze (*Gargioli, Fontebuoni*); scarsa nei distretti di Fucecchio e Sesto (*Lenzi, Turchetti, Ginori*). Frequente nel Casentino, Arezzo; giunge in aprile e parte entro la prima metà del settembre (*Beni, Pauer*). Estiva, ma poco frequente in Val di Chiana, ove ne ho ucciso anche in ottobre (*Griffoli*). Estiva nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune da aprile a settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Estiva e comune in Toscana, alleva due covate (*Roster*).

Marche: Estiva e comune; giunge in aprile-maggio, nidifica in giugno e luglio, e parte in agosto-settembre (*Paulucci*).

Lazio: Estiva e comune, parte dal 20 luglio al 10 agosto, nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente ed estiva nel distretto di Ielsi. Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Estiva e nidificante alle Murge, ove è comune (*De Romita*).

Calabrie: Estiva nella prov. di Catanzaro, giunge in aprile e parte in settembre e ottobre (*De Fiore*). Così in quella di Reggio, ove è comune (*Moschella*).

Sicilia: Scarsa, di passo in settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, giunge in aprile e parte in ottobre nel distretto di Modica, Siracusa (*Della-forte, Garofalo*). Sopra un Pruno spinoso nelle vicinanze di un Carubbo ove stazionava una di queste Averte trovai come risultato della sua caccia infilzati 52 insetti, cioè: 12 Ortoteri, 10 Lepidotteri, 30 Coleotteri (*Garofalo*). Abbondante; giunge in aprile-maggio e parte in settembre, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Di scarso passaggio in primavera soltanto, al Capo settentrionale (*Bonomi*).

180. Lanius Collurio, Linn. ex Briss.

AVERLA PICCOLA.

Furghéra, Frèghéra, Frauéra, Caiurno, Gazanétta, Gaviurna (*Basso-Piem.*) — Stragasa peita (*Nov.*) — Gazeola (*Berg.*) — Stragazzetta, Gasgetta (*Mil.*) — Sgarzett, Sgarzetta (*Cremon.*) — Sársacolo (*Veron.*) — Regestola piccola (*Vicenza*) — Revest da campagna (*Cadore*) — Redestól (*Feltre*) — Giàrle fajàne (*Friuli*) — Giarla, Garle, Garlutt (*Cividale*) — Resestola (*Rovigo*) — Gavazùla (*Padova*) — Farlótta buscaróla (*Ravenna*) — Bufferla (*Bologna*) — Bufferla piccola (*Vergato*) — Gazuéla, Gazuéleta (*Spezia*) — Averla piccola (*Pisa, Lucca*) — Averlia rossa (*Fucecchio*) — Velia comune (*Fiesole*) — Castrocchia (*Sarteano*) — Gueja scopina e scopajola (*Senese*) — Ghierla (*Grosseto*) — Capigrosso (*I. di Giglio*) — Verla rossa (*Garf.*) — Castrica asinina (*Viterbo*) — Querula cestaregna, Quèrola, Quèrola cenerina, Quèrola passerègna, il giov. (*Nap.*) — Testa rossa picciridda (*Mess., Modica*) — Testa grossa (*Terran. Sicil.*) — Pitigrussa (*Sard.*) — Pitilongu (*Nuoro*).

Piemonte : Comune al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica nel giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Il 17 agosto 1886 ebbi da Gavi un maschio di questa specie perfettamente bianco, lo donai alla Collezione italiana centrale. Nel Basso Piemonte giunge tardi in primavera, ma è una delle specie estive più comuni; gli adulti scompaiono col luglio, i giovani rimangono sino ad oltre il settembre (*Comusso*). Comune nell'Ossola, vi giunge in primavera, nidifica ed emigra (*Bazetta*). Così in Valsesia e nel distretto di Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia : Comunissima al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo ovunque (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune ed estiva in quella di Cremona (*Ferragni*). Così nella prov. di

Mantova (*Paglia*). Generalmente assai comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune in primavera ed autunno nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno, ove passa in maggio ed agosto (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove giunge in aprile (*Delaito*). Comunissima nel Friuli; giunge in maggio, nidifica e parte alla fine di ottobre; ne ebbi uno, maschio adulto, il 6 dicembre 1885 (*Vallon*); estiva nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova; il 16 dicembre 1886 venne ucciso presso Monselice un maschio giovane di questa specie, e lo conservo nella mia raccolta (*Arrigoni*). Abbondante e nidificante nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comune ed estiva nelle prov. di Ravenna e di Bologna, nidifica ovunque (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio, specialmente in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Abbondante nel distretto di Savona, giunge in aprile e nella prima metà di maggio, nidifica e parte alla fine di agosto od in settembre (*Piscone*); così in quello di Arenzano, ove però è assai più abbondante in primavera che non in autunno (*Luciani*). Frequente di doppio passaggio regolare nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Abbondante dall'aprile alla metà di ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Estiva e ovunque comune nel distretto di Fauglia. Pisa (*Ott*). Frequente da aprile a settembre nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Abbondante nel Casentino, Arezzo, ove giunge in aprile e parte in settembre (*Beni*); trovai un nido con 3 pulcini sul monte della Consuma il 20 agosto (*Pauer*). Estiva e comune in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Assai comune ed estiva nel Senese (*Dei*); non tanto frequente in

Maremma (*Ademollo, Cambi*). Estiva e nidificante all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e più comune della precedente in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune ovunque; nidifica in giugno e luglio (*Paolucci*).

Lazio: Estiva e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo; parte in luglio ed agosto (*Mimmi*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa all'isola di Capri dalla fine di marzo a tutto maggio ed in settembre (*Cerio*).

Puglie: Scarsa assai, ne ebbi un solo esemplare in primavera (*De Romita*).

Calabrie: Piuttosto rara nella prov. di Catanzaro; vedesi alle epoche del passo (*De Fiore*).

Sicilia: Scarsa, di passo in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Estiva, ma non abbondante nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente in aprile e anco nidificante in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Abbondante ed estiva, al piano specialmente, ove nidifica (*Bonomi*).

181. *Lanius auriculatus*, P. L. S. Müll.

AVERLA CAPIROSSA.

Furghéra, Fréghéra, Frauéra, Gaviurna, Gazanétta, Caiurno (*Basso-Piem.*) — Stragasa (*Nov.*) — Gascetta del col ross (*Lomb.*) — Sgarzett, Sgarzetta (*Cremon.*) — Cavazù, Sgarvazù, Regéstola bianca o foresta (*Padova*) — Sàrsacolo dalla testa rossa (*Veron.*) — Regestola rossa (*Vicenza*) — Redestól (*Feltre*) — Resestola da la testa rossa (*Rovigo*) — Gazuéla (*Spezia*) — Averla capirossa (*Pisa, Lucca*) — Capirossa (*Lucca, Fucecchio*) — Vastrica a capo rosso (*Valdich.*) — Gazzina rossa (*Senese*) — Capirossa (*I. di Giglio*) — Castrica (*Viterbo*) — Farlótta da la testa rossa (*Ravenna*) — Bufferla mezzana

(*Vergato*) — Quèrola caparòssa, Quèrula passarègna, il giov. (*Nap.*) — Caracefalo (*Calabr.*) — Testa rossa (*Mess.*) — Mulinaru picciolu (*Modica*) — Carcarazzeddu (*Terran. Sicil.*) — Pitigrussa (*Sard.*) — Pitilongu (*Nuoro*).

Piemonte: Frequente al piano nella prov. di Cuneo, ove nidifica nel giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Estiva e abbondante nel Basso Piemonte, frequenta più i monti (*Camusso*). Non è abbondante nell'Ossola ove giunge in primavera, nidifica ed emigra (*Bazzetta*). Così nella Valsesia e nel distretto di Crodo, Novara (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia: Meno frequente della precedente nella prov. di Sondrio, vive al piano (*Galli*). Di passaggio; pochi nidificano nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Piuttosto rara in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non comune nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente e nidificante nel distretto di Feltre, Belluno, ove giunge in aprile e parte in agosto (*Delaito*). Piuttosto rara nel Friuli ed estiva; parte nella prima metà di ottobre (*Vallon*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rara, ma nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Piuttosto comune dall'aprile al settembre nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove nidifica (*Bacchi della Lega*). Scarsa ed estiva nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio, specialmente in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, giunge in aprile, nidifica e parte in settembre (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove però è più abbondante nella primavera (*Luciani*). Scarsa, ma di passaggio regolare nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Piuttosto scarsa nella prov. di Lucca dalla metà di aprile alla metà di settembre; pochi vi nidificano

(*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune ovunque dai primi di maggio al settembre, nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott. Papasogli*). Estiva, ma poco comune nella prov. di Firenze, passa in aprile-maggio ed agosto-settembre (*Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*). Frequente nel Casentino, Arezzo; giunge in aprile, parte in settembre (*Beni*). Estiva e piuttosto comune in Val di Chiana (*Griffoli*). Estiva nel distretto di S. Gimignano Siena (*Paulucci, Marri*). Comune ed estiva nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e comune in Toscana, ne vidi due uccisi in Mugello il 27 novembre 1884 ed uno dallo stesso luogo ucciso il 17 dicembre 1886 (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, arriva in aprile-maggio, nidifica in giugno e luglio, e parte in agosto-settembre (*Paolucci*).

Lazio: Estiva e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). All'isola di Capri passa dalla fine di marzo ai primi di giugno ed in settembre (*Cerio*).

Puglie: Comune e nidificante al piano ed in collina; da novembre abbondano i giovani (*De Romita*).

Calabrie: Estiva, ma scarsa nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio, ove è comune (*Moschella*).

Sicilia: Comune ed estiva nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante ed estiva in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente in primavera e anche estiva e nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Estiva, abbondante (*Bonomi*).

MUSCICAPIDÆ

(Pigliamosche).

—

182. *Muscicapa collaris*, Bechst.

BALIA.

Ficedula collaris, Salvad.

Alèt (*Bergamo*) — Alett del col bianc (*Lomb.*) — Ciapamusch (*Nov.*) — Favarèto (*Padova*) — Battiale (*Feltre*) — Sarchianaccio (*I. di Giglio*) — Aliuzza (*Lucca*) — Scellavàtto, Scellavàttolo (*Nap.*) — Munachedda di passa (*Castelb.*) — Papamusca (*Sard.*).

Piemonte : Scarsa al monte in prov. di Cuneo, ove però nidifica nel maggio allevando una sola covata (*Abre*). Piuttosto rara; non capita nel Basso Piemonte che di primavera, e fermasi solo pochi giorni. non nidificandovi che rarissimamente (*Camusso*). Nidifica nella Valsesia in maggio, alleva una sola covata, le uova in numero di 5 o 6 sono di color celeste sbiadito (*Guarinoni*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Poco comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati*); nidificante e frequente (*Borromeo*).

Veneto : Piuttosto frequente nel distretto di Feltre, Belluno; giunge in aprile, nidifica in maggio e giugno, allevando due covate di 5 a 7; le uova sono bianco-azzurrognole con macchie di un rosso scuro; parte in agosto (*Delaito*). Secondo notizie assunte sarebbe poco frequente ai colli nella prov. di Padova; io non l'ho mai veduta (*Arrigoni*).

Emilia : Di scarso passaggio ai primi di aprile nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Rara nel Nizzardo (*Gal*). Molto scarsa, ma di passo regolare nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : La ebbi una sola volta in aprile nella prov. di Lucca (*Martorelli*); scarsa di passo in aprile nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Rara nella prov. di Firenze; il 23 agosto 1888, ebbi dal signor Gargioli un esemplare assai interessante di questa specie, preso quella mattina a Fiesole. Per lo sviluppo dei testicoli era un maschio adulto, eppure sulla testa e sul dorso, il nero era rimpiazzato da un cenerino scuro e non v'era traccia del bianco sulla fronte, mentre sulla nuca e sul dietro del collo il collare caratteristico appariva nettamente segnato dalla tinta più chiara del cenerino; il bianco delle parti inferiori non era puro. Dubito che questo sia un abito autunnale dell'adulto, che sembra essere assunto anche dalla specie seguente, e che somiglia assai a quello del giovane e della femmina (*Giglioli*). Estiva, ma non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Accidentale affatto in Val di Chiana (*Griffoli*). Rara assai in aprile nel Senese (*Dei*); estiva in Maremma (*Ademollo*); così nell'isola di Giglio (*Bianchi*). Rara in Toscana (*Roster*).

Marche : Piuttosto frequente al piano (*Paolucci*).

Campania : Di scarso passo in aprile nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). All'isola di Capri passa dalla fine di marzo alla metà di maggio (*Cerio*).

Puglie : Non frequente e scarsi assai gli adulti; più facilmente vedonsi i giovani alla fine dell'estate ed in autunno (*De Romita*).

Calabrie : Molto scarsa in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Rara, di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, giunge in aprile e parte in agosto; nell'aprile 1881 comparve in numero straordinario, nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Non rara al piano alla fine d'aprile nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo accidentale in primavera; ne ebbi un solo (*Bonomi*).

183. Muscicapa Atricapilla, Linn. (ex Aldrov.)

BALIA NERA.

Ficedula atricapilla, Salvad.

Alèt nigher (*Bergamo*) — Bati-ale negrisòl (*Veron.*) — Favaréto, Becafigo foresto (*Padova*) — Sbattiae (*Arenzano*) — Aliuzza (*Lucca*) — Beccamosche (*Valdich.*) — Sgolacchio (*Marche*) — Scellavàtto. Scellavàttolo (*Nap.*) — Acchiappamuschi (*Mess.*) — Monachedda (*Modica*).

Piemonte: Scarsa al monte in prov. di Cuneo; vi nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Abres*). Così in quella di Torino (*Gasca*); numerosa in aprile e settembre (*Martorelli*). Rara di passo primaverile nel Basso Piemonte, ben di rado rimane a nidificare (*Camusso*). Nidifica nella Valsesia, una sola volta nel maggio (*Guarimoni*).

Lombardia: Comunissima ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di passaggio regolare in aprile e maggio, non osservata al ripasso, nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Comune nella Lombardia (*Turati*); scarsa (*Borromeo*).

Veneto: Non rara nel distretto di Caprino. Verona, di passo in aprile e maggio (*Pellegrini*). Frequente nel Bellunese, ove nidifica una sola volta, nel maggio, e passa in marzo ed ottobre (*Soravia*). Estiva e piuttosto comune nel Friuli; nidifica nel maggio e nel giugno, giunge alla fine di marzo e parte nel settembre (*Vallon*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Rara nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Non rara ed estiva nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarsa nel distretto di Savona, giunge in aprile e sino alla metà di maggio, nidifica e parte sul finire di agosto od in settembre (*Piccone*). Comune in aprile e maggio

nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Abbastanza frequente e di passo regolare nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Assai comune in aprile e settembre nella provincia di Lucca, ma in autunno non vidi che giovani ¹ (*Martorelli*); scarsa ai primi di maggio nel distretto di Massarosa (*Fontebuoni, Gragnani*). Scarsa nella prov. di Firenze, distretti di Fiesole e Signa (*Gargioli, Fontebuoni*); io però ne ho veduto più volte in aprile sugli alberi del Viale dei Colli, Firenze (*Giglioli*). Estiva, ma non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini*). Piuttosto comune di passo in aprile, mai veduta in autunno in Val di Chiana (*Griffoli*). Estiva e comune in Toscana, nidifica in coppia nel Mugello; parte alle prime piogge autunnali (*Roster*).

Marche: Scarsa (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Non frequente, scarsi gli adulti e più abbondanti i giovani alla fine dell'estate ed in autunno (*De Romita*).

Sicilia: Rara, di passo in aprile-maggio, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, giunge in aprile e parte in agosto nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Di passo in aprile in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

184. *Erythrosterna parva* (Bechst.)

PIGLIAMOSCHE PETTIROSSO.

Lombardia: Nella raccolta ornitologica del Museo Civico di Milano, ho veduto un esemplare maschio di questa specie, che venne preso a Somma (Lombardia): il cartellino

¹ Non sono alieno dal credere che in questa e nella specie precedente gli adulti in autunno possano rivestire un abito simile a quello dei giovani, le ali e la coda rimanendo neri; anche in primavera vedonsi giovani i quali non hanno pienamente raggiunto l'abito nuziale (se così è) degli adulti.

non porta indicazioni di data ed ha il numero di Catalogo 2978 (*Giglioli*). Di comparsa accidentale (*Turati, Borromeo*).

Liguria: Il prof. F. Magni-Griffi ebbe un maschio ed una femmina di questa specie, catturati a Savona nel 1852, egli li cedette a Paolo Savie e si conservano tuttora nel Museo Zoologico della R. Università di Pisa. Debbo all' amico prof. Carazzi questa notizia precisata, ¹ essendomi sfuggita la menzione del fatto che si trova nell' opera postuma del Savi; *Orn. Ital.* II, p. 12. FIRENZE, 1874 (*Giglioli*).

185. Butalis Grisola (Linn.) (ex Aldrov.)

PIGLIAMOSCHE.

Muscicapa grisola, Salvad.

Cicheich (*Basso-Piem.*) — Alètu (*Berg.*) — Grugnett (*Lomb.*) — Schasseàlis (*Friuli*) — Machèt (*Feltre*) — Grisetò, Canèto, Risaròlo (*Padova*) — Parpaiol (*Bol.*) — Bazanà (*Arenzano*) — Ciappa mosche (*Gen.*) — Pigliamosche (*Pisa*) — Beccamosche (*Fiesole*) — Chiappamosche (*Casentino*) — Beccamosche (*Valdich.*) — Siccio (*Lucca*) — Pilusa (*Calabr.*) — Muscalureddu, Carcarazzedda (*Mess.*) — Appappa-muschi (*Castelb.*) — Papamusca (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta, nel maggio (*Abre*). Frequente e nidificante in quella di Torino (*Gasca*). Specie abbastanza comune nel Basso Piemonte; in pianura vedesi più facilmente in primavera, in montagna durante il passo autunnale; non rimane a nidificare (*Camusso*).

Lombardia: Di passaggio nella prov. di Como: i primi giungono al principio di settembre, gli ultimi ai primi di ottobre (*Regazzoni, Bernasconi*). Scarso nella prov. di Ber-

¹ D. CARAZZI, *Avifauna della Spezia e della Val di Magra*, p. 33, nota SPEZIA, 1887.

gamo (*Stefanini*). Estivo e comune in quella di Cremona (*Ferragui*). Piuttosto raro nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comunissimo nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Scarso e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); nidificante nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Scarso, ma nidificante nel distretto di Feltre. Belluno, ove giunge in aprile e parte in agosto (*Delaito*). Molto frequente, ma localizzato nel Friuli: giunge in aprile, nidifica in maggio e parte in ottobre (*Vallon*). Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Comune, specialmente nel passo autunnale, nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove giunge in aprile, nidifica e parte in settembre (*Piccone*). Comune in aprile e maggio in quella di Arenzano (*Luciani*). Scarso, ma di passo regolare in maggio e settembre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comunissimo nella prov. di Lucca, ove giunge in aprile e parte alla metà di settembre (*Martorelli*, *Gragnani*). Estivo e scarso nel distretto di Lari, Pisa (*Papasogli*). Frequente ed estivo nel distretto di Fiesole, Firenze (*Gargioli*); scarso in quello di Sesto e Signa (*Fontebuoni*). Estivo, ma non frequente nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune di solo passo in aprile-maggio in Val di Chiana; mai veduto nell'autunno (*Griffoli*). Avuto in agosto e settembre nel Senese (*Dei*); estivo in Maremma (*Dei*, *Cambi*). Estivo e comune in Toscana, nidifica ai monti allevando due covate di 4 piccoli (*Roster*).

Marche: Comune al piano, nidifica nel giugno (*Paolucci*).

Campania: Scarso, di passo nella prima metà di aprile nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*). All'isola di Capri passa dalla fine di marzo a quella di maggio (*Cerio*).

Puglie: Non scarsa dal novembre a tutto aprile (*De Romita*).

Calabrie: Autunnale nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Non comune, di passo in aprile-maggio nella

prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso in aprile nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune, giunge in primavera e parte nell'autunno (*Bonomi*).

HIRUNDINIDÆ

(*Rondini*).

186. Hirundo rustica, Linn. ex Frisch.

ROUNDINE.

Rondanina, Rondola, Rondaninn-a (*Basso-Piem.*) — Rondena (*Berg.*) — Zhisila (*Feltre*) — Zhiliga, Zhiria (*Cadore*) — Sisila, Çisile, Rondinèle (*Friuli*) — Rondine, Rondina (*Padova*) — Rondenina (*Rovigo*) — Rundanèna da la furzella (*Ravenna*) — Ciseu (*Nizza*) — Rondanina (*Spezia*) — Rondanin (*Gen.*) — Rondine reale (*Pisa*) — Rondine vera (*Firenze*) — Rondinella (*I. di Giglio*) — Rondine rossa (*Marche*) — Rondinella (*Viterbo*) — Renninella (*Campobasso*) — Remmenèlla tagliafuorfece (*Nap.*) — Ndalandishia (*Albanesi italiani*) — Rindine, Lindaneja (*Calabr.*) — Martiduzzu (*Lentini*) — Rinninedda (*Modica, Palermo*).

Piemonte : Abbonda nella prov. di Cuneo al piano ed alleva due covate, la prima in maggio, la seconda in giugno. Nei primi giorni di ottobre 1885, come al solito partirono tutte le Rondini; ma il 27 di quel mese fui ben sorpreso vedendo quasi tutti gli ornati e cornici del palazzo provinciale di Cuneo, nonchè tutti i fili telegrafici delle adiacenze coperti di Rondini, potevano essere qualche migliaio. Il tempo era bellissimo nè minacciava bufera: il giorno dopo erano tutte scomparse. L'albinismo è frequente in questa specie; nel giugno 1883 al cotonificio del signor Pirinoli alla

Prata di Bovis, Cuneo, ne esisteva un nido con quattro pulcini tutti albi, e gli ebbi io stesso a preparare (*Abre*). Assai comune nella prov. di Torino, vi arriva verso il 20 marzo, dopo il Balestruccio, e parte prima di quella specie (*Gasca, Martorelli*): ne vidi una tutta nera e due completamente bianche (*Gasca*). Comune nel Basso Piemonte; i primi giungono verso la metà d'aprile, la massa entro la prima quindicina del maggio; partono dalla fine di agosto a tutto settembre (*Camusso*). Comunissima nell'Ossola da marzo a settembre (*Bazetta*). Così nei distretti di Varallo, Crodo e Piedimulera, Novara (*Guarinoni, Demori, Danisi*); nella Vallesia fa due e talvolta tre covate (*Guarinoni*).

Lombardia: Comunissima al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Estiva ed abbondante in quella di Cremona (*Ferragni*). Così nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Ho notato un costante antagonismo tra questa specie e la *Chelidon urbica*; questa, che giunge qualche giorno dopo la Rondine, la disturba in modo da costringerla spesso ad andarsene; ho osservato che dove abbonda la prima manca la seconda, e viceversa (*A. Bonomi*). Comunissima nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Abbondante, nidificante e di passaggio in aprile ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, che lascia però in settembre (*Delaito*). Abbondante nel Friuli; le prime giungono alla fine di marzo; dopo allevata la seconda covata si riuniscono all'aperta campagna e partono agli ultimi di agosto (*Vallon, Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Assai comune nelle prov. di Ravenna e Bologna. giunge in marzo e parte in settembre (*Bacchi della Lega*). Comune nel distretto di Vergato, Bologna; arriva in marzo, fa due covate e parte in settembre (*Lorenzini*). Estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estiva nel Nizzardo, ove pare essere meno abbondante del Balestruccio (*Gal*). Comune ed estiva nel distretto di Savona, arriva dalla metà di marzo alla metà di aprile, parte in settembre; ne ho veduto il 12 novembre 1874 (*Piccone*). Così in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente nel distretto di Spezia dall'ultima diecina di marzo alla prima metà di ottobre; ai primi del dicembre 1886, ne ebbi una viva (*Carazzi*).

Toscana: Comune ed estiva nella prov. di Lucca, giunge verso il 20 marzo ed è raro vederne ancora ai primi d'ottobre (*Martorelli, Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa si vedono già in febbraio (*Gragnani*). Estiva e comune nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*); ne uccisi una agli ultimi del novembre 1880 (*Ott*); i primi arrivi nella seconda metà di marzo, le ultime partenze alla fine di ottobre (*Papasogli*). Comune ed estiva nella prov. di Firenze, i primi giungono nella prima metà di marzo, gli ultimi partono in ottobre (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Abbondante nel Casentino, Arezzo; giunge in marzo, parte in ottobre (*Beni, Fiorini, Pauer*). Estiva e comunissima in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*): ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Abbondante dal marzo al settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Abbondante di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comunissima ed estiva in Toscana, giunge solitamente tra il 18 e 20 marzo e parte alla metà di ottobre (*Roster*).

Marche: Comune al piano, giunge in marzo-maggio, parte in settembre-ottobre (*Paolucci*).

Lazio: Estiva e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sparsa nel distretto di Ielsi, Campobasso; giunge nella prima metà di aprile e parte in settembre (*D'Amico*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Di solo passo all'isola di Capri, nel marzo ed in settembre-ottobre; nessuna vi nidifica (*Cerio*).

Puglie : Comune e nidificante, arriva alla fine di marzo e parte in settembre (*De Romita*).

Calabrie : Comunissima da marzo ad ottobre nella prov. di Catanzaro; qualcuna sverna' (*De Fiore*). Estiva e comune nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Comune ed estiva, passa dalla metà di marzo a quella di maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini. Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica, ove giunge alla metà di marzo e parte alla metà di ottobre (*Dellafonte, Garofalo*). Nel maggio 1874, colta una Rondine in cova che aveva il nido nelle pareti del Cisternone del R. Istituto Tecnico di Modica, le venne assicurata al piede una listarella di cuoio; rilasciata, essa riprese tosto le cure materne e alla fine dell'estate partì. Ricomparve nel medesimo luogo nell'aprile 1875 e ancora nel maggio 1876, covandovi di nuovo; poi non si vide più (*Garofalo*). Nel distretto di Terranova, Caltanissetta, è comune ed estiva; le prime giungono ai primi di marzo e anche in febbraio, la massa parte nella prima metà di agosto, se ne vedono però di transito nel settembre (*Carvana*). Estiva e comune nel distretto delle Madonie. Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comunissima, giunge in marzo-aprile e parte in settembre; ho notato non pochi casi d'individui rimasti nell'inverno; ¹ ebbi esemplari albini ed isabellini (*Bonomi*).

187. *Hirundo rufula*, Temm.

RONDINE FORESTIERA.

Rondine collo giallo (*Aut. Ital.*) — Rinnina monica, Rinnina furastera, Rinnina svara (*Mess.*).

Piemonte : Rare volte qualche individuo di questa specie giunge nella prov. di Alessandria, insieme colla Rondine comune (*Camusso*).

¹ Osservazione che andrebbe accuratamente controllata.

Veneto : Di dubbiosa comparsa nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

— **Liguria** : Di comparsa accidentale in primavera nel Nizzardo (*Gal.*). Rara nel distretto di Arenzano e Cogoleto. Genova, ove si vede in aprile e maggio (*Luciani*). Rarissima nel distretto di Spezia, ne ebbe una anni sono il prof. Magni-Griffi, la uccise sul filo del telegrafo presso il ponte di Magra (*Carazzi*).

Toscana : Accidentale nella prov. di Firenze, ne uccisi una (*Fontebuoni*); il 25 marzo 1877 ne vidi volare una sull'Arno entro Firenze, *Arif. Ital.* p. 185 (*Griglioli*). Rarissima in Toscana, ne vidi una sola presso Romena, Casentino, nel luglio 1883 (*Roster*).

Campania : Accidentale nella prov. di Napoli; una venne uccisa nell'aprile 1885 (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Scarsa, ma di passaggio regolare in primavera, dalla fine di marzo ai primi di maggio (*De Romita*).

Sicilia : Rara, s'incontra sul litorale a levante nella prov. di Messina, da marzo a maggio (*Ruggeri, Pistone*). Rara, veduta due volte in settembre in branchi della *H. rustica* nel distretto delle Madonie. Palermo (*Palumbo, Morici*).

188. *Chelidon urbica* (Linn. ex Frisch.)

BALESTRUCCIO.

Racaurin (*Alba*) — Roundanina, Cul bianch, Cubianc, Cubianchin, Cugianco d'aia (*Basso-Piem.*) — Dardanel, Roundon sasserö, Roundon sassareu (*Nor.*) — Dardì (*Berg.*) — Darden (*Mil.*) — Capriolo, Dardaro (*Ven.*) — Ciprioto (*Véron.*) — Rondina dal cu bianch (*Padov.*) — Rondolèt, Rondolèt dal cul bianch (*Feltre*) — Rondul, Cisilin (*Friuli*) — Rundanèna (*Bol.*) — Rondic (*Vergato*) — Arendoula (*Nizza*) — Cùo gianco (*Spezia*) — Rondinino (*Pisa*) — Rondine bianca (*Ancona*) — Rondinella (*Viterbo*) — Rondine, Linda-neja (*Calabr.*) — Martiduzzu (*Mess.*) — Riminedda (*Lentini*).

— Marzunieddu (*Modica*) — Rinninedda, Rinnina, Martidduzzu (*Terran. Sicil.*) — Culubiancu (*Sard.*).

Piemonte: Frequente, alleva due covate, in maggio e giugno al piano in prov. di Cuneo (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*); ne ebbero due di color isabella (*Gasca*). Quest'anno (1887), per tutto l'abitato di Voltaggio e per un raggio di circa tre chilometri all'intorno, non si rinvenne un solo Balestruccio; fatto notevole giacchè è specie estiva comune nel Basso Piemonte, giungendovi qualche giorno dopo la *H. rustica* e protraendo anche la sua partenza di qualche giorno: usualmente ne aumenta assai il numero all'epoca della migrazione autunnale (*Camusso*). Comunissimo nell'Ossola da marzo a settembre (*Bazetta*). Così nei distretti di Varallo, Crodo e Piedimulera, Novara (*Guarinoni, Demori, Danisi*); alleva due covate nella Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia: Comunissimo, specialmente al monte nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Estivo ed abbondante in quella di Cremona (*Ferragni*). Così nella provincia di Mantova (*Paylia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune assai nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Abbondante, nidificante e di passo in marzo ed agosto nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, da dove parte in settembre (*Delaito*). Comune nel Friuli; giunge agli ultimi di marzo od ai primi d'aprile, nidifica due volte e parte in ottobre (*Vallon, Del Torre*). Comunissimo nella prov. di Padova; il 25 settembre 1886, uccisi io stesso a Monselice un individuo ibrido tra questa specie e la Rondine comune (*Arrigoni*). Frequente ed estivo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Abbondantissimo dal marzo all'ottobre nelle prov. di Ravenna e Bologna, malgrado le stragi che se ne fa (*Bacchi della Lega*). Comune ed estivo nel distretto di Ver-

gato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo ed abundantissimo nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove giunge dalla metà di marzo alla metà di aprile e parte in settembre (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è pure specie estiva e di doppio passaggio, ma da due anni circa nella città di Arenzano ha cessato di nidificare e ciò in seguito alla continua persecuzione dei ragazzi i quali a colpi di pietre distruggevano i nidi appena fatti; va pure rammentato che una casa ove nidificavano in abbondanza fu distrutta. Qualche anno fa io vidi un Balestruccio in Arenzano il 7 gennaio (*Luciani*). Frequente nel distretto di Spezia; i primi si vedono subito dopo la metà di marzo, ma la massa giunge circa un mese dopo; il 20 gennaio 1886 e nei giorni successivi fu veduto entro Spezia un individuo di questa specie (*Carazzi*).

Toscana: Comune ed estivo nella prov. di Lucca; giunge ai primi di marzo in scarso numero, la massa nella seconda metà di quel mese; con altre Rondini si trattiene sui paduli qualche giorno; parte entro la prima metà di ottobre, eccezionalmente vedonsene qualcuno in novembre inoltrato (*Martorelli, Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa se ne vedono già in febbraio (*Gragnani*). Estivo e comune nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa: i primi arrivi ai primi di marzo, la massa in aprile, le ultime partenze in ottobre (*Ott. Papasogli*). Assai frequente ed estivo nella prov. di Firenze, i primi giungono, e gli ultimi partono qualche giorno dopo le Rondini (*Leoni, Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*). Abbondante nel Casentino, Arezzo; giunge in marzo, parte in ottobre (*Beni, Fiorini, Pauer*). Estivo e comunissimo in Val di Chiana; presso Cortona ne ho veduto volare uno in gennaio¹ (*Griffoli*). Estivo e frequente nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Pautucci, Marri*). Estivo ed abundantissimo, arriva e parte un poco dopo la Rondine nelle prov. di Siena e di Grosseto

¹ Non è improbabile che fosse invece una *Cotile rupestris*.

(*Del. Ademollo, Cambi*). Di passo abbondante all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e comunissimo in Toscana, spesso ritarda all'arrivo, ma più spesso protrae la partenza sino ai primi di novembre e anche più tardi (*Roster*).

Marche: Estivo e comune ovunque; arriva in marzo-maggio, nidifica in maggio e giugno, e parte in settembre-ottobre (*Paolucci*).

Lazio: Comune ed estivo nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comune ed estivo, ma meno abbondante dell'*H. rustica*; nidifica in città (*De Romita*).

Calabrie: Comunissimo da marzo ad ottobre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Estivo ed abbondante, passa da marzo a maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica, dalla metà di marzo a quella di ottobre (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante ed estivo, vive anche a colonie numerose sotto gli archi di alti ponti sopra i fiumi nel distretto di Terranova, Caltanissetta; giunge alla metà di marzo e parte nella seconda metà di agosto (*Carrana*). Frequente ed estivo nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comunissimo, giunge in primavera e parte in settembre, alcuni anche alla fine di ottobre (*Bonomi*).

189. *Chelidon cashmiriensis*, Gould

BALESTRUCCIO DEL CASHMIR.

Mi dispiace che le differenze palesi nel confronto con individui del Balestruccio comune e che mi hanno condotto a considerare come *C. cashmiriensis* un Balestruccio ucciso dal mio amico signor Dante A. Roster al Poggio Imperiale, Firenze, il 13 ottobre 1885, sembrano al Salvadori (*Ucc.*

ital. p. 81) « troppo poco caratteristiche »; esse sono però appunto quelle che caratterizzano la *C. cashmiriensis*. Onde mantengo quanto scrissi in proposito (*Avif. Ital.* p. 187). Aggiungo che il Salvadori, il quale crede che l'esemplare suddetto si possa considerare siccome « una varietà minore accidentale del Balestruccio ordinario », non lo ha veduto. Naturalmente egli non accoglie la *C. cashmiriensis* tra le specie avventizie in Italia.

190. *Clivicola riparia* (Linn. ex Gesn.)

TOPINO.

Cótile riparia, Salvad.

Cubbianch d'eva, Cubiane d'riva, Rivaréu. Cugianco de riva (*Basso-Piem.*) — Rondenì (*Berg.*) — Caltaren (*Cremona*) — Rondin d'acqua (*Vicenza*) — Rundanéna d'fion (*Ravenna*) — Rivaról (*Bologna*) — Frattin (*Arenzano*) — Balestruccio bigio (*Pisa*) — Balestruccio (*Lucca*) — Bigino (*Fucecchio*) — Occhi di Pulce (*Sesto fiorentino*) — Remmenèlla (*Nap.*) — Rinnina suricina, Monacedda (*Mess.*) — Rundili de a' riu (*Sard.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, ove alleva una sola covata, in maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*). Cacciando lungo il Po presso Carignano nella prov. di Torino nella prima metà di aprile 1885, potei osservare una colonia di alcune migliaia di Topini, nidificanti. Il Po in quel tratto del suo corso è strettamente chiuso dalle ripe verticali che continuamente logora colla forza grandissima della corrente; la ripa sinistra a poca distanza dal su nominato paese raggiunge per breve tratto un'altezza di circa 10 metri, ed è formata da terreno che assai facilmente frana; in questa ripa sono i numerosi fori in cui annidano queste Rondini, ed ove vivono al sicuro (*Martorelli*). Piuttosto raro in prov. di Alessandria ove giunge dopo il Balestruccio e parte alla fine di ottobre (*Camusso*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Estivo e abbondante in quella di Cremona (*Ferragni*). Abbondante nella buona stagione, nidifica negli argini e nelle ripe nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Veduto una sola volta nel Friuli, il 9 maggio 1884 (*Vallon*); scarso nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comunissimo nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Frequente dal marzo all'ottobre e nidificante nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Nel Nizzardo è più frequente durante la migrazione autunnale (*Gal*). Scarso al passo nel distretto di Savona, ove non so se soggiorna, vedesi più facilmente in primavera frammisto ai Balestrucci (*Piccone*). Comune di passo in primavera ed in autunno a tutto novembre nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarso nel distretto di Spezia, più frequente nella Val di Magra (*Carazzi*).

Toscana: Nella prov. di Lucca giunge abbondante alla metà di marzo, parte e ripassa nella prima quindicina di ottobre: non lo trovai nidificante (*Martorelli*); vedonsene anche in febbraio nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Assai comune al piano all'epoca del passo in aprile nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Nella prov. di Firenze è assai meno frequente, come specie estiva, che il Balestruccio, ma si vede in abbondanza alle epoche del passo, specialmente in primavera (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*); nidifica nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*). Non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Estivo e comune nelle colmate in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo ed abbondante nella prov. di Grosseto, nidifica a colonie lungo l'Ombrone e la Bruna (*Ademollo*). Comune ed estivo; credo sia l'ultima specie che giunge da noi (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Puglie: Di passo poco abbondante in primavera (*De Romita*).

Sicilia: Comune nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Estivo e nidificante, ma un poco irregolare nelle sue comparse; ne presi a Porto Torres e presso Cagliari in agosto e settembre, quando si riuniscono in masse per la partenza (*Bonomi*).

191. *Cotile rupestris* (Scop.)

RONDINE MONTANA.

Biblis rupestris, Salvad.

Cubiane d'riva, Rocareù, Cubiane d'roca (*Basso-Piem.*) — Sassareul d'montagna (*Nor.*) — Tartagin, Rondin de monte (*Vicenza*) — Rondol (*Belluno*) — Rondol da croda (*Cadore*) — Tartagin, Rondin (*Padova*) — Rondolèt griso, Rondolèt da croda (*Feltre*) — Rondine (*Lucca*) — Rondine d'inverno (*I. di Giglio*) — Rondine grottara (*Viterbo*) — Lindaneja di muntagna (*Calabr.*) — Nivalora, Nivaloreda. Monacedda (*Mess.*) — Rinnina d'inviernu, Martidduzzu (*Modica*) — Arrundili de a' roca (*Sard.*).

Piemonte: Frequente in montagna nella prov. di Cuneo; vi nidifica nel giugno allevando una sola covata (*Abbr.*). Trovata sulle Alpi di Lanzo e di Gressoney, ove forma due piccole colonie, in luglio, agosto e settembre (*Martorelli*). Le poche coppie le quali nidificano ne' monti presso Voltaggio, Alessandria, scompaiono colle altre Rondini al principio dell'autunno; giunge tardi e tutti partono verso la fine di ottobre (*Camusso*). Comune da marzo a settembre nell'Ossola, nidifica nelle scogliere (*Bazetta*). Abbondantissima e sedentaria nel distretto di Crodo. Novara (*Demori*).

Lombardia: Rara nella prov. di Mantova, fu presa a Castelgoffredo (*Paglia*). Scarsa ai monti nella Lombardia (*Turati*); comune (*Borromeo*).

Veneto: Comune ai monti nel distretto di Caprino. Verona; è la prima Rondine che si vede e giunge al 20 marzo

(*Pellegrini*). Scarsa, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentaria nel Cadore, Belluno (*Tissi*); nel distretto di Feltre è scarsa e trovasi ai monti dal marzo all'agosto, non essendovi sedentaria (*Delaito*). Veduta sulle rupi di Prestento nel Friuli (*Del Torre*). Di passaggio irregolare nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Nel distretto di Vergato (Bologna), nidifica sugli alti monti, donde sul finire dell'estate scende in branchi numerosissimi: se allora un temporale li sorprende, si fermano aggruppati insieme come uno sciame di api, sotto le grondaie o sopra un albero, e allora facilmente si prendono (*Lorenzini*).

Liguria: Sedentaria ed abbondante nel Nizzardo, nidifica sugli alti monti e nell'autunno scende al piano (*Gal*). Sedentaria e comune nel distretto di Arenzano e Cogoleto (Genova), ove è anche di passo in febbraio e marzo ed in agosto e settembre (*Luciani*). Scarsa lungo la Magra nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Ne trovai una numerosa colonia presso Galliciano nella Garfagnana, ove nelle buone annate rimangono sino al novembre per tornarvi nel marzo (*Martorelli*). Non comune di passo in ottobre e d'inverno al piano nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Ne ebbi una dalla Maremma (*Dei*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*).

Marche: Scarsa (*Comizio agrario Fabriano*). Questa specie è sedentaria e nidificante nelle montagne del Furlo, Urbino (*Carpegna*).

Lazio: Nidifica nelle grotte sui monti nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Sedentaria all'isola di Capri, nidifica tra le rupi a picco sul mare e vi rimane l'inverno; è la sola Rondine che nidifica nell'isola (*Cerio*).

Calabrie: Non molto comune nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune; nidifica ai monti nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente ai monti e abbondante dal dicembre al marzo, nel distretto di Modica, Siracusa,

ove nel febbraio 1886 comparve in grandi colonne e se ne fece caccia abbondantissima; essendo molto grasse erano assai apprezzate (*Dellafonte, Garofalo*). Frequente e sedentaria ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentaria, vive nei luoghi alpestri ed è specialmente abbondante nelle rupi a picco sopra il mare, così ai Capi Carbonara, Spartivento, Caccia ecc. ecc.: scende anco alle valli lungo i fiumi (*Bonomi*).

192. *Cotile obsoleta*, Cab.

RONDINE MONTANA MINORE.

Biblis obsoleta, Salvad.

Ho dato in modo ampio le ragioni che m'indussero ad includere questa specie tra quelle che capitano accidentalmente in Italia (*Avif. Ital.* p. 190); esposi pure in modo chiaro i dubbii che vi sono intorno ai due esemplari supposti catturati in Toscana e conservati nel Museo di Firenze; non ho nulla da aggiungere in proposito. Dirò inoltre che non fui molto sorpreso dal vedere questa specie scartata dal Salvadori, il quale sembra essere sotto la impressione che io ammetto con troppa facilità e con deboli o fallaci argomenti specie avventizie nell'avifauna italiana; ciò non è esatto giacchè ho sempre esposto i dubbii che potevano circondare la provenienza di tali esemplari. Concludo chiedendo al dotto ornitologo e caro amico perchè egli, non accogliendo affatto la possibilità della comparsa in Italia di individui erratici della *C. obsoleta*, dice, parlando dell'*H. Savignyi*, che trovasi in quasi identiche condizioni, « parrebbe che dovesse trovarsi in Sicilia » (*Ucc. ital.* p. 82).

MACROCHIRES.

CYPSELIDÆ

(Rondoni).

193. *Cypselus Apus* (Linn. ex Bell.)

RONDONE.

Rondon (*Basso-Piem.*) — Dardù (*Berg.*) — Roundoûn (*Mil.*) — Rondón (*Mantov.*) — Rondol, Rondolon, Sbirro (*Calore*) — Barbairou (*Nizza*) — Dardao (*Savona*) — Rondón (*Spezia*) — Rondinaccio (*Pisa*) — Moracchiolo (*Isola di Giglio*) — Ronminone (*Campobasso*) — Rindune, Rindinune, Linduni (*Calabr.*) — ? Rindinuni o Rinninuni petto jancu (*Mess.*) — Rundonis (*Sard.*).

A proposito del preteso svernare di questa specie in Sicilia (V. *Avif. Ital.* p. 193), il prof. Carazzi scrive: « Nell'inverno 1883-84 che passai a Catania non vidi mai Rondoni » (*Avif. Spezia* ecc. p. 35, nota).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, vi alleva due covate in maggio ed in giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Giunge in gran copia nella prov. di Alessandria verso la fine d'aprile, annida e riparte dalla prima metà alla fine d'agosto, qualche individuo si vede di rado sino alla metà di settembre; il 15 settembre 1884 ne ebbi uno perfettamente albino, preso a Voltaggio, e ne feci dono alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani a Firenze (*Camusso*). Comunissimo da marzo a settembre nell'Ossola (*Bazetta*). Così in Valsesia e nei distretti di Crodo e Piedimulera (*Guarinoni, Demori, Danisi*).

Lombardia : Comunissimo ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo (*Stefanini*). Ed in quella di Milano (*Brambilla*). Estivo ed abbondante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova, ove giunge dopo e parte prima delle Rondini (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune, nidificante, di passaggio in aprile e luglio nel Cadore (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune nel Friuli ove giunge alla metà di aprile, nidifica e parte usualmente verso il 20 agosto (*Vallone*); nidifica una sola volta (*Del Torre*). Comunissimo nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Frequente nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove giunge in aprile e parte in agosto (*Bacchi della Lega*). Nel distretto di Vergato, Bologna, giunge il 25 aprile e parte il 25 luglio dopo aver nidificato (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Frequente ed estivo nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove arriva in aprile e parte alla fine di luglio o a metà agosto; ne ho veduti due alla fine di novembre (*Piccone*). Comune in quello di Arenzano, passa dal 15 aprile al giugno, ripassa in agosto e settembre (*Luciani*). Nel distretto di Spezia arriva alla seconda metà di aprile, scompare in luglio, ma qualcuno si vede in agosto ed anche in settembre (*Carazzi*).

Toscana : Comune ed estivo nella prov. di Lucca; i primi si vedono al principio d'aprile, dalla città di Lucca scompaiono ai primi d'agosto, ma sui monti elevati si trovano ancora ai primi di settembre (*Martorelli, Gragnani*). Estivo e comune, giunge in aprile e parte alla fin di luglio nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Frequente da circa il 10 aprile a tutto luglio nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*); dalla città di Firenze scompare sempre tra il 27 e il 31 luglio (*Giiglioli*). Abbondante nel Casentino; giunge in maggio, parte in set-

tembre (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune assai in Val di Chiana, giunge in aprile e parte in agosto (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Marri*). Nel Senese giunge abbondante circa un mese dopo la Rondine, parte tra il 20 ed il 21 luglio; raramente si vede qualche giovane in agosto, e sembrano essere quelli di una seconda covata, effettuata soltanto nei casi in cui è andata a male la prima, giacchè nei casi usuali il Rondone alleva una sola covata (*Dei*). Così nella prov. di Grosseto, ove però qualcuno si vede anche in settembre (*Ademollo, Cambi*). Estivo e nidificante sull'isola di Giglio; ho potuto constatare in modo positivo che durante l'incubazione le femmine rimangono la notte sui nidi, mentre i maschi s'innalzano a grandi altezze nell'aria per non scendere che all'alba, quando raggiungono le femmine (*Bianchi*). Estivo e comunissimo in Toscana giunge alla fine del marzo, alleva due covate e lascia le città pei monti tra il 10 e 15 agosto; poco dopo parte (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, giunge in aprile-maggio, nidifica in maggio e giugno e parte in luglio-agosto (*Paolucci*).

Lazio: Estivo e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Comune nel distretto di Ielsi, Campobasso; giunge nella seconda metà di aprile e parte in settembre (*D'Amico*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in aprile e non si ferma all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Estivo e comune, giunge in aprile, nidifica sulle torri e parte in settembre (*De Romita*).

Calabrie: Comune da aprile a settembre nella prov. di Catanzaro; qualcuno rimane l'inverno¹ (*De Fiore*). Estivo e comune in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Estivo, comune, ma non abbondante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente dalla metà di aprile

¹ Osservazione che andrebbe accuratamente controllata.

alla metà di luglio e di transito in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante: arriva ai primi di aprile e talvolta agli ultimi di marzo e parte alla fine del luglio nel distretto di Terranova, Caltanissetta; di tanto in tanto nell'agosto passa qualche branchetto diretto da E. ad O. (*Carvana*). Frequente, giunge in marzo-aprile e parte in luglio, verso il 20; di rado vedonsi passare branchetti nel settembre nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Giunge agli ultimi di marzo, e la massa ai primi d'aprile; parte alla metà di agosto, ma non pochi si vedono anche a tutto settembre (*Bonomi*).

194. *Cypselus pallidus*, Shelley

RONDONE CHIARO.

Rondone pallido (*Aut. Ital.*).

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA a proposito di questa specie; nessuna altra cattura è stata avvertita nella nostra regione, dopo quelle colà indicate.

195. *Cypselus Melba* (Linn.)

RONDONE ALPINO.

Roundon dourè (*Alba*) — Pivi di baus, Rondón marin. Rondon bianco, Rondon bianc (*Basso-Piem.*) — Rondon marin (*Padova, Rovigo*) — Rondol de montagna (*Cadore*) — Rondón o Rondolón de zhima (*Feltre*) — Arcón (*Bologna*) — Dardao da pausa gianca (*Sarona*) — Rondon (*Arenzano*) — Rondone marino (*Garf.*) — Rondone (*Sarteano, I. di Giglio*) — Rondone bianco (*Marche*) — Petto-bianco (*Nap.*) — Rindinuni, Rinninuni americanu (*Mess.*) — Rimminuni di lu piettu janco (*Modica*) — Rundoni bianca, Varzia do monti (*Sard.*).

Piemonte : Frequente in montagna nella prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta in maggio (*Abre*). Scarso in quella di Torino (*Gasca*). Raro assai ai monti nella prov. di Alessandria; ne ebbi uno a Voltaggio il 28 ottobre 1885. dopo un fortissimo temporale con vento impetuoso da S. S. E; faceva parte di un branchetto di individui della medesima specie (*Camusso*). Nell' Ossola giunge in maggio e nidifica nelle scogliere sui monti sino ai 2000 metri (*Bazetta*). Nidifica nel distretto di Crodo, Novara, ove è di passaggio piuttosto abbondante in primavera (*Demori*).

Lombardia : Avventizio in seguito a burrasche nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Raro ai monti in Lombardia (*Turati*); frequente (*Borromeo*).

Veneto : Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente ai monti nel Cadore, Belluno; giunge in marzo, nidifica tra le roccie allevando una sola covata di 2 a 4, e parte nell' agosto (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, da dove parte in settembre (*Delaito*). Raro nella prov. di Padova (*Arigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Piuttosto raro nelle prov. di Bologna e Ravenna, dove giunge in aprile e parte in agosto; s' incontra sui monti, ove nidifica (*Bacchi della Lega*). Di comparsa accidentale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Due sole catture sono registrate nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Nidifica in colonie sulle alte montagne nel Nizzardo; al piano vedesi soltanto alle due epoche del passo (*Gal*). Scarso nel distretto di Savona, ove non so se soggiornì; ne ebbi uno il 4 maggio 1883 (*Piccone*). Comune in quello di Arenzano, passa dal 15 aprile al giugno e ripassa in agosto e settembre (*Luciani*). Nel distretto di Spezia questa specie nidifica sui punti meno accessibili dell' isola di Palmaria (*Carazzi*).

Toscana : Nella prov. di Lucca ne vidi due isolati durante un temporale in settembre, ed un numerosissimo branco sul Penna, Monte Pisano, alla metà di ottobre (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa passa abbondante in aprile (*Gragnani*). Scarso di passo nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*).

Nidifica ed è estivo sui monti in luoghi rocciosi e dirupati nel distretto di Sarteano. Siena (*Bargagli*). Nella prov. di Grosseto questa specie cova tra le roccie del Monte Argentario, giunge dai primi al 26 maggio, parte in luglio (*Dei, Ademollo, Cambi*). Estivo e nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*).

Marche: Raro (*Paolucci*).

Campania: Ne vidi moltissimi alle isole Ponzie e specialmente a Zannone alla fine di agosto del 1878 (*Griglioli*). Passa ai primi d'aprile all'isola di Capri, ma non vi nidifica (*Cerio*).

Puglie: Si vede in scarso numero in primavera e nell'autunno (*De Romita*).

Sicilia: Abbondante e nidificante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente ai monti, giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*De-la-fonte, Garofalo*). Raro al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Giunge in aprile e parte alla fine di agosto o ai primi di settembre; abita le rupi a picco sul mare, ed è più abbondante al Capo settentrionale (*Bonomi*).

CAPRIMULGIDÆ

(*Nottoloni*).

196. *Caprimulgus europæus*, Linn. ex Bell.

NOTTOLONE.

Carcababi, Carcabaggio, Carcabagg, Scarabaggio (*Basso-Piem.*) — Carcaciatri, Neuciola, Nociola (*Nor.*) — Squartasatt (*Berg.*) — Piacarân (*Milano*) — Tetavache (*Veron.*) — Tettavacce (*Cadore*) — Boçhàss (*Friuli*) — Bocassa (*Roigo*) — Bocassa (*Padova*) — Bucazza (*Ravenna*) — Sfiàlapp (*Bologna*) — Fialapp (*Vergato*) — Carcabaggiu (*Arenzano*) — Teta-

vache (*Spezia*) — Nottola (*Pisa, Fucecchio*) — Ingoiavento (*Fiesole*) — Nottolaccio (*Sesto fiorentino*) — Merdaiolo (*S. Gimignano*) — Calcabodda (*Lucca*) — Vol di notte (*Garf.*) — Dormiglione (*I. di Giglio*) — Piattajone (*Viterbo*) — Ingannapastore (*Nap.*) — Cordaru (*Calabr.*) — Guardalepre (*Foggia*) — Curdaru (*Modica, Castelb.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove alleva una sola covata nel giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*). Piuttosto abbondante nella prov. di Alessandria, giungendo a primavera inoltrata; nidifica al monte e parte verso la metà dell'autunno (*Camusso*). Nell'Ossola giunge in maggio, nidifica e parte in settembre; non è comune (*Bazetta*). Così nella Valsesia, ove fa due covate dal maggio all'agosto (*Guarinoni*); nel distretto di Crodo è raro di passaggio in primavera (*Demori*).

Lombardia : Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Estivo e comunissimo nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Comune al piano ed in collina nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Verona : Raro nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso, nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Comune nel Cadore, Belluno, arriva in giugno, nidifica e parte in ottobre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, che lascia però in settembre (*Delaito*). Frequente ed estivo nel Friuli, giunge in aprile, nidifica e parte in settembre (*Vallon, Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Abbastanza frequente ed estiva nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*). Scarso ed estivo nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo nella prov. di Parma; ebbi il nidiaceo l'8 agosto (*Del Prato*).

Liguria : Estivo nel Nizzardo, ove però si vede più facilmente alle due epoche del passo (*Gal*). Comune ed estivo nel distretto di Savona, nidifica ai monti; giunge in aprile e maggio e parte in settembre (*Piccone*); così in quello di Aren-

zano (*Luciani*). Estivo nel distretto di Spezia, ove si trova in collina di primavera ed al piano nell'agosto (*Carazzi*).

Toscana: Comune dalla metà di aprile alla metà di ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Estivo e più frequente in collina nel distretto di Fauglia, Pisa; agli ultimi del novembre 1880, in una caccia alle Beccaccie, ne venne ucciso uno (*Ott*); scarso nel distretto di Lari (*Papasogli*). Estivo, frequente ai monti e scarso al piano nella prov. di Firenze (*Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Non frequente nel Casentino, Arezzo; giunge in maggio, parte in settembre-ottobre (*Beni, Fiorini, Pauer*). Comune, ma di solo passo in aprile-maggio ed agosto-settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quella di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Estivo e comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa in aprile e maggio e nidifica pure all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e comune in Toscana; so di uno catturato in Mugello il 21 novembre 1883 (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, estivo (*Paolucci*).

Lazio: Estivo e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Di scarso passaggio in aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Estivo e piuttosto comune (*De Romita*).

Calabrie: Giunge in aprile e parte in ottobre nella prov. di Catanzaro, ove qualcuno rimane l'inverno ¹ (*De Fiore*). Comune ed estivo in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Ordinariamente scarso, ma talvolta abbondante, di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica, ove giunge in aprile e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Nel distretto di Terra-

¹ Osservazione che merita conferma.

nova. Caltanissetta, giunge alla spicciolata alla fine d'aprile o agli ultimi di marzo; nidifica ai monti e parte in ottobre e novembre (*Carvana*). Frequente al piano in aprile e anco nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune nell'estate, ma anco sedentario; e più abbondante al Capo settentrionale e specialmente lungo i fiumi del Sassarese nell'autunno ed inverno.¹ Notai singolari differenze nell'abito e nelle dimensioni (*Bonomi*).

197. *Caprimulgus ægyptius*, Licht.

NOTTOLONE DEL DESERTO.

Succiacapre isabellino (*Aut. Ital.*).

Il Salvadori cade in errore quando dice (*Ucc. ital.* p. 78) che il Nottolone isabellino di cui scrisse il Caruso al Doderlein e che questi menziona (*Arif. Sicil. e Mod.* p. 344) come probabilmente una mera varietà del *C. europæus*, si conserva nel Museo di Firenze; nè il Doderlein, nè io abbiamo mai veduto l'esemplare preso dal Caruso a Girgenti; non so neppure se quell'uccello sia stato conservato. Nella Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo Zoologico di Firenze vi sono, è vero, due esemplari del *C. ægyptius*, ma il primo è uno dei tre individui i quali erano nel Museo universitario di Malta, colto in quell'isola nella primavera 1876; il secondo è l'individuo ucciso a Modica nel dicembre 1879.

Sicilia: Accidentale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

198. *Caprimulgus ruficollis*, Temm.

NOTTOLONE A COLLARE ROSSO.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie, rarissima per noi.

¹ Osservazione che merita conferma.

199. *Caprimulgus asiaticus*, Lath.

NOTTOLONE ASIATICO.

Ho già espresso ampiamente il mio parere intorno all'esemplare di questa specie, che sembra esser stato preso in Italia (*Avif. Ital.* p. 198); oggi non posso che mantenere quanto dissi allora, sebbene il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 79) non sembri voler ammettere la possibilità della cattura in Italia di un *C. asiaticus*.¹

¹ Soltanto in questi giorni, mercè la gentilezza del conte senatore G. B. Camozzi Vertova, ho potuto esaminare l'esemplare di *Podager nacunda* (Vieill.) che fa parte della sua raccolta ornitologica. Quell'esemplare è una femmina e si trova in buono stato; sulla base che lo sostiene sta scritto *Caprimulgus lacteum*, nome che non mi risulta essere stato dato ad alcuna specie di Nottolone; su questò esemplare scrisse per incidenza il Salvadori in una nota nella prima sua opera sugli uccelli italiani (*Faun. ital. Ucc.* p. 80, nota 1), non ammettendo neppure per dubbio che fosse da prendersi in seria considerazione l'asserto che quel *Podager nacunda* potesse essere stato colto nelle vicinanze di Brescia come si asseriva. Ecco cosa mi scrive in proposito di quell'uccello il conte Camozzi: « io l'ebbi dal signor Luigi Bonomi, ma fu spedito a questi dall'ora defunto signor Odeschini di Brescia. La pelle che io vidi tosto e che il Bonomi stava preparando, era stata levata di fresco e puzzava perchè l'uccello era in putrefazione incipiente; da ciò derivò la preparazione mal fatta dal Bonomi. Ti unisco poi il brano di lettera che scrisse l'Odeschini, da me richiesto del luogo ove dicevasi fosse stato preso il *Caprimulgus*.... » Darò anche quel brano di lettera che porta la data 12 gennaio 1848, data che fa credere che la supposta cattura del *Podager* suddetto fosse avvenuta nel precedente autunno od estate. Ecco cosa scriveva in proposito il signor Odeschini: « Rapporto a quel *Caprimulgus*, fu preso nel paese di Colle Beato che resta a ponente dalla città di Brescia, ma però un po' verso monte, alla distanza di 8 miglia circa; e fu preso l'Avemaria di sera da certo Giuseppe Piovani. Questo è tutto quello che ti posso dire. » In conclusione pare anche a me che in questo caso la buona fede del conte Camozzi possa essere stata sfruttata forse con una surrogazione; chi ha visitato un laboratorio tassidermico capirà come può puzzare una pelle inumidita per essere montata, e chi esamina l'esemplare di *Podager*, che mi sta davanti vede come esso non era certamente in putrefazione incipiente, giacchè nè sulle redini nè sul ventre manca una sola penna, e sappiamo quanto siano facili a cadere le penne nei *Caprimulgi*! Aggiungo in fine che il *Podager nacunda* abita la zona tropicale dell'America meridionale, e non credo possibile che possa giungere in Europa altrimenti che « in pelle. »

SAUROGNATHÆ.

PICI.

PICIDÆ

(Picchi).

200. *Drycopus martius*¹ (Linn.)

PICCHIO NERO.

Picus martius, Salvad.

Beccalegn negro, Pigot moro (*Cadore*) — Beccalegnón, Pigozhon, Pigozh negro (*Feltre*) — Pizzica ferru niru (*Mess.*).

Piemonte: Scarso, ma sedentario in montagna, nella prov. di Cuneo; vi nidifica nel giugno, allevando una sola covata; depone 2 o 3 uova, la incubazione dura da 16 a 18 giorni e vi prendono parte il maschio e la femmina (*Abre*). Nell'Ossola è sedentario, ma non tanto comune; abita e nidifica nei boschi di conifere e non sale oltre i 1500 metri. Nel giugno ebbi più volte i nidiacei e due volte anche le femmine, queste morirono però d'inedia; invece, meno tre

¹ Il cav. dott. A. Ademollo cita questa specie come di **accidentale** comparsa nell'inverno nella prov. di Grosseto (*Ornitologia Maremmana*, pag. 24); io ritengo che tale notizia abbia per base un equivoco. Così debbo pur dire riguardo alla asserita presenza del Picchio nero nelle Marche, ove secondo le notizie avute dal Comizio agrario di Fabriano, sarebbe « raro, ma sedentario. » Del resto pel primo caso rammento quanto scrisse il Savi intorno alla presenza in un passato lontano del Picchio nero nella Maremma Toscana.

appena usciti dall'ovo nudi e ciechi ancora, che morirono, io sono sempre riuscito ad allevare i nidiacei; essi hanno l'iride scura; stando alle informazioni avute pare che il maschio covi alternando colla femmina (*Bazetta*). Poco frequente e sedentario nei distretti di Varallo e Crodo (*Guarinoni, Demori*); nella Valsesia fa una sola covata in aprile e maggio (*Guarinoni*).

Lombardia: Raro sui monti (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Un maschio venne preso il 29 ottobre 1884 in Folgaria presso Rovereto, ed una femmina il 14 ottobre 1886 alla Madonna del Monte sopra la città medesima (*A. Bonomi*). Sedentario e nidificante ai monti nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno; predilige i boschi annosi di faggio e vi nidifica nel giugno allevando una sola covata di tre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Scarso e sedentario ai monti nel Friuli (*Vallon*); manca nel distretto di Cividale, ma sembra essere frequente e sedentario nella Carnia (*Del Torre*).

Liguria: Sedentario, ma poco frequente sugli alti monti nel Nizzardo (*Gal*).

Calabrie: In parecchie escursioni che ho fatto in Sila, una sola volta mi fu dato di vedere una coppia di Picchi neri, in mezzo ad una folta pineta; non potei però ucciderli e ritengo siano molto rari (*Lucifero*).

Sicilia: Rarissimo nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

201. *Picus major*, Linn. ex Willugh.

PICCHIO MAGGIORE.

Dendrocopus major, Salvad.

Pich peit (*Alba*) — Picunsin, Picunzétt, Picons rouss (*Basso-Piem.*) — Picot ross (*Berg.*) — Beccalegn ross, Pigot (*Cadore*) — Beccalégn, Beccazóch, Pigozh (*Feltre*) — Pigozzo (*Rovigo*) — Pice de coròne (*Friuli*) — Pigoséta (*Padova*) —

Peece gardlein (*Bol.*) — Pic queu rongie (*Nizza*) — Piunzo (*Savona*) — Picùn, Picazo (*Spezia*) — Picchio rosso (*Pisa, Lucca*) — Picchiaccio (*Garf.*) — Culorosso, Picchio focaro (*Viterbo*) — Becco-de-fierro, Turzopica (*Nap.*) — Gadduzzu di muntagna (*Calabr.*) — Pizzica-ferru, Carpinteri (*Mess.*) — Papa formigas (*Sard.*).

Piemonte : Frequente e sedentario ovunque in prov. di Cuneo: alleva due covate, una in aprile e l'altra in giugno (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Poco abbondante, ma sedentario ovunque in prov. di Alessandria (*Camusso*). Sedentario e comune nell'Ossola, abita di preferenza i monti, ma non sale in alto (*Bazetta*). Così nella Valsesia, ove nidifica (*Guarinoni*); nel distretto di Crodo è scarso di passaggio autunnale (*Demori*).

Lombardia : Nella prov. di Sondrio è sedentario sui monti, ma non comune (*Galli*). Frequente al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Stazionario e comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comunissimo sui monti boschivi nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante in quella di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune e sedentario nel Friuli, nidifica in maggio e giugno (*Vallon*); anche nel luglio (*Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Abbastanza comune e sedentario sulle colline nella prov. di Bologna (*Bacchi della Lega*). Non frequente e nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Abbastanza comune, sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Vedesi specialmente d'autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune e sedentario nel distretto di Savona (*Piccione*); così in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Scarso, ma sedentario nella prov. di Lucca

(*Martorelli*); piuttosto comune nel distretto di Massarosa (*Fontebuoni, Gragnani*). Comune ovunque e sedentario nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in quello di Lavajano (*Papasogli*). Scarso in collina, ma sedentario nella prov. di Firenze (*Gargioli, Fontebuoni*). Non comune, ma sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Scarso, ma sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena, ove è frequente (*Bargagli*); avuto in novembre e dicembre in quello di S. Gimignano (*Paulucci*). Scarso nel Senese (*Dei*); comune e sedentario in Maremma (*Dei, Ademollo*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Sedentario, ma raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Lazio: Sedentario e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Sedentario e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Sedentario, ma poco frequente (*De Romita*).

Calabrie: Comune e sedentario nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio, ove ebbi i nidiacei in luglio (*Moschella*).

Sicilia: Scarso assai nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente e sedentario, erratico d'inverno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario ai monti (*Bonomi*).

202. *Picus leuconotus*, Bechst.

PICCHIO A DORSO BIANCO.

Dendrocopus leuconotus, Salvad.

Il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 70) non ammette che questa specie sia stata presa in Italia; credo abbia torto e mantengo quanto già scrissi in proposito (*Atif. Ital.* p. 201). Ho anzi un nuovo caso da registrare che sarebbe il terzo della cattura in Italia di questa specie: l'esemplare in quistione è nella raccolta del prof. F. Magni-Griffi a Siena, il quale

lo acquistò dal signor S. Brogi di quella città, che avrebbe avuto *in carne* quel raro Picchio, ucciso alla Montagnola senese. Io però non ho veduto questo uccello e ne seppi soltanto dal prof. Carazzi, il quale lo vide e ne parla nel suo lavoro sull'ornitologia della Liguria orientale.¹

203. Picus Lilfordi, Sharpe e Dresser

PICCHIO DALMATICO.

Dendrocopus Lilfordi, Salvad.

Picchio di Lilford (*Aut. Ital.*).

Piemonte: Il 22 novembre 1886 il signor Marchisio trovò una femmina di questa specie sul mercato di Torino; essa era stata presa nelle vicinanze di Pinerolo (*Salvadori*).

Toscana: Accidentale nel Casentino, Arezzo (*Avif. Ital.* p. 202), il primo registrato (*Beni, Pauer*); ne ebbi un secondo il 20 ottobre 1888, era in un mazzo di Tordi e fu ucciso presso la Falterona (*Beni*).

204. Picus medius, Linn.

PICCHIO MEZZANO.

Dendrocopus medius, Salvad.

Pigozzo rosso (*Vicenza*) — Beccalégn, Beccazhòch, Pigozh (*Feltre*) — Picc mezzan (*Friuli*) — Pigoséla (*Padova*) — Pigossetto (*Rovigo*) — Picchio cardinale (*Viterbo*) — Piz-zica-ferru testa-russa (*Mess.*).

Piemonte: Nidifica nella Valsesia, ove sarebbe specie sedentaria, diventando erratica nella stagione fredda (*Guarinoni*).

¹ D. CARAZZI, *Avifauna della Spezia e della Val di Magra*, p. 36, nota SPEZIA, 1887.

Lombardia: Assai raro nella prov. di Milano (*Brambilla*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Così nel distretto di Feltre, Belluno; ove è sedentario e nidifica nel maggio, allevando una sola covata di 3 o 4 (*Delaito*). Ne ebbi uno solo nel Friuli, preso il 1 ottobre 1880 (*Talton*). Raro e forse confuso col *P. major* nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo, ma sedentario in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Toscana: Scarso assai nella prov. di Firenze, ne conservo uno ucciso a Prato il 20 gennaio 1876 (*Giglioli*). Scarso nella prov. di Grosseto (*Dei*). Assai raro in Toscana (*Poster*).

Marche: Raro, ma sedentario (*Comizio agrario Fabriano*).

Lazio: Comune e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Sicilia: Rarissimo nella prov. di Messina (*Pistone*). Raro ai monti, ma sedentario nel distretto delle Madonie. Palermo; nidifica in maggio e diventa erratico d'inverno (*Palumbo, Morici*).

205. *Picus minor*, Linn. ex Gesn.

PICCHIO MINORE.

Dendrocopus minor, Salvad.

Picchio rosso minore (*Aut. Ital.*) — Pich-peit, Picunsín, Picunzín (*Basso-Piem.*) — Pic ros cito, Pichet fiorà, Pigazet (*Nor.*) — Beccalegn (*Chodore*) — Beccalègn. Beccazhóch, Pigozh, Pigozhét (*Feltre*) — Pigoséto (*Padova*) — Pigossetto (*Rovigo*) — Plecch pznen (*Ravenna*) — Picunzetto, Piunzetto (*Savona*) — Piza-formighe (*Sarzana*) — Picchio rosso piccolo (*Pisa, Lucca, Valdich.*) — Picchio arancino (*Casentino*) — Pizzica ferru nicu (*Mess.*).

Piemonte: Frequente al monte nella prov. di Cuneo, ove nidifica nel maggio allevando una sola covata; d'in-

verno scende al piano (*Albre*). Rarissimo in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Scarso al monte in prov. di Alessandria (*Canusso*). Sedentario nell'Ossola, ma piuttosto raro; abita le foreste di pini e scende di rado al piano (*Bazetta*). Abbastanza frequente e sedentario nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*); nidifica in Valsesia, poi diventa erratico (*Guarinoni*).

Lombardia : Raro al piano ed in collina nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Di scarso passaggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Scarso nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno; nidifica nel giugno ed alleva una sola covata di 6 a 7 (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove nidifica nel maggio (*Delaito*). Poco frequente e sedentario in collina nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso, ma sedentario in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Sedentario, ma molto scarso in collina nella prov. di Bologna (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato (*Lorenzini*). Non raro, sedentario e nidificante nella prov. di Parma; erratico in autunno (*Del Prato*).

Liguria : Non comune, ma nidificante e sedentario nel distretto di Savona (*Piccone*). Assai scarso e, pare, invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Scarso assai, ma sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Lavajano, Pisa (*Papasogli*). Non comune e specialmente invernale nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Raro, ma nidificante nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Scarsissimo, ma sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarso e sedentario nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); avuto in novembre in quello di S. Gimignano (*Paulucci*). Sedentario e comune in Maremma (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune, ma assai localizzato, in Toscana; sedentario (*Roster*).

Marche : Raro, ma sedentario (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie : Sedentario, ma poco frequente (*De Romita*).

Sicilia : Raro, ma sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna : Piuttosto scarso, ma sedentario nelle foreste dei più alti monti; Gennargentu, Spada, Limbara ecc. (*Bonomi*).

206. *Picoïdes tridactylus* (Linn.)

PICCHIO A TRE DITA.

Veneto : Scarso, ma apparentemente sedentario nei boschi di Pontebba, Friuli (*Bayer, Vallon*). Accidentale affatto nella prov. di Padova; l'esemplare nella mia raccolta (*AVIF. ITALICA*, p. 205) venne preso nell'autunno 1873 non sulle Alpi Venete, ma nei préssi di Padova (*Arrigoni*).

207. *Gecinus viridis* (Linn. ex Gesn.)

PICCHIO VERDE.

Piuns galinè (*Alba*) — Pice, Picons, Piconso, Piconso gazanà (*Basso-Piem.*) — Picot verd (*Berg.*) — Pigoson, Spigozzon (*Bassano*) — Beccalegno o Pigot verdo (*Cadore*) — Beccalègn, Beccazhóch, Pigozh verdo (*Feltre*) — Picott (*Friuli*) — Pigosón, Spigosón (*Padova*) — Pigosso o Pigozzo verde (*Rovigo*) — Pigh gross (*Vergato*) — Picunsu (*Arenzano*) — Picunzo gallinà (*Savona*) — Picùn (*Spezia*) — Picchio polastro (*Pisa*) — Picchio gallinaccio (*Lucca*) — Picchiaccio (*Garf.*) — Picchio giallone (*Viterbo*) — Formicolaru di voscu (*Calabr.*) — Pizzica-ferru viridi (*Mess.*).

Piemonte : Ne ebbi uno color isabella; è frequente e sedentario al piano in prov. di Cuneo; vi alleva due covate, una in aprile, l'altra nel giugno (*Abre*). Così in prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Comune e ovunque sedentario in prov. di Alessandria (*Camusso*). Comune e sedentario nell'Ossola sino ai 1000 metri (*Bazetta*). Così in Valsesia

e nel distretto di Crodo (*Guarinoni, Demori*); erratico in quello di Piedimulera, Novara (*Danisi*).

Lombardia : Frequente ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso al piano in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune e sedentario in quella di Cremona (*Ferragni*). Così nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Non raro nei boschi nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Frequente, sedentario e nidificante in quella di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Comune e sedentario nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comune e sedentario nel Friuli (*Vallon, Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comunissimo nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove è sedentario, specialmente in collina (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato (*Lorenzini*). Comune, sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Vedesi specialmente in autunno ed inverno nel Nizzardo (*Gal*). Comune più degli altri Picchi e sedentario nel distretto di Savona (*Piccone*); raro, ma sedentario pure in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente e sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Piuttosto scarso e sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); abbastanza comune nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Sedentario e più comune in collina nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in quelli di Lavajano e Peccioli (*Papasogli, Degli Alessandri*). Scarso ma sedentario nei distretti di Fucecchio e Fiesole (*Turchetti, Gargioli*); comune in quelli di Sesto e Signa, Firenze (*Fontebuoni*). Frequente e sedentario nel Casentino Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Frequente e sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comunissimo e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Piuttosto comune e sedentario (*Paolucci*).

Lazio: Sedentario e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Poco frequente e sedentario (*De Romita*).

Calabrie: Piuttosto comune e sedentario nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Non raro ai monti nella prov. di Messina (*Pistone*).

208. *Gecinus canus* (J. F. Gmel.)

PICCHIO CENERINO.

Picott, Picc verd, Picc gris (*Friuli*) — Pigot (*Bell.*) — Beccalègn, Beccazhòch, Pigózh (*Feltre*) — Pigozzo verde (*Vicenza*) — Pigossón (*Padova*).

Veneto: Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso, ma sedentario ai monti nel distretto di Feltre, Belluno, ove sarebbe in diminuzione; vi nidifica nel maggio, allevando una sola covata di 4 a 6 (*Delaito*). Il signor Puccini donò alla Collezione italiana una femmina di questa specie da lui uccisa il 7 settembre 1888 a Forno di Canale, Agordo (*Giglioli*). Assai più scarso della specie precedente: apparentemente sedentario ai monti nel Friuli; nell'autunno vengono quasi sempre portati alcuni individui sul mercato di Udine; sembra però essere in diminuzione (*Tallon*). È abbastanza frequente e sedentario nel distretto di Cividale, ove viene generalmente confuso colla specie precedente (*Del Torre*). È molto raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Accidentale nel distretto di Spezia; un esemplare poté averne a Sarzana nel dicembre 1860 il prof. Magni-Griffi, e lo conserva nella sua raccolta a Siena (*Caracci*).

IÿNGIDÆ

(*Torcicolli*).

209. Iÿnx Torquilla, Linn. ex Bell.

TORCICOLLO.

Torsacól, Stortacól, Tortacol, Pitta formighe (*Basso-Piem.*) — Stortacol, Stortacheul, Beccaformig, Storzacheul (*Nov.*) — Beca feormighe (*Berg.*) — Contorcol (*Cadore, Fel-tre*) — Picasceta (*Como*) — Gavitorciola (*Vergato*) — Torsicollo, Piunzo torsicollo (*Savona*) — Lengua lunga (*Arenzano*) — Formiguìn, Colo-storto (*Spezia*) — Capitorza (*Sarzana*) — Storgicollo, Torgicollo (*Pisa*) — Torgicollo (*Fucecchio*) — Capitorsolo (*Lucca*) — Torcicollo (*Fiorent.*) — Giracollo (*I. di Giglio*) — Capitontova (*Garf.*) — Ciorlui, Storcicollo (*Viterbo*) — Formichiere, Gallo di selva (*Campobasso*) — Pizzua formica (*Bari*) — Formicòne (*Nap.*) — Culerciaru, Formicularu, Fermicularu (*Calab.*) — Furmicularu (*Modica*) — Lingua-longa (*Castelb.*) — Papa formigas (*Sard.*).

Piemonte : Frequente al piano in prov. di Cuneo, vi alleva due covate, una in aprile, l'altra nel giugno (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Abbondante nella prov. d'Alessandria, ove giunge dopo la prima metà di marzo, annida nelle buche delle vecchie piante, specialmente fruttifere, e parte dalla metà di agosto alla metà di settembre (*Camusso*). Nell'Ossola giunge alla fine di marzo, nidifica e parte in ottobre (*Bazetta*). Nidifica una sola volta nel maggio in Valsesia (*Guarinoni*); raro di passo in maggio, nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia : Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). In quella di Como arriva ai primi d'aprile e parte nella prima metà dell'ottobre (*Regazzoni, Bernasconi*). Fre-

quente al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Estivo ed abbondante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non raro e sedentario nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarso, nidificante e di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molavi, Ferrari*). Scarso nel Cadore, Belluno, ove passa in aprile ed in agosto (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove è però frequente (*Delaito*). Comune nel Friuli; giunge nella seconda metà di aprile, nidifica e parte in ottobre (*Vallon, Del Torre*). Comune; qualcuno sverna nella prov. di Padova; ne ebbi uno colto a Merendole (Monselice) il 10 novembre 1886¹ (*Arrigoni*). Abbastanza frequente e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo ovunque nelle prov. di Ravenna e Bologna, vi giunge in maggio e parte in settembre avendovi nidificato (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune specialmente in primavera nel distretto di Savona, ove non è accertato che nidifichi (*Piccone*); estivo in quello di Arenzano, ove abbonda in primavera (aprile e maggio), e scarseggia in autunno (*Luciani*). Frequente ed anche sedentario nel distretto di Spezia; ne ebbi in gennaio e febbraio (*Carazzi*).

Toscana: Comunissimo; alcuni rimangono assai tardi nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); Sedentario nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Sedentario e comune nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Venerosi*). Nella prov. di Firenze è piuttosto scarso, ma sedentario nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*); frequente, specialmente di passo in marzo e settembre-ottobre in quelli di Fiesole, Sesto e Signa (*Gargioli, Fontebuoni*). Co-

¹ Il 22 dicembre 1887 il conte E. Arrigoni degli Oddi mi spediva uno di questi uccelli *in carne*; era stato ucciso presso Monselice.

mune ed estivo nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Estivo e comune in Val di Chiana; i più partono in settembre, ma alcuni svernano e ne ho avuto anche in dicembre (*Griffoli*). Estivo nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*; così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Estivo, comune ed anco sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa in maggio e giugno all'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario, ma più comunemente estivo in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, arriva in aprile-maggio, e parte in agosto-settembre (*Paolucci*).

Lazio: Scarso nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente, giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).


Campania: Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Di scarso passaggio in aprile e settembre all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Comune in autunno ed in primavera (*De Romita*).

Calabrie: Sparso, ma non comune nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Sedentario e comune in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Sedentario e di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente ovunque nel distretto di Modica, Siracusa; giunge in marzo e parte in ottobre (*Dellafonte, Garofalo*). Soltanto di passo, non abbondante, in aprile ed ottobre in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrana*). Frequente al piano in marzo-aprile e settembre nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di doppio passo e dubbiosamente sedentario; non è comune (*Bonomi*).



DESMOGNATHÆ.

COCCYGES.

CUCULIDÆ

(Cucùli).

210. *Cuculus canorus*, Linn.

CUCÙLO.

Cúccu, Cúcu, Cucù (*Basso-Piem.*) — Cöch (*Berg.*) — Cucco (*Cadore*) — Cucc, Cuchuse (*Friuli*) — Cucco (*Rovigo*) — Cocch (*Bol., Rav.*) — Cuch (*Vergato*) — Cucù, Cücu (*Spezia*) — Cuccù (*Lucca*) — Cucule (*Sarteano, S. Gimignano*) — Cu-cù (*I. di Giglio*) — Cucco (*Marche, Viterbo*) — Cuccubè, Cuc-cupè (*Nap.*) — Cuccovaio (*Campobasso*) — Cuccu, Turturaru (*Calabr.*) — Bufolo (*Sicil.*) — Turturaru (*Molise*) — Cucca di maiu (*Castell.*) — Pachedu (*Arzana, Sard.*).

Piemonte: Frequente ovunque nella prov. di Cuneo; credo faccia una sola covata, non mi capitarono mai nidia-
cei oltre il mese di giugno (*Albre*). Comune in quella di To-
rino (*Gasca, Martorelli*). Trovai un pulcino di Cucùlo in un
nido di Sterpazzola (*Gasca*). Nella prov. di Alessandria è
frequente, giunge in aprile e gli adulti partono col lu-
glio, mentre i giovani rimangono sin verso la fine del set-
tembre (*Camusso*). Nell' Ossola giunge in maggio e parte in
settembre; mi venne recato un nido di *Ruticilla titys* con
entro un uovo di Cucùlo trovato all'Alpe di Veglia a me-

tri 1777; all'Alpe Nembro nel 1884 una coppia di *R. titys* aveva il nido in una cucina a pian terreno, e per giungervi passava per una feritoia del fienile e per il vano di una botola. Il 28 maggio il proprietario si recò all'Alpe, e aperta la porta della cucina vide un Cucùlo svolazzare contro le pareti; lo prese e quindi si accorse del nido dei Codirossi che conteneva anche un uovo di Cucùlo. È qui evidente che il Cucùlo non poteva vedere il nido, ma ne indovinò la presenza dall'andirivieni dei Codirossi, e li seguì per la stessa strada, che poi, sorpreso, non seppe ritrovare (*Bazetta*). Non molto comune nel distretto di Crodo ove depone le uova (*Demori*); in Valsesia depone le uova dalla metà di maggio al luglio nei nidi di altri uccelli; le sue uova variano assai, essendo rossiccie, verdastre o turchine talvolta macchiate, talvolta lineate di color rossastro, olivastro o bruno; vengono deposte ad intervalli (*Guarimoni*).

Lombardia: Comune ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nel Comasco giunge in primavera e parte in settembre (*Rosales*). Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Estivo e comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune tra aprile e ottobre in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Non raro nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passo in quella di Vicenza (*Molari*). Frequente nel Cadore. Belluno; giunge in aprile e parte in agosto (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove giunge nel maggio (*Delaito*). Frequente nel Friuli nei luoghi boschivi: arriva in aprile e parte nella seconda metà di ottobre. Il 12 maggio 1882 trovai un uovo di Cucùlo nel nido di una *Sylvia cinerea*, sensibilmente più grande delle altre due che nel nido si trovavano, esso però s'avvicinava molto ad esse pel colorito (*Vallon*). Comune ed estivo nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Abbondante ed estivo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Abbastanza comune nelle prov. di Ravenna e Bologna, vi giunge in maggio e parte in settembre; ne tro-

vai un giovane in un nido di Fringuelli e sotto, in terra e ripuliti dalle Formiche, erano gli scheletri dei Fringuellini (*Bacchi della Lega*). Estivo e frequente nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo e non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estivo nel Nizzardo, abbondante durante il passo primaverile (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove giunge in aprile e dove alcuni rimangono ai monti: parte o ripassa nel settembre (*Piccone*). Così pure nel distretto di Arenzano, ove è frequente nel passo primaverile, scarso in quello autunnale; trovai giovani Cucùli nei nidi di *Monticola saratilis*, *Accentor modularis* e *Miliaria Projer*; pochi si riproducono nel distretto (*Luciani*). Frequente ed estivo in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Estivo nella prov. di Lucca: giunge ai primi d'aprile e parte o ripassa verso la metà di settembre; nel maggio frequenta le pinete in cerca di bruchi: non molti rimangono l'estate (*Martorelli, Fontebuoni*): nel distretto di Massarosa si vede già nel marzo (*Gragnani*). Rimane dall'aprile al settembre nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa, ed è più abbondante in collina (*Ott. Papasogli*). Estivo nella prov. di Firenze, scarso al piano e frequente ai monti; giunge in aprile e parte in settembre (*Lenzi, Turchetti, Fucini, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Frequente nel Casentino, Arezzo; giunge in aprile e parte in settembre (*Beni, Fiorini, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune da aprile a luglio nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*): così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune dall'aprile al settembre: gli adulti partono in agosto: nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa in maggio all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo e comune in Toscana: so di due giovani tolti da nidi della *Sylvia orphana* nel 1883: il 23 novembre 1881 un adulto fu trovato morto nel Chianti (*Rosteri*).

Marche: Estivo, frequente ed erratico (*Paolucci*).

Lazio: Comune, giunge nel distretto di Montefiascone. Viterbo, nel marzo, depone le uova nei nidi di Lodola e di Strillozzo, e parte ai primi di agosto (*Mimmi*).

Abruzzi : Frequente nel distretto di Ielsi, Campobasso ; giunge in aprile e parte in giugno ; depone le uova nei nidi della Lodola comune (*D'Amico*).

Campania : Comune ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in aprile ed in settembre all' isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Non infrequente di maggio, si vede qualche volta in autunno e ne ho avuto in agosto (*De Romita*).

Calabrie : Comune dalla metà di aprile a quella di settembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Scarso, giunge alla metà di marzo in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Di solo passo nel distretto di Terranova, Caltanissetta, ove giunge in aprile (*Carvana*). Poco frequente ai monti e colli in primavera ; alcune coppie rimangono l'estate ; io rinvenni l'uovo in un nido di *Pratincola Rubicola* nel distretto delle Madonie , Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Estivo e comune in primavera, soggiorna di preferenza nel Sassarese (*Bonomi*).

211. *Coccystes glandarius* (Linn.)

CUCULO AFRICANO.

? Pavoni africani (*Pian di Sesto fiorentino*) — ? Pavone africano (*Casentino*) — Giriuni (*Mess.*) — Turturaru tuputu (*Modica*).

Liguria : Rarissimo nel distretto di Spezia, due ne ebbe il prof. Magni-Griffi (*Avif. Ital.* p. 211, a Sarzana: entrambi nel maggio (*Carazzi*).

Toscana : Nel distretto di Massarosa, Lucca, ne ebbi uno nell'aprile 1887. ed un secondo ai primi di maggio 1888 ; fui assicurato che contemporaneamente altri tre erano stati

veduti presso il mare (*Gragnani*). Accidentale nel distretto di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*); ebbi per la Collezione italiana una femmina uccisa a Poggio a Cajano, Firenze, il 25 marzo 1888 (*Giglioli*). Col nome di « *Pavone africano* » che corrisponde al nome volgare usato a Sesto fiorentino secondo il Fontebuoni, il signor Fiorini indica un uccello di passaggio casuale in maggio nel Casentino, Arezzo, che pare essere questa specie (*Giglioli*). Accidentale in Val di Chiana, so di un solo che fu mangiato e di cui vidi le penne (*Griffoli*). Uccisi una femmina in Siena il 25 aprile 1873 (*Dei*).

Sicilia: Rarissimo nella prov. di Messina (*Ruggeri*); ne ebbi uno solo preso al Faro il 10 maggio 1884 (*Pistone*). Accidentale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte*, *Giarofalo*).

212. *Coccyzus americanus* (Linn.)

CUCULO AMERICANO.

Non ho nulla di nuovo da dire intorno a questa specie, in aggiunta a quanto scrissi in proposito nella mia AVIFAUNA ITALICA.

213. *Coccyzus erythrophthalmus*, (Wils.)

CUCULO AMERICANO OCCHIO ROSSO.

Cuculo americano dagli occhi rossi (*Aut. Ital.*).

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA, intorno a questa specie.

ANISODACTYLÆ.

ALCEDINIDÆ

(*Alcedini*).

214. *Alcedo Ispida*, Linn. (ex Gesn.)

PIOMBINO.

Martin pescadù, Re der ian-nì, Sirena, Pescamartin, Martin pescou, Merlo pescou, Seréna, Piombin (*Basso-Piem.*) — Serena (*Novara*) — Piumbén (*Rav., Bol.*) — Piumbin (*Vergato*) — Bluet (*Nizza*) — Useo smenièò, Useo santa-maria, Martinèò (*Spezia*) — Santa Maria (*Pisa, Lucca*) — Chiappapescei (*Casentino*) — Beccapesci (*Sarteano*) — Uccello bello, Mieddura d'acqua (*Calabr.*) — Auceduzzu di paradisu, Cuociu di camula, Pizza re (*Modica*) — Cocciu di campa, Martin piscaturi (*Terran. Sicil.*) — Pilloni de S. Maria (*Sard.*).

Piemonte: Frequente e sedentario al piano nella prov. Cuneo; alleva due covate, una in aprile l'altra in giugno. Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi*); ove è più numeroso nell'inverno (*Martorelli*). Abbastanza comune e sedentario in tutta la prov. di Alessandria (*Camusso*). Non sedentario nell'Ossola (*Bazetta*). In Valsesia fa una covata dall'aprile al luglio (*Guarinoni*); nel distretto di Verbania di passaggio in settembre e ottobre (*De-Donato*). Sedentario in Piedimulera, Novara, è sedentario (*Danisi*). Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Stefanini*). Così in quella di Bergamo (*Brambilla*). Sedentario e comune in

quella di Cremona (*Ferragni*). Così nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Frequente e sedentario nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Così nel distretto di Feltre, Belluno, al piano (*Delaito*). Comune e sedentario nel Friuli, nidifica in maggio e giugno (*Vallon*, *Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissimo e sedentario nelle prov. di Ravenna e Bologna (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario, ma specialmente autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarso, anche lungo il mare nel distretto di Savona, non consta che vi abbia nidificato (*Piccone*). Sedentario e comune in quello di Arenzano (*Luciani*); così pure nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Frequente e sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune ovunque e sedentario nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in quello di Lavajano (*Papasogli*). Non abbondante, ma sedentario nella prov. di Firenze (*Turchetti*, *Gargioli*, *Ginori*, *Fontebuoni*). Comune e sedentario al piano nel Casentino (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Piuttosto frequente e sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci*, *Morri*). Comune e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Comunissimo e sedentario in Toscana; nell'ottobre diventa erratico (*Roster*).

Marche: Comune e sedentario al piano (*Paulucci*).

Campania: Sedentario e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*). Passa in branchetti alla fine di aprile e nel maggio all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Sedentario e comune, più frequente nell'estate, ma non mai abbondante (*De Romita*).

Calabrie: Piuttosto raro, ma sedentario nella prov. di

Catanzaro (*De Fiore*). Comune e sedentario in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Sedentario e comune, specialmente al litorale, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente e sedentario in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Invernale e non frequente nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Raro al piano, ma sedentario in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario, ma si vede più facilmente nell'inverno (*Bonomi*).

CORACIIDÆ

(*Coracie*).

215. *Coracias Garrula*, Linn. (ex Gesn.)

GHIANDAIA MARINA.

Cornacchia celeste, Picchio marino femmina (*Aut. Ital.*)
— Sirenón, Serénón (*Basso-Piem.*) — Giàje marine (*Frinli*)
— Gai marin (*Nizza*) — Seenun (*Arenzano*) — Gaza maina (*Spezia*) — Uccello turco (*I. di Giglio*) — Carragiau, Pica marina (*Calabr.*) — Carraru (*Mess.*) — Carragiàu (*Lentini*)
— Carcarazza di mari (*Modica*) — Càrnagiaju (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Accidentale; nel 1871 un esemplare venne ucciso in Bra; nel maggio 1881 un secondo fu preso a S. Benigno presso Cuneo (*Abre*). Nella prov. di Torino l'ho avuta varie volte (*Pezzi*); vi è accidentale (*Gasca*). Così nella prov. di Alessandria, ove un maschio venne ucciso presso Novi nella primavera 1870; pare però che abbia nidificato presso Serravalle Scrivia (*Camusso*). Di casuale

comparsa nell'Ossola (*Bazetta*). Di comparsa accidentale in aprile e settembre nella Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia : Di casuale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Cremona, ove ne venne colta una ad Alfiano nel settembre 1884 (*Ferragui*). Rara, presa a Bozzolo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Nella valle dell'alto Adige qualcuna si vede ogni anno, specialmente in aprile e maggio (*A. Bonomi*). Nel Friuli è rara e pare essere di solo passo, l'ebbi in aprile e settembre (*Vallon*); rarissima nel distretto di Cividale (*Del Torre*). È rara nella prov. di Padova, ove però diversi esemplari vennero colti (*Arrigoni*). Rara assai in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Rara nella prov. di Parma: avuta il 28 aprile e nella prima metà di settembre (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio regolare in maggio nel Nizzardo (*Gal*). Scarso nel distretto di Savona, ove si vede alla fine di aprile od in maggio (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove è comune (*Luciani*). Scarsa, forse nidificante, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Di passo irregolare in primavera ed autunno nella prov. di Lucca, ne ebbi un giovane nel settembre in Valle di Freddana (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa giunge regolarmente nel maggio (*Gragnani*). Scarsa nella prov. di Firenze, ove si vede in maggio ed ottobre (*Lenzi, Fontebuoni*). Rara nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Piuttosto rara in Val di Chiana, ove ne ho vedute in primavera inoltrata, mai in autunno (*Griffoli*). Estiva, ma non comune nel Senese (*Dei*); specialmente di passo in aprile ed agosto-settembre nella prov. di Grosseto (*Ademollo, Cambi*). Rara di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e comune in Toscana (*Roster*).

Marche : Scarsa al piano (*Paolucci*).

Campania : Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Vedonsi individui isolati di passo alla fine di marzo ed in aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Non abbondante, giunge in maggio, nidifica nella regione boschiva e parte o ripassa nell'autunno (*De Romita*).

Calabrie : Comune dovunque dalla metà di aprile a quella di ottobre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Frequente in collina in aprile e maggio nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Comune e nidificante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica, ove giunge in aprile, nidifica al piano in giugno e luglio allevando una covata di 4 a 7, e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Frequente ed estiva nel distretto di Terranova, Caltanissetta; giunge alla metà di aprile e parte in settembre (*Carvana*). Rara in Castelbuono, frequente in Petralia in primavera, e anco nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Scarsa, giunge in primavera e parte in settembre; nidifica nel piano di Ardara e Chilivani (*Bonomi*).

MEROPIDÆ

(*Vespieri*).

216. *Merops Apiaster*, Linn. ex Gesn.

GROTTAIONE.

Sirena, Serena (*Basso-Piem.*) — Usel vespee (*Lomb.*) — Tordo marin, Tordo de Russia (*Padova*) — Dardar (*Bologna*) — Sera corsa (*Nizza*) — Seenna (*Arenzano*) — Tordo main (*Spezia*) — Dardàn (*Beverino*) — Cione, Ciane, Cruccione (*Pisa*) — Nottaione (*Tosc.*) — Acquaiolo (*I. di Giglio*) — Aparuolo (*Ielsi*) — Verderame, Aparuolo (*Foggia*) — Lupa-ruolo (*Brindisi*) — Pizzifainu, Pizzafainu (*Calabr.*) — Pizzi-

ferru (*Lentini*) — Pizzofierru (*Modica*) — Apaluoru, in primavera, Vignignuolu, in autunno (*Castell. Madonie*) — Puzzonei birdi (*Fonni, Sard.*) — Rundini murinisca (*Manojada, Sard.*) — Abiargiu (*Lanusei*).

Piemonte: Scarso al piano nella prov. di Cuneo; di passaggio nella prima metà di maggio (*Abre*). Un esemplare venne preso a Staffarda in prov. di Torino il 18 aprile 1886 (*Bainotti*); vi è accidentale affatto (*Gasca*). Rarissimo nel Basso Piemonte, ma pare aver nidificato presso Serravalle Scrivia (*Camusso*). Accidentale nell'Ossola (*Bazetta*).

Lombardia: Di casuale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Di passaggio nella prov. di Cremona ove era in passato più comune (*Ferragni*). Raro in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di casuale comparsa nel Friuli; un giovane fu preso il 28 agosto 1885 ad Udine, ed uno a Cividale nel luglio precedente (*Vallon, Del Torre*). È piuttosto raro nella prov. di Padova, ove però ha pure nidificato (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Passa molto in alto in aprile e settembre nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove è assai dubbioso che qualche coppia rimanga a nidificare (*Bacchi della Lega*). Estivo ed anche nidificante nella prov. di Parma; ebbi le uova il 13 giugno (*Del Prato*).

Liguria: Di copioso passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarso nel distretto di Savona, passa dalla fine di aprile a tutto maggio, ripassa in settembre (*Piccone*). Comune dalla fine d'aprile a tutto maggio in quello di Arenzano (*Luciani*). Di doppio passaggio regolare, più scarso però in autunno, nel distretto di Spezia, ove qualcuno rimane a nidificare (*Carazzi*).

Toscana: Passa regolarmente in maggio nella prov. di Lucca, ma per lo più vien soltanto udito o visto per aria, giacchè di rado si abbassa durante il suo viaggio diurno, spesso si odono senza poterli scorgere tanto sono in alto

(*Martarelli, Fontebuoni*); molti nidificano nella tenuta del Duca Salviati a Migliarino (*Gragnani*). Estivo e abbondante, nidifica a colonie in collina nel distretto di Fauglia, Pisa (*Otto*); scarso in quello di Lavajano (*Papasogli*). Scarso di passo in primavera ed autunno nella prov. di Firenze (*Turchetti, Gargioli, Fontebuoni, Giglioli*). Scarso di passo nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune, ma non ugualmente ogni anno in Val di Chiana, passa in grossi branchi in maggio e settembre (*Griffoli*). Estivo e nidificante a colonie in Val d'Orcia, Siena (*Bargagli*); di doppio o scarso passo nel distretto di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune da maggio a settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa in maggio e giugno all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estivo ed abbondante in alcune località della Toscana (*Roster*).

Marche : Comune al piano, passa in aprile-maggio ed in settembre-ottobre (*Paolucci*).

Lazio : Raro assai nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi : Frequente, ma soltanto di passo in settembre nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania : Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in aprile e maggio e ancora in settembre all'isola di Capri, in branchi di 20 a 50 individui (*Cerio*).

Puglie : Di passo abbondante alla fine di aprile ed in maggio; nidifica sulle Murge, parte e ripassa in settembre (*De Romita*).

Calabrie : Estivo e comune di passo nella prov. di Catanzaro, giunge in aprile e parte in ottobre (*De Fiore*). Frequentissimo di passo in aprile e maggio nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Abbondante di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica, ove giunge in aprile e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Estivo pure nel distretto di Terranova, Caltanissetta; giunge in aprile e parte in agosto settembre (*Car-*

vana). Frequente al piano, passa soltanto in primavera, fa breve dimora nel distretto delle Madonie, Palermo, in autunno (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Giunge in aprile e maggio abbondante, nidifica e parte in settembre (*Bonomi*).

217. Merops persicus, PALL.

GROTTAIONE EGIZIANO.

Pizzaferru svariù (*Mess.*).

Liguria: Accidentale nel distretto di Spezia: ne ebbe uno il prof. Magni-Griffi nel maggio 1858 e lo conserva nella sua raccolta a Siena ¹ (*Carazzi*).

Puglie: Accidentale; sinora un solo preso, nell'aprile 1874 presso Bari (*De Romita*).

UPUPIDÆ

(*Upupe*).

218. Upupa Epops, Linn. ex Gesn.

BUBBOLA.

Galét d'marz, Galet d'ra pupù, Galetto, Galetto d'marzo, Po-pò, Bobò, Poupoù (*Basso-Piem.*) — Puppola, Pupa, Upa, Buba (*Nov.*) — Böba (*Berg.*) — Pochéta, Galét (*Feltre*) — Galet da montagna (*Cadore*) — Upùpa, Galèto mejaròlo. Bubu (*Padova*) — Pòpa (*Ravenna*) — Pùppla (*Bologna*) — Pùppla (*Vergato*) — Galetto de marso (*Spezia*) — Bumbola

¹ Non so davvero come potè sfuggirmi questa specie rarissima, quando visitai la Collezione interessante del prof. Magni-Griffi.

(*L. di Giglio*) — Uppola (*Roma*) — Gallo di selva, Luppa (*Campobasso*) — Lupolo (*Foggia*) — Coppulari (*Nap.*) — Pipitune, Pipituni (*Calabr.*) — Brubola (*Sicilia*) — Pipituna (*Lentini, Modica*) — Galettè marzo (*Sard.*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo, vi nidifica una sola volta nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*); nel dicembre 1885 ne trovai un esemplare sul mercato di Torino (*Martorelli*). Abbondante nella prov. di Alessandria, ove giunge alla fine di marzo, annida e riparte alla fine di ottobre (*Camusso*). Nell' Ossola giunge in aprile, nidifica e parte in settembre (*Bazetta*). Nidifica di rado in Valsesia allevando una sola covata (*Guarinoni*); rara di passo in primavera nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara (*Demori, Danisi*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa al piano in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Estiva e piuttosto comune nella prov. di Cremona; giunge in marzo e talvolta in febbraio, parte e ripassa in agosto e settembre (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova, giunge in aprile e parte in ottobre (*Paglia*). Generalmente frequente nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Rara nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Di passaggio e nidificante nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarsa nel Cadore, Belluno, nidifica nei fori tra le roccie ed alleva una sola covata; giunge in aprile e parte in agosto (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Non rara nel Friuli, ove l' ho veduta alle due epoche del passo, aprile e settembre; sono propenso a credere che nidifichi in provincia (*Vallon*); è dubbioso se nidifichi nel distretto di Cividale, ove l' ho veduta soltanto in primavera (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa ma nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Piuttosto frequente nelle prov. di Ravenna e Bologna, ove giunge in aprile e parte in settembre (*Bacchi della Lega*). Estiva, ma non frequente nel distretto di Ver-

gato, Bologna (*Lorenzini*). Estiva e non rara nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Estiva nel Nizzardo e di doppio passaggio (*Gal*). Alquanto scarsa nel distretto di Savona, passa in marzo ed aprile, ripassa in settembre ed ottobre (*Piccone*). Comune in marzo ed aprile in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente nel distretto di Spezia giunge in marzo ed aprile e qualcuna vi nidifica; parte e ripassa in settembre (*Carazzi*).

Toscana: Nella prov. di Lucca giunge ai primi d'aprile e parte o ripassa in settembre, pochi rimangono a nidificare (*Martorelli, Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa si vede già in marzo (*Gragnani*). Comune da marzo a settembre nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott, Papasogli, Degli Alessandri*). Abbastanza frequente nella prov. di Firenze, arriva in marzo-aprile e parte in settembre (*Gargioli, Fontebuoni*); scarsa nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*). Comune nel Casentino, Arezzo: giunge in marzo e parte in settembre-ottobre (*Beni, Pauer*); passa anche in maggio (*Fiorini*). Estiva e comune nei boschi, in agosto scende al piano in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune dall'aprile al settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Passa dalla metà di marzo a quella d'aprile e nella prima quindicina di settembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e abbondante in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano, passa in marzo-aprile ed in settembre-ottobre (*Paolucci*).

Abruzzi: Frequente, giunge ai primi d'aprile e parte in settembre nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Vedonsi individui isolati di passo all'isola di Capri alla fine di marzo ed in settembre (*Cario*).

Puglie: Estiva e di passo in aprile-maggio e settembre (*De Romita*).

Calabrie: Estiva, giunge in aprile e parte in ottobre, è specialmente comune al passo primaverile nella prov. di

Catanzaro (*De Fiore*). Frequente in aprile e maggio in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune e nidificante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*); verso la fine del novembre 1883, ne ho avute diverse uccise nei pressi di Messina; ed il 20 gennaio 1881 vidi alcune Bubbolo nei piani paludosi di Spaccaformo (*Pistone*). Frequente nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Così in quello di Modica, al piano, dalla metà di marzo alla metà di settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Giunge in marzo-aprile e parte in settembre, nel distretto di Terranova, Caltanissetta; è più abbondante nel passo primaverile (*Carrara*). Frequente ai monti in aprile, qualcuna rimane l'estate e nidifica nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo in primavera e nidificante, parte in settembre e ottobre; abbonda nei piani di Castiadas, Chilivari ed Oristano (*Bonomi*).

STRIGES.



STRIGIDÆ

(Strigi).



219. *Strix flammea*, Linn. (ex Gesn.)

BARBAGIANNI.

Dona (*Alba*) — Dama, Damina, Damin-a (*Basso-Piem.*) — Cravea, Cravareul (*Novara*) — Lourouck (*Lomb.*) — Balúco (*Padova*) — Ciuite (*Friuli*) — Barbazagn (*Vergato*) — Mou-nega (*Nizza*) — Rumfun (*Savona*) — Aüco (*Spezia*) — Gufo (*Marche*) — Facciomo (*Campobasso*) — Malaciedd (*Bari*) — Facciòmm, Facciòmmo jàncu (*Nap.*) — Varvajanni, Bar-vajanni, Barbajanni (*Calabr.*) — Barbajanni, Piula (*Mess. Lentini, Modica, Terran. Sicil.*) — Faguanu biancu (*Castelb.*) — Stria bianca (*Sard.*).

Piemonte: Frequente e sedentario ovunque nella prov. di Cuneo, vi nidifica una sola volta, nel maggio (*Abbr.*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Comune e sedentario al piano, scarso al monte in prov. di Alessandria; qualche individuo però emigra nell'inverno (*l'amusso*). Rarissimo nell'Ossola (*Bazetta*): vi ha nidificato (*Pertusi*). Nella Valsesia alleva una sola covata nel giugno (*Guarinoni*); è sedentario nel distretto di Piedimulera, raro e di doppio passo in quello di Crodo, Novara (*Danisi, Demori*).

Lombardia: Non comune nella prov. di Sondrio; vive al piano (*Galli*). Frequente ovunque in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune e

sedentario in quella di Cremona (*Ferragni*). Così nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Poco comune nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente e sedentario al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso, ma sedentario nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissimo e sedentario nel Friuli; nidifica dal maggio al giugno (*Valton, Del Torre*). Comunissimo e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune e sedentario in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Rarissimo nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario e comune nel Nizzardo, nidifica anche nel Castello di Nizza (*Gal*). Sedentario, ma non abbondante, sugli edifizi, nel distretto di Savona (*Piccone*); così in quello di Arenzano, ove è comune (*Luciani*). Comune e sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Frequente e sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*); sarebbe anco di passo nel marzo (*Fontebuoni*). Comune e sedentario nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso e anche di passo in ottobre in quello di Lavajano (*Papasogli*). Non abbondante, ma sedentario nella prov. di Firenze, ove sarebbe anco di passo (*Turchetti, Gargioli, Ginori, Fontebuoni*). Comune e sedentario al piano nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Sedentario e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune e sedentario ai monti (*Paulucci*).

Lazio: Sedentario e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Sedentario e frequente ovunque nella prov.

di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sedentario e nidificante all' isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Sedentario e comune (*De Romita*).

Calabrie: Comune e sedentario nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Scarso e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente e sedentario in quello di Modica (*Della fonte, Garofalo*). Così in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente e sedentario al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario, variano alquanto e ne presi uno albino nei pressi di Cagliari (*Bonomi*).

BUBONIDÆ

(*Gufi*).

220. *Syrnium Aluco* (Linn.) (ex Gesn.)

ALLOCCO.

Uròcc, Oocco, Auco (*Basso-Piem.*) — Lolôch (*Ossola*) — Cul da ja jeui (*Nov.*) — Lok de bosk (*Berg.*) — Lourouk (*Mil.*) — Siveton (*Cremona*) — Lourouk (*Lomb.*) — Alòcc (*Frinli*) — Sbaregol (*Belluno*) — Sberegh (*Feltre*) — Alòco salvadègo, Alòco de palù (*Padova*) — L'Osèl cavalaro (*Rovigo*) — Locch (*Vergato*) — Aùco (*Spezia*) — Barbagianni (*Pisa*) — Olocco (*Garf.*) — Gufo (*Marche*) — Guléo (*Calabr.*) — Cuccu di passa, Fuannu (*Mess.*) — Fuànu (*Lentini*) — Fruguànu (*Modica*) — Fruguànu (*Castelb.*).

Piemonte: Frequente al monte in prov. di Cuneo, vi nidifica una sola volta nel maggio (*Abre*). Poco frequente

in prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Piuttosto raro, solo al monte in prov. di Alessandria, i più emigrano nell'inverno (*Camusso*). Comune e sedentario nell'Ossola, ove abita di preferenza i monti (*Bazetta*). Nella Valsesia nidifica una sola volta in maggio (*Guarinoni*); nel distretto di Crodo è sedentario, ma non comune (*Demori*).

Lombardia: Scarso ai monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Autunnale, forse nidificante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro nella Lombardia (*Turati*); piuttosto comune (*Borromeo*).

Veneto: Scarso ai monti, ove nidifica ed è sedentario nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Piuttosto raro nel Friuli, ne ebbi parecchi nel dicembre 1879, e poi non ne vidi (*Vallon*); nidifica nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Sedentario nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario nella prov. di Parma; il 24 maggio ebbi il giovane già svelto (*Del Prato*).

Liguria: Sedentario ai monti nel Nizzardo (*Gal*). Scarso ai monti, ove forse nidifica, nel distretto di Savona; durante il passo si vede anche al piano. Ne ebbi uno, di passaggio, il 5 maggio, ed un altro il 18 agosto (*Piccone*). Raro nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Comune e sedentario in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Sedentario, ma scarso, ai monti nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Non raro e sedentario nei boschi al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso e anche di passo in ottobre in quello di Lavajano (*Papasogli*). Non abbondante, ma sedentario nella prov. di Firenze, specialmente in Mugello (*Giglioli*). Comune e sedentario ai monti nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Par essere sedentario, ma non è comune in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario ai monti nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Marri*). Comune e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso, ma sedentario (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie: Sedentario, ma poco frequente; l'ho avuto in febbraio, aprile e giugno (*De Romita*).

Calabrie: Piuttosto scarso ai monti nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Sedentario e fors'anche di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina, ove è scarso (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Sedentario e scarso in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Raro assai, di passo, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Raro ai monti, ma sedentario in quello delle Madonie, (*Palumbo, Morici*).

221. *Syrnium uralense* (Pall.)

ALLOCCO DELL'URALE.

Gufo degli Urali (*Aut. Ital.*).

Nel settembre 1879 io visitai il signor Mosero a Udine, vidi la sua piccola raccolta, egli allora non aveva avuto il *S. uralense*; nel dicembre successivo egli mi scrisse e nella sua lettera menziona un grosso Allocco avuto sul mercato, ma non in modo da richiamare specialmente la mia attenzione; era appunto quello l'esemplare ceduto poi al dott. De Carli e venuto quindi in possesso della Collezione italiana centrale a Firenze, mercè gli amichevoli uffici del signor Vallon. Ciò spiega come per caso mi trovai meglio in grado di precisare la data di cattura di quella interessante specie.

Il 1 gennaio 1887, fu ucciso nelle vicinanze di Trieste un bellissimo esemplare di questa specie, che venne preparato per quel Museo Civico. Ebbi questa notizia interessante dai signori G. Vallon e A. Valle; questi, che è assistente nel Museo Civico di Trieste, mi ricorda che ivi, nella collezione Eggenhöfner, si conserva pure un vecchio esemplare del *S. uralense*, senza data di cattura, ma che sembra essere stato probabilmente preso in quei pressi.

222. Nyctala Tengmalmi (J. F. Gmel.)¹

CIVETTA CAPO-GROSSO.

Sieta del co gros (*Bergamo*) — Zhiveta da croda (*Belluno*) — Zhuita da campagna (*Cadore*).

Lombardia: Rara al monte nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di comparsa accidentale nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Di rarissima comparsa in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Nel Museo Civico di Rovereto (Trentino), che visitai per la prima volta il 28 agosto 1887, vidi ben quattro individui di questa specie presi nel Trentino; e seppi che la Civetta capo-grosso senza essere abbondante è uccello sedentario nei boschi di conifere nell'alto di quelle valli (*Giglioli*). È scarsa, ma sedentaria nel Cadore, Belluno. nidifica in giugno nel cavo degli alberi annosi, depone 2 a 3 uova di un bianco sporco ed alleva una sola covata (*Tissi*). Ebbi un bellissimo individuo, femmina adulta, colto nei pressi di Pieve di Cadore il 5 marzo 1888 (*Giglioli*). Rarissima nel Friuli: ne vidi un solo esemplare friulano, che si conserva nella raccolta del signor De Carli di Gemona (*Vallon*). Di comparsa accidentale nella prov. di Padova; ne ebbi uno colto il 13 settembre 1886 sul Monte Venda, il più alto degli Euganei (*Arrigoni*).

Liguria: Assai rara in montagna nel Nizzardo; avuta quattro volte d'inverno (*Gal*).

¹ Il Bonaparte (*Iconog. Faun. Ital. Uccelli*, Introd. p. 6) indica la *Surnia ulula* come di rara comparsa in Italia; ma non precisa alcun caso e sono d'accordo col Salvadori nel dubitare della esattezza dell'asserzione. Nessun Ornitologo, che io mi sappia, ha citato esemplari italiani di quella specie, in nessuna raccolta ne ho veduto; uno l'avrebbe veduto il mio amico G. Vallon in una collezione presso Udine, ma dalle indagini fatte quell'esemplare risultò non essere di provenienza italiana. La *S. ulula* giunge però nell'inverno nelle contrade centrali dell'Europa e potrebbe benissimo varcare i confini del paese nostro.

223. Asio Otus (Linn.) (ex Gesn.)

GUFO.

Mesdùch, Urócc, Lurócc, Aucco (*Basso-Piem.*) — Sceve-ton, Cul da ja jeui, Olouch di bosch (*Nov.*) — Lok (*Berg.*) — Ciusso (*Veron.*) — Gufo, Aloco coi corni (*Vicenza*) — Ciò (*Cadore*) — Catùss (*Friuli*) — Burububù (*Feltre*) — Necioula, Picioun dugo (*Nizza*) — Testa gatto (*Arenzano*) — Gùfo (*Spezia*) — Bufo (*Pisa*) — Allocco (*Lucca*) — Gufo, Ngannapastore (*Campobasso*) — Cuccazzu (*Mess.*) — Curnuteddu (*Terran. Sicil.*) — Faguanu (*Castelb.*).

Piemonte: Scarso al monte in prov. di Cuneo, d'inverno scende al piano; da noi nidifica una sola volta nel maggio (*Abre*). Poco frequente in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Rarissimamente nidificante in quel di Voltaggio; pochi individui rimangono a svernare nel Basso Piemonte (*Camusso*). Non raro nell'Ossola, ove però non si vede nell'inverno (*Bazetta*). Di passaggio tra il 15 maggio e il 15 giugno nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Scarso ai monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Puramente invernale in quella di Cremona (*Ferragni*). Poco comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nel distretto di Caprino (Verona) è abbastanza comune e sedentario, nidifica nei boschi (*Pellegrini*). Piuttosto scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno, ove nidifica nel maggio depone 4 a 5 uova ed allevando una sola covata (*Tissi*): così nel distretto di Feltre, ove però è scarso (*Delaito*). Non raro nel Friuli, ove deve nidificare, giacchè l'ho veduto più volte nel bosco di S. Giovanni Manzano nel maggio e nel luglio (*Vallon*); pare esserè sedentario nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Abbastanza frequente nella prov. di

Padova (*Arrigoni*). Comune, sedentario e nidificante in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nel distretto di Vergato, prov. di Bologna, ove venne preso uno nell'ottobre 1887 (*Lorenzini*). Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passo in novembre nel Nizzardo (*Gal*). Ne ho veduti molti nel distretto di Savona, ma eccetto uno preso il 2 aprile ed un altro preso il 4 novembre, sempre nell'inverno (*Piccone*). Comune nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Abbastanza frequente nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Veduto soltanto in ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli*); sedentario nel distretto di Massarosa (*Graguani*). Assai comune ovunque nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Scarso nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*); vedesi specialmente dall'ottobre al dicembre (*Giglioli*). Non comune, ma sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*, *Marri*). Non comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*); sedentario in Maremma (*Cambi*). Comune e, credo, sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune ovunque (*Paolucci*).

Abruzzi: Frequente e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Non infrequente alle due epoche del passo (*De Romita*).

Sicilia: Sedentario e di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte*, *Garofalo*). Sedentario; ma raro in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Poco frequente, ma sedentario ai monti, vi nidifica nei boschi in aprile, deponendo 4 uova; nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

224. *Asio accipitrinus* (Pall.)

GUFO DI PADULE.

Ganavel di fau, Uróce, Luróce, Barba Giuân, Testa-gatto, Aucco (*Basso-Piem.*) — Çoetón de vále, Alocòn (*Padova*)—Necioula, Picioun Dugo (*Nizza*)—Testa gatto (*Arenzano*) — Güfo (*Spezia*) — Allocco (*Lucca*) — Gufo (*Marche*) — Guliu (*Calabr.*) — Cuccuni di passa (*Mess.*) — Cuccu di passa (*Modica*) — Triorva (*Terran. Sicil.*) — Stria groga (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al monte in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in marzo e settembre (*Abre*). Poco frequente in quella di Torino (*Gasca*). Ho constatato la nidificazione casuale anche di questa specie nel territorio di Voltaggio; abbonda durante la migrazione autunnale nel Basso Piemonte (*Camusso*). Giunge raramente di passo nell'Ossola, ove non avrebbe nidificato (*Bazetta*). Scarso, di solo passo nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Non comune sui monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di passo autunnale regolare, da settembre a novembre, nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Piuttosto raro in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune e nidificante nel Friuli; l'ebbi in aprile ed in novembre (*Vallon*); non raro nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Poco frequente nei luoghi paludosi nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune, sedentario e nidificante in quella di Rovigo, ove talvolta nell'autunno vedesi abbondante (*Dal Fiume*).

Emilia: Non comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio regolare in novembre e dicembre nel Nizzardo (*Gal*). Anche questa specie pare essere invernale nel distretto di Savona, che lascia in aprile (*Piccone*). Comune e sedentario nel distretto di Spezia (*Caruzzi*).

Toscana: Di passo in primavera nella prov. di Lucca

(*Martorelli*): sedentario nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Non comune nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*); vedesi specialmente in marzo-aprile ed ottobre-novembre, ma ha nidificato nei pressi di Firenze, AVIF. ITAL. p. 225 (*Giglioli*). Non comune nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Scarso, ma sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Avuto in dicembre nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paolucci*). Piuttosto comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*); sedentario in Maremma (*Ademollo*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune ovunque (*Paolucci*).

Puglie: Di doppio passo, un poco più frequente della specie precedente (*De Romita*).

Calabrie: Scarsamente sedentario, ma comune alle epoche del passo, nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Sedentario e di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, di passo in marzo-aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Sarebbe di passo primaverile in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Raro ai monti, ma sedentario; vi nidifica nelle cartiere in maggio; nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Migrante e forse in parte sedentario; ho sempre ucciso questa specie durante il passo delle Quaglie in settembre-ottobre, alla Plaja presso Cagliari (*Bonomi*).

225. *Glaucidium passerinum* (Linn.)

CIVETTA MINORE.

Zhuitta da bosch (*Cadore*).

Nel Museo Civico di Rovereto, ho esaminato nell'agosto 1887 un bellissimo individuo di questa specie proveniente da Rabbi. Seppi inoltre che la Civetta minore è specie sedentaria, ma scarsa, nelle alte valli del Trentino, ove nidifica nelle foreste di Conifere. Rammenterò inoltre che nel Museo del R. Istituto Tecnico di Bergamo ho veduto un

esemplare di questa specie che sarebbe stato colto in quei monti molti anni fa; è l'individuo che citai (*Arif. Ital.* p. 226) come esistente nel Liceo di Bergamo. Nella Collezione del conte Camozzi non esiste alcun esemplare del *G. passerinum*.

Veneto: Scarso, ma sedentario in montagna, nel Cadore, Belluno; nidifica nei boschi nei cavi di alberi vetusti, depone nel giugno 2 a 3 uova bianche ed alleva una sola covata (*Tissi*).

226. *Athene Noctua* (Scop.)

CIVETTA.

Carine noctua, Salvad.

Sivétta, Suétta, Sciucco, Suguettra, Sugretta, Ciò, Siguetttra (*Basso-Piem.*) — Çoéton (*Padova*) — Zoeta, Ziveta (*Vicenza*) — Zhuita (*Cadore*) — Zhivita, Zhuita, Zhoéta (*Feltre*) — Soeta (*Rovigo*) — Zvetta (*Bol.*) — Zivetta (*Vergato*) — Maciotta (*Nizza*) — Sivettoa (*Spezia*) — Cevèttola (*Nap.*) — Druutz (*Albanesi italiani*) — Picciusa, Pigula, Cuccuvella. Civetta (*Calabr.*) — Cuccu (*Lentini*) — Cuca (*Modica*).

Piemonte: Frequente e sedentaria ovunque in prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta, nel maggio (*Abrev.*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi*); l'osservai specialmente all'epoca della nidificazione (*Martorelli*). Nella prov. di Alessandria è ovunque comunissima e nidificante; alcuni partono nell'autunno altri rimangono a svernare (*Camusso*). Rara nell'Ossola superiore, comune nell'Ossola inferiore (*Bazetta*). Nidifica una sola volta in maggio nella Valsesia (*Guarinoni*); è sedentaria nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara (*Demori, Danisi*).

Lombardia: Comunissima in collina nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente al piano in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Sedentaria, ma anche migrante nella prov. di Cremona (*Ferraguti*). Co-

munissima in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente frequente in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Assai comune nel distretto di Caprino, Verona, nidifica tra le roccie (*Pellegrini*). Frequente e sedentaria nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Frequente e sedentaria nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però è scarsa (*Delaito*). Comune assai e sedentaria nel Friuli, nidifica in maggio (*Vallon*, *Del Torre*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Frequente e sedentaria nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Sedentaria e comune nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove però è più abbondante nell'inverno (*Piccone*). Così pure in quello di Arenzano (*Luciani*). Comune e sedentaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Frequente e sedentaria nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Graguani*). Comune e sedentaria nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott*, *Papasogli*, *Venerosi*). Frequente e sedentaria nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Gargioli*, *Ginori*, *Fontebuoni*). Comune e sedentaria al piano nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Assai comune e sedentaria in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Comunissima e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Sedentaria e nidificante sull'isola di Giglio (*Biunchi*). Comune e sedentaria in Toscana (*Roster*).

Marche : Frequente ovunque e sedentaria (*Paolucci*).

Lazio : Sedentaria e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi : Comune e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania : Sedentaria e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Comune e sedentaria (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante dovunque e sedentaria nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune e sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*); ed in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Frequente e sedentaria nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentaria ovunque (*Bonomi*).

227. Scops Giu (Scop.)

ASSIOLO.

Suettin, Sivettin, Ciò (*Basso-Piem.*) — Sciscieu (*Lomb.*) — Lochet, Siseol (*Berg.*) — Sciscieu (*Mil.*) — Siven (*Cremona*) — Cius (*Vicenza*) — Zhus (*Feltre, Cadore*) — Giù, Çiucch (*Friuli*) — Ciuu (*Vergato*) — Maciotta (*Nizza*) — Ciodo (*Spezia*) — Chiurlo, Chirluchiò (*Pisa*) — Chiurlo-in-Chiò (*Lucca, Valli di Sopa*) — Chiù (*Casentino*) — Chiurlo (*Sarteano*) — Chiò (*Garf.*) — Chiu (*Marche*) — Gufetto (*Viterbo*) — Chiò (*Catanzaro*) — Zivittula, Scropiu (*Reggio Calabr.*) — Scupiu (*Mess.*) — Chiù, Gioppu (*Lentini*) — Facuopu (*Modica*) — Chiuppu (*Terran. Sicil.*) — Chiò, Jacobu (*Castell.*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo, vi nidifica una volta, nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca*); nell'estate (*Martorelli*). Non abbondante nella prov. di Alessandria ove giunge a primavera avanzata, anida e riparte dalla fine di settembre alla metà di ottobre (*Camusso*). Abbastanza comune nell'Ossola, ove giunge in maggio, nidifica e parte in ottobre (*Bazetta*). Nidifica in maggio e giugno nella Valsesia (*Guarini*); è sedentario ? nel distretto di Piedimulera (*Danisi*); raro e di solo passaggio in quello di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Sparso, ma non abbondante, nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente ovunque nella prov. di Bergamo

(*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Puramente estivo nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Sparso ed estivo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno, giunge nel maggio e parte in settembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Frequente nel Friuli, ove arriva in marzo e parte in agosto o settembre (*Vallon*, *Del Torrè*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso ed estivo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Estivo e frequente nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Non raro ed estivo nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, nidifica nelle valli boschive, giunge dalla metà di marzo a tutto aprile, parte in settembre, o nella prima metà di ottobre (*Piccone*). Comune in quello di Arenzano (*Luciani*). Nel distretto di Spezia arriva in marzo ed aprile, nidifica e parte in settembre (*Carazzi*).

Toscana : Frequente ed estivo, giunge in marzo nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Estivo e frequente, giunge in aprile, parte in agosto e settembre nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott*, *Papasogli*, *Venerosi*); fors'anche sedentario in quello di Fauglia (*Ott*). Generalmente frequente ed estivo nella prov. di Firenze, giunge in marzo-aprile e parte in agosto-settembre (*Gargioli*, *Ginori*, *Fontebuoni*); piuttosto scarso nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); qualcuno sverna casualmente in provincia, AVIF. ITAL. p. 229 (*Giglioli*). Comune da marzo ad ottobre nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Comune assai nell'estate, ma non sverna in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo e frequente nel distretto di Sarteano, e specialmente in Val d'Orcia, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci*, *Marri*). Comune da aprile a settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*). Estivo e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Piuttosto scarso (*Paolucci*).

Lazio: Estivo e scarso nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Sedentario e frequente ovunque nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*). Vedonsi individui isolati di passo a Capri nell'aprile (*Cerio*).

Puglie: Estivo e nidificante, più frequente in primavera (*De Romita*).

Calabrie: Comune e anche sedentario nella prov. di Catanzaro (*De Fiori*). Estivo e frequente in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Estivo e comune nella prov. di Messina, di rado qualcuno vi rimane a svernare (*Ruggeri*, *Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica dalla metà di marzo alla metà di ottobre (*Della-forte*, *Garofalo*). Estivo, da marzo a settembre, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Estivo e frequente, giunge alla metà di marzo nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Di passo irregolare ed anche sedentario, sverna al piano (*Bonomi*).

228. *Bubo maximus*, Gerini ex Charleton

GUFO REALE.

Bubo ignavus, Salvad.

Dug, Dugo, Oocco grosso (*Basso-Piem.*) — Büblon (*Casteggio*) — Bourv (*Nor.*) — Bubo, Gran Bubo (*Veron.*) — Gufo grande, Aloco grande (*Vicenza*) — Gufo, Dugo (*Cadore*, *Feltre*) — Gran duca (*Rovigo*) — Barbezuan grand (*Friuli*) — Dugou (*Nizza*) — Nduccu, Dduccu (*Calabr.*) — Cuccuni (*Mess.*) — Fujanazzu, Auceduzzu di notti (*Modica*) — Faguanazzu (*Castellb.*, *Madonie*).

Piemonte: Frequente al monte in prov. di Cuneo, vi nidifica nell'aprile allevando una sola covata; d'inverno

scende al piano (*Abre*). Non comune nel distretto di Torino (*Gasca*); nella provincia è piuttosto comune (*Martorelli*). Piuttosto raro nella prov. di Alessandria: abita l'alto monte, vi giunge a primavera, annida e per lo più riparte nell'autunno; qualcuno però rimane a svernare (*Camusso*). Abbastanza comune e sedentario nell'Ossola; nidifica ai monti sino ai 2000 metri. Esso non teme di avventurarsi fino nel mezzo dell'abitato: nel gennaio 1867 venne preso un Gufo reale entro un pollaio nel villaggio di Casale Corte Cerro; nel gennaio 1873 un altro si prese entro una piccionaia nel bel mezzo di Domodossola; un altro, entrato nel pollaio di una casa colonica alle porte di Domodossola nel 1885, non seppe uscirne (*Bazetta*). Nella Valsesia fa una sola covata in aprile e maggio (*Guarimoni*); nei distretti di Crodo e di Piedimulera, Novara, è raro, ma sedentario (*Demori, Danisi*).

Lombardia: Comune nella prov. di Sondrio, vive in montagna, ma scende anche al piano (*Galli*). Scarso sui monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Di rara comparsa nell'autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Raro; preso a Campione nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati*); comune (*Borromeo*).

Veneto: Alquanto comune sui monti nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Scarso nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno, sui monti (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove però è meno comune e sparso (*Delaito*). Non tanto raro nel Friuli e nidificante; nel gennaio 1879 ne ebbi 3 individui, uno tolto dal nido e coperto di piumino, non mise le penne che nel maggio (*Vallon*). Nel distretto di Cividale nidifica ai monti ed è erratico nell'inverno (*Del Torre*). Da notizie assunte sarebbe localizzato ai colli nella prov. di Padova, così al Colle di Cà Barbaro presso Monselice (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Un esemplare fu preso a Fiorano, Mo-

denese, nel novembre 1884 (*Piccaglià*). Scarso, sedentario e forse anche di passo nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Non comune, ma sedentario nel Nizzardo; nidifica ai monti verso Turbie ed Escarene (*Gal*). Alquanto raro nel distretto di Savona, ove è sedentario e nidificante ai monti (*Piccone*); raro in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso, ma sedentario ai monti, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Abbastanza frequente nella prov. di Lucca; è sedentario e comune nei monti della vicina Garfagnana ove sono dirupi inaccessibili di roccia calcarea con abbondanti cavità in cui nidifica (*Martorelli*); veduto una sola volta nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Raro ai monti nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*). Raro ai monti nel Casentino, Arezzo (*Beni*); vi è sedentario (*Fiorini*). Di comparsa accidentale in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario, ma non comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Sedentario e non rarissimo in Toscana, mi consta che ha nidificato nel Casentino; all'epoca del passo sembra che alcuni giungano d'oltr'Alpe (*Roster*).

Marche : Scarso (*Paolucci*).

Campania : Sedentario, ma scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Ogni anno nella prima metà di maggio se ne prende qualcuno a Capri (*Cerio*).

Puglie : Non comune, ma neanche raro, sedentario nei boschi, ma si vede altrove alle due epoche del passo (*De Romita*).

Calabrie : Piuttosto raro, ma sedentario ai monti nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Sedentario e non raro ai monti in quella di Reggio (*Moretti*); ebbi i nidiacei in aprile (*Moschella*).

Sicilia : Raro, ma sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, ma sedentario ai monti nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Raro ai monti, ma sedentario nel distretto delle Madonie. Palermo: nidifica nelle Manche d'Alfano, ne' balzi con macechie, in aprile (*Palumbo, Morici*).

ACCIPITRES.

FALCONIDÆ

(*Falchi*).

229. *Circus æruginosus* (Linn.) (ex Aldrov.)

FALCO DI PADULE.

Lár, Fárc, Farco (*Basso-Piem.*) — Falc d'acqua (*Lomb.*) — Pojana, Poja (*Vicenza*) — Falchet paluder (*Bell.*) — Pojane col cial blanc (*Friuli*) — Pója de vale (*Padova*) — Gronouglie (*Nizza*) — Farco (*Spezia*) — Pogliana (*Lucca*) — Falco marino (*Garf.*) — Falco, Astore (*Campobasso*) — Falcone (*Napoli*) — Acedduzzu cu a testa janca (*Calabr.*) — Appegghia, Arpegghia, Farcunazzu (*Mess.*) — Culorcìa (*Lentini*) — Stori de sa puliga (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove s'incontra di passaggio soltanto nell'ottobre e nella prima quindicina di novembre (*Abre*). Rarissimo e di solo passo in autunno nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Raro nell'Ossola (*Bazetta*). Così nel Novarese (*Rodino*).

Lombardia: Accidentale in primavera nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati*); comune (*Borromeo*).

Veneto: Sparso e non comune nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso al piano nel Bellunese, ove non nidifica e passa in marzo e settembre (*Soravia*). Comune al piano e nidificante nel Friuli (*Vallon*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo, ove non consta sia sedentario (*Dal Fiume*).

Emilia: Di scarso passaggio nella prov. di Parma; avuto il 6, 8 e 17 aprile (*Del Prato*).

Liguria: Non raro di passaggio in maggio, nel Nizzardo (*Gal*). Scarso nel distretto di Savona, ove si vede in aprile e maggio (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è comune in aprile coi venti di tramontana (*Luciani*). Frequente nel distretto di Spezia, di doppio passo regolare; qualcuno rimane l'inverno (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario al piano nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Sedentario nella prov. di Firenze (*Giglioli*); comune nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); scarso in quello di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*). Scarso al piano nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Sedentario, ma non abbondante in Val di Chiana, in primavera sembra fare un passaggio numeroso (*Griglioli*). Non comune nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Non frequente nel Senese (*Dei*); sedentario in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Non raro in Toscana, specialmente alle epoche del passo (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Abruzzi: Frequente e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Accidentale nella prov. di Napoli; uno fu ucciso a Somma nel 1882 (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comune e sedentario alle Saline, frequente di doppio passo altrove (*De Romita*).

Calabrie: Comunissimo al piano e sedentario nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Sedentario e di passo in maggio-giugno ed ottobre, in quella di Reggio, ove ebbi i nidiacei in agosto (*Moschella*).

Sicilia: Sedentario e comune nella prov. di Messina, anche di passo in marzo, aprile e maggio (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Scarso, ma sedentario in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Comunissimo e sedentario ovunque sono paduli (*Bonomi*).

230. Circus cyaneus (Linn.)

ALBANELLA.

Falchet muliner (*Bergamo*) — Falcheto bianco (*Veron.*) — Pója bianca, Pója bianca de vale (*Padova*) — Falchet, Auzhel dalle pite (*Cadore*) — Sivettua gianca (*Arenzano*) — Farco gianco, Farco de padù (*Spezia*) — Falco di padule bianco (*Valdich.*) — Falcone ianco (*Nap.*) — Iurmanaro, Aceddazzu jancu (*Calabr.*) — Albeneddu de passa, Appegghia od Arpegghia janca (*Mess.*) — Farcunieddu jancu (*Modica*) — Farcuni biancu (*Castelb.*) — Stori biancu (*Sard.*).

Piemonte: Accidentale nella prov. di Cuneo; nel 1857 ne fu ucciso una presso Alba (*Abre*). Così nella prov. di Torino; il 24 aprile 1886 venne presa una femmina presso Moncalieri (*Bainotti*). Specie avventizia nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Rara nell' Ossola (*Bazetta*). Così nel Novarese (*Rodino*).

Lombardia: Di comparsa accidentale nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Di scarso passaggio in aprile e novembre nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Accidentale in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Rara nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Piuttosto rara nel Friuli (*Vallon*). Poco frequente, ma sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Di scarso passaggio nella prov. di Parma; avuta il 7 aprile e nell' ottobre (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio quasi regolare in maggio nel Nizzardo (*Gal*). Scarsa nel distretto di Savona, ove si vede in aprile e maggio (*Piccone*). Comune d'aprile coi venti di tramontana in quello di Arenzano (*Luciani*). Sedentaria, ma più frequente al tempo del passo nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non rara nella prov. di Lucca (*Martorelli*); di passo in febbraio nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Accidentale nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*): io non la credo tanto rara nella provincia di Firenze, ove l'ebbi più volte in gennaio, marzo, aprile ed ottobre (*Griglioli*). Rara al piano nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Di scarso passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Rara nel Senese (*Dei*); sedentaria in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Rara in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Campania: Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale alle Saline (Barletta); di passo irregolare in autunno, più raramente in primavera, altrove (*De Romita*).

Calabrie: Piuttosto comune, specialmente in primavera al piano, nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Avuta nell'aprile 1886 in quello di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Sedentaria e di passo dalla metà di marzo a tutto aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa, ma sedentaria nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Rara in quello delle Madonie, Palermo; l'ebbi nel marzo 1851, al Finale (*Palumbo*).

Sardegna: Non comune, di passo autunnale e stazionaria nell'inverno (*Bonomi*).

231. *Circus Swainsoni*, Smith

ALBANELLA CHIARA.

Pója bianca (*Padova*) — Sivettua gianca (*Arenzano*) — Falco bianco (*Fucecchio*) — Falco di padule bianco (*Valdich.*) — Aceddazzu jancu (*Catanzaro*) — Iurmanaro (*Reggio, Calabr.*) — Arpegghia, Appegghia (*Mess.*) — Farcunieddu jancu rari (*Modica*) — Storittu biancu (*Sard.*).

Veneto: Assai rara nel Friuli; ne vidi una soltanto presa l'8 febbraio 1881 (*Vallon*). Di passaggio accidentale nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Rara nella prov. di Parma, ne ebbi due in aprile (*Del Prato*).

Liguria : Non comune, ma di passaggio quasi regolare in maggio nel Nizzardo (*Gal*). Comune di passo in aprile coi venti di tramontana nel distretto di Arenzano e Cogolito, Genova; il 4 aprile 1885 vi fu un passaggio straordinario di questa specie, in ogni abito (*Luciani*).

Toscana : Scarsa; forse più frequente ai monti nella prov. di Lucca (*Martorelli*); non rara di passo in febbraio nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Rara nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); avuta più volte nella prov. di Firenze, in marzo, aprile e novembre (*Giglioli*). Di scarso passaggio in Val di Chiana (*Griffoli*). Ebbi un maschio adulto il 13 marzo 1886, nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paolucci*).

Marche : Scarsa al piano (*Paolucci*).

Puglie : Frequente di passo in primavera; una sola volta (ottobre 1887) la ebbi in autunno (*De Romita*).

Calabrie : Vedesi al piano alle epoche del passo, ma non è comune, nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Frequente assai in quella di Reggio, di passo in aprile e maggio, e allora con altri « Rapini » o Falchi, è oggetto di una caccia speciale alla posta (*Moschella*).

Sicilia : Rarissima, ma anche sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa, ma sedentaria nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna : Rara di passo ed invernale (*Bonomi*).

232. *Circus cineraceus* (Montag.)

ALBANELLA MINORE.

Falchet, Galinel (*Cadore*) — Sivettua gianca (*Arenzano*) — Falconetto (*Campobasso*) — Farnarone (*Bari*) — Arpegghia, Appegghia (*Mess.*) — Farcuni (*Castell.*) — Stori biancu (*Sard.*).

Piemonte: Ne ebbi un bell'esemplare a Cuneo il 15 dicembre 1870; ed il 25 novembre 1882 ne uccise una in quei pressi l'avv. Reynaudi; è dunque accidentale in provincia (*Abre*). Avventizia nel Basso Piemonte (*Camusso*).

Lombardia: In Lombardia questa specie ha nidificato, e recentemente ho potuto esaminare nel Museo Civico di Milano il nido col maschio adulto e tre giovani già quasi del tutto impennati; vennero presi nel Bosco Raschisio presso Rivolta d'Adda nel luglio 1886, e furono donati a quel Museo dal dott. I. Regazzoni (*Giglioli*). È specie generalmente rara in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non rara, sedentaria e nidificante nel Cadore (*Tissi*). Non tanto rara nel Friuli (*Vallon*). Di casuale comparsa nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Scarsa nel Nizzardo, ove capita in primavera (*Gal*). Scarsa nel distretto di Savona, ove si vede in aprile e maggio (*Piccone*). Rara in aprile coi venti di tramontana nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Molto scarsa, ma di passaggio regolare nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale in primavera nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Non comune, ma forse sedentaria in Maremma (*Ademollo*).

Abruzzi: Frequente e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Rara: ne ebbi due soli individui, uno nel maggio 1874, l'altro nell'aprile 1886 (*De Romita*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Rara al Finale nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Rara e forse confusa colle specie affini: io ne ebbi vari esemplari (*Bonomi*).

233. Pandion Haliaëtus (Linn.) (ex Gesn.)

FALCO PESCATORE.

Acula bianca (*Basso-Piem.*) — Piombòn (*Mantova*) — Falcon, Aquilóto (*Padova*) — Farco pescao (*Arenzano*) — Stori de pisci, Achili piscadrixi (*Sard.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove si mostra di passaggio in marzo e novembre (*Abre*).

Lombardia : Di passaggio regolare in marzo ed aprile, più raro in settembre nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Poco comune in quella di Mantova, ove fu preso nel 1861 a Pietole (*Paglia*). Di rarissima comparsa nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Accidentale nel Friuli, ove ne ebbi un solo individuo ucciso sul Livenza (*Vallon*). Di passo irregolare non molto raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Un maschio giovane fu preso presso il bosco Bertoni, sulla Secchia, prov. di Modena, ai primi di ottobre 1887 (*Picaglia*). Accidentale nella prov. di Parma, avuto il 26 settembre 1880 (*Del Prato*).

Liguria : Di irregolare comparsa nel Nizzardo (*Gal*). Raro, passa in aprile nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Di casuale comparsa nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Divenuto scarso dopo il prosciugamento del lago di Bientina; l'ebbi in aprile da Massaciuccoli nella prov. di Lucca (*Martorelli*); di passo in agosto nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Scarso nel distretto di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*); ne conservo tre presi nella provincia di Firenze nel marzo e nell'aprile (*Giglioli*). Di casuale comparsa nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*); ne ebbi uno nel settembre 1858 (*Dei*).

Marche : Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania : Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Di comparsa irregolare, ma non rara alle due epoche del passo (*De Romita*).

Sicilia : Sedentario al piano e di passo da marzo a maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna : Comune e sedentario, qualcuno però emigra (*Bonomi*).

234. *Circaëtus gallicus* (J. F. Gmel.)

BIANCONE.

Agugia, Scanalévre (*Basso-Piem.*) — Falcon, Aquiloto (*Padova, Rovigo*) — ? Astór (*Cadore*) — Cagne (*Friuli*) — Aigloun (*Nizza*) — Farco grosso (*Savona*) — Farco büson, Farco marsaiolo (*Spezia*) — Marzolo (*Lucca*) — Baccalotto (*I. di Giglio*) — Falcunazzu (*Mess.*) — Farcunazzu (*Modica*).

Piemonte : Nella prov. di Cuneo questa specie è stata presa nell'autunno e nell'inverno; un esemplare fu preso a Brà nel 1851, un secondo nei pressi di Cuneo nell'autunno 1870, un terzo presso Mondovì nel novembre 1871, e ne trovai due sul mercato di Cuneo il 10 dicembre 1885 (*Abre*). Nella prov. di Torino ne ebbi tre in settembre in diversi anni e ne registrai inoltre uno ucciso il 7 ottobre 1870 ed un altro avuto in carne il 20 marzo 1871 (*Pezzi*). Ho avuto notizia della casuale nidificazione di questa specie nel Basso Piemonte e appunto nel distretto di Voltaggio; non sarebbe specie rara in provincia, ove qualche individuo rimane a svernare, così uno si uccise a Voltaggio il 29 gennaio 1879, un altro alle sorgenti dell'Orba il 23 dicembre 1882 (*Canusso*).

Lombardia : Di accidentale comparsa (*Turati, Borronico*).

Veneto : Frequente e sedentario ai monti nel Cadore, ove nidifica tra le rupi (*Tissi*). Piuttosto raro nel Friuli, ove so di tre sole catture (*Vallom*); nel distretto di Cividale sembra essere sedentario, nidifica ai monti e più volte ne ebbi i nidiacci; giunge in grandi stuoli alle epoche del passo

(*Del Torre*). Di passaggio irregolare, non molto raro sui colli nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Raro assai nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio regolare e talvolta copioso in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune in collina ed ai monti nel distretto di Savona, ove è di passo in marzo ed aprile e nel settembre (*Piccone*). Comune di passaggio in marzo e primi di aprile, e abbondantissimo al ripasso in settembre ed ottobre nel distretto di Arenzano e Cogoleto. Genova (*Luciani*). Passa in primavera, e qualcuno nidifica ai monti nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non raro e forse sedentario nella prov. di Lucca: lo ebbi in maggio ed in settembre e lo vidi anche d'inverno; predilige le pinete (*Martorelli*); di passo regolare nel marzo nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Scarso, ma non tanto raro nella prov. di Firenze; ebbi una femmina uccisa ad Empoli il 16 marzo 1888 (*Giglioli*). Non credo possa dirsi sedentario in Val di Chiana, ma anche d'inverno vi capita, forse in cerca di cibo dalla vicina Maremma, ove è comune (*Griffoli*). Ebbi una femmina il 2 settembre 1886 nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Poco frequente nel Senese, cova al M. Amiata (*Dei*); sedentario in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Nidifica all'isola di Giglio; il 6 maggio 1886 venne presa una femmina e potei togliere dal nido un uovo incubato (*Bianchi*). Non raro all'epoche del passo in Toscana (*Roster*).

Marche: Sedentario, ma scarso (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: So di due sole catture, ma nel 1888 ebbi un nidiaceo da Matera nell'attigua Basilicata (*De Romita*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Pistone*). Scarso ai monti, giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Rarissimo; ne ebbi un solo (*Bonomi*).

235. *Haliaëtus Albicilla* (Linn.) (ex Willugh.)

AQUILA DI MARE.

Acula roussa, *Acula dla couva bianca* (*Basso-Piem.*) — *Aquilóto* (*Paolova*) — *Aigla de mar* (*Nizza*) — *Aquila* (*Spezia*).

Piemonte: Accidentale nella prov. di Cuneo, nel 1865 ne venne uccisa una lungo il fiume Stura nelle vicinanze di Fossano (*Abre*). Rammento tre catture di questa specie nella prov. di Torino in anni diversi: il 23 e 25 settembre ed il 5 ottobre, ebbi in carne gli esemplari (*Pezzi*). So di una uccisa nei pressi di Moncalieri (*Martorelli*).

Lombardia: Accidentale nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*).

Veneto: Scarsa nel Friuli al litorale (*Vallon*). Poco frequente nelle valli dell'estuario nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: A Mesola nella prov. di Ferrara alla fine di dicembre 1887 ed il 9 gennaio 1888 furono uccisi tre individui di questa specie, tutti giovani (*Magnelli*). Di scarso passaggio nella prov. di Parma; fu presa tre volte, l'ultima il 5 dicembre (*Del Prato*).

Liguria: Di comparsa irregolare nel Nizzardo (*Gal*). Accidentale e rara nel distretto di Spezia, Genova (*Carazzi*).

Toscana: Di accidentale comparsa nella prov. di Lucca (*Martorelli*); veduta nel gennaio 1884 nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Accidentale nella prov. di Firenze, anni sono ne venne uccisa una a Poggio a Cajano, Firenze (*Magnelli*). Di accidentale comparsa nella prov. di Grosseto. d'inverno lungo il litorale (*Dei, Ademollo*).

Sardegna: Non tanto comune, ma nidificante; ogni inverno ne ebbi qualche individuo (*Bonomi*).

236. Aquila Chrysaëtus (Linn.) ex Willugh.

AQUILA.

Ágia (*Alto Canavese*) — Ogli (*Val Soana*) — Stur (*Nov.*)
Ácuile (*Friuli*) — Aquila real (*Rovigo*) — Aquila mora, Aquila
reale (*Padova*) — Petrit (*Albanesi italici*).

In quanto all'*A. Barthelemyi*, Jaubert, della quale ho veduto l'esemplare tipo nel Museo di Storia Naturale di Marsiglia, e che si distingue soltanto per avere alcune delle scapolari bianche, io sono d'opinione che sia fondata su individui assai vecchi dell'*A. Chrysaëtus*; anche in altre specie di Aquile, ed in modo notevole nel *Nisaëtus pennatus*, le penne scapolari divengono coll'età, e, pare casualmente, bianche.

Piemonte: Frequente e sedentaria in montagna nella prov. di Cuneo, vi nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Abre*). Nella prov. di Torino l'ho veduta spesse volte, anche viva (*Martorelli*). Rarissima al monte in prov. di Alessandria, ove ha però nidificato (*Camusso*). Nidifica nell'Ossola, ove però diventa erratica nel dicembre; confermo questa asserzione coi fatti seguenti: il 7 dicembre 1867, quattro Aquile vennero catturate in Ossola in una zona di 7 a 8 chilometri di raggio; il 12 dicembre 1873 un maschio venne preso vivo a 400 metri dalla città di Domodossola; il 27 dicembre 1881 una fu presa a Montecrestese, ove il 29 due altre si fecero vedere; ai primi del gennaio 1882 un'Aquila impigliate le zampe in un grosso ferro per Volpi, trasportato dalla vetta di un monte vicino, si lasciò prendere presso Villa d'Ossola. Trovandomi poi a Como il 18 dicembre 1881 seppi di un'Aquila presa vivente in mezzo al lago in faccia a Bellagio; a Gemonio, Laveno, pure in dicembre, venne catturata un'Aquila, ed un'altra fu veduta il giorno stesso presso Varese. Infine nel « *Corriere della sera* » del 25 marzo 1884 si legge: « Giorni sono

in Valtellina, presso Morbegno, ebbe luogo una caccia straordinaria: passò di là uno stormo di Aquile reali provenienti dal N. ed i cacciatori ne fecero strage uccidendone 14. » Ebbi occasione io stesso di accertare la verità di quella notizia (*Bazetta*). Nella Valsesia questa specie fa una sola covata in marzo e aprile (*Guarini*): è sedentaria nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*).

Lombardia: Comune e sedentaria sugli alti monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Di casuale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Di rara comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Avventizia in quella di Mantova: venne presa alla Virgiliana nel 1817 (*Paglia*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati*); frequente e sedentaria (*Borromeo*).

Veneto: Sedentaria sul Monte Baldo nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarsa, ma sedentaria ai monti nel Cadore. Belluno; nidifica nel giugno sulle rupi inaccessibili, depone 2 uova ed alleva una sola covata (*Tissi*): così nel distretto di Feltre, ove nidifica nel maggio, va però considerata quasi specie accidentale (*Delaito*). Nel Friuli comparisce abbastanza regolarmente e nidifica sulle montagne (*Vallon*). Di passaggio irregolare nell'autunno ed inverno nella prov. di Padova (*Arrigoni*). So di una sola cattura nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nel 1886 nel distretto di Vergato. Bologna (*Lorenzini*). Scarsa, ma sedentaria nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentaria e nidificante sugli alti monti nel Nizzardo (*Gal*). Rara in montagna nel circondario di Savona; il 10 gennaio 1882 ne fu ferita una nella valle del Letimbro presso Savona: era in abito giovanile, ma, tenuta viva in gabbia, dopo la quarta muta aveva acquistato l'abito dell'adulto (*Piccone*).

Toscana: Ne vidi una sola presa sull'Appennino lucchese e conservata a Coreglia (*Martorelli*). Sedentaria ai monti nel Casentino, Arezzo (*Beni, Ficini, Pauer*). Nel novembre 1886, un maschio venne ucciso sul monte di Ce-

tona, Siena: era su di un cerro e divorava un tacchino; è affatto accidentale nel distretto (*Bargagli*).

Marche: Scarsa ai monti (*Paolucci*).

Puglie: Accidentale; ne ebbi una sola, il 17 settembre 1887 (*De Romita*).

Sicilia: Rara, ma sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa ai monti nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Abbastanza comune e sedentaria, più ai monti che al piano, ove scende di rado nell'inverno (*Bonomi*).

237. *Aquila nipalensis*, Hodgs.

AQUILA DELLA STEPPA.

Ho preferito per questa specie il nome dato dal Hodgson sul quale non cade dubbio, mentre i nomi più antichi *A. mogilnik*, Gmel. e *A. bifasciata* J. E. Gray, vennero anco applicati a specie diverse. Recentemente il Salvadori (*Avif. Ital.* p. 39) ha insistito soverchiamente sul dubbio che sembra avvolgere il luogo della cattura dell'esemplare conservato nella Collezione italiana centrale a Firenze; dichiarai in modo esplicito (*Avif. Ital.* p. 237) che ho dati per ritenere che quell'Aquila fosse preparata, *dal fresco*, nel 1855 o 1856; onde la sua cattura sarebbe avvenuta nei pressi di Genova. Io non so distinguere gli esemplari russi da queglii indiani, onde mi trovo d'accordo col Sharpe nel ritenere identiche l'*A. nipalensis* e l'*A. orientalis*.

238. *Aquila clanga*, Pall.

AQUILA ANATRAIA.

Aquila maciada (*Padova*).

Piemonte: Ne ho veduto alcuni esemplari a Torino, presi nella provincia (*Martorelli*).

Lombardia: Accidentale nella prov. di Cremona (*Fer-*

ragui). Rara in quella di Mantova, venne presa nei pressi di Mantova (*Paglia*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Ne ebbi una soltanto, catturata nei pressi di Bertolo, Friuli (*Vallon*). So di due soli esemplari colti nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Cinque individui di questa specie furono catturati nel Modenese negli anni 1883-84: quattro alle basse presso Novi, uno sul Panaro vicino a S. Anna (*Picaglia*). Accidentale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio scarso, ma quasi regolare in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana: Rara nella prov. di Lucca (*Martorelli*). Rara nella prov. di Firenze; ne conservo una presa ad Empoli nell'autunno 1868, e so di un'altra presa in autunno del 1880 presso Pistoia (*Figlioli*). Ebbi un maschio il 1 novembre 1885, nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Accidentale nel Senese (*Dei*).

239. *Aquila pomarina*, C. L. Brehm

AQUILA ANATRAIA MINORE.

Aquila maculata, Salvad.

Acula (*Basso-Piem*).

Recentemente (*Ucc. ital.* p. 40) il Salvadori riapplica a questa specie il nome di *A. maculata* (J. F. Gmel.), ma quest'ultimo (*Syst. Nat.* I. p. 258) non dà invero una descrizione riconoscibile e caratterizzata dell'*Aquila anatraia minore*, onde il nome suo, che è poi stato applicato pure all'*A. clanga* da diversi Autori, non può essere accettato.

Piemonte: Nel Museo Zoologico di Torino si conserva un individuo in muta di questa specie, ucciso nel 1885 nei boschi di Stupiuigi (*Salvadori*). Ricordo, in modo dubbioso però, due esemplari di questa specie: uno ucciso a Roccavione il 23 novembre 1875, l'altro nei pressi di Cuneo

il 1° dicembre 1882: il dubbio è che appartenessero invece alla specie precedente (*Abre*).

Toscana: Accidentalmente capita nella prov. di Firenze, *Avif. Ital.* p. 239 (*Giglioli*).

Puglie: Di casuale comparsa; un solo avuto nell'ottobre 1875 (*De Romita*).

Sardegna: Accidentale, ne vidi un solo, conservato nel R. Museo di Cagliari (*Bonomi*).

240. *Nisaëtus fasciatus* (Vieill.)

AQUILA DEL BONELLI.

Agugia foestea (*Arenzano*) — Aquilotta (*Mess.*) — Aculotta (*Modica*) — Achili de pisci, Achiloni (*Cagliari*).

Liguria: Di rara e casuale comparsa nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Accidentale nel distretto di Spezia; il prof. Magni-Griffi assicura averne avuto dei giovani, presi in Val di Magra (*Carazzi*).

Campania: Di comparsa accidentale nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Accidentale; so di un solo individuo, un adulto, preso nelle vicinanze di Taranto nel 1872 (*De Romita*).

Sicilia: Scarsa nella prov. di Messina (*Pistone*). Frequente e sedentaria ai monti nel distretto di Modica, Siracusa; vi fa una covata di 3 a 4 uova in aprile (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Non tanto comune, ma sedentaria (*Bonomi*).

241. *Nisaëtus pennatus* (J. F. Gmel. ex Briss.)

AQUILA MINORE.

Hieraëtus pennatus, Salvad.

Toscana: Accidentale nel Senese: una venne presa presso Mondinegnoli il 19 ottobre 1830 (*Dei*).

242. Archibuteo lagopus J. F. Gmel. ex Brünn.)

POIANA CALZATA.

Lâr, Larás, Fârc, Farcón Farco galinà (*Basso-Piem.*)
— Pojana, Pojane (*Friuli*) — Pója imbragada (*Padova*).

Piemonte: Ebbi due soli individui di questa specie nella prov. di Cuneo: uno fu preso a Brà nel 1851, l'altro nel 1860 ad Alba (*Abre*). Accidentale nella prov. di Torino: il 17 ottobre 1882 fui testimonia della cattura di uno di questi Falchi sulla Collina, regione Maddalena, Torino (*Gasca*). Rara assai e di solo passo autunnale nella prov. di Alessandria: potei inviare in dono alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani un magnifico maschio nel biancheggiante abito giovanile, ucciso presso Voltaggio il 16 gennaio 1888 (*Camusso*).

Lombardia: Rara nella prov. di Mantova, ove fu presa a Castelfogfiredo (*Paglia*). Di comparsa accidentale in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Appare casualmente ogni tre, quattro o cinque anni, nel Cadore, Belluno (*Tissi*). Di comparsa accidentale nei rigidi inverni nel Friuli; ne ebbi due, maschi, nel gennaio 1880 (*Vallon*): così nel distretto di Cividale, ove ne ebbi una nel febbraio 1886 (*Del Torre*). Di rara comparsa negli inverni rigidi nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Accidentale nella prov. di Parma; so di due sole catture, una il 20 gennaio 1888 con un freddo di -15° C. (*Del Prato*).

Liguria: Accidentale nel distretto di Spezia, ove capitò una sola volta al prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Lucca (*Martorelli*). Avuta una sola volta da Grosseto (*Dei*): assai rara nei rigidi inverni nella Maremma (*Ademollo*).

Puglie: Accidentale; due sole catture note. una nel

dicembre 1879, l'altra ai primi di maggio 1888 (*De Roma*).

Sardegna: Accidentale (*Bonomi*).

243. *Buteo vulgaris*, Leach ex Willugh.

POIANA.

Lâr, Larás, Fâre, Fârcon, Farco galinà (*Basso-Piem.*) — Eula, Pojana, Rattouner, Nibi, Palaccia (*Nov.*) — Guia, Avión (*Feltre*) — Pojana, Poja (*Vicenza*) — Cagne (*Friuli*) — Pujen (*Vergato*) — Farco (*Savona*) — Büsun (*Spezia*) — Falco gallinâ, Farco bûsùn (*Gen.*) — Capponaccio (*Pisa*) — Fojana (*Sesto fiorentino*) — Astore (*Senese*) — Falco gallinaio (*Maremma*) — Nibbio (*I. di Giglio*) — Pojava (*Marche*) — Falcone (*Viterbo, Napoli*) — Aceddazzu (*Calabr.*) — Farcunazzu (*Mess.*) — Farcuni (*Modica*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo; diventa erratica dopo la nidificazione, che ha luogo nel maggio (*Abre*). Frequente e sedentaria nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). In quella di Alessandria amida raramente al monte, ma è comune alle epoche del passo, specialmente nell'autunno (*Canusso*). Comune e sedentaria nell'Ossola (*Bazetta*). Così nel distretto di Crodo (*Demori*); erratica in quello di Piedimulera (*Danisi*); nidifica una sola volta in maggio e giugno nella Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia: Comunissima ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente sui monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune e stazionaria nella prov. di Cremona, ove però è più abbondante nell'autunno ed inverno (*Ferragni*). Comunissima in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Abbastanza comune nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Sparsa in quella di Vicenza (*Molari*): sedentaria nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente e nidificante

nel Cadore, Belluno, passa in aprile ed ottobre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove è sedentaria (*Delaito*). Comune assai e sedentaria nel Friuli; nidifica dal maggio all'agosto (*Vallon*); erratica nell'inverno (*Del Torre*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarsa, ma nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio in ottobre nel Nizzardo (*Gal*). Più o meno abbondante, secondo gli anni, nel distretto di Savona, pare esservi invernale, giacchè le più le ebbi in dicembre, gennaio e febbraio (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente e sedentaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentaria nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); di passo in settembre nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Invernale e ovunque frequente nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarsa in quello di Lavajano (*Papasogli*). Sedentaria e generalmente comune nella prov. di Firenze (*Fontebuoni, Giglioli*): scarsa nei distretti di Fucecchio e Sesto (*Lenzi, Turchetti, Ginori*). Comune ai monti e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). Avuta in ottobre nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paolucci*). Comune e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Nidificante nell'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentaria in Toscana, ove credo che diventi erratica nell'inverno (*Roster*).

Marche: Comune ovunque (*Paolucci*).

Lazio: Sedentaria e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Sedentaria, ma scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Scarsa, invernale e di doppio passo (*De Romitar*).

Calabrie: Comune e sedentaria nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Scarsa nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente ai monti nel distretto di Modica, Siracusa; giunge in aprile e parte in ottobre (*Dellafonte, Garofalo*). Scarsa, ma sedentaria ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comunissima e sedentaria, più frequente nel Sassarese: ve ne sono anco di passo, diverse però dalle stazionarie per mole e colori (*Bonomi*).

244. *Buteo ferox* (S. G. Gmel.)

POIANA A CODA BIANCA.

Pojana dalla coda bianca (*Aut. Ital.*).

Nell'agosto 1887, visitando il Museo Civico di Rovereto ho potuto assicurarmi che il Falco che venne creduto essere un *Buteo ferox* dal prof. A. Bonomi (*Avifauna Tridentina*, p. 7, Rovereto, 1884) è invece un *Pernis apivorus* in uno degli abiti meno comuni che assume quella specie variabilissima.

245. *Pernis apivorus* (Linn.) (ex Willugh.)

FALCO PECCHIAIOLO.

Poundră, Lâr, Larás, Farco galinà, Fâreon, Fârc (*Basso-Piem.*) — Pojana (*Belluno*) — Pôja (*Padova*) — Tartau (*Nizza*) — Farco (*Spezia*) — Agugiotto, Farco (*Gen.*) — Pojana (*Lucca*) — Falco cappone (*Fucecchio*) — Orru, Ornu, Adornu, Uccello (*Reggio, Calabr.*) — Adorno (*Cotrone, Reggio Calabr.*) — Passante (*Calabr.*) — Adornu, Orro, Orru (*Mess.*) — Farcuni jancu (*Modica*).

Piemonte: Frequente in certe annate, scarso in altre, al piano, nella prov. di Cuneo: passa in maggio e settembre (*Albre*). Poco frequente in prov. di Torino (*Gasca*). Nella

prov. di Alessandria è piuttosto raro di doppio passaggio (*Camusso*). Pochi giungono di passo nell'Ossola, ove non pare abbia nidificato (*Bazetta*). Erratico nel distretto di Piedimulera (*Danisi*); scarso e sedentario (?) in quello di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Uno catturato nel Cremonese, nell'autunno del 1888 (*Ferragni*). Generalmente raro (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Scarso al piano nel Bellunese, ove pare abbia nidificato (*Soravia*). Raro, ma nidificante nel Friuli; ebbi un giovane tolto dal nido a Claud, Carnia (*Vallon*). Accidentale nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Non so se questa specie sia veramente rara o confusa col *B. vulgaris* nella prov. di Padova; nella mia raccolta conservo due esemplari, uno isabellino colto a Monselice nell'ottobre 1864. l'altro melanico colto presso Padova il 15 novembre 1884 (*Arrigoni*).

Emilia: Accidentale nella prov. di Parma; ebbi una femmina nella prima metà di ottobre 1887 (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio regolare in settembre ed ottobre nel Nizzardo (*Gal*). Abbastanza frequente nel distretto di Savona, ove ne ho avuto in maggio, giugno, agosto, settembre ed ottobre (*Piccone*). Comune di passo in maggio e sino al 15 giugno, più scarso in autunno nel distretto di Arenzano; l'8 maggio 1881 vi fu un passaggio straordinario di questa specie; ne contai molte centinaia (*Luciani*). Di scarso passaggio in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Frequente, di doppio passo nella prov. di Lucca (*Martorelli*); passa in settembre nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Di scarso passaggio in ottobre nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*); io l'ho trovato abbastanza frequente, specialmente in settembre nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Raro nel Casentino, Arezzo (*Beati*). Scarso e solo di passo in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Raro assai nel Senese (*Dei*); di passo in primavera ed estate nella Maremma (*Ademollo*). Comune alle epoche del passo in Toscana, specialmente in autunno (*Roster*).

Marche : Raro, ma qualche anno giunge in copia (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie : Di passaggio irregolare e mai abbondante in autunno e primavera; ne ebbi uno il 22 agosto 1886 (*De Romita*).

Calabrie : Abbondante alle epoche del passo specialmente in settembre ed ottobre ai monti; passa anche nella seconda quindicina di aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). In quella di Reggio passa in abbondanza in maggio, giugno e anco in luglio nelle ore calde e specialmente sugli altipiani di Milea sopra Scilla, e di Pentimele; vi è oggetto di una prediletta caccia di posta. È scarso al ripasso (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Di passo in aprile-maggio ed agosto-settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nella prov. di Siracusa, distretto di Modica, ai monti; giunge in aprile e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Scarso ai monti in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Raro ed accidentale; ne vidi uno fresco al Museo di Cagliari preso dal Meloni (*Bonomi*); sarà quello menzionato dal dott. Lepori e rammentato dal Salvadori, è noto come questo Falco non era stato avvertito in Sardegna (*Giglioli*).

246. *Milvus Ictinus*, Savigny

NIBBIO.

Aquilott (*Mantova*) — Forfesón, Pója foresta (*Padova*) — Aigloun (*Nizza*) — Niggio (*Arenzano*) — Falco (*Pisa, Viterbo*) — Nibbio, Arpone (*Campobasso*) — Nigghia (*Calabr.*) — Nigliu, Nigliazzu (*Castelb. Madonie*).

Piemonte : Scarso tanto al monte come al piano nella prov. di Cuneo: di passaggio nella prima quindicina di aprile (*Abre*). Piuttosto raro al monte in prov. di Alessandria, ove pare che qualche coppia nidifichi (*Canusso*). Scarso

ed erratico nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*); nidifica una sola volta in aprile e maggio nella Valsesia (*Guarironi*).

Lombardia: Di scarso passaggio in primavera nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non so che di una sola cattura nel Friuli, la quale avvenne nei pressi di Udine (*Vallon*). Di passo accidentale nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nella prov. di Parma; uno vi fu colto il 30 novembre 1885 (*Del Prato*).

Liguria: Non comune nel Nizzardo, vedesi più facilmente in settembre (*Gal*). Raro nel distretto di Arenzano e Cogoleto Genova (*Luciani*). Scarso in quello di Spezia (*Carrazzi*).

Toscana: Raro, ma sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Comune ovunque, specialmente nell'ottobre nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Non raro nel distretto di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Raro nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Scarso in Val di Chiana, ove però capita in ogni stagione (*Griffoli*). Raro nel Senese (*Dei*); di scarso passo invernale in Maremma (*Ademollo*); sedentario nel distretto di Gavorrano, Grosseto (*Cambi*).

Marche: Sedentario (*Comizio agrario Fabriano*).

Lazio: Comune e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Scarso, ma sedentario nel distretto di Ielsi. Campobasso (*D'Amico*).

Puglie: Accidentale (*De Romita*).

Calabrie: Non raro nella prov. di Reggio, vedesi specialmente in luglio ed agosto (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Sedentario e non raro nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*). Scarso, ma sedentario: una volta era più comune nel distretto delle Madonie, Palermo, se ne videro sino a 24 sopra un solo albero (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario (*Bonomi*).

247. *Milvus migrans* (Bodd.)

NIBBIO NERO.

Aigloun (*Nizza*) — Nibbio (*I. di Giglio*) — Nibbio niro (*Nap.*) — Nibbiu di passa, Nigghiu niru (*Mess.*) — Nigghiu (*Modica*).

Piemonte : Il 15 maggio 1886 il signor Bainotti di Torino ne ebbe un maschio adulto ucciso in quei dintorni (*Giglioli*). Scarso al monte nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Di scarso, ma regolare passaggio nel maggio nella prov. di Cremona; tre veduti a Spinadesco il 6 maggio 1883, parecchi nel maggio 1884 e 1885 (*Ferragni*). Assai raro in provincia: preso sul lago di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Lo considero di dubbiosa comparsa nella provincia di Padova; secondo notizie avute un esemplare sarebbe stato colto a Vigodarzere il 25 maggio 1885 (*Arrigoni*).

Liguria : Accidentale nel Nizzardo, ove si vede più facilmente in settembre (*Gal*). Raro nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Accidentale nella prov. di Firenze: ne conservo uno ucciso a Poggio a Cajano nell'autunno 1856 (*Giglioli*). Raro in Val di Chiana, ove però più volte è stato preso (*Griffoli*). Ebbi una femmina il 3 settembre 1886, nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Accidentale nel Senese, ne ebbi uno nell'aprile 1864 (*Dei*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*).

Puglie : Accidentale; ne ebbi due soltanto, uno nel maggio 1874, l'altro nel settembre 1877, dai pressi di Bari (*De Romita*).

Sicilia : Rarissimo nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, ma sedentario ai monti nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

248. Gennaia Saker (J. F. Gmel. ex Gesn.)

SACRO.

Mantengo quanto ho già detto in riguardo alla cattura di un esemplare di questa specie in Italia (*Arif. Ital.* p. 249): il Salvadori non l'ammette tra le specie avventizie da noi (*Ucc. Ital.* p. 50).

Aggiungo poi, a conferma di quanto ho scritto intorno a questa specie, che sappiamo ora di due altri individui catturati in Italia. Uno venne trovato al mercato della Rotonda (Pantheon) a Roma dal dott. Bertini verso la primavera del 1860; egli lo preparò per il Museo zoologico dell'Università ove rimase dimenticato, perchè privo di ogni indicazione, sino al maggio 1887, quando lo osservò il prof. G. Martorelli. Questi lo credette sulle prime un *Hierofalco islandus* e pubblicò una nota in proposito nel giornale « *Lo Spallanzani*, »¹ dando una minuziosa descrizione dell'interessante uccello. L'annuncio dell'avvenuta cattura di un *Hierofalco islandus* (Gmel) in Italia doveva sorprendermi assai: infatti questa specie propria all'Islanda ed alla Groenlandia meridionale, è meno vagante delle sue due congeneri. e se giunge non tanto di rado nell'estremo nord delle Isole Britanniche, è molto dubbioso se sia veramente mai stato colto in altre parti dell'Europa settentrionale, ove però, e anche nella Germania, capita accidentalmente negli inverni rigidi la specie affine *H. Gyrfalco* (Linn.), la quale è poi sedentaria nel nord della Scandinavia e della Russia. Confesso dunque che quella asserzione dell'avvenuta cattura di un *H. islandus* in Italia e proprio nei dintorni di Roma, turbava i miei sonni e non fui tranquillo che quando potei esaminare accuratamente quell'esemplare, che avevo veduto alla sfuggita prima, ma di cui mi ricordavo poco. E questo

¹ G. MARTORELLI, *Sopra un FALCO ISLANDICUS Brünn. per la prima volta annunciato in Italia.* Estr. dallo « *Spallanzani* » fascicolo V-VI. Roma, 1887.

fu il 17 novembre 1887, quando mi recai appositamente al Museo zoologico della R. Università di Roma. Bastò un'occhiata per farmi vedere che l'uccello in quistione apparteneva a ben altra specie, e che avevo innanzi a me una *Gennaia Saker* quasi adulta, che dalle dimensioni direi essere una femmina; è un bell'individuo in ottime condizioni di penna; lo vidi con vero piacere, giacchè la sua cattura avvenuta, come non ho ragioni a dubitare, nei dintorni di Roma, conforta e appoggia quanto ho già scritto intorno alla comparsa accidentale di questa specie in Italia.

Dopo uno studio più accurato di questo uccello interessante, il prof. Martorelli si è riceduto in quanto alla determinazione specifica previamente fatta, ed ha recentissimamente pubblicato una memoria in proposito, ornata di una bellissima tavola da lui disegnata.¹

Ho saputo poi recentemente dal signor Vallon, che egli pure ha potuto avere una *G. Saker*, catturata vivente l'8 ottobre 1887 nei pressi di Trieste da un contadino, il quale tolse barbaramente all'uccello le remiganti e le timoniere; quel Falco visse sino al 21 gennaio 1888, ma le timoniere soltanto erano cresciute a metà. Colla solita sua generosità il signor Vallon ha ceduto questo raro esemplare alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo zoologico di Firenze; è un maschio giovane ben caratterizzato, e sarebbe il terzo esemplare di questa specie preso nella nostra regione.

249. *Gennaia Feldeggi* (Schleg.)

LANARIO.

Falcuni raru (*Mess.*) — Cappuccina (*Modica*).

¹ G. MARTORELLI, *Sopra un Falcone sacro* (FALCO SAKER), preso nella provincia di Roma — ROMA, 1888. In seguito a questa esplicita memoria, è sorprendente davvero il vedere la primitiva erronea determinazione mantenuta dal Direttore del R. Museo Zoologico di Roma! (V. *Boll. Mus. Zool. Roma*, I, p. 15 e nota ROMA, 1888).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente e sedentario ai monti nel distretto di Modica, prov. di Siracusa, vi nidifica in aprile, allevando una sola covata di 3 a 4 uova (*Dellafonte, Garofalo*).

250. Falco Peregrinus, Tunst. ex Gesh.

FALCONE.

Falchét, Oselaz (*Cadore*) — Falcon, Falcùzz (*Friuli*) — Falchétto foresto (*Padova*) — Oseláz (*Feltre*) — Sivettua grossa (*Arenzano*) — Farco reale (*Spezia*) — Falco reale (*Isola di Giglio*) — Arbaneddu (*Mess.*).

Anche io col Gurney ed altri non so ammettere come specie distinta dal Falcone comune il *Falco leucogenys*, Brehm; dico ciò a proposito di un *F. Peregrinus*, femmina giovane uccisa in Piemonte e conservata nel Museo zoologico di Torino (Cat. 8892); che per avere la cervice biancheggiante ed una fascia biancastra limitante il pileo, venne considerato dal Menzbier come appartenente a quella sedicente specie (SALVADORI, *Ucc. ital.* p. 52).

Piemonte: Frequente in montagna nella prov. di Cuneo, ove nidifica nell'aprile, allevando una sola covata; diventa erratico nell'inverno (*Abre*). Accidentale nella prov. di Torino (*Gasca*). Non raro al monte nella prov. di Alessandria, dove annida e sverna; casuale al piano (*Camusso*).

Lombardia: Accidentale in autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Piuttosto raro in quella di Mantova (*Puglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati*); piuttosto frequente (*Borromeo*).

Veneto: Sedentario ai monti nel distretto di Bassano, Vicenza (*Ferrari*). Scarso, ma sedentario ai monti nel Cadore, Belluno (*Tissi*); frequente e sedentario nel distretto di Feltre; nidifica tra le rupi in maggio e giugno, ed alleva una sola covata di 2 a 4 (*Delaito*). Raro nel Friuli, ove so di due individui, uno dei quali venne ucciso nell'autunno 1883

presso Udine (*Vallon*); raro nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Scarso, ma nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Scarso, ma sedentario nella prov. di Parma; diventa erratico nell'inverno (*Del Prato*).

Liguria : Non comune nel Nizzardo, ove si vede irregolarmente (*Gal*). Comune e sedentario nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Accidentale nella prov. di Lucca, ne vidi uno a Massaciuccoli nel novembre 1886 (*Gragnani*). Raro nella prov. di Firenze; ne conservo tre colti a: Firenze 21 luglio 1841; Marcialla, Val di Pesa luglio 1875; Erbaia, Mugello 20 settembre 1883 (*Giglioli*). Scarso assai in Val di Chiana; ne ebbi due, entrambi nell'inverno (*Griffoli*). Scarso, ma sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Sedentario e nidificante nell'isola di Giglio (*Bianchi*). Non comune, ma sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche : Sedentario (*Comizio agrario Fabriano*).

Lazio : Non raro e sedentario nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania : Sedentario all'isola di Capri, ove due o tre coppie nidificano in aprile, deponendo 3 o 4 uova: cibansi principalmente di Quaglie (*Cerio*).

Puglie : Piuttosto raro, le poche catture avvennero alle due epoche del passo (*De Romita*).

Sicilia : Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Non comune, ma sedentario; può darsi che qualcuno giunga in autunno; nell'agosto 1888 ne ebbi due presi a Donorì presso Cagliari (*Bonomi*).

251. Falco punicus, Levaill. jun.

FALCONE MINORE.

Falcone tunisino (*Aut. Ital.*).

Lord Lilford mi scrive in data del 5 giugno 1886, che, viaggiando il Mediterraneo col suo « *yacht* » nel 1882, egli ebbe occasione di scoprire varie stazioni di nidificazione di questa specie sulle nostre coste; così nel maggio 1882 ne trovò: due sulle rupi della costa meridionale dell'isola dell'Elba; due sul lato occidentale di Montecristo; una assai vicino al faro sulla punta S. O. di Giglio; ed uno sulle rupi del Monte Argentario. All'isola di Giannutri Lord Lilford vide un paio di questi uccelli e la femmina venne uccisa; egli però non crede che avessero il nido su questa isola. È noto come i Falconi continuano per anni, forse sempre, a nidificare nel medesimo luogo. Inoltre Lord Lilford potè avere due nidiacei dal nido sul lato occidentale dell'isola della Maddalena; conservava ancora la femmina vivente, e dev'essere quella da lui recentemente figurata (« *Ibis*, » 1887, pl. VIII). Trovò pure un nido sull'isolotto di Spargi e seppe di un altro sulla punta S. E. di Caprera (egli scrive *Capria*). Finalmente anche Lord Lilford opina che il *F. minor* non giunga nella regione Europea, considerata in senso lato.

Sardegna: Scarso, ma sedentario; lo colsi pel primo a Porto Torres e ne vidi a Porticciuolo, Porto Conti, Alghero (*Bonomi*).

252. Hypotriorchis Eleonoræ (Gené)

FALCO DELLA REGINA.

Farchetto da Reginna (*Gen.*).

Liguria: Debbo registrare la cattura di un bellissimo esemplare di questa specie, avvenuta nei pressi di Nizza il

16 luglio 1886; è un maschio nell'abito che ricorda quello del *H. Subbuteo*; l'esemplare suddetto è ora nella Collezione italiana centrale a Firenze. Un secondo individuo venne preso il 21 giugno 1887; i fratelli Gal ai quali devo questa notizia, mi scrivono che in 30 anni di osservazioni questi due sono i soli che essi hanno veduto nel Nizzardo (*Giglioli*). Il 21 giugno 1871, in un orto presso le case d'Albissola superiore (Savona), venne ucciso un maschio in abito macchiato: era posato sulla cima di un Ciliegio e gridava continuamente, forse per richiamare la compagna, che potrebbe esser quella colta il giorno dopo nelle vicinanze di Genova ed ora in quel Museo Civico (Vedi *Arif. Ital.* p. 257). Era in amore con testicoli grossissimi, grasso e con lo stomaco pieno di frammenti d'insetti verdi (*Piccone*). Di rara comparsa nel distretto di Arenzano; vi ebbi un maschio nell'agosto 1879 (*Luciani*). Il prof. D. Carazzi (*Appunti ornitologici in Boll. Soc. Nat. Napoli* I. fasc. 1, 1887), ricorda due esemplari dell'*H. Eleonora* presi nella valle della Durasca a pochi chilometri dalla Spezia il 12 settembre 1878, che si conservano nel Museo Civico di quella città; nessuno dei due ha l'abito scuro.

Sardegna: Aggiungo averlo osservato anche ai Capi Caccia e Spartivento, all'isola dei Cavoli, a quello di Serpentara e anche al capo S. Elia di Cagliari: non solo è sedentario e nidificante alle isolette della Vacca e del Toro, ma anche a Capo Caccia (*Bonomi*).

253. *Hypotriorchis Subbuteo* (Linn. ex Aldrov.)

LODOLÁIO.

Lâr, Fârc, Fârco, Farchetto (*Basso-Piem.*) — Falchet (*Berg.*) — Falchét (*Feltre*) — Crivèla (*Savona*) — Sivettua neigra (*Arenzano*) — Farchètto (*Spezia*) — Falchetto (*Lucca*) — Canivello (*I. di Giglio*) — Falco pellegrino (*Foggia*) — Cirbio (*Calabr.*) — Arbaneddu di passa (*Mess.*) — Cozzicaventu (*Lentini*) — Farchettu (*Modica*).

Piemonte: Di passaggio nella seconda quindicina di aprile ed in settembre, ma scarso ovunque nella prov. di Cuneo (*Abre*). Vedesi in ottobre nella prov. di Torino, ma in scarso numero (*Martorelli, Gasca*). Nella prov. di Alessandria è di solo passo, e più abbondante in autunno che in primavera (*Camusso*). Pochi giungono di passo nell'Ossola, ove non pare abbia nidificato (*Bazetta*). Così nel Novarese (*Rodino*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Di scarso passaggio in marzo ed aprile e nel settembre nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Nidifica in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati*); frequente (*Borromeo*).

Veneto: Sparso, ma non frequente nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente di passaggio in marzo, ottobre e novembre nel distretto di Feltre, Belluno; non consta che vi nidifichi (*Delaito*). Accidentale nel Friuli, so di un solo ucciso presso Bertiole nell'ottobre 1879 (*Vallon*); raro nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio regolare in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune di passaggio in aprile e maggio ed in settembre nel distretto di Savona; ne ebbi uno il 29 giugno 1879 (*Piccone*). Comune, di passo in aprile o maggio in quello di Arenzano (*Luciani*). Di passaggio regolare nel distretto di Spezia, ma scarso specialmente in autunno (*Carazzi*).

Toscana: Si vede specialmente in settembre ed ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Scarso nella prov. di Firenze in settembre-ottobre (*Turchetti, Gargioli, Fontebuoni*). Apprendo dal signor G. Caiani di Firenze, che il 17 agosto 1881, egli ricevette da Coniale, in quel di Firenzuola, un *H. Subbuteo* ancora coperto di piumino; era stato preso nel nido, in un bosco, proprietà dell'ing. G. Alessandri (*Giglioli*). Non raro, di doppio passo nel Casentino, Arezzo (*Fiorini, Paueri*). Non comune, ma forse

sedentario in Val di Chiana; ne ebbi in agosto e settembre (*Griffoli*). Sarebbe di passo autunnale nel distretto di S. Gimignano, Siena; nell'ottobre 1886 ne ebbi uno, ucciso in un branchetto di 6 o 7 individui (*Paulucci*). Di passo in primavera, e talvolta nidificante nel Senese (*Dei*); frequente ai due passi in Maremma (*Ademollo*). Sedentario e nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Sedentario in Toscana, ma più frequente all'epoca del passo, specialmente in ottobre, quando segue i branchi di uccelletti migranti (*Roster*).

Marche: Comune ovunque (*Paolucci*).

Puglie: Piuttosto frequente in primavera ed autunno: ne ebbi uno l'11 agosto 1886 (*De Romita*).

Calabrie: Di passo in primavera nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune di passo da marzo a maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica, ove giunge in settembre e parte in aprile; vi è anco nidificante ed ebbero un nidiaceo da un pastore che lo aveva tolto dal nido l'11 giugno 1886 (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Di passo irregolare in primavera ed autunno, ne ebbi dalla Nurra di Porto Torres (*Bonomi*).

254. *Æsalon regulus* (Pall.) (ex Gesn.)

SMERIGLIO.

Lâr, Farchétt, Farchetto (*Basso-Piem.*) — Ganiel de Franguei (*Berg.*) — Storéla, Astoréla (*Feltre*) — Storèla (*Padova*) — Falcùzz (*Friuli*) — Falchett da Passer (*Vergato*) — Farchèt (*Spezia*) — Falchetto nero (*Pisa*) — Riulo (*Bari*) — Cacciaventu furasteri (*Mess.*) — Veditore (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al monte in prov. di Cuneo, ove si mostra di passaggio soltanto durante la prima metà del settembre (*Abre*). Avuto sul mercato di Torino anche nell'inverno (*Martorelli*). Poco frequente in prov. di Torino

(*Gasca*). Piuttosto raro nel Basso Piemonte, ove si vede soltanto all'epoca delle migrazioni (*Canusso*). Pochi giungono nell'Ossola di passaggio; non pare vi abbia nidificato (*Bazetta*). Erratico nel distretto di Piedimulera. Novara (*Danisi*).

Lombardia : Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Di scarso passaggio in quella di Cremona (*Ferragni*). Raro: preso a Castelgoffredo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati*); piuttosto frequente (*Borromeo*).

Veneto : Frequente di passaggio in marzo, ottobre e novembre nel distretto di Feltre, Belluno, ove pare abbia pure nidificato (*Delaito*). Abbastanza frequente nel Friuli: avuto in agosto, settembre, ottobre e novembre (*Valloni*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comune, nidificante e forse sedentario nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Un esemplare fu ucciso presso Modena nel novembre 1884 (*Picaglia*). Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passo regolare, ma non copioso in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Scarso e di comparsa irregolare nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Di passo in autunno e primavera nella prov. di Lucca (*Martorelli*). Piuttosto comune nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Piuttosto raro, capita specialmente nell'autunno, in Val di Chiana (*Griffoli*). Ne presi due al paretaio nel distretto di S. Gimignano nell'autunno 1884 (*Paulucci*). Poco frequente nel Senese, ove l'ebbi in novembre e dicembre (*Dei*); raro ed autunnale in Maremma (*Ademollo*). Scarso ed invernale in Toscana (*Roster*).

Campania : Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Non raro in primavera ed autunno; ne ebbi uno il 28 gennaio 1888 (*De Romita*).

Sicilia : Comune di passo da marzo a maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*).

Sardegna : Invernale e di passo regolare (*Bonomi*).

255. Cerchneis Tinnunculus (Linn. ex Gesn.)

GHEPPIO.

Tinnunculus alaudarius, Salvad.

Farchétt, Chervela, Crivèla, Crevèla (*Basso-Piem.*) — Falchet de Tör (*Berg.*) — Falchett de campanin (*Mil.*) — Falchett da tourr (*Cremona*) — Falchèt de tore, Storèla de campanil (*Feltre*) — Vidul, Falcùzz di ciàmpanil (*Friuli*) — Falchett (*Vergato*) — Falchett d'torr (*Bol.*) — Siettua o Sivettua roussa, Crivèla russa (*Arenzano*) — Farchèto (*Spezia*) — Falchetto (*Lucca, Giglio*) — Falco (*Viterbo*) — Cristarieddu, Rapineddu di loco (*Calabr.*) — Cristareddu (*Mess.*) — Izzu (*Modica*) — Crivedda (*Castelb.*).

Piemonte: Frequente e sedentario ovunque in prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta in aprile (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Assai comune e sedentario nella prov. di Alessandria, più numeroso al piano alle epoche della migrazione (*Camusso*). Comune e sedentario nell'Ossola (*Bazetta*). Così nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*): nella Valsesia nidifica una sola volta dall'aprile al giugno (*Guarinoni*).

Lombardia: Comune ovunque nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Comune e sedentario nella prov. di Cremona, diventa erratico nell'inverno (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente frequente in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nel distretto di Caprino, Verona, abita e nidifica sulle roccie dei monti (*Pellegrini*). Sparso e nidificante nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso, ma sedentario nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Comunissimo e sedentario nel Friuli (*Vallon, Del Torre*). Comune e sedentario

nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Comune e nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Sedentario e nidificante ai monti e di passo autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona, ove per molti anni l'ho veduto annidare sulle rupi sporgenti sul mare tra Albissola e Savona, e tra Albissola e Celle (*Piccone*). Sedentario e comune nel distretto di Arenzano, ove è anco di passo in marzo ed aprile (*Luciani*). Frequente e sedentario nel distretto di Spezia; più numeroso nell'inverno (*Carazzi*).

Toscana : Assai comune e sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); anche di passo in settembre nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Comunissimo e sedentario nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Frequente e sedentario nella prov. di Firenze (*Gargioli, Fontebuoni*). Comune e sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*); così in Val di Chiana (*Griffoli*). Frequente e sedentario sulle rupi nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paolucci, Marri*). Comune assai e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Sedentario sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Abbondante e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune al piano, nidifica in maggio al Monte Conero, Ancona (*Paolucci*).

Lazio : Sedentario e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania : Sedentario e comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sedentario all'isola di Capri, nidifica tra le rupi (*Cerio*).

Puglie : Comune e sedentario (*De Romita*).

Calabrie : Sedentario e comune ovunque nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Modica, Siracusa

(*Dellafonte, Garofalo*). Frequente e sedentario nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune e sedentario (*Bonomi*).

256. *Cerchneis Naumanni* (Fleisch.)

GRILLAIO.

Tinnunculus tinnunculoides, Salvad.

Farchétt, Chervéla, Crivéla, Crevéla (*Basso-Piem.*) — Galinèl (*Feltre*) — ? Storéla (*Padova*) — Falchettin (*Rovigo*) — Crivéla russa (*Savona*) — Siettua (*Arenzano*) — Arcistrello (*Pisa*) — Cacciaventu maltisi (*Mess.*) — Marvizzaru (*Modica*).

Piemonte : Il 17 agosto 1879 ne venne ucciso uno al Passatore presso Cuneo ; il 3 settembre 1883 ne trovai un altro sul mercato di Cuneo (*Abre*). Ne ho avuto uno in carne a Torino (*Pezzi*). Rarissimo nel Basso Piemonte ; uno venne ucciso nella primavera del 1869 presso Serravalle Scrivia (*Camusso*). Accidentale nella prov. di Novara (*Rodino*).

Lombardia : Di scarso passaggio, ma fors' anche nidificante nella prov. di Cremona, ove fu veduto lungo il Po il 15 luglio 1883 (*Ferragni*).

Veneto : Abbastanza comune da maggio ad agosto nel distretto di Feltre, Belluno ; lo si vede volare sui prati di montagna cacciando grilli ed altri insetti (*Delaito*). Rarissimo nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Non tanto scarso nel Nizzardo (*Gal*). È raro nel distretto di Savona, ne ebbi uno ad Albissola il 17 aprile 1873 (*Piccone*). Raro ; passa in aprile e maggio nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarsissimo nel distretto di Spezia ; ne ebbe due il prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana : Nella prov. di Lucca ebbi soltanto una femmina, uccisa sul monte Valimona, Lucca, il 21 agosto 1886 (*Martorelli*) ; passa anche in settembre nel distretto di Mas-

sarosa e non è raro (*Gragnani*). Scarso al piano in maggio nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Piuttosto raro in Val di Chiana, l'ho veduto ed ucciso presso i laghi in primavera, in compagnia della specie seguente (*Griffoli*). Raro nel Senese, ove l'ebbi soltanto il 10 maggio 1870 (*Dei*); di passo irregolare in primavera nella Maremma (*Ademollo*).

Marche : Scarso al piano (*Paolucci*).

Campania : Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Di passaggio irregolare, non mai abbondante, ma neanche raro, ordinariamente in primavera: ne ebbi uno il 18 marzo 1888 (*De Romita*).

Calabrie : Non comune, di passo; vedesi specialmente in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Non scarso di passo in primavera in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Non raro nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalò*).

Sardegna : Di passo in primavera ed autunno; alcuni svernano e pare che qualcuno si accoppi colla specie precedente (*Bonomi*).

257. *Cerchneis vespertinus* (Linn.)

BARLETTA.

Erythropus vespertinus, Salvad.

Farchètt, Farchettin, Farchétto (*Basso-Piem.*) — Falchet, Storèla (*Bell.* — Vidul (femm.), Balarin? (*Friuli*) — Farchetto (*Savona*) — Farchèto american (*Spezia*) — Arcistrello (*Pisa*) — Grillaio (*Sesto fiorentino*) — Moscardo (*Napoli*) — Diavulicchiu, Chiumbino (*Reggio Calabr.*) — Arbaneddu, Chiumminu (*Mess.*) — Farcuni frusteri o di passa (*Castell.*) — Vedidore (*Sard.*).

Piemonte : Scarsa ovunque nella prov. di Cuneo, di passaggio nella seconda metà di aprile (*Abre*). Nell'autunno 1864 m'imbattai nei pressi di Carmagnola (Torino) in un branco di una trentina d'individui di *C. vespertinus*, da noi di passo accidentale, i quali stavano posati sulle alte piante ed erano così poco paurosi, che potei abbatterne cinque (*Gasca*). Nella prov. di Alessandria si vede soltanto nel tempo delle migrazioni e specialmente in primavera; in quella stagione nel 1872 un branco di oltre un centinaio di individui comparve presso Serravalle Scrivia; e nella pianura di Novi nella primavera del 1857 questi Falchi passarono in abbondanza, a vere colonne per diversi giorni (*Camusso*). Nell'Ossola giunge talvolta di passaggio, non pare vi abbia nidificato (*Bazetta*).

Lombardia : Di passo irregolare in primavera nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Rara in quella di Mantova, presa a Castelfogno (*Paglia*). Generalmente rara nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Comune nel Bellunese, ove frequenta i boschi, giunge in aprile, nidifica nel cavo delle rocce in agosto e parte in ottobre (*Soravia*). Abbastanza frequente di passo nel Friuli (*Vallon*); nel distretto di Cividale qualche coppia nidifica ai monti, così sopra Brischis (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissima in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Di passaggio nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Di passaggio nella prov. di Parma; avuta dal 29 aprile all'8 maggio (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio abbastanza regolare in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Più o meno abbondante secondo gli anni nel distretto di Savona, ove è di passaggio soltanto in aprile e maggio (*Piccone*). Rara nel distretto di Arenzano, ove passa in maggio e giugno (*Luciani*). Una volta di passaggio regolare ed abbondante nel distretto di Spezia, compariva a branchetti nel maggio; ora sembra essere divenuta scarsa e di passo irregolare (*Carazzi*).

Toscana : Molte passano in aprile e maggio in Val di

Serechio nella prov. di Lucca; alcuni anni or sono ne ebbi un maschio adulto ai primi del novembre (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa non è regolare nelle sue comparse; così nella primavera del 1878 il padule di Massaciuccoli ne fu coperto; poi non ne vidi più sino al maggio 1888, ed allora una sola coppia (*Gragnani*). Comune qualche anno in aprile e maggio nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa; si vede in branchi nelle praterie (*Ott, Papasogli*). Non rara, ma di comparsa irregolare in aprile e maggio nella prov. di Firenze, distretto di Sesto (*Fontebuoni*). Non comune, di passo irregolare in aprile, nel Casentino, Arezzo (*Beni*). In Val di Chiana è abbondantissima alcuni anni e scarsa in altri, sempre per pochi giorni in primavera al piano e nelle colmate; ben di rado si vede in autunno (*Griffoli*). Di passo ora più, ora meno copioso, in aprile, maggio e giugno, nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Comune di passo in primavera in Toscana: è sempre gregaria (*Roster*).

Marche: Frequente di passo (*Paolucci*).

Campania: Scarsa, di passo in marzo, aprile e maggio nella prov. di Nāpoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Giunge ordinariamente copiosa in piccoli branchi nell'aprile e nella prima metà di maggio; si rivede in scarso numero però nell'autunno (*De Romita*).

Calabrie: Di passaggio, ma non comune nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Frequente di passo in maggio in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune di passo, e qualche anno abbondante in aprile-maggio nella prov. di Messina, ove si vede anche in ottobre (*Ruggeri, Pistone*). Al piano, di passo soltanto, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo in primavera ed in autunno: io non ebbi che individui giovani (*Bonomi*).

258. *Astur palumbarius* (Linn. ex Gesn.)

ASTORE.

Farchtoun, Capastr (*Cuneo*) — Falcon (*Padova*) — Cagne, Cagnass, Cagnasse (*Friuli*) — Falco palombaro (*Rovigo*) — Asturi (*Calabr.*).

Piemonte : Frequente e sedentario in montagna nella prov. di Cuneo ; vi nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Albre*). Specie rara assai nella prov. di Alessandria ; un giovane venne preso presso Serravalle nell'autunno 1882 (*Camusso*). Di casuale comparsa nell'Ossola, ove so di una sola cattura (*Bazetta*). Nella Valsesia nidifica una sola volta in aprile e maggio (*Guarinoni*).

Lombardia : Di accidentale comparsa (*Turati*) ; piuttosto frequente (*Borromeo*).

Veneto : Frequente e sedentario ai monti nel Cadore, Belluno ; vi nidifica nel maggio (*Tissi*) ; così nel distretto di Feltre, ove però è scarso (*Delaito*). Rarissimo nel Friuli ; ne ebbi uno giovane colto alle panie il 24 settembre 1885 (*Valton*) ; di passo in autunno e primavera nel distretto di Civile (*Del Torre*). Raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Accidentale nella prov. di Parma ; un maschio giovane venne preso il 10 ottobre 1883 (*Del Prato*).

Liguria : Scarso nel distretto di Spezia, Genova (*Carazzi*).

Toscana : Non raro nella prov. di Lucca (*Fontebuoni*). Scarso nel distretto di Lari, Pisa (*Papasogli*). Raro nella prov. di Firenze, vedonsi specialmente i giovani in ottobre e novembre (*Fontebuoni, Giglioli*). Il 29 maggio 1886 nella macchia di Serra Chiusi in Casentino, sopra un enorme faggio a circa 20 metri da terra, il barone H. F. de S.^t Remy trovò un nido di Astore con entro due pulcini, i quali furono presi e poi donati alla Collezione centrale italiana nel R. Museo zoologico di Firenze ; erano maschio e femmina. Il nido era largo un 2 metri : vi si rinvenne una grossa serpe

e vari rospi (*Giglioli*). Non frequente, ma sedentario nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Paneri*). Raro in Val di Chiana, ove però quasi ogni anno capita di passo (*Griffoli*). Raro assai nel Senese (*Dei*); sedentario in Maremma (*Ademollo, Cambi*).

Marche : Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania : Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Calabrie : Di passo in primavera nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Raro, ma sedentario nella prov. di Messina (*Rag-geri, Pistone*). Accidentale nel distretto delle Madonie, Palermo : ma nell'aprile 1856 e 1886 ne passarono parecchi, fermandosi alcuni giorni (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Invernale e anco sedentario e nidificante, io ne presi in agosto al monte Ortobene, Nuoro (*Bonomi*).

259. *Accipiter Nisus* (Linn.) (ex Gesn.)

SPARVIERE.

Farchét, Farchétt, Farchétto (*Basso-Piem.*) — Falcùzz, Vidul (*Friuli*) — Galinel (*Calore*) — Falchetin (*Feltre*) — Pogianelo (*Rovigo*) — Falchett da la manella longa (*Bol.*) — Falchett (*Vergato*) — Crivèla grixia (*Savona*) — Farchétto (*Spezia*) — Falchetto (*Pisa*) — Falco cenerino (*Fiesole*) — Sparviero (*Marche*) — Riulo (*Bari*) — Petrit (*Albanesi italici*) — Fareu (*Calabr.*) — Striveri, Mancia jaddini (*Modica*) — Farchettu (*Castell.*) — Veditore (*Sard.*).

Piemonte : Frequente ovunque in prov. di Cuneo, ove diventa erratico nell'inverno; nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*); ebbi le uova deposte nel nido di una Gazza su di un pioppo nei pressi di Torino (*Gasca*). Nidifica, ma non abbonda al monte nella prov. di Alessandria; qualcuno rimane tutto l'anno, ma molti si vedono alle due epoche

del passo e sono specialmente giovani e più femmine che maschi (*Camusso*). Abbastanza comune e nidificante nell'Ossola (*Bazetta*). Così nel Novarese (*Rodino*); nella Valsesia fa una sola covata (*Guarinoni*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Comune di passo e nell'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Piuttosto frequente nella prov. di Vicenza (*Molari*); ove è sedentario (*Ferrari*). Frequente e sedentario nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Frequente nel Friuli (*Vallon*); vi è sedentario (*Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Sedentario nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Comune e sedentario nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Principalmente di passaggio in settembre nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove giunge dalla fine di agosto a tutto ottobre e dove alcuni svernano; parte e ripassa in aprile (*Piccone*). Sedentario e comune in quello di Arenzano, ove passa in aprile, e, meno abbondante, nell'autunno (*Luciani*). Frequente e sedentario nel distretto di Spezia, ove è specialmente abbondante d'inverno (*Carazzi*).

Toscana: Comune alle due epoche del passo e specialmente in settembre, nella prov. di Lucca, ove è anche sedentario (*Martorelli*, *Gragnani*). Frequente, specialmente in ottobre nel distretto di Lari, Pisa (*Papasogli*). Sedentario nella prov. di Firenze; scarso nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); frequente in quelli di Fiesole, Sesto e Signa (*Gargioli*, *Fontebuoni*). Comune e sedentario nel Casentino (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Così in Val di Chiana, ove inoltre molti se ne vedono di passo nell'ottobre (*Griffoli*). Sedentario e di passo autunnale nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*, *Marri*). Comune d'autunno e d'inverno nel Senese (*Dei*); scarso di doppio passo nel Grossetano

(*Ademollo*); anche sedentario in Maremma (*Cambi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune ovunque (*Paolucci*).

Campania : Di scarso passaggio in autunno all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Invernale e frequente alle due epoche del passo (*De Romita*).

Calabrie : Comune nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Non raro e anche sedentario nella prov. di Mes-
sina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente nel distretto di Modica,
Siracusa; giunge in settembre e parte in marzo (*Dellafonte*,
Garofalo). Frequente in quello delle Madonie, Palermo (*Pa-
lumbo, Morici*).

Sardegna : Comune, sedentario e nidificante, ma anche
di passo regolare ed invernale (*Bonomi*).

VULTURIDÆ

(*Avvoltoi*).

260. *Gypaëtus barbatus* (Linn.)

ARPIA.

Avvoltoio degli agnelli (*Ant. Ital.*) — Storàzh. Falcón
(*Feltre*) — Aigla (*Nizza*) — Vuturu (*Mess.*) — Bentruxiu de
angiom (*Sard.*).

Piemonte : Sembra essere inesatta la notizia data in-
torno ai due esemplari della collezione Craveri (*Arif. Ital.*
p. 264), io li ho veduti sin dal 1874 in quella raccolta. Ram-
mento poi una femmina uccisa sul monte Bego, Cuneo, il
21 giugno 1876 (*Abre*). Negli ultimi giorni del marzo 1887
il R. Museo Zoologico di Torino ebbe una bellissima Arpia
uccisa presso Valdieri (*Salvadori*).

Lombardia: Pare vivere ancora sulle Alpi sopra Chiavenna nella prov. di Sondrio (*Galli*). Rara nella Lombardia (*Turati, Borromeo*); sedentaria sul monte Legnone, Como (*Borromeo*).

Veneto: Scarsa, ma sedentaria sugli alti monti nel distretto di Feltre, Belluno; vi nidifica una sola volta in maggio, tra le rupi, depone 2 uova bianche con macchie scure e le incuba circa 20 giorni. Ora però va considerata specie rarissima; l'ultima sua nidificazione che si ricorda avvenne sulle rupi del Comune di Arrie' sopra il Canale del Brenta verso il 1845; vennero allora tolti dal nido i due giovani (*Delaito*). Il signor Riccardo Milesi mi assicurò che questa specie è ben nota nella Carnia, ove è distinta col nome tedesco di « *Gämsgeier* » (*Del Torre*).

Liguria: Sedentaria, ma assai scarsa nel Nizzardo, verso Saorgio ed il colle di Tenda; abbiamo avuto i nidiacei (*Gal*).

Sicilia: Rarissima sugli alti monti nella prov. di Messina (*Pistone*). Rara nel distretto delle Madonie, Palermo; nel 1839-40 nidificò nella rupe sopra le cartiere, Castelbuono (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentaria; ne osservai nel 1886 a Correboi, Lanusei, in numero grande; erano giovani (*Bonomi*).

261. *Vultur Monachus*, Linn.

AVVOLTOIO.

Vuturu, Buturu (*Mess.*).

Veneto: Ne furono uccisi in Caruia (Friuli), e ne conserva uno il signor R. Milesi, nella sua raccolta (*Del Torre*).

Toscana: Di rara e casuale comparsa in Maremma (*Ademollo*).

Sicilia: Raro ai monti nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Comune e sedentario (*Bonomi*).

262. Gyps fulvus (J. F. Gmel. ex Ray)

GRIFONE.

Avariul (*Friuli*) — Avoltojo (*Padova*) — Votour (*Nizza*) — Crifone (*Nap.*) — Vuturazzu (*Mess.*) — Mascolinu, Mangia scecchi (*Modica*).

Lombardia: Accidentale; preso a Buscoldo nel 1813 e a Formigosa nel 1885, nella prov. di Mantova (*Paglia*). Di rara comparsa in Lombardia (*Turati*); sedentario sul monte Legnone, Como (*Borromeo*).

Veneto: Abbastanza frequente e sedentario sugli alti monti del Friuli, così nelle vicinanze di Tarcetta; nidifica in marzo; nell'autunno 1882 due vennero portati dalla Carnia sul mercato di Udine (*Tallon*). È frequente e nidificante nell'alto Friuli; io ne ebbi due nel luglio 1886, uccisi a Montefosca sopra Stupizza e molti ne vidi in Carnia; compaiono tosto ove è una carogua (*Del Torre*). Rarissimo nella prov. di Padova; seppi dal signor E. Busetto di Villafranca Padovana che pochi anni fa ne vennero presi tre o quattro esemplari a Giarabassa (*Arrigoni*).

Emilia: Accidentale nella prov. di Parma: un maschio giovane venne preso il 21 ottobre 1885 (*Del Prato*).

Liguria: Di non rara comparsa nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Firenze: uno fu preso molti anni fa presso Firenze (*Arif. Ital.* p. 266) e lo vidi conservato in casa Dini (*Giglioli*).

Marche: Avventizio (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie: Un individuo fu ucciso a Taranto il 22 ottobre 1888 (*De Romita*).

Calabrie: Uno venne ucciso a Terretti il 25 settembre 1888, ed un secondo a Capo d'Armi, prov. di Reggio, quasi contemporaneamente; erano sfiniti e si lasciarono avvicinare facilmente (*Moschella*).

Sicilia: Non raro ai monti nella prov. di Messina (*Prestone*). Frequente e sedentario ai monti nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte*, *Garofalo*). Ora scarso, ma seden-

tario ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo; nidifica in febbraio-marzo nei balzi di Gonato, della Canna e della Juntera e depone 2 uova (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Sedentario e più abbondante della specie precedente (*Bonomi*).

263. *Neophron Percnopterus* (Linn.) (ex Gesn.)

CAPOVACCAIO.

Resclucié¹ (*Nizza*) — Baccalotto (*I. di Giglio*) — Aquilotto (*Monte Argentario*) — Nia (*Reggio Calabr.*) — Tignusu (*Modica*) — Pasqualinu² (*Castelb. Madonie*).

Liguria: Sedentario e non tanto raro sui monti del Nizzardo; nidifica alla Torre a Robiou (*Gal*).

Toscana: Non comune, ma sedentario in Maremma (*Dei, Ademollo*). Nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*).

Puglie: Accidentale; un individuo fu catturato a Taranto al dire del Costa (*De Romita*). Sedentario nel distretto di Taranto, giacchè ebbi in dono dal dott. Nicola De Bellis due giovani, maschio e femmina, tolti viventi dal nido il 18 ottobre 1887 nei pressi di Palagianello (*Giglioli*).

Calabrie: Piuttosto frequente nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Scarso nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso, ma sedentario ai monti nel distretto di Modica, Siracusa; alleva una sola covata di 2. in aprile-maggio (*De-la-fonte, Garofalo*). Accidentale in quello di Terranova, Caltanissetta, ove uno esausto di forze fu colto vivo il 29 ottobre 1886 (*Carrana*). Sedentario, ma divenuto raro nel distretto delle Madonie, Palermo; vi è anco di passo in aprile. Ha nidificato nel balzo inaccessibile di Gonato in marzo-aprile; depone 2 uova (*Palumbo, Morici*).

¹ Chiamato così perchè si recano ove sono i Pastori per divorare gli avanzi dei formaggi, che si danno usualmente ai porci.

² Perchè si osserva vicino a Pasqua tra gli armenti bovini.

STEGANOPODES.



PELECANIDÆ

(*Pellicani*).



264. *Pelecanus crispus*, Bruch

PELLICANO RICCIO.

Mantengo assolutamente quanto ho già scritto intorno all'esemplare di questa specie catturato a Nonantola nel Modenese (*Avif. Ital.* p. 269). Il Salvadori, ingannato da erronee informazioni in proposito e non ammettendo che il litorale dalmato sia da considerarsi come parte della regione italiana, esclude il *P. crispus* dall'avifauna italiana. Per riguardi verso un Collega ed amico non voglio raccontare le diverse e contraddittorie storielle messe in giro a proposito del Pellicano di Nonantola, dopochè quell'esemplare venne a prender posto nella Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo zoologico di Firenze; mi limiterò semplicemente a confermare quanto già dichiarai in proposito. Ed ora ho un nuovo fatto da aggiungere in appoggio alla casuale comparsa di questa specie in Italia: trovandomi a Bergamo il 7 ottobre 1887, visitai una raccolta lombarda che si conserva nel Museo di quel R. Istituto Tecnico, e tra le altre specie interessanti vi rinvenni un individuo giovane del *P. crispus* ucciso a Calcio sull'Oglio nel 1855. Confesso che rimasi assai contento di questa scoperta.

265. Pelecanus Onocrotalus, Linn. (ex Gesn.)

PELLICANO.

Pelican (Milano) — Pellicanu (Modica) — Pilucani (Terran. Sicil.).

Piemonte: Ricordo di aver veduto alcuni anni fa d'inverno sul Po presso Carmagnola, Torino, un branco di circa una ventina d'individui di questa specie, dei quali parecchi vennero uccisi: è però di comparsa affatto accidentale nella provincia (Gasca). Un individuo venne preso sul Toce in Ossola, Novara, nell'autunno 1867 (Bazetta).

Lombardia: Capita casualmente nella prov. di Sondrio (Galli). Ed in quella di Milano (Brambilla). Accidentale nella prov. di Cremona; nell'agosto 1877 un branco di 32 si posò su di un'isoletta all'imboccatura dell'Adda, di cui tre vennero uccisi (Ferragni). Accidentale in quella di Mantova (Paglia). Di rara comparsa in Lombardia (Turati, Borromeo).

Veneto: Un esemplare nel Museo dell'Istituto Tecnico di Padova, donato dal signor G. Trieste, pare essere stato preso in provincia (Arrigoni).

Emilia: Di comparsa accidentale nella prov. di Parma (Del Prato).

Liguria: È stato preso una sola volta nel Nizzardo, a Fontan presso il Colle di Tenda (Gal).

Toscana: Accidentale nella prov. di Lucca; ne ebbi uno giovane nell'agosto 1883 ed in più anni ne ho veduto tre volte sul lago di Massaciuccoli, sempre in branchi, fuorchè una volta, nel maggio, un individuo isolato (Gragnani). Accidentale nella prov. di Firenze; ne conservo uno ucciso ad Empoli nel giugno 1836, *Avif. Ital.* p. 269 (Giglioli). Accidentale affatto in Val di Chiana (Griffoli). Accidentale nel Senese, ove è stato preso lungo l'Arbia (Dei); di casuale comparsa dopo burrasche ad Orbetello, Burano e Castiglion della Pescaia, Grosseto (Ademollo).

Marche: Accidentale: ne ebbi due dal Porto di Numana (*Paolucci*).

Campania: Di comparsa accidentale, in branchi, dopo forti burrasche nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale, ma non molto raro; più volte in varie località si vide a branchi (*De Romita*).

Calabrie: Accidentale nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio, ove giunge casualmente in branchetti (*Moschella*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Di casuale comparsa in quello di Terranova, Caltanissetta, ove venne preso un maschio adulto isolato nel novembre 1868, uno giovane nel dicembre 1881, un altro, sempre isolato, il 9 agosto 1886; seppi poi che alcuni anni fa sul fiume Salso tra Pietraperzia e Caltanissetta, fu veduto un branco di circa 30 individui (*Carvana*).

PHALACROCORACIDÆ

(*Marangoni*).

266. *Phalacrocorax Carbo* Linn. ex Gessl.

MARANGONE.

Courmoran (*Nizza*) — Corvo marino (*Ancona*) — Cuòrvo de mare, Cuòrvo marino, Cuòrvo d'acqua (*Nap.*) — Cuòrvo de mare (*Calabr.*) — Marguni (*Mess.*).

Piemonte: Qualche raro individuo si uccide lungo il Tanaro, nella prov. di Cuneo; io ne ebbi già tre (*Abrè*). Un maschio adulto venne preso in Ossola lungo il Toce nel marzo 1887 (*Bazetta*).

Lombardia: Di rara comparsa nella prov. di Cremona

(*Ferragni*). Accidentale in quella di Mantova, preso a Felonica e sul lago di Mantova nel 1861 (*Paglia*). Di rara comparsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : È poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo; ne ebbi uno ucciso nel dicembre 1878 lungo l'Adige presso Badia Polesine (*Dal Fiume*).

Emilia : Di comparsa accidentale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Vedesi più facilmente in primavera nel Nizardo (*Gal*). Scarso assai nel distretto di Spezia, ove capitano più facilmente i giovani nell'inverno (*Carazzi*).

Toscana : Comune sul lago di Massaciuccoli nella prov. di Lucca, ove è anche di passo in settembre (*Gragnani*). Accidentale nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Lenzi*). Non comune d'inverno sui laghi in Val di Chiana; dicesi sedentario sul lago Trasimeno (*Griffoli*). Comune e sedentario in Maremma (*Dei, Ademollo*).

Marche : Scarso (*Paolucci*).

Campania : Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Invernale e di comparsa regolare in primavera ed autunno (*De Romita*).

Calabrie : Invernale e piuttosto raro nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio; nell'ottobre 1886 uno venne ucciso sopra un pioppo a Pentimele (*Moschella*).

Sicilia : Scarso in novembre e dicembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Invernale in quello di Terranova, Caltanissetta, donde scompare in marzo (*Carvana*). Scarso al litorale nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune e sedentario (*Bonomi*).

267. Phalacrocorax Graculus (Linn.) (ex Aldrov.)

MARANGONE COL CIUFFO.

Marguni svariù (*Mess.*) — Cuorvi di mari (*Modica*).

Marche: Rarissimo, avuto da Ancona (*Paolucci*).

Puglie: Accidentale; un giovane venne preso nell'aprile 1878 presso a Bari (*De Romita*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina; ne ebbi uno giovane dal Faro (*Pistone*). Scarso al litorale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Abbondante e sedentario su tutto il litorale (*Bonomi*).

268. Microcarbo pygmæus (Pall.)

MARANGONE NANO.

Lombardia: Accidentale; preso nel 1843 nella prov. di Mantova (*Paglia*).

Liguria: Di accidentale comparsa in primavera nel Nizzardo (*Gal*).

Sicilia: Il 25 maggio 1887, mentre attraversavo lo stretto di Messina, vidi un branco di quattro individui di questa specie, che si dirigevano verso il Faro (*Giglioli*). Un individuo venne ucciso a Cefalù nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

DYSPORIDÆ

(*Sule*).

269. Sula Bassana (Linn.) (ex Gesn.)

SULA.

Liguria : In una sua lettera in data 2 luglio 1886, il signor Salvatore Queirolo mi dà l'interessante notizia che nel 1882 o 1883, a forse duecento metri dalla spiaggia di Sampierdarena (Genova), egli uccise un esemplare di questa specie così rara per noi: esso venne preparato, ma non so in quale Collezione privata sia andato a seppellirsi (*Giglioli*).

Toscana : Il 15 agosto 1888 alle 9, 30 a. m. posato sull'acqua a circa un chilometro da terra tra Monte Grosso e Capo S. Vito, isola dell'Elba, il mio conservatore Amedeo Giulianetti vide un esemplare di questa specie in abito giovanile. Intorno alla Sula erano posati alcuni *Puffinus anglorum* e tre *Larus cachinnans*; anche il primo individuo catturato in Italia fu preso in quei paraggi (*Giglioli*).

HERODIONES.

ARDEIDÆ

(Sgarze).

270. *Ardea cinerea*, Linn. (ex Bell.)

AIRONE.

Giacou d'eva (*Alba*) — Ardea, Sgolgia, Sgolgion, Airòn, Perdigiorni grosso (*Basso-Piem.*) — Airòn blanc, Garze, Sgarze, Crostar (*Friuli*) — Sgarza (*Vicenza*) — Airon zenerin (*Feltre*) — Sgardo zenerin (*Padova*) — Goitre gris (*Nizza*) — Peticòla (*Spezia*) — Gianna (*Pisa*) — Scarza bigia (*Casentino*) — Ariòne cenerina (*Nap.*) — Cicogna, Cicogna chiumbina, Airuni (*Calabria*) — Russieddu cinniruso (*Modica*) — Ariuni cinnirinu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove è soltanto di passaggio dalla metà di aprile alla metà di maggio e dalla metà di ottobre a quella di novembre (*Abre*). Frequente in quella di Torino (*Gasca, Pezzi*); nell'inverno ed al principio di primavera (*Martorelli*); vi nidifica (*Pezzi*). Non raro al piano in prov. di Alessandria all'epoca delle migrazioni, specialmente in primavera: qualche coppia ha nidificato lungo il Po ed il Tanaro (*Camusso*). Di passo in maggio nell'Ossola (*Bazetta*). Di comparsa casuale nell'inverno in Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia: Di comparsa accidentale nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Comune dall'agosto al maggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova: nidifica nei

canneti del lago superiore e di giorno va in cerca di cibo nelle risaie (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarsa comparsa al piano nel distretto di Feltre, Belluno, in aprile (*Delaito*). Frequente al piano nel Friuli ove è sedentario; non ebbi notizie sulla nidificazione (*Vallon*); invernale e di passo nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arri-goni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale d'estate nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentario, ma più specialmente invernale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio, primavera ed autunno, nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto raro nel distretto di Savona, ove ne ebbi in marzo, maggio e ottobre (*Piccone*). Comune di passo in aprile e maggio nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Frequente dal febbraio al maggio, più scarso in autunno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Scarso nel distretto di Massarosa, Lucca, ove si vede anche di passo nel luglio (*Gragnani*). Invernale e di scarso passaggio nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Frequente in marzo ed aprile nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Comune al piano in marzo ed aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Piuttosto comune ai due passi in Val di Chiana, ove si vede anche nell'inverno e nell'estate, ma non sembra esservi sedentario (*Griffoli*). Scarso nel Senese (*Dei*); sedentario e comune in Maremma, ove giunge anche a svernare (*Dei, Ademollo, Cambi*). Nella seconda metà del marzo 1881 trovandomi nel padule di Castiglion della Pescaia mi fu detto che le Gianne (*A. cinerea*) avevano il nido nelle cosiddette « Sgarzaie » (oggi « macchioni »); volli vedere, ed infatti dopo aver attraversato, con l'acqua sino alla cintura, buon tratto di padule coperto di cannelle foltissime, incominciai a veder volare le Gianne sopra il macchione; esse gridavano assai. Poco più in là vidi con grande meraviglia il mac-

chione tutto coperto di nidi, posti a 3 o 3 $\frac{1}{2}$ metri dal suolo; visitatili constatai che non solamente v'erano le uova, ma ancora molti piccoli appena nati ed altri che avevano incominciato a mettere le penne. I nidi erano una trentina e contenevano da 2 a 5 uova o piccoli. Il puzzo all'intorno era insopportabile; sotto il macchione non crescevano nè canne nè erbe, v'era invece un'acqua scura e fetida ripiena di avanzi putrefatti di pesci, anguille e rane. I nidi per la più parte erano stati costruiti sopra quelli vecchi che erano letteralmente intonacati di sterco (*Ott*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Campania: Di scarso passaggio al piano nella prima quindicina di marzo e nella seconda di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comune e sedentario, ma più abbondante alle due epoche del passo (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante di passo in aprile e maggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Piuttosto scarso di passo in marzo-aprile nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Scarso, invernale e di passo in marzo nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Comune nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica, giunge in luglio e parte in maggio (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante di passo nella prima metà di aprile, assai scarso nel settembre, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Raro al piano in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune, sedentario ed in parte migrante (*Bonomi*).

271. *Ardea purpurea*, Linn. (ex Briss.)

AIRONE ROSSO.

Ardea, Airòn ross, Perdigiorno rosso (*Basso-Piem.*) —
Sgolia roussa (*Milano*) — *Sgarz ross* (*Mantov.*) — *Crotar*

(*Friuli*) — Airón (*Belluno*) — Goître rous (*Nizza*) — Perticòla (*Spezia*) — Scarza rossa (*Casentino, Valdich.*) — Nonna rossa (*Senese*) — Rossiello (*Nap.*) — Russiedd (*Bari*) — Russiellu, Russeddu (*Calabr.*) — Russieddu russu (*Modica*) — Russiddazzu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, e soltanto di doppio passaggio; dalla metà di aprile alla metà di maggio e dalla metà di ottobre a quella di novembre (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*); osservato in maggio presso la Stura (*Martorelli*). Più raro della specie precedente in prov. di Alessandria, ove appare alle epoche del passo ed ove pare non aver nidificato (*Camusso*). Di passaggio in primavera nell'Ossola; nel maggio 1876 vi ebbi però due nidiacei (*Bazetta*).

Lombardia: Di casuale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Meno frequente della precedente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Raro nella prov. di Cremona, ove giunge in aprile e maggio e forse rimane a nidificare (*Ferragni*). Comune sul lago di Mantova (*Paglia*). Generalmente frequente in Lombardia (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Turati*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso al piano nel Bellunese, ove non nidifica e passa in marzo e settembre (*Soravia*). Frequente nel Friuli basso in aprile e settembre: forse vi nidifica (*Vallon*); nel distretto di Cividale ne uccisi diversi in maggio; vedesi di rado nell'autunno (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passo primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove passa dal marzo al maggio e ripassa in settembre (*Piccone*); in quello di Arenzano si vede frequente in aprile e maggio (*Luciani*). Frequente in primavera, scarso in autunno, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune di passo in primavera a cominciare dal marzo nella prov. di Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Di scarso passaggio in aprile e maggio al piano, nei distretti

di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Non raro di passo in aprile e maggio, più scarso in settembre-ottobre nella prov. di Firenze (*Turchetti, Fontebuoni, Giglioli*). Comune al piano in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Comune in aprile in Val di Chiana, ripassa in settembre: l'ho trovato anche in giugno nelle colmate, probabilmente proveniente dalla vicina Maremma, ove nidifica (*Griffoli*). Avuta nell'ottobre 1882, nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Di passo regolare in primavera nel Senese (*Dei*); estivo in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Raro di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune (*Paulucci*).

Campania: Frequente: passa nella prima metà di marzo ed in quella di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comune in primavera e nell'autunno, a cominciare dai primi di settembre (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante di passo in aprile e maggio, scarso in novembre, nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune di passo in marzo-aprile in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica, giunge in marzo e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante di passo in aprile, scarso in settembre nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvina*). Frequente al piano nell'autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo in autunno o primavera (*Bonomi*).

272. *Egretta alba* (Linn. ex Gesn.)

SGARZA.

Herodias alba, Salvad.

Airoun, Leiroun bianch (*Basso-Piem.*) — Och mǎrgón (*Mantov.*) — Airon bianco (*Feltre*) — Goître blanc (*Nizza*) —

Garza (*Lucca*) — Gran Airone d'Italia (*Sesto fiorentino*) — Searza bianca (*Valdich.*) — Airone maggiore (*Senese*) — Sgarzettone bianco (*Marche*) — Ariòne janca (*Nap.*) — Cicogna janca, Russeddu ianco (*Calabr.*) — Aroi jancu (*Mess.*) — Ariuni biancu (*Terran. Sicil.*) — Cicogna 'imperiali (*Castell.*) — Menga bianca, Garza bianca (*Sard.*).

Il Temminck (*Man. d'Orn.* IV, p. 375) per erronee indicazioni avute, disse di aver ricevuto dalla Sicilia due esemplari dell' *Egretta intermedia* (Wagl.), chiamata da lui *Ardea egrettoïdes*; fu lo Schlegel che corresse quell'errore (*Faun. Jap. Aves*, p. 115).

Piemonte: Il 10 maggio 1881 ne ebbi una uccisa lungo il Tanaro, nella prov. di Cuneo (*Abre*). Di comparsa accidentale nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Di casuale comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Rara in quella di Mantova (*Paglia*). Veduta una sola volta, il 7 maggio 1882, nelle risaie della Menocchia verso Carbonara in prov. di Pavia (*Pavesi*). Di rarissima comparsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di passo accidentale nella prov. di Vicenza (*Ferrari*). Capita casualmente nel tardo autunno, nell'inverno e nella primavera nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaïto*). Rara nel Friuli (*Del Torre*); ne vidi un solo (*Val-lon*). A proposito di questa specie il conte Ninni mi scrive che è assai comune nell'estuario Veneto, frequentando specialmente le « valli » d'acqua salmastra; in valle Dogado nell'inverno 1887-88, ve n'erano circa 200 stazionarie; una uccisa l'11 febbraio 1888 ed inviatami dal Ninni aveva nello stomaco 200 a 250 grammi di *Mugil saliens*. Onde, soggiunge l'amico mio, da un calcolo da me fatto risulta che ci vogliono non meno di 200 chilogrammi al giorno per saziare tali ingordi e poco graditi ospiti, i quali in sei mesi di soggiorno nella valle sottraggono al proprietario circa 30,000 chilogrammi di pesce (*Giglioli*). Pare essere poco frequente nella prov. di Padova, ove sarebbe molto localizzata (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Di rarissima comparsa in primavera nel Niz-
zardo (*Gal*). Di accidentale comparsa in primavera nel di-
stretto di Spezia, Genova (*Carazzi*).

Toscana : Rara a Massaciuccoli, Lucca, ne uccisi tre
giovani nell'agosto 1882 (*Gragnani*). Di scarso passaggio al
piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Rara assai nel
pian di Sesto (*Fontebuoni*); ne ebbi una da Sesto, Firenze, il
5 novembre 1878; una venne presa presso S. Romano il 29 no-
vembre 1888 (*Giglioli*). Accidentale d'inverno in Val di
Chiana (*Griffoli*). Accidentale nel Senese, ove l'ebbi in mag-
gio (*Dei*); rara ed invernale in Maremma (*Ademollo, Cambi*;
nel 1880, d'inverno, varie comparvero sul padule di Searlino
(*Ademollo*). Rara di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*).

Marche : Rara (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania : Di scarso passaggio nella prima quindicina
di marzo e nella seconda d'ottobre, nella prov. di Napoli
(*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Scarsa, si vede in autunno e primavera (*De Romita*).

Calabrie : Non rara di passo tra aprile e giugno nella
prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Scarsa in quella di Reggio
(*Moschella*).

Sicilia : Rara, di passo in aprile e novembre nella prov.
di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Di scarso passaggio in aprile:
più rara in settembre nel distretto di Terranova, Caltanis-
setta (*Carvana*). Frequente al Finale e fiumara di Castel-
buono nel distretto delle Madonie, Palermo, in autunno
(*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo in primavera ed autunno; qualcuna
rimane a svernare (*Bonomi*).

273. *Egretta Garzetta* (Linn.) ex Gesn.

SGARZETTA.

Herodias garzetta, Salvad.

Sgarzetta (*Vicenza, Rovigo*) — *Airón bianco* (*Bell.*) —
Garzetta bianca (*Padova*) — *Goître blanc* (*Nizza*) — *Perdi-*

giorni gianco (*Arenzano*) — Perticòla gianca (*Spezia*) — Ariotto (*Fucecchio*) — Scarza bianca (*Casentino*) — Cicognella ianca, Cicognella janca (*Calabr.*) — Ariuncellu, Grassottu biancu (*Terran. Sicil.*) — Russieddu jancu (*Modica*) — Garxixedda bianca (*Sard.*).

Piemonte: Accidentale nella prov. di Cuneo; il 13 giugno 1879 fu ucciso un maschio in perfetta livrea lungo il fiume Stura (*Abre*). Raramente, e soltanto durante il passo primaverile, capita in prov. di Alessandria; una venne uccisa presso Voltaggio nella primavera 1877 (*Camusso*).

Lombardia: Due individui furono presi nella prov. di Pavia in primavera del 1873 (*Pavesi*). Di casuale comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Piuttosto rara; presa alla Rafaina in prov. di Mantova, ove non nidifica (*Paglia*). Di rara comparsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarso passaggio al piano in aprile e settembre nel Bellunese (*Soravia*). Non tanto rara nel Friuli (*Vallon*): alle basse in primavera (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarsa nella prov. di Parma; osservata il 12 maggio (*Del Prato*).

Liguria: Di scarso passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarsa nel distretto di Savona; ne ebbi in aprile, maggio e giugno (*Piccone*). Comune di passo in maggio e giugno in quello di Arenzano (*Luciani*). Di passo regolare, più frequente in primavera, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Di passo regolare in aprile nella prov. di Lucca (*Martorelli*); è comune allora nel distretto di Massarosa; nel 1887 tre coppie rimasero nel padule di Massaciucoli sino alla metà di luglio, e forse vi nidificarono (*Graguani*). Di passaggio in primavera, al piano, nel distretto di Fauglia. Pisa (*Ott*). Non comune in maggio in quello di Fucecchio. Firenze (*Turchetti*). Rara in aprile nel Casentino, Arezzo

(*Beni, Paner*). Qualche anno comune, ma non sempre, in aprile e maggio in Val di Chiana; mai in autunno (*Griffoli*). Estiva e nidificante nel padule di Castiglion della Pescaia, Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Specie estiva non rara in Toscana; ne ebbi però due individui da Pisa nel dicembre 1881 (*Roster*).

Marche: Scarsa (*Paolucci*).

Campania: Frequente, di passo, nella prima quindicina di aprile, nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in piccoli branchi alla fine d'aprile all'isola di Capri (*Cerini*).

Puglie: Si vede, anche in grossi branchi, nella primavera e nell'autunno a cominciare dall'agosto (*De Romita*).

Calabrie: Comune di passo in aprile e maggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Non frequente di passo in maggio in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Passa soltanto in aprile in branchetti in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Rara di passo in primavera ed in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo; una fu preso a Petralia nel 1857 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo in primavera ed autunno e anco invernale (*Bonomi*).

274. *Bubulcus lucidus* (Rafn.)

SGARZA GUARDA-BUOI.

Sprucavoi (*Terran. Sicil.*).

Liguria: Di accidentale comparsa invernale nel Nizzardo (*Gal*).

Puglie: Accidentale; ne ebbi una sola nell'aprile 1884 (*De Romita*).

Sicilia: Scarsa di passo in aprile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

275. Bubulcus coromandus (Bodd.)

GUARDA-BUOI INDIANO.

Mantengo quanto ho già scritto a proposito di questa specie (*Arif. Ital.* p. 281): il Salvadori non l'ammette tra le specie avventizie in Italia e afferma che non è mai stata presa in Europa. Posso ora aggiungere che il signor Howard Saunders, mio amico e dotto Ornitologo inglese, mi ha scritto, a proposito dell'esemplare che sarebbe stato ucciso in Piemonte, che egli ne aveva veduti varî uccisi a Lenkoran sulle sponde del Caspio (Vedi anche « *Ibis*, » 1886, p. 517). Pare inoltre che il *B. coromandus* giunga anche nell'Africa orientale, giacchè in una Collezione di uccelli fatta recentemente nello Scioa dal mio amico dott. L. Traversi, vi sono due Aironi Guarda-buoi che ho dovuto riferire a questa specie e non al *B. lucidus*.

276. Ardeola ralloïdes (Scop.)

SGARZA CIUFFETTO.

Airoun giaun peit (*Basso-Piem.*) — Sgolgin (*Mil.*) — Sgarzetta d'la coa (*Mantov.*) — Sgarzetta (*Rovigo*) — Sgarzètt (*Friuli*) — Guà dal zúfo (*Padova*) — Goître (*Nizza*) — Perdigiorni gianco (*Arenzano*) — Perticòlin (*Spezia*) — Scarza col ciuffo (*Sesto fiorentino*) — Scarzetta (*Casentino*) — Spòlleca-voje (*Nap.*) — Cicognedda ianca, Zinni (*Calabr.*) — Aretta biunna, Sciabocchi (*Mess.*) — Grassottu (*Terran. Sicil.*) — Russieddu giarnu (*Modica*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, e di passaggio soltanto: dalla metà di aprile a quella di maggio e dalla metà di ottobre alla metà di novembre (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*). Di casuale comparsa in prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Rara nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di scarso passaggio in aprile e maggio in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova, ove però si trattiene poco (*Paglia*). Di rara comparsa nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Non tanto rara nel basso Friuli (*Vallon*); di passaggio specialmente in primavera (*Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Accidentale nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Scarsa, di passo soltanto, nella prov. di Parma; avuta il 27 aprile (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Più o meno abbondante secondo gli anni nel distretto di Savona, ove passa in maggio e ai primi di giugno soltanto (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Di passo regolare e abbastanza frequente nel distretto di Spezia, ove qualcuno rimane sino ad ottobre, onde vi è probabilmente nidificante (*Carazzi*).

Toscana : Passa in abbondanza e regolarmente in aprile nella prov. di Lucca (*Martorelli*); forse talvolta nidifica nel distretto di Massarosa, giacchè nel 1887 una coppia rimase nel padule di Massaciuccoli sino al luglio inoltrato (*Tragnani*). Di passaggio al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Non rara di passo in aprile e maggio nel pian di Sesto, Firenze (*Fontebumi*); di scarso passo anche in settembre (*Giglioli*). Rara in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Comune in aprile e maggio in Val di Chiana, mai veduto nell'autunno (*Griffoli*). Ebbi una femmina di questa specie nel distretto di S. Gimignano, Siena, l'11 gennaio 1883 (*Paulucci*). Di passo in marzo, aprile, maggio e anche d'autunno nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Adenotlo*). Scarsa in Toscana, ove si vede più facilmente in aprile e maggio (*Roster*).

Marche : Scarsa (*Paulucci*).

Campania : Di scarso passaggio nella seconda quindicina di marzo nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticel-*

li. Passa in piccoli branchi alla fine di aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Frequente: si vede a grossi branchi dal marzo alla prima metà del maggio e nel settembre (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante di passo in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Di passo in aprile-maggio in quella di Reggio: fu assai abbondante nella primavera del 1886 (*Moschella*).

Sicilia: Comune di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa nel distretto di Modica, Siracusa: giunge in aprile e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Di passo abbondante e regolare in aprile in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente di passo al litorale in maggio nel distretto delle Madonie, Palermo: giunse abbondante nel 1843 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo irregolare in primavera ed in autunno (*Bonomi*).

277. *Ardetta minuta* (Linn.)

NONNOTTO.

Ardea peita, Sgolgia peita, Sgolgin, Perdigiorni piccin (*Basso-Piem.*) — Tarabus (*Belluno*) — Tarabusét (*Feltre*) — Sgarzétz pizzul (*Friuli*) — Goîtroun (*Nizza*) — Perticòlin (*Spezia*) — Tarabusino (*Pisa*) — Trabucchella (*Lucca*) — Cinciguatto (*Fucecchio*) — Scarzetta (*Casentino*) — Rossellino (*Nap.*) — Cicognedda (*Calabr.*) — Sciaboccheddu, Sciabocchi (*Mess.*) — Trummitedda (*Lentini*) — Russieddu picciulu, Inganna-cacciaturi (*Modica*).

Piemonte: Scarso in pianura nella prov. di Cuneo, ove si vede soltanto di passaggio, dalla metà di aprile alla metà di maggio, e dalla metà di ottobre alla metà di novembre (*Abbr.*). Frequente in quella di Torino (*Gasca, Pezzi*); frequente nella buona stagione e nidificante (*Martorelli*). Comune nella

prov. di Alessandria, specialmente in primavera; alcuni vi nidificano e ripartono ai primi freddi (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune, ma vi nidifica ogni anno (*Bazetta*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Raro nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Estivo ed assai comune nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova, ove nidifica tra le canne (*Paglia*). Generalmente assai comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarso passaggio in aprile nel distretto di Feltrino, Belluno, ove pare abbia pure nidificato nel padule di Celarda (*Delaito*). Piuttosto frequente nel basso Friuli (*Valton*); comunissimo nel maggio, di passaggio soltanto (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Estivo e frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di regolare passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove passa dalla metà di aprile a quella di maggio: una sola volta lo vidi in autunno, il 7 ottobre (*Piccone*). Nel distretto di Arenzano è comune di passo in maggio e giugno (*Luciani*). Frequente di doppio passo e fors' anche estivo nel distretto di Spezia; vi è più scarso nell'autunno (*Carazzi*).

Toscana: Estivo e comune nella prov. di Lucca, ove giunge in aprile (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Di passo al piano in aprile e maggio nei distretti di Fauglia e Lari (*Ott, Papasogli*: ne ebbi uno in collina nel marzo 1875 (*Ott*). Estivo, frequente e nidificante nella prov. di Firenze, giunge in aprile-maggio, parte in agosto-settembre (*Turchetti, Fontebuoni, Giglioli*). Non comune in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Abbondante nelle macchie di salei lungo i paduli da aprile ad agosto in Val di Chiana (*Griffoli*). Estivo nelle prov. di Siena e di Grosseto, comune in Maremma (*Dei*). Comunissimo ed estivo in Toscana, credo che viaggi sempre a coppie (*Roster*).

Marche : Frequente (*Paolucci*).

Campania : Di scarso passaggio in marzo, aprile e maggio nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Vedonsi individui isolati di passo alla fine di aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Estivo e comune (*De Romita*).

Calabrie : Comune di passo, specialmente in aprile; vedesi anco in settembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così nella prov. di Reggio, anche nel maggio (*Moschella*).

Sicilia : Comune di passo in marzo, aprile, maggio, e anche nidificante nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente nel distretto di Modica, Siracusa; giunge in aprile e parte in agosto (*Dellafonte, Garofalo*). Di solo passo in aprile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente al litorale in aprile-maggio, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo in primavera ed autunno; non tanto frequente (*Bonomi*).

278. *Botaurus stellaris* (Linn.) (ex Bell.)

TARABUSO.

Leiroun (*Basso-Piem.*) — Câ de sère, Scacc (*Berg.*) — Tanabûs (*Mil.*) — Tirabus (*Mantov.*) — Strâbuso, Osélo cavâlâro (*Padova*) — Peçhecrots (*Friuli*) — Goître (*Nizza*) — Perdigiorni, Grixelan (*Arenzano*) — Capon de padù (*Spezia*) — Trabucco (*Lucca*) — Scarza cappona (*Fucecchio*) — Capòne servàggio, Capone servatéco (*Nap.*) — Liebbure d'acqua (*Calabr.*) — Bittordu, Bittornai (*Mess.*) — Paturu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove si mostra di doppio passo dalla metà di aprile alla metà di maggio, e dalla metà di ottobre alla metà di novembre (*Abre*). Frequente in quella di Torino (*Gasca*); in primavera

ed autunno (*Martorelli*). Di casuale comparsa in prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Scarso al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Invernale e di passo in autunno e primavera nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comunissimo di primavera e d'autunno nella prov. di Mantova, scarso d'inverno (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di casuale comparsa nel Cadore, Belluno, ove due individui vennero uccisi al passo della Mauria nell'ottobre 1883 (*Tissi*). Frequente al piano nel distretto di Feltre, ove fa passaggio in marzo ed aprile, assai più di rado nell'autunno e non nidifica (*Delaito*). Comune e nidificante nel Friuli (*Vallou*); frequente alle basse; ne ebbi uno il 21 gennaio 1886 (*Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arigoni*). Scarso, ma sedentario in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Accidentale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Di passaggio in marzo e novembre nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarso nel distretto di Savona, ove l'ho veduto al principio di marzo e alla fine di settembre (*Piccone*). Comune di passo in aprile e maggio in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente di passo in primavera, scarso nell'autunno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune da primavera ad autunno nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); sedentario nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Di scarso passaggio al piano in marzo ed aprile nei distretti di Fanglia e Lari, Pisa (*Ott*, *Papasogli*). Frequente in marzo, aprile, ottobre e novembre nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*, *Turchetti*); scarso nel pian di Sesto (*Fontebuoni*); avuto anche in dicembre nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Non comune in marzo nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*). Comune e sedentario, ma specialmente invernale in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale e non comune nel Senese

(*Dei* : sedentario in Maremma, ove però è più abbondante in primavera ed autunno (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune (*Paolucci*).

Campania : Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Comune, invernale e di doppio passo (*De Ronita*).

Calabrie : Passa in aprile e novembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Non raro specialmente in ottobre in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Comune in marzo-aprile e ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Frequente da novembre a marzo nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonti*, *Garofalo*). Non abbondante: giunge in ottobre e parte in marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Curvana*). Raro al litorale in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna : Giunge in primavera, nidifica e parte; è comune (*Bonomi*).

279. *Nycticorax griseus* (Linn. ex Briss.)

CORVO DI NOTTE.

Quak, Ajroûn (*Milano*) — Guà, Airòn foresto (*Padova*) — Tarabuso zhenerin, Tarabùso dalle ongie col péten (*Feltre*) — Goître (*Nizza*) — Perdigiorni (*Arenzano*) — Airòn (*Spezia*) — Scarzotto (*Casentino*) — Sgarzetta (*Marche*) — Guai, Orale (*Calabr.*) — Russieddu cinnirusu cu la pinna-cera (*Modica*) — Grassòttu imperiali (*Terran. Sicil.*).

Piemonte : Di doppio passo: dalla metà di aprile alla metà di maggio e dalla metà di ottobre a quella di novembre, ma scarso, al piano, in prov. di Cuneo (*Abre*). Uno venne ucciso a Staffarda, Torino, il 25 aprile 1886 (*Bainotti*); da me preso in maggio tra il Po e la Stura (*Martorelli*). Raro nella prov. di Alessandria, ove però ha nidificato (*Camusso*).

Lombardia : Di casuale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Poco frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Di passo non abbondante, ma regolare nella prov. di Cremona, ove si vede dal marzo al giugno e dalla seconda metà di luglio al settembre (*Ferragni*). Non molto comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*); piuttosto scarso (*Borromeo*).

Veneto : Scarso al piano di solo passo in aprile nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Comune e nidificante nel Friuli; ho veduto i giovani nei primi giorni di luglio (*Valton*); vien ucciso di frequente in maggio (*Del Torre*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Rarissimo nel distretto di Vergato, Bologna, ove uno venne preso nell'inverno 1886 (*Lorenzini*). Di passo in aprile nella prov. di Parma; sono rari i giovani (*Del Prato*).

Liguria : Di passo primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove passa soltanto da metà marzo a metà maggio (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente di passo in primavera nel distretto di Spezia, ove non l'ho veduto in autunno (*Carazzi*).

Toscana : Comune da primavera ad autunno; giunge in aprile nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Di passaggio al piano nel distretto di Fauglia, Pisa; due si trattennero lungo il torrente Isola dalla metà di aprile alla metà di maggio 1885 (*Ott*). Comune di passo in aprile-maggio nel pian di Sesto (*Fontebuoni*); ne ebbi uno adulto ucciso il 10 febbraio 1887, vicino a Firenze (*Giglioli*). Comune al piano in aprile nel Casentino, Arezzo, (*Beni, Pauer*). Piuttosto comune, specialmente i giovani, in aprile in Val di Chiana, raro in ottobre (*Griffoli*). Comune di passo in maggio nelle prov. di Siena e di Grosseto; in Maremma è anche estivo e nidificante (*Dei, Ademollo*). Comune in Toscana: nel maggio passa a branchi, nell'ottobre e novembre credo sempre alla spicciolata; è stato ucciso da noi varie volte nell'inverno (*Roster*).

Marche : Frequente (*Paolucci*).

Campania: Frequente, passa in marzo, aprile e maggio nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in piccoli branchi nell'aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Comune in primavera e nell'autunno (*De Romita*).

Calabrie: Non molto comune, di doppio passaggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Abbondante in aprile-maggio e nell'autunno in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso nel distretto di Modica, Siracusa; giunge in aprile e parte in settembre (*Dellafonte, Garofalo*). Di passo soltanto in aprile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente di doppio passo al litorale, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo irregolare in primavera ed in autunno (*Bonomi*).

CICONIIDÆ

(*Cicogne*).

280. *Ciconia alba*, Schæff. ex Willugh.

CICOGNA.

Sigogna. Sigoeugna, Cicogna (*Basso-Piem.*) — Zhicogna (*Bell.*) — Cicogne (*Friuli*) — Sigheugna (*Arenzano*) — Sigugna (*Spezia*) — Aciddazzu biancu (*Castell. Madonie*) — Grua, Grui (*Sard.*).

A proposito del nome di questa specie, rammenterò che lo Stejneger ha reso noto (*Proc. U. S. Nat. Mus.* V. p. 34) come lo Schæffer (*Mus. Orn.* p. 52) lo usasse ben quattro anni prima del Bechstein, cioè nel 1789.

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove si vede soltanto di passaggio nel marzo e dalla metà di agosto a quella di settembre (*Abre*). Accidentale affatto nella

prov. di Alessandria; una venne uccisa presso Boscomarengo nella primavera 1880, un'altra a Gazzo, Novi, il 24 aprile 1882 (*Camusso*). Quasi ogni anno in maggio se ne vedono alcune nell'Ossola (*Bazetta*).

Lombardia : Di passaggio casuale in Valtellina; presa a Colico (*Galli*). Rara nella prov. di Milano (*Brambilla*) ; il 4 agosto 1887 venne ucciso un individuo giovane di questa specie a Settimo milanese (*E. Bonomi*). Accidentale in marzo ed aprile in quella di Cremona (*Ferragni*). Di rara comparsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*); nel maggio 1885 varie vennero prese nei pressi di Milano (*Borromeo*).

Veneto : Di scarso passaggio al piano nel Bellunese in aprile ed ottobre (*Soravia*). Rara nel Friuli; ne ebbi due il 21 aprile 1880 (*Vallon*); molti anni fa si vedeva spesso lungo il Iudrio nel distretto di Cividale, ove ora non capita più (*Del Torre*). Di passo quasi regolare nella prov. di Padova, ove questa specie sembra prediligere come sosta la località detta Baone nei Colli Euganei, ove un individuo venne preso, circostanza notevole, il 1^o dicembre 1885 (*Arrigoni*). Rarissima nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Rare volte si vede nella seconda metà di agosto nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Nel circondario di Savona passa usualmente alta, senza fermarsi; il 3 maggio 1883, ebbi però un maschio ucciso nel letto del Sansobbia presso Albissola; aveva lo stomaco pieno di Coleotteri neri, forse di due specie che non seppi determinare. Nella primavera del 1874 venne raccolta sulla spiaggia del mare una Cicogna morta, colla testa a metà divorata dai Talitri (*Piccone*). Rara nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarsissima in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Rara assai nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Il 13 aprile 1887 vari individui si videro nel Tombolo Livornese: uno venne ucciso (*Papasogli*). Scarsa nel pian di Sesto (*Fontebuoni*); quasi ogni anno si vede nella prov. di Firenze in maggio e giugno e anche più tardi (*Giglioli*). Accidentale nel Casentino, Arezzo: una venne uccisa a Poppi

alla fine di maggio 1887 (*Beni*). Piuttosto rara e soltanto di passo in giugno in Val di Chiana (*Griffoli*). Accidentale; avuta in maggio nel Senese (*Dei*). Non comune in Toscana alle epoche del passo (*Roster*).

Marche : Scarsa (*Paolucci*).

Campania : Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Scarsa, le poche catture note avvennero nell'aprile (*De Romita*).

Calabrie : Molto rara in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Scarsa in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Rarissima nella prov. di Messina (*Ruggeri*); di passo quasi regolare in aprile ed ottobre (*Pistone*). Scarsa, di passo irregolare in ottobre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Di accidentale comparsa; so di due sole catture nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Accidentale nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Rara, di passo irregolare; nel 1883 ne ebbi una presa a Condongianus, Sassari (*Bonomi*).

281. *Ciconia nigra* (Linn.) ex Bell.

CICOGNA NERA.

Sigogna negra (*Nizza*). — Cicògna nègra (*Nap.*) — Cicogna nira (*Mess.*).

A proposito della Cicogna nera uccisa a Desenzano ai primi dell'ottobre 1884 (*Avif. Ital.* p. 288). debbo dire che si conserva nel Museo locale e non già in quello di Varallo come scrissi.

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo, facendosi vedere soltanto di passaggio: in marzo e dalla metà di agosto alla metà di settembre (*Abre*).

Lombardia : Di passaggio casuale in Valtellina, presa a Colico (*Galli*). Rara nella prov. di Milano (*Brambilla*). Acci-

dentale in quella di Cremona; osservata in agosto e settembre 1882 e 1883; ne ebbi una il 14 agosto ed un'altra il 1° settembre 1882 entrambe uccise sul Po (*Ferragui*). Rara, presa a Castellaro nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente rarissima nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nella prov. di Padova è assai più rara della specie precedente; ne ebbi una giovane a Monselice il 20 settembre 1884 (*Arrigoni*).

Emilia: Di passaggio in aprile ed agosto nella prov. di Parma, ove è rara (*Del Prato*).

Liguria: Rara, di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Lucca (*Graguani*). Rara nella prov. di Firenze: ne furono vedute quattro nel distretto di Fucecchio nel 1880 (*Lenzi*); scarsa in pian di Sesto (*Fontebuoni*): è stata presa nell'aprile 1863 alle porte di Firenze, *Arif. Ital.* p. 287 (*Giglioli*). Accidentale nel Casentino, una presa a Poppi è nella mia raccolta (*Beni*); ebbi in dono per la Collezione italiana dal cav. A. Brizzolari un magnifico maschio adulto di questa specie ucciso ad un laghetto artificiale vicino ad Arezzo il 7 marzo 1887 (*Giglioli*). Accidentale, so di una sola cattura in Val di Chiana (*Griffoli*). Rarissima nel Senese (*Dei*).

Marche: Rara (*Paolucci*).

Campania: Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Scarsa, pochi individui furono presi nelle Saline di Barletta in primavera (*De Romita*).

Calabrie: Accidentale nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Rarissima, di comparsa irregolare in aprile ed ottobre, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa, di passo irregolare in aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Rara nel distretto delle Madonie, Palermo; un branco si vide nel 1853 sul fiume Monalo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo irregolare; ne ebbi nell'autunno (*Bonomi*).

PLATALEIDÆ

(*Spatole*).

282. Platalea Leucorodia, Linn. (ex Aldrov.)

SPATOLA.

Spatula (*Arenzano*) — Cüciaio (*Spezia*) — Spàtola (*Nap.*)
— Spatula (*Calabr.*) — Palilda (*Lentini*) — Pizzu a cucchia-
reddu (*Modica*) — Gragallu (*Sard.*).

Piemonte : Accidentale : nel 1865 venne ucciso un giovane lungo il fiume Pesio in prov. di Cuneo (*Abre*).

Lombardia : Il 2 novembre 1887 venne ucciso un giovane individuo di questa specie presso Busto Arsizio, Milano (*E. Bonomi*). Di casuale comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Generalmente di comparsa accidentale nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Di passaggio accidentale nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Accidentale affatto nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Rara assai nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova, ove capita coi forti scirocchi all'epoca dei passi (*Luciani*). Accidentale nel distretto di Spezia, ove però i cacciatori la conoscono (*Carazzi*).

Toscana : Rara nella prov. di Lucca; ne ebbi una nell'aprile 1882 da un branco di quattro che si fermò nel padule di Massaciuccoli (*Gragnani*). Una venne uccisa nel distretto di Fucecchio, Firenze, nel 1881 (*Lenzi*). Giunge raramente in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Ne ebbi due dalla prov. di Grosseto: una in maggio 1854 da Castiglione, l'altro in aprile 1856 da Orbetello (*Dei*). Scarsa, ma di passo forse regolare in Toscana; nel 1885 varie furono

uccise nel padule di Fucecchio, e nel 1886 o 1887 una nei pressi di Firenze (*Roster*).

Campania : Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli; vedonsi i giovani nell'inverno (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Di passo regolare, ma non abbondante in primavera; ne ho avuto il 30 maggio: più scarsa, ma non rara, in settembre ed ottobre (*De Romita*).

Calabrie : Alquanto rara, di passo, in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Assai rara in aprile in quella di Reggio (*Moretti, Moschella*).

Sicilia : Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggeri*): di passo in aprile ed ottobre (*Pistone*). Scarsa nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Di casuale comparsa nel marzo in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Scarsa, ma ogni anno qualche individuo viene ucciso all'epoca del passo autunnale nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvano*).

Sardegna : Di passo irregolare, ma è certo che giunge alla fine dell'autunno e parte in primavera: ne ebbi adulti e giovani in dicembre come in aprile (*Bonomi*).

IBIDÆ

(*Ibi*).

283. Plegadis Falcinellus (Linn.) ex Gesn.

MIGNATTIAIO.

Arcáza verde, Arcása americana, Ibi (*Padova*) — Ibis (*Spezia*) — Curvèlla (*Nap.*) — Corviellu (*Calabr.*) — Cicogna (*Bari*) — Gaddaranu, Vaddaranu (*Lentini*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo (*Abbr.*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*). Di casuale comparsa nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Accidentale nel maggio nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Raro in quella di Mantova (*Paglia*). Non tanto raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Di passaggio scarso ed irregolare nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo, ove mi consta che venne preso una sola volta (*Dal Fiume*).

Emilia : Di scarso passaggio nella prov. di Parma: veduto il 23 aprile ed il 5 ottobre (*Del Prato*).

Liguria : Raro in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Accidentale nel distretto di Savona, ne ebbi un solo nel maggio 1872 (*Piccone*). Raro in primavera in quello di Arenzano (*Luciani*). Passa in primavera nel distretto di Spezia, ma scarsamente (*Carazzi*).

Toscana : Passa regolarmente in aprile nel distretto di Massarosa (*Tragnani*): ne vidi otto presi insieme a Massaciuccoli (*Martorelli*). Scarso, ma ogni anno si vede in aprile-maggio e settembre nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); è molto più raro nell'autunno, ne ebbi uno giovane ucciso a Campi-Bisenzio, Firenze, il 1° ottobre 1881 (*Giglioli*). Nel Casentino, Arezzo, ne ebbi un solo, preso il 5 ottobre 1888 a Bibbiena (*Beni*). Piuttosto abbondante nel passo primaverile in Val di Chiana, raro assai nell'autunno (*Griffoli*). Di questa specie al lago di Montepulciano, tengo a far notare la seguente singolare abitudine che mi venne comunicata da un mio amico, vecchio cacciatore e degno di tutta fede; ed è che i Mignattaj dormono l'uno sopra l'altro come in tanti strati, i quali strati man mano che si innalzano, vanno diventando meno estesi, e così quel mucchio prende la forma di una piramide. Ciò fu osservato in un aggallo del Lago, già di sopra rammentato, ove una sera fu visto andare uno straordinario branco di questa specie, tanto che, la mattina appresso, molto prima dello spuntare del giorno, con la certezza di fare un bel tiro, il mio amico montato in barca, col massimo silenzio si portò al punto indicato. Colà giunto a breve distanza, vide due grosse piramidi alte più di un uomo: tutt'altro pensando che quelli potessero essere gli uccelli ricercati, ignorando questa loro bizzarra abitudine, si

sforzava a guardare per terra onde vederne, quando tutto ad un tratto questi due monti, li chiamerò così, di uccelli, con sua enorme sorpresa, si innalzarono prendendo rapidamente il volo. Ne furono uccisi abbastanza dalla scarica che loro fu indirizzata, ma non quanti ne sarebbero potuti restare, se, conoscendo il loro modo di dormire, tal scarica loro avesse potuto farsi a fermo e mentre stavano fitti in quella maniera (*Pauer*). Di passo regolare in aprile e maggio nelle prov. di Siena e Grosseto, si trattiene circa un mese (*Dei, Ademollo*). Comune in Toscana durante il passo primaverile, io non ne vidi mai in quello autunnale (*Roster*).

Marche: Scarso (*Paolucci*).

Campania: Di rara comparsa in aprile e maggio nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Giunge a branchi nell'autunno: ne ho avuto dei giovani nella seconda metà di agosto; si vede pure in marzo ed aprile, ma forse con minore frequenza (*De Romita*).

Calabrie: Di passaggio abbondante da marzo a giugno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Raro in aprile-maggio in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune di passo in aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini. Siracusa (*Bonfiglio*). Passa a grossi stormi nella prima quindicina di aprile, ma non si rivede nell'autunno in quello di Terranova. Caltanissetta (*Carrara*). Accidentale nel distretto delle Madonie. Palermo; uno venne ucciso a Castelbuono nell'aprile 1847 (*Paulucci, Moriçi*).

Sardegna: Di passo irregolare in primavera ed in autunno; qualcuno rimane a svernare (*Bonomi*).

ODONTOGLOSSÆ.

PHÆNICOPTERIDÆ

(*Fiammanti*).

284. *Phænicopterus roseus*, Pall.

FIAMMANTE.

Fiammingo (*Calabr.*) — Urgananti (*Lentini*) — Finicot-
turu (*Terran. Sicil.*),

Lombardia: Di rara comparsa (*Turati*).

Liguria: Di accidentale comparsa nel Nizzardo, ove capita in primavera; da 8 anni circa non se ne sono più presi (*Gal.*). Di casuale e rarissima comparsa nel distretto di Savona: i marchesi Gavotti ne presero uno nel luglio 1868, in Albissola: erano due e stavano in mare tra il torrente Sansobbia e la stazione ferroviaria (*Piccone*). Accidentale nel distretto di Spezia; ne ebbe uno preso alle Bocche di Magra nel marzo 1857, il prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Lucca; ne ebbi uno giovane a Massaciuccoli nell'agosto 1880 (*Gragnani*). Nella prima quindicina di settembre 1888 furono uccisi due Fiammanti nella prov. di Grosseto, uno ad Orbetello, l'altro a Castiglione della Pescaia (*Giglioli*). Di comparsa accidentale nella Maremma, dopo violenti burrasche da mezzogiorno (*Ademollo*). Accidentale sull'isola di Giglio; ne vidi due volte dopo burrasche (*Bianchi*).

Campania: Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli: uno venne preso in ottobre nel lago di Patria (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale, ma non molto raro alle saline di Barletta; ho notizia di quattro catture (*De Romita*).

Calabrie: Rarissimo; tre giunsero nell'inverno nel 1855 nel distretto di Maida. Catanzaro, uno venne ucciso (*De Fiore*). Raro nella prov. di Reggio, uno fu preso in mare innanzi a Pellarò nel 1884, ed uno a Bianco-nuovo nel gennaio 1888 (*Moschella*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Tra il 31 dicembre 1887 ed il 2 gennaio 1888, nel distretto di Lentini, Siracusa, comparve un branco di una quarantina di cui tre vennero uccisi; erano molti anni che non se ne vedevano (*Bonfiglio*). Accidentale in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Accidentale nell'autunno nel distretto di Terranova, Caltanissetta, ove so di due catture: una nel 1882, l'altra nel 1885 (*Carvina*). Raro assai in quello delle Madonie, Palermo: è stato ucciso nel fiume Imera (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Abbondante e sedentario; giovani ne vidi in ogni stagione e ne uccisi uno giovanissimo che appena poteva volare a S. Gilla nell'agosto: ritengo che gli adulti lascino l'isola per nidificare e che da noi rimangano i giovani i quali non si riproducono; ho fatto ricerche accurate, ma non rinvenni mai traccia di uova o di nidi, onde escludo affatto che questa specie nidifichi nell'isola (*Bonomi*).

ANSERES.

CYGNIDÆ

(*Cigni*).

285. *Cygnus Olor* (J. F. Gmel.)

CIGNO.

Cignu (*Modica*).

Lombardia: Accidentale nell'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragni*).

Veneto: Rarissimo nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Un maschio giovane venne ucciso a Noli, Genova, il 21 ottobre 1888 (*Borgioli*).

Toscana: Ne vidi due volte d'inverno prima del 1880, sul lago di Massaciuccoli, Lucca (*Gragnani*). Invernale, di accidentale comparsa nella prov. di Grosseto: nel gennaio 1845 ne comparvero 13 sul padule di Castiglione (*Dei*); uno venne ucciso sul lago di Orbetello (*Ademollo*).

Marche: Rarissimo, avuto da Porto Recanati (*Paolucci*).

Sicilia: Accidentale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Di casuale comparsa nell'inverno in seguito a burrasche: ne vidi uno nello stagno di Cagliari (*Bonomi*).

286. *Cygnus musicus*, Bechst.

CIGNO SELVATICO.

Cign, Cigno, Cin (*Basso-Piem.*) — Cing salvadega (*Milano*) — Cigne sauvage (*Nizza*) — Shkittetza (*Albanesi italiani*) — Cignu (*Mess., Terran. Sicil.*).

Piemonte: Accidentale nella prov. di Cuneo; nel 1868 ne furono uccisi due lungo il fiume Stura (*Abre*). Di casuale comparsa nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Rarissimo nella prov. di Milano (*Brambilla*). Il 31 ottobre 1887 venne ucciso dal signor Restelli sul Po presso Mezzana Corti, prov. di Pavia, un individuo adulto di questa specie (*Pavesi*). Raro nei rigidi inverni in quella di Cremona; l'ultimo preso fu un maschio adulto, ucciso sull'Oglio nel febbraio 1880 (*Ferragni*). Capita casualmente d'inverno sul lago di Mantova; se ne videro in Paiolo nel 1859 (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Di casuale comparsa nel Friuli; due vennero presi a Casarsa sul Tagliamento nel 1877 (*Vallon*). Tra il 22 novembre 1888 ed il 21 febbraio 1889, comparvero alcuni branchetti di Cigni di questa specie nella prov. di Venezia, in « Bottenigo. » nella « Paluda di Dragoiesolo » ed in « Val de Bon » (*Ninni*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Un maschio giovane di questa specie venne catturato presso il Po nella prov. di Parma, il 4 marzo 1888 (*Del Prato*).

Liguria: Accidentale d'inverno nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana: Accidentale d'inverno sul lago di Massaciucoli, Lucca (*Gragnani*). Scarso d'inverno nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); raramente si vedono nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*). Di casuale comparsa in Val di Chiana (*Griffoli*). Accidentale nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*); il 6 febbraio 1861 uno venne ucciso sul padule di Scarlino (*Dei*).

Puglie: Accidentale; oltre l'individuo citato dal Costa, ne ebbi uno ucciso nel febbraio 1886 presso Brindisi (*De Romita*).

Calabrie: Rarissimo: due capitarono nel distretto di Maida, Catanzaro, nell'inverno 1885 (*De Fiore*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggieri*). Così nel distretto di Terranova, Caltanissetta; nell'inverno

del 1879 ne furono presi cinque (*Carvana*). Accidentale nel distretto delle Madonie, Palermo; è stato ucciso nei pantani di Cefalù nel 1845 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di comparsa accidentale nell'inverno, dopo burrasche (*Bonomi*).

287. *Cygnus Bewicki*, Yarrell

CIGNO MINORE.

Toscana: Due individui furono uccisi sul lago di Massaciuccoli nel gennaio 1874 (*Gragnani*). Una femmina giovane di questa rara specie venne uccisa nel padule di Fucecchio, Firenze, il 23 marzo 1888 dal signor Luigi Ancuri, il quale ne fece generoso dono alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo Zoologico di Firenze (*Giglioli*).

Puglie: Accidentale; uno venne colto nel Mar piccolo di Taranto nel dicembre 1879 (*De Romita*).

Sicilia: Alcuni Cigni più piccoli giunti accidentalmente nel distretto di Terranova, Caltanissetta, con individui della specie precedente dovevano forse riferirsi a questa (*Carvana*).

ANSERIDÆ

(Oche).

288. *Bernicla leucopsis* (Bechst.)

OCA A FACCIA BIANCA.

Branta leucopsis, Salvad.

Lombardia: Oltre il maschio adulto ucciso a Corana sul Po nella prov. di Pavia il 28 febbraio 1886, ed ora conservato nella raccolta provinciale presso il R. Istituto Tecnico

di Pavia (*Arif. Ital.* p. 542); debbo ora registrare la cattura di un terzo esemplare di questa specie rara ed avventizia in Italia, colto nei pressi di Lugano il 26 novembre 1878; è una femmina adulta e trovasi ora nella Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo di Firenze (*Giglioli*).

Puglie: Accidentale; un individuo fu preso a Foggia (*De Romita*).

L'esemplare ucciso a Foggia lo fu nell'inverno del 1878, e non del 1877 come scrissi per errore nella mia *Arifanna Italica*, p. 296 (*Giglioli*).

289. *Bernicla brenta* (Pall.) ex Jonst.

OCA COLOMBACCIO.

Branta bernicla, Salvad.

Oca negra (*Padova*).

Piemonte: Un individuo di questa specie è stato ucciso nell'inverno del 1888 non lungi da Torino (*Marchisio*).

Lombardia: Di rarissima comparsa (*Turati*).

Veneto: Di passo scarso ed irregolare nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Accidentale in primavera ed autunno nel Nizzardo; l'ultimo individuo avvertito venne preso nel 1880; si conserva nel Museo Civico di Nizza (*Gal*).

290. *Bernicla ruficollis* (Pall.)

OCA COLLO ROSSO.

Branta ruficollis, Salvad.

Lombardia: Di rara comparsa (*Turati*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Firenze, *Arif. Ital.* p. 298 (*Giglioli*).

291. *Anser cinereus*, Meyer

OCA SELVATICA.

Oca salvaréga, Oeh (*Feltre*) — Oçhe salvàdie, Ocie (*Friuli*)
— Oca granda (*Padova*) -- Auca fera (*Nizza*) — Oca (*Lucca*)
— Paparo a castagne (*Campobasso*) — Cisini (*Sard.*).

A proposito dell'asserzione del Savi, il quale avrebbe trovato questa specie nidificante nel padule di Castiglione della Pescaja e ne avrebbe catturato un pulcino nella primavera del 1827, ho ragioni ora per riedermi su quanto scrissi (*Avif. Ital.* p. 299). L'asserzione del Savi può essere vera, giacchè nel settembre 1886 ho potuto esaminare nella magnifica raccolta del mio amico H. Seebohm a Londra le uova dell'*Anser cinereus* prese nel nido da Henke al delta del Volga e da Saunders in Spagna. Questa specie nidifica dunque in contrade ben più meridionali delle specie congeneri ed in latitudini uguali a quella di Castiglione della Pescaja.

Lombardia : Rara nell'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Di passaggio nell'inverno in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarso passaggio nel marzo, raramente in altra epoca nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Quasi ogni anno se ne vedono al ripasso, cioè nel marzo, nel Friuli (*Vallon*, *Del Torre*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rara in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Di scarso passaggio nell'autunno e nell'inverno nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana : Non rara di passo in novembre nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Scarsa in novembre e marzo nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*, *Turchetti*); non tanto rara nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*). Di passo irregolare nell'inverno in Ma-

remma (*Ademollo, C'ambi*). Di passo non abbondante in novembre nella Toscana (*Roster*).

Abruzzi : Frequente di passaggio soltanto in dicembre nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania : Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Invernale dal novembre e non rara nelle saline di Capitanata (*De Romita*).

Sicilia : Scarsa nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Accidentale d'inverno in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Accidentale nel distretto delle Madonie, Palermo; una sola cattura sull'Imera è registrata (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Giunge casualmente nei rigidi inverni, in branchetti colla specie seguente (*Bonomi*).

292. *Anser segetum* (J. F. Gmel.)

OCA GRANAIOLO.

Oucoun (*Alba*) — Oca salvadega, Oca paa, Oca sarvaja, Oca sarvaega (*Basso-Piem.*) — Oca salvaréga, Och (*Feltre*) — Oca faraóna (*Padova*) — Oche, Ocie (*Friuli*) — Auca fera (*Nizza*) — Oca pãa (*Arenzano*) — Oca da gran (*Spezia*) — Oca (*Lucca*) — Paparune (*Calabr.*) — Paparuni (*Mess.*) — Cisini (*Sard.*).

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio dalla metà di novembre a tutto dicembre (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*). Di passaggio casuale nel tardo autunno nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Capita raramente al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Di passo regolare in novembre e dicembre e nel marzo ed aprile, nella prov. di Cremona, ove pochi individui rimangono a svernare (*Perragui*). Non comune in quella di Man-

tova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*); piuttosto scarsa (*Borromeo*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di casuale comparsa nel Cadore, Belluno (*Tissi*); di scarso passaggio nel marzo nel distretto di Feltre (*Delaito*). Più scarsa della specie precedente nel Friuli; ne ebbi nel dicembre 1884 (*Vallon*); vengono uccise in febbraio e marzo nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di scarso passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio regolare nel Nizzardo (*Gal*). Nel distretto di Savona passa in marzo e poi in ottobre, fermandosi solo casualmente (*Piccone*). Rara d'inverno in quello di Arenzano (*Luciani*). Poco frequente nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune, di passo regolare in marzo e novembre nella prov. di Lucca (*Fontebuoni*, *Gragmani*). Di passo in autunno ed inverno nel distretto di Fauglia, Pisa; si fermano al piano, mai in collina (*Ott*). Passa in novembre, marzo ed aprile nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*, *Turchetti*); non se ne vedono più nel distretto di Empoli (*Fucini*); non rara di passo in quello di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Rara nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*). Di doppio passo regolare in grandi branchi in Val di Chiana, ove capita pure durante l'inverno dalla prossima Maremma (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Giunge a grossi branchi ed è invernale in Maremma (*Dei*, *Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Invernale e comunissima in Toscana, parte nel marzo (*Roster*).

Marche: Scarsa di doppio passaggio (*Paolucci*).

Lazio: Passa a grossi branchi e danneggia i seminati nel distretto di Montefiascone, Viterbo: giunge ai primi di dicembre e parte verso la metà di febbraio (*Mimmi*).

Campania: Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Copiosissima: giunge a colonne estese alla fine di novembre e si trattiene sino al marzo (*De Romita*).

Calabria : Invernale e comune nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Rara nella prov. di Messina (*Ruggieri*). Scarsa nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Accidentale d'inverno in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Scarsa nel distretto delle Madonie, Palermo; è stata veduta in Petralia tra i frumenti, e sull'Imera (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo regolare nell'inverno (*Bonomi*).

293. *Anser albifrons* (Scop.)

OCA LOMBARDELLA.

Oca, Oca foresta (*Padova*).

Lombardia : Accidentale nell'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Di rara comparsa in Lombardia (*Tinati, Borromeo*).

Veneto : Di passaggio scarso ed irregolare nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria : Accidentale nell'autunno e nell'inverno nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana : Di casuale comparsa nel Senese e nel Grossetano (*Dei*).

294. *Anser erythropus* (Linn.)

OCA LOMBARDELLA MINORE.

Oca nana, Lombardella minore (*Aut. Ital.*).

Le mie previsioni si sono avverate; ho potuto esaminare con cura il curioso *Anser* a becco piccolissimo del Mu-

seo di Padova (*Avif. Ital.* p. 301), ed è risultato essere una femmina giovane dell'*Anser erythropus* (L.). Inoltre il signor Odoardo Ferragni di Cremona ha avuto la fortuna di avere in carne un bellissimo maschio adulto di questa specie, ucciso dal cav. dott. Luigi Lena sul Po nelle vicinanze di Cremona, in mezzo ad un branco di *A. segetum*, il 3 febbraio 1886. Si credeva allora che quell'esemplare fosse un' *A. albifrons* ed io lo menzionai come tale (*Avif. Ital.* p. 300). Questi due esemplari, i soli di questa specie che a me risultino presi sinora in Italia, fanno ora parte della Collezione centrale degli Animali Vertebrati italiani nel R. Museo zoologico di Firenze. In quanto all'esemplare proveniente dal Museo di Padova, non si ha la data della sua cattura, ma il prof. Giovanni Canestrini, direttore di quel Museo, mi scrive esser egli convinto che sia stato preso nelle valli Padovane. Debbo ancora aggiungere che nell'Appendice al Catalogo dell'I. e R. Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze per l'anno 1797, trovo registrato « 1. *Anas erythropus*, mandata in dono da S. A. R. il dì 27 novembre 1797; da valutarsi L. 8 » — esemplare da anni scomparso da queste Collezioni. Il merito di avere aggiunto questa bella e distinta specie alla nostra Avifauna spetta però al signore O. Ferragni. Io ero incerto se si dovevano considerare distinte l'*A. albifrons* e l'*A. erythropus*, non avendo nel passato avuto l'opportunità di esaminare esemplari di questa specie; ma ora che ho potuto confrontare sette individui della prima con cinque appartenenti alla seconda specie, mi sono convinto che vanno separate.

La differenza più saliente tra questa specie e l'*A. albifrons*, sta proprio nel becco che è in proporzione *notevolmente più piccolo*, e anche nella forma ricorda quello delle *Bernicla*; inoltre è rosso-lacca o rosso-carneo, non giallo con leggiera velatura di carnicino. Il bianco della fronte sembra estendersi più sul vertice, ed il colore generale delle penne della testa e del collo è più cupo. Pare infine che la differenza nella statura tra i due sessi sia più marcata nell'*A. erythropus*.

Aggiungo le misure delle due specie prese su esemplari da me esaminati; *m*, vale « montati, *p*, vale « pelli. »

	Lungh. tot. (apice becco coda)	ALA (piegata)	BECCO (a fronte)	TARSO	Dito medio con unghia
ANSER ALBIFRONS (Scop.).					
<i>a. ♂ ? Pisa (Coll. ital. 1790) m.</i>	0,680	0,420	0,044	0,060	0,069
<i>b. ♀ ? Peschiera (Coll. ital. 2161) m.</i>	0,660	0,410	0,043	0,058	0,070
<i>c. ♀ ? Roma (Coll. ital. 1107) m. ...</i>	0,610	0,405	0,042	0,056	0,066
<i>e. ♂ ? Fusan (Corea) m 1517 p.</i>	0,780	0,420	0,050	0,068	0,069
<i>f. ♀ ? » » » 1517 p.</i>	0,760	0,410	0,045	0,066	0,067
<i>g. ♂ . Shimosa (Giappone) m 2618 p.</i>	0,670	0,440	0,048	0,069	0,078
<i>h. ♀ . Shimosa (Giappone) m 2618 p.</i>	0,667	0,440	0,054	0,073	0,078
ANSER ERYTHROPUS (Linn.).					
<i>a. ♂ . AD Cremona (Coll. ital. 2915) m.</i>	0,650	0,400	0,036	0,062	0,062
<i>b. ♀ . AD Jenissei Lat. 66°,30' (See- bohm) m: 1908 m.</i>	0,585	0,350	0,032	0,053	0,059
<i>c. ♀ ? juv. Padova (Coll. ital. 2587) m.</i>	0,560	0,365	0,032	0,053	0,059
<i>d. ♂ . Shimosa (Giappone) m. 2618 p.</i>	0,570	0,390	0,035	0,058	0,060
<i>e. ♀ . Shimosa (Giappone) m. 2618 p.</i>	0,482	0,350	0,031	0,053	0,060

ANATIDÆ

(Anatre).

295. *Dendrocyena javanica* (Horsf.)

ANATRA ARBOREA.

Mantengo quanto ho già scritto intorno all'unico esemplare di questa specie che sarebbe stato catturato in Italia (*Avif. Ital.* p. 301), esso è una femmina; e confesso che fui sorpreso della sicurezza colla quale il Salvadori (*Ucc. Ital.* p. 256) afferma che sia fuggita di schiavitù. Aggiungo che

quell'esemplare è ora nella Collezione italiana centrale nel R. Museo zoologico di Firenze.

Dal signor Luigi Gasca di Torino ho ricevuto una lunga nota sull'esemplare suddetto, confermando le notizie già da me pubblicate; egli dice inoltre che avendo aperto lo stomaco di quell'uccello lo trovò pieno di semi finissimi, che ritenne fossero di piantaggine (*Plantago major*) e che per notizie avute crede che quell'Anatra sia stata uccisa sul torrente Mallone presso S. Benigno nel Canavese.

296. *Casarca rutila* (Pall.)

CASARCA.

Puglie: Accidentale; due sole catture vennero registrate, una delle quali avvenne nel 1875 (*De Romita*).

297. *Tadorna cornuta* (S. G. Gmel.)

VOLPÒCA.

Anitra maltisa (*Terran. Sicil.*) — Anariera (*Sard.*).

Lombardia: Di comparsa accidentale nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Rara in quella di Mantova (*Paglia*). Rarissima nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Un individuo venne preso a Novi nel Modenese nel settembre 1884, un altro nell'aprile 1885, altri due a Rolo sul finire del novembre 1887 (*Picaglia*). Accidentale affatto nel Parmense; una femmina fu presa il 20 novembre 1887 sul Po, dopo una burrasca di neve (*Del Prato*).

Liguria: Accidentale nel Nizzardo (*Gal.*). Di casuale comparsa d'inverno nel distretto di Spezia; una sola ne ebbe il prof. Magni-Griffi nel dicembre (*Carazzi*).

Toscana: Rara nella prov. di Lucca, ne vidi tre sul lago di Massaciuccoli (*Gragnani*). Nel marzo 1887 ne vidi un

branchetto posato su un laghetto temporaneo vicino ad Arezzo (*Giglioli*). Accidentale in Val di Chiana: ne ebbi tre uccisi presso Foiano il 27 novembre 1886 (*Griffoli*). Avventizia nel Senese; avuta in febbraio e marzo (*Dei*). Invernale ed abbastanza frequente in Toscana negli anni passati; dal 1884 non se ne vedono più (*Roster*).

Marche: Rara nell'inverno (*Paolucci*).

Campania: Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale e frequente alle Saline di Barletta e in Capitanata (*De Romita*).

Calabrie: Invernale, ma rara; una venne uccisa al litorale nell'inverno 1884 (*De Fiore*).

Sicilia: Rarissima nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Di passo regolare ed invernale nel distretto di Terranova, Caltanissetta; giunge in gennaio e febbraio e rimane sino a marzo (*Carvana*).

Sardegna: Di passo in primavera ed in autunno; molte svernano e molte rimangono a nidificare, ciò che ha luogo in insenature del mare coperte di tamarischi, in piccoli ed in grandi stagni presso le dune e più specialmente in quelle dell'Asinara e di Sorso, ove sempre ne uccisi (*Bonomi*).

298. *Anas Boscas*, Linn. (ex Gesn.)

GERMANO.

An-nia salvaja, Anga salvadga, Ania sarvaiga. Collo-verde (*Basso-Piem.*) — Nedròt salvadek (*Berg.*) — Germana (*Mil.*) — Mazzorin, Arena salvadega (*Vicenza*) — Anera grossa, Mazhorin (*Feltre*) — Capoverde (*Spezia, Marche*) — Anitra (*Viterbo*) — Mallardo (*Campobasso*) — Riàle, maschio, Anetra, femmina (*Nap.*) — Capuvirdi, il mas., Gaddina, la femm., Mellardi (*Calabr.*) — Coddu-virdi, mas., Anitra, femm. (*Mess.*) — Middarda, femm. (*Lentini*) — Cuoddu-virdi, mas., Anitra, femm. (*Modica*) — Anatra furmintina, femm. (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo; ove qualche coppia nidifica nel maggio (*Abre*). Così in quella di Torino (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Comune in ambedue le passate nella prov. di Alessandria, ove qualcuno sverna (*Camusso*). Nell'Ossola non è comune; giunge di passo, ma quasi ogni anno alcune coppie vi nidificano (*Bazetta*). Raro di passo invernale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*); così nella Valsesia (*Guarironi*); nel distretto di Crodo la straordinaria comparsa di questa specie in dicembre e gennaio è considerata preavviso di lunga e abbondante nevicata (*Demori*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso in pianura in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio nella prima metà di febbraio e ottobre (*Magretti*). Sedentario, ma specialmente abbondante durante l'inverno e alle epoche del passo, in ottobre e novembre e nel marzo, nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comunissimo in quella di Mantova, giunge in grandi stuoli al cominciare dell'inverno e si trattiene; alcuni partono in primavera, altri rimangono a nidificare (*Paglia*). Generalmente comunissimo in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di comparsa casuale nel Cadore, Belluno (*Tissi*); frequente di passaggio al piano in dicembre-marzo, e anche nidificante nel distretto di Feltre (*Delaito*). Comunissimo di passo e anche sedentario e nidificante nel Friuli (*Vallon*); raramente si vede d'inverno sul Natisone nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comunissimo ed in parte sedentario nella prov. di Padova; il 27 di maggio 1886 fu ucciso nelle valli di Monselice un Germano maschio con abito affatto simile a quello della femmina: mancano, il verde, il castagno e le penne a spira sul sopraccoda. Ho pure esaminato un individuo ibrido tra questa specie e la *D. acuta*; era un maschio preso in provincia (*Arrigoni*). Comune assai e anche sedentario nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale d'inverno nel distretto di Vergato,

Bologna (*Lorenzini*). Di passaggio, ma anche nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Comune in mare ed alla foce dei fiumi nel distretto di Savona, ove giunge dalla metà di ottobre a tutto novembre e anche più tardi; parte o ripassa in febbraio e marzo (*Piccone*). Così in quello di Arenzano; ho potuto constatare in un maschio adulto di questa specie tenuto vivo in schiavitù, l'assunzione di una livrea molto simile a quella della femmina alla fine di luglio ed in agosto (*Luciani*). È specialmente di doppio passo ed invernale nel distretto di Spezia, ma sembra esservi anche sedentario, giacchè alcune coppie vi nidificano (*Carazzi*).

Toscana : Abbondante di passo e da ottobre a marzo, ma anche sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*); durante l'epoca della incubazione il maschio assume un abito molto simile a quello della femmina (*Gragnani*). Comune al piano d'inverno ed alle epoche del passo, scompare in febbraio dal distretto di Fauglia e Lari (*Ott*); scarso in quello di Lavajano (*Papasogli*). Frequente di passo in agosto-settembre e febbraio-marzo, alcuni svernano ed alcuni passano l'estate e nidificano nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*); comune ai due passi nel distretto di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Frequente al piano in gennaio e marzo-aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauci*). Comune d'inverno ed anche sedentario e nidificante in Val di Chiana (*Griffoli*). Di casuale comparsa nell'inverno nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Sedentario in scarso numero in Maremma, abbondante d'inverno nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comunissimo e anche sedentario nella Toscana (*Roster*).

Marche : Comune nell'inverno (*Paolucci*).

Lazio : Invernale e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi : Scarso, di passo in dicembre, nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Abbondantissimo dal principio dell'autunno fino all'aprile (*De Romita*).

Calabrie: Sedentario, ma specialmente invernale e abbondantissimo nella prov. di Catanzaro; passa in marzo e novembre (*De Fiore*). Comune, ma una volta più abbondante nella prov. di Reggio, ove alcune volte ha pure nidificato (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune in marzo-aprile e novembre-dicembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Abbondante durante l'inverno, a cominciare dal dicembre, nel distretto di Lentini, Siracusa; nel 1880 vi giunsero in numero straordinario (*Bonfiglio*). Frequente in quello di Modica, ove giunge in novembre e parte in marzo-aprile (*Dellafonte, Garofalo*). Di passo regolare ed invernale in quello di Terranova, Caltanissetta; giunge in ottobre-novembre e parte in febbraio (*Carvana*). Comune nell'autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Abbondante, sedentario e nidificante, ed invernale e di passo (*Bonomi*).

299. *Chaulelasmus streperus* (Linn. ex Gesn.)

CANAPIGLIA.

Ania, An-nia salvaja, Anga salvaga, Ania sarvaega (*Basso-Piem.*) — Grisetta (*Milano*) — Albaro (*Rovigo*) — Marigiano (*Fucecchio, Valdich.*) — Sarsellune (*Calabr.*) — Irbatora (*Lentini*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, di passaggio nella prima metà del dicembre (*Abre*). Rara, di solo passo invernale nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Rara ed invernale in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova; vive solitaria e vi nidifica, depo-

nendo da 8 a 9 uova (*Paglia*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati*); piuttosto comune (*Borromeo*).

Veneto: Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria: Scarsa d'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Rara nel distretto di Savona: ne ebbi un solo nel dicembre 1886, dopo una nevicata (*Piccone*). Scarsa ed invernale in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Invernale e scarsa nella prov. di Lucca (*Martorelli*); era una volta assai più frequente e l'ho veduta di passo in luglio a Massaciuccoli (*Gragnani*). Invernale e di scarso passaggio al piano nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Scarsa in febbraio-marzo nei distretti di Fucecchio e Sesto, Firenze (*Turchetti, Fontebuoni*). Piuttosto scarsa in novembre-dicembre ed in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale e comune in Maremma (*Dei*). Comune assai nell'inverno in Toscana; trovai le femmine nella proporzione di circa il 5 % (*Roster*).

Marche: Scarsa d'inverno (*Paolucci*).

Puglie: Invernale, giunge in novembre; qualche anno è anco abbondante, così fu nel 1888 (*De Romita*).

Calabrie: Non comune nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune in ottobre e novembre nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Accidentale in quello delle Madonie, Palermo; avuta nell'autunno 1846 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Abbastanza comune, invernale e di passo (*Bonomi*).

300. *Spatula clypeata* (Linn. ex Alb.)

MESTOLONE.

Spatola, Beccociatto, Cassù (*Basso-Piem.*) — Cazzulot (*Milano*) — Palton, Busion, Tognin (*Mantova*) — Anérón (*Feltre*) — Tofanáchio (*Padova*) — Fafan (*Bol.*) — Collo-verde

piccin (*Arenzano*) — ? Specchio (*Valdich.*) — Mallardo romano (*Nap.*) — Cucchiarune, Mijardo (*Calabr.*) — Cuciarone (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, di passaggio nella prima metà di marzo (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*); ove è assai frequente d'inverno (*Martorelli*). Nella prov. di Alessandria si vede abbondante alcuni anni specialmente nel passo primaverile: sembrano essere rari gli adulti e specialmente i maschi (*Camusso*). Raro di passaggio invernale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passaggio non abbondante nella prima quindicina di aprile (*Magretti*). Piuttosto comune nell'inverno ed alle due epoche del passo, nella prov. di Cremona; quella primaverile ha luogo dal marzo al maggio (*Ferragni*). Comune, ma non abbondante, alle epoche del passo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente frequente in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di scarso passo al piano in aprile nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Scarso ed invernale nel Friuli (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non raro di passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Comune ed invernale nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarso ed invernale in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Assai frequente d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); veduto anche di passo in luglio a Massaciuccoli (*Gragnani*). Invernale e di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Frequente in settembre, novembre e marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Di scarso passo in autunno e primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale e di passo più o meno copioso in settembre, novembre e marzo nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Invernale e comu-

nissimo in Toscana, si trattiene in mare e la sera viene a terra nelle paludi (*Roster*).

Marche : Scarso d'inverno (*Paolucci*).

Campania : Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Frequente dall'autunno all'aprile (*De Romita*).

Calabrie : Comune d'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Raro d'inverno nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Comune nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Scarso in quello di Modica, giunge in agosto e parte in maggio (*Dellafonte, Garofalo*). Di passo non abbondante in febbraio e marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrana*). Nel distretto delle Madonie, Palermo, si vede circa ogni tre anni (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Invernale e di passo abbondante in autunno e primavera (*Bonomi*).

301. *Dafila acuta* (Linn.) (ex Gesn.)

CODONE.

Ania sarvaja dla couva longa, An-nia salvaja, Ania cualonga (*Basso-Piem.*) — Sforceloûn (*Lago Maggiore*) — Cua de Roundaninna (*Arenzano*) — Coon, Codone, Marzaièu, Ania de due cùe (*Gen.*) — Anatrìn (*Spezia*) — Mallardo verdatero (*Bari*) — Coda-luònga (*Nap.*) — Cudune (*Calabr.*) — Carrabaru (*Lentini*) — Anitra cuduta (*Terran. Sicil.*)

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo; di passaggio nella prima metà del dicembre (*Abre*). Frequente in quella di Torino (*Gasca, Martorelli*). Piuttosto raro di passo invernale nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passaggio non abbondante nella prima metà di febbraio

(*Magretti*). Nella prov. di Pavia si vede usualmente in primavera; so di uno solo colto in fine dicembre 1880 (*Pavesi*). Invernale e comune nella prov. di Cremona, ove abbonda di più durante il passo primaverile; ne vidi uno maschio, sul Po il 3 giugno 1886 (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente abbondante in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di scarso passaggio al piano in maggio ed agosto nel Bellunese (*Soravia*). Non raro ed invernale nel Friuli (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Molto comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non raro di passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Abbastanza frequente nel distretto di Savona, essendovi invernale; parte in marzo ed aprile (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Abbastanza comune ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Frequente d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli*); di passo anche in luglio; durante l'epoca della incubazione, il maschio assume un abito simile a quello della femmina (*Gragnani*). Invernale e di scarso passaggio al piano nei distretti di Fauglia e Lari (*Ott, Papasogli*). Frequente in settembre-novembre e febbraio-marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Invernale e abundantissimo nel passo primaverile in Val di Chiana; più scarso in quello autunnale (*Griffoli*). Non tanto comune nel marzo nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*); invernale in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Abbondante ed invernale in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso, invernale (*Paolucci*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Comune dall'autunno all'aprile (*De Romita*).

Calabrie: Non molto comune da febbraio ad aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Scarso nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bon-*

figlio). Di passo, con brevissima fermata, in febbraio, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Invernale e di passo abbondante in autunno e primavera (*Bonomi*).

302. Mareca Penelope (Linn.) (ex Gesn.)

FISCHIONE.

Ania, Col rouss, An-nia salvaja, Anga salvadga, Ania sarvaega (*Basso-Piem.*) — Còu-rouss (*Mil.*) — Pio (*Lago Maggiore*) — Cò-ross, Mio (*Mantova*) — Anera medàna (*Feltre*) — Choss (*Friuli*) — Fio (*Rovigo*) — Sgiorz (*Bol.*) — Ania matta, Annia, Marzaièu, Anatrìn (*Gen.*) — Fratino (*Lucca*) — Frischiettu, Carìci (*Calabr.*) — Ninfea (*Spaccaforro, Sicil.*) — Fischiumi (*Mess.*) — Friscuni (*Lentini*) — Anitra friscalora (*Terran. Sicil.*) — Anari conc'arrubia (*Sard.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio nella prima metà del dicembre (*Abre*). Frequente in quella di Torino (*Gasca*); in autunno e primavera (*Martorelli*). Non infrequente nella prov. di Alessandria, ove giunge al principio dell'autunno e rimane tutto l'inverno (*Camusso*).

Lombardia : Scarso al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio non abbondante nella seconda metà di marzo (*Magretti*). Di passo primaverile nella prov. di Pavia (*Pavesi*). Invernale nella prov. di Cremona, ma più copioso alle epoche del passo in novembre e marzo (*Ferragnis*). Comune, ma di solo passo in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Di scarso passaggio in ottobre e novembre ed in marzo ed aprile nel distretto di Feltre, Belluno (*De-*

lato). Comunissimo da settembre a maggio nel Friuli (*Val-lon, Del Torre*). Nella prov. di Padova questa specie, comunissima alle epoche del passo, ha nidificato più volte in Valle Morosina; una coppia fu veduta per tutta l'estate 1877 nelle valli di Monselice, e so anche di una seconda che nidificò, mi pare nel 1884, in Valle Sora. Ebbi un individuo ibrido tra questa specie e la *N. Crecca*, maschio, ucciso in Valle Morosina nel dicembre 1882 (*Arrigoni*). Molto comune nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di passaggio abbondante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona da metà ottobre a tutto novembre e da febbraio ad aprile (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Assai abbondante d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli*); sedentario nel distretto di Massarosa; durante la incubazione il maschio assume un abito molto simile a quello della femmina (*Gragnani*). Invernale e di scarso passaggio al piano nei distretti di Fauglia e Lari. Pisa (*Ott, Papasogli*). Frequente in settembre-novembre e febbraio-marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Abbondante assai e di doppio passaggio in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale nelle prov. di Siena e di Grosseto, comune assai nel marzo in Maremma (*Dei, Ademollo*). Invernale ed assai abbondante in Toscana (*Roster*).

Marche: Non comune, invernale (*Paolucci*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Abbondante dall'autunno all'aprile (*De Romita*).

Calabrie: Invernale e frequente nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Raro nell'inverno nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Scarso nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Giunge in novembre e parte in febbraio-marzo in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Raro nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo in autunno e primavera, ma anco sedentario, giacchè molte coppie nidificano allo stagno di Sorso, Sassari (*Bonomi*).

303. Marmaronetta angustirostris (Ménétr.)

GARGANELLA MARMORIZZATA.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie, che è evidentemente assai rara per noi.

304. Nettion Crecca (Linn.)

ALZAVOLA.

Querquedula crecca, Salvad.

Garganè, Garganèlla (*Basso-Piem.*) — Crecolèta (*Feltre*) — Cercègne (*Friuli*) — Sarsegnòla (*Padova*) — Pazzetto (*Bol.*) — Garganello (*Arenzano*) — Testa rossa (*Savona*) — Gavarelo, Anitrin (*Spezia*) — Alzagola, Germanello, Germano piccolo (*Pisa*) — Bozzoletto (*Fucecchio*) — Germanello (*Sesto fiorentino*) — Germanello, Barazzuolo (*Sen.*) — Rocchelle (*Viareggio*) — Anitrella (*Viterbo*) — Terzetola vernile (*Bari*) — Mallardèlla (*Nap.*) — Terzina, Sarsella (*Calabr.*) — Purpuredda (*Mess.*) — Cirzotta (*Modica*) — Mitarda, maschio (*Tirran. Sicil.*).

Piemonte : Frequente al piano in prov. di Cuneo: di passo nella seconda metà di ottobre, ma succede altresì d'incontrarne qualche branchetto nel mese di agosto (*Alber.*). Così in quella di Torino, ove sembra però essere specie sedentaria (*Gasca, Martorelli*). Abbonda durante le epoche del passo, specialmente durante quello autunnale nella prov. di Alessandria; qualche coppia vi nidifica (*Camusso*).

Lombardia : Scarsa in pianura nella prov. di Bergamo

(*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio nella seconda quindicina di marzo (*Magretti*). Abbondantissima dall'autunno alla primavera, e in scarso numero nidificante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comunissima ai due passi in quella di Mantova, ove non è accertato che nidifichi (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente di passo in marzo, ottobre e novembre, ma non nidificante nel distretto di Feltre (*Delaito*). Frequente durante l'inverno nel Friuli, ove è fors'anche nidificante (*Vallon*); comune nel marzo (*Del Torre*). Comunissima e anche sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Abbondante, di passaggio, nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Così nel distretto di Savona; da novembre a marzo vi è comune (*Piccone*); così pure in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente nel distretto di Spezia, specialmente al passo in marzo (*Carazzi*).

Toscana: Comunissima d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli*); vi è anche sedentaria ed il maschio assume all'epoca della incubazione un abito simile a quello della femmina (*Gragnani*). Invernale e di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Comune di passo in settembre-novembre e febbraio-marzo; qualcuna nidifica pure nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Scarsa in marzo-aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Invernale ed abbondante alle due epoche del passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarsa ed invernale nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Sedentaria, ma nell'inverno abundantissima nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Comune d'inverno e anche sedentaria in Toscana (*Roster*).

Marché: Comune nell'inverno (*Paolucci*).

Lazio: Invernale e comune nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente; passa nella prima quindicina di

marzo e nella seconda di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Invernale ed abbondante (*De Romita*).

Calabrie : Abbondante d'inverno e di passo in ottobre e marzo; qualche coppia rimane a nidificare nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Oggi scarsa in quella di Reggio, ove una volta nidificava (*Moschella*): invernale ed abbondante nel distretto di Palme (*Moretti*).

Sicilia : Comune in marzo-aprile e novembre-dicembre nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa, ove si vede anche in settembre (*Bonfiglio*). Frequente da novembre a marzo in quello di Modica (*De-la-fonte, Garofalo*). Giunge in ottobre-novembre e parte in febbraio nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente in autunno in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo in autunno, invernale e più abbondante in primavera, ma ancora sedentaria e nidificante (*Bonomi*).

305. *Nettion formosa* (Georgi)

ALZAVOLA ASIATICA.

Querquedula formosa, Salvad.

Non ho nulla da aggiungere a quanto dissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie, che risulta essere stata presa una sola volta in Italia.

306. *Querquedula Circia* (Linn. ex Gesn.)

MARZAIOLA.

Saslot, Gargot, Garganel, Garganè, Garganella (*Basso-Piem.*) — Arzadega, Crè-Crè (*Milano*) — Creccola (*Vicenza*) — Crecoléta (*Feltre*) — Sarségna (*Padova*) — Gavarèlo, Ani-

trini (*Spazia*) — Germanello (*Pisa*) — Marzolo, Granajolo (*Fu-
cecchio*) — Gregoli (*I. di Giglio*) — Rocchelle (*Viareg.*) —
Terzetola marzarola (*Bari*) — Mijardoli, Marsola (*Calabr.*)
— Marzola (*Mess.*) — Girbinu (*Lentini*) — Papareda (*Mo-
dica*) — Riddena (*Terran. Sicil.*) — Circuredda a conca bianca
(*Sard.*).

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo; di passo
nella prima metà del marzo (*Abre*). In prov. di Torino la
trovai alcuni anni assai numerosa anche prima della metà
di agosto, e ritengo vi avesse nidificato essendo i giovani
assai più frequenti degli adulti in quella stagione (*Marto-
relli*). Frequente nel distretto di Torino (*Gasca*). Non abbon-
dante nella prov. di Alessandria e di solo passo in prima-
vera, essendo assai raro il vederne nell'autunno (*Camusso*).
Accidentale di passaggio invernale nella Valsesia (*Gua-
rinoni*).

Lombardia : Comune al piano nella prov. di Sondrio
(*Galli*). Scarsa in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente
nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passo abbondante in
marzo e settembre (*Magretti*). Nella prov. di Pavia non ho
mai visto nè saputo di catture invernali; sempre passa in
primavera. Nel 1884 si videro già il 10 febbraio, usualmente
giungono tra la fine del febbraio ed il principio di aprile,
ma rimangono branchetti fino a maggio inoltrato (*Pavesi*).
Abbondante nella prov. di Cremona, ma usualmente soltanto
durante il passo primaverile; il 28 marzo 1886 questa spe-
cie passò in grandissimi branchi. L'11 ottobre poi del 1885
uccisi due Marzaiole sul Po, onde questa specie fa comparsa
da noi anche nell'autunno (*Ferragni*). Comune, ma soltanto
durante il passo primaverile nella prov. di Mantova (*Pa-
glia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*);
vi ha nidificato (*Borromeo*).

Veneto : Accidentale al piano nella prov. di Vicenza
(*Molari*). Di passo frequente in marzo ed aprile, incerto nel-
l'autunno, nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Non
rara nel Friuli, ove nidifica nel maggio e giugno; ne ebbi

le uova il 27 maggio 1883 (*Vallon*); frequente nel maggio nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comunissima nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Molte Marzaiole nidificano negli estuari del Veneto, ma raramente svernano nelle lagune; il passo maggiore ha luogo in primavera; nel 1886 esso fu straordinario ¹ toccando il culmine il 28 marzo (*Ninni*). Comune nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di abbondante passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove si vede più facilmente in marzo ed aprile (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Invernale, più frequente in marzo, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Abbondante nella prov. di Lucca soltanto alla fine di febbraio ed ai primi di marzo (*Martorelli*, *Fontebuoni*); veduta anche in luglio; durante l'epoca della incubazione il maschio assume un abito simile a quello della femmina (*Gragnani*). Di scarso passaggio al piano in febbraio e marzo nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott*, *Papasogli*). Frequentissima di passo nel febbraio-marzo-aprile, più scarsa in settembre (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fontebuoni*); sembra avere anche nidificato nella prov. di Firenze a Fassine (*Fontebuoni*). Scarsa in marzo-aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Comune in marzo ed aprile in Val di Chiana, forse anche nidificante giacchè ne ebbi una giovane nel luglio; non si vede in autunno (*Griffolini*). Meno abbondante dell'Alzavola nelle prov. di Siena e di Grosseto, ove si vede in febbraio e marzo (*Dei*, *Ademollo*). Invernale e comune in Toscana; abbonda al passo nel marzo, scarseggia assai in quello del settembre (*Roster*).

Marche: Comune in marzo (*Paolucci*).

Campania: Frequente, passa nella prima metà di marzo nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Scarsa assai nell'autunno e nell'inverno; si

¹ A. P. NINNI, *Sul passaggio straordinario della Q. CIRCIA in marzo 1886 nell'estuario Veneto* (Atti Soc. ital. Sc. Nat. XXX, Milano 1887).

vede con frequenza, non mai in abbondanza, nel marzo e nell'aprile (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante dalla metà di febbraio a quella di aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Passa in agosto-settembre e non è comune nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Scarsa in quello di Modica, ove giunge in novembre e parte in marzo (*Della-fonte, Garofalo*). Di passo regolare in febbraio e marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente in primavera, meno in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di doppio passo, invernale, e anche sedentaria e nidificante (*Bonomi*).

307. *Fuligula rufina* (Pall.)

GERMANO TURCO.

Callichen rufinus, Salvad. .

Testón (*Mantova*) — Anára turca (*Padova*) — Chiosso (*Bologna*) — Fischione turco (*Lucca*) — Capone schiavonisco (*Bari*) — Natra turca (*Lentini*) — Testa di turcu (*Modica*) — Anitra tuppupa (*Terran. Sicil.*).

Lombardia: Avventizio nell'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Raro nella prov. di Mantova, vive solitario e talvolta rimane l'estate (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Raro ed invernale nel Friuli, ne ebbi un maschio giovane nel gennaio 1884 (*Vallon*). Molto raro nel Padovano: due maschi presi in provincia sono nel Museo universitario (*Arrigoni*). Ho avuto maschio e femmina di questa specie nell'inverno 1888 nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di accidentale comparsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Scarso d'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Rarissimo nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Raro nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Raro, ma si vede quasi ogni anno a Massaciuccoli, Lucca; vi uccisi una femmina nell'agosto 1886 (*Gragnani*). Poco frequente in novembre nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fontebuoni*). Raro ed invernale in Val di Chiana (*Griffoli*). Accidentale nelle prov. di Siena e di Grosseto; avuto in dicembre (*Dei*); scarso in Maremma (*Ademollo*). Piuttosto comune in Toscana, più abbondante di passo nel marzo, meno in autunno; molti ne vidi nel 1885 (*Roster*).

Marche : Scarso d'inverno (*Paolucci*).

Puglie : Giunge regolarmente nell'inverno, e qualche anno è abbondante (*De Romita*).

Sicilia : Comune e nidificante nel distretto di Lentini, Siracusa, ove giunge in marzo e parte in settembre; il 6 gennaio 1887 uno venne preso dentro l'abitato (*Bonfiglio*). Scarso in quello di Modica; giunge in novembre e parte in marzo (*Dellafonte*, *Garafalo*). Invernale e non abbondante nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Giunge a branchetti in autunno in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna : Di doppio passo, invernale ed in scarso numero sedentario e nidificante; ebbi le uova (*Bonomi*).

308. *Fulix ferina* (Linn.)

MORIGLIONE.

Aethya ferina, Salvad.

An-nia salvaja, Anga salvadga, Collorosso, Moetton. Ania nègra (*Basso-Piem.*) — Rossera (*L. Maggiore*) — Moretten, Munarasso (*Rovigo*) — Marzaieu, Annia. Annia du collo russo (*Savona*) — Moetton (*Arenzano*) — Testa rossa (*Spezia*) — Morigiana (*Sesto fiorentino*) — Morettone (*Fuere-*

chio) — Mijardo (*Calabr.*) — Cappurrussu o Capurrussu, il mas., Moja, la femm. (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove si mostra di passaggio solo nel mese di novembre (*Abre*). Non frequente nella prov. di Alessandria e di solo passo dal principio dell'autunno a tutto l'inverno (*Camusso*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passo nella seconda quindicina di marzo (*Magretti*). Invernale, ma specialmente di passaggio in ottobre e novembre e febbraio e marzo nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Invernale e comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro (*Turati*); frequente in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto: Di scarso passaggio al piano in maggio e settembre nel Bellunese (*Soravia*). Comune ed invernale nel Friuli, parte nel marzo (*Vallon*). Comunissimo nella prov. di Padova; ho veduto un individuo assai interessante, risultante dall'ibridismo tra questa specie e la *F. Fuligula*, è un maschio e fu ucciso nella Valle dei Millecampi nel novembre 1867 (*Arrigoni*). Comune nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Abbastanza frequente di passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarso nel distretto di Savona, ove l'ho visto in novembre, febbraio, marzo ed aprile (*Piccone*). Invernale e comune in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune nell'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa se ne vedono alcuni tutto l'anno (*Graguani*). Frequentè in novembre e febbraio-marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fontebuoni*). Invernale e comune in Val di Chiana: parte in aprile (*Griffoli*). Così nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*). Invernale e comune in Toscana (*Roster*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Invernale e frequente (*De Romita*).

Calabrie: Comune ed invernale nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune nel distretto di Lentini, Siracusa; pochi vi giunsero nel 1887-88 (*Bonfiglio*). Giunge in settembre-ottobre e parte in febbraio nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Giunge in autunno e parte in primavera. è assai abbondante sullo stagno di Cagliari (*Bonomi*).

309. *Fulix Marila* (Linn.)

MORETTA GRIGIA.

Fuligula marila, Salvad.

Morettoun (*Mil.*) — Morettón (*Padova*) — Morettone (*Lucca*) — Moretta nera (*Fucecchio*) — Niedduzzu (*Sard.*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Piuttosto comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente rara (*Turati*); piuttosto frequente in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto: Assai rara ed invernale nel Friuli; ne ebbi una nel gennaio 1884 (*Vallon*). Piuttosto rara nella prov. di Padova; ebbi un maschio da Valle Morosina il 1° febbraio 1881, ed una femmina da Piove di Sacco il 12 gennaio 1887 (*Abrigoni*).

Liguria: Scarsa d'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Molto scarsa nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Rara a Massaciuccoli, Lucca, ove capita di novembre (*Gragnani*). Poco frequente in novembre nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Fontebuoni*). Accidentale d'inverno in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale e scarsa nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

Sardegna: Invernale e rara; ne ebbi un solo individuo ora nel Museo universitario di Sassari (*Bonomi*).

310. Fulix Fuligula (Linn. ex Gesn.)

MORETTA.

Fuligula cristata, Salvad.

Tomireula (*L. Maggiore*) — Spornacin, Magassèto, Magasso moro (*Padova*) — Crecola mora (*Feltre*) — Marzaièu, Annia, Ania neigra (*Gen.*) — Muretta (*Bol.*) — Morettone (*Lucca*) — Moretta turca (*Fucecchio*) — Nchiummata (*Napoli*) — Mijardo (*Calabr.*) — Scavuzzu (*Lentini, Terran. Sicil.*).

Piemonte : Nei rigidi inverni qualche esemplare si uccide lungo i fiumi della prov. di Cuneo e specialmente sul Tanaro (*Abre*). Comune nella prov. di Torino (*Gasca*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di doppio passaggio in quella di Cremona, ove qualche anno è abbondante nel marzo (*Ferragni*). Comune alle epoche del passo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di passo abbondante in marzo, aprile e dicembre nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Invernale e non rara nel Friuli; parte nel marzo (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Non rara di passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarsa nel distretto di Savona, ove l'ho vista alla fine di novembre, in dicembre ed in aprile (*Piccone*). Invernale e comune in quello di Arenzano (*Luciani*). Comune in autunno e primavera nel distretto di Spezia; ne vidi alla fine di ottobre (*Carazzi*).

Toscana : Comune d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); se ne vedono tutto l'anno e nidificano certamente a Massaciuccoli (*Graggiani*). Frequente assai in

novembre e febbraio-marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Piuttosto comune d'inverno e scarsa in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale e comune nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Comune ed invernale in Toscana (*Roster*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale e abbondante (*De Romita*).

Calabrie: Comune d'inverno nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Rarissima nell'inverno nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Comune e nidificante nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Scarsa invernale e abbondante di passo in febbraio in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Invernale e di doppio passo (*Bonomi*).

311. *Fulix Nyroca* (Gald.)

MORETTA TABACCATA.

Nyroca africana, Salvad.

An-nia salvaja. Anga salvadga, Col ròss (*Basso-Piem.*)
— Moetta (*Arenzano*) — Russetta (*Bol.*) — Morettone (*Casentino*) — Mijardo (*Calabr.*) — Purpuredda tabacchina (*Mess.*)
— Occhi-bianchi (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo; di passaggio soltanto nella prima metà di marzo (*Albre*). Rara, di passo invernale nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Non frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Rara nell'autunno e nell'inverno nella prov. di Cremona, ove è talvolta di passaggio copioso in primavera (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova, ove qualche coppia rimane a nidificare (*Paglia*). Piuttosto rara (*Turati*): frequente in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto: Rara ed invernale nel Friuli; ne ebbi in gen-

naio e nel marzo (*Vallon*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune, sedentaria e anche nidificante nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Non rara, di passaggio, nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Invernale pure e comune nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Di doppio passaggio, ma scarsa nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli*); se ne vedono tutto l'anno e ritengo che nidifichi a Massaciuccoli (*Gragnani*). Frequente in novembre e febbraio-marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fontebuoni*). Rara in marzo-aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Abbastanza comune in primavera, rara d'inverno in Val di Chiana (*Griffoli*). Non comune, avuta in marzo nel Senese (*Dei*); passa in marzo-aprile e novembre nella prov. di Grosseto (*Ademollo*, *Cambi*); qualche coppia rimane e nidifica in Maremma (*Ademollo*). È comune e specialmente invernale in Toscana (*Róster*).

Marche : Scarsa (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania : Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Invernale e piuttosto scarsa (*De Romita*).

Calabrie : Comune d'inverno nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Comune in marzo-aprile e novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Invernale e non abbondante nel distretto di Terranova, Caltanissetta; parte in marzo (*Carvanti*). Accidentale in quello delle Madonie, Palermo; venne uccisa nella fumara di Castelbuono nel 1846 (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna : Invernale e di doppio passo (*Bonomi*).

312. *Bucephala Clangula* (Linn.) (ex Gesn.)

QUATTR' OCCHI.

Clangula glaucion, Salvad.

An-nia salvaja, Anga sarvaega, Quattr' oeuggi (*Basso-Piem.*) — Domenicanu (*Calabr.*) — Anitra bianca cu l'ali niuri, Anitra maltisa (*Terran. Sicil.*) — Anari a ulieras (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo; di passaggio soltanto nella prima metà di marzo (*Abre*). Raro assai e rarissimi gli adulti, nella prov. di Alessandria, durante l'inverno (*Camusso*).

Lombardia: Poco frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Raro nell'inverno in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune, più scarsi gli adulti, nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune (*Turati*); piuttosto scarso in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto: Invernale e non raro nel Friuli, ove trovasi dall'ottobre all'aprile (*Vallon*). I giovani molto più frequenti degli adulti nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non comune, di passaggio invernale, nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Scarso d'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Raro, specialmente gli adulti, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Scarso a Massaciuccoli, Lucca, ove passa in novembre (*Martorelli*, *Gragnani*). Scarsi gli adulti, frequenti i giovani in novembre nella prov. di Firenze, distretto di Fucecchio (*Lenzi*, *Turchetti*). Invernale e piuttosto raro in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nella prov. di Grosseto (*Ademollo*). Comune in primavera, più scarso nell'autunno in Toscana; i giovani sono più abbondanti (*Roster*).

Marche: Scarso nell'inverno (*Paolucci*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : I giovani sono frequenti nell'inverno, ma i maschi adulti sono rarissimi (*De Romita*).

Calabrie : Passa in marzo-aprile ed in novembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Scarso; giunge in novembre-dicembre e parte in marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Invernale, giunge a branchetti nel distretto delle Madonie, Palermo; nel 1846 fu più del solito abbondante sull'Imera (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di scarso passaggio d'inverno (*Bonomi*).

313. *Harelda glacialis* (Linn.)

MORETTA CODONA.

Magasséto bianco (*Padova*).

Lombardia : Di rarissima comparsa (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Nei mesi di ottobre e novembre 1887 vi fu nel Veneto una straordinaria comparsa di questa specie; il conte A. P. Ninni mi scrive che più di *cento* individui furono uccisi sulla Laguna di Venezia, ed egli ne spediva vari bellissimi per la Collezione italiana del R. Museo di Firenze. Erano individui giovani la più parte, ma variavano assai nell'abito; alcuni maschi, conservando la veste giovanile pur mostravano già sviluppate le lunghe timoniere mediane, proprie all'adulto; altri, coll'abito di adulto, non avevano quelle penne allungate. Io ebbi una femmina in veste così simile al maschio, di cui aveva pure le dimensioni, che se non avessi verificato io stesso il sesso ed esaminato pure il tamburo tracheale (*siringe*) sviluppato nei soli maschi e mancante affatto nelle femmine, non avrei mai creduto che appartenesse a quel sesso (*Giglioli*). Usualmente è di comparsa irregolare e scarsa nella prov. di Padova; specialmente rari sono gli adulti; io ne ebbi uno, maschio bellissimo, da Valle Zappa nel novembre 1887 (*Arrigoni*).

Liguria : Accidentale d'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Di

casuale comparsa nell'inverno nel distretto di Spezia e Sarzana (*Avif. ital.* p. 319), la sola cattura che si conosce (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale in novembre nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); ne conservo un giovane ucciso presso Prato, *Avif. Ital.* p. 319 (*Giglioli*). Accidentale in novembre nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

Puglie: Accidentale; ebbi una femmina nel novembre 1875 (*De Romita*).

314. *Edemia fusca* (Linn.) (ex Jonst.)

ORCO MARINO.

Chérso foresto (*Padova*) — Doubla macrusa (*Nizza*) — Anatra di mare (*Lucca*) — Anari a caparuccia (*Sard.*).

Lombardia: Verso la metà del gennaio 1879 un magnifico maschio adulto venne ucciso a S. Cipriano Po; l'8 novembre 1880 un altro fu ferito, ma non preso, vicino a Scarpone sul Ticino; infine verso la metà del novembre 1887 diversi individui di questa specie comparvero sul Po nella prov. di Pavia; una femmina venne acquistata sul mercato di Pavia per il Museo Universitario dal prof. Pavesi, dal quale ricevo queste notizie (*Giglioli*). Raro nella prov. di Mantova (*Paglia*). Di scarsa apparizione in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Poco frequente nella prov. di Padova, specialmente gli adulti (*Arrigoni*).

Emilia: Non di rado fa comparsa d'inverno nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Scarso d'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Raro assai nel distretto di Spezia, il prof. Magni-Griffi ne ebbe uno da S. Stefano di Magra in dicembre; non si conoscono altre catture (*Carazzi*).

Toscana: Scarso a Massaciuccoli, Lucca, ma ogni anno sene vedono in novembre (*Gragnani*). Accidentale nelle prov.

di Siena e di Grosseto; avuto in dicembre e gennaio (*Dei, Ademollo*).

Calabrie: Un maschio adulto sarebbe stato preso nella « piana » di Calabria, prov. di Reggio, durante il passo straordinario di Anatre che avvenne nell'inverno 1879-80 (*Moretti*).

Sardegna: Forse meno raro di quanto si crede; invernale (*Bonomi*).

315. *Ædemia nigra* (Linn. ex Briss.)

ORCHETTO MARINO.

Macrusa (*Nizza*).

Lombardia: Vengo a sapere dall'amico prof. Pietro Pavesi che il 13 novembre 1887 venne uccisa sul Ticino, poco al di sotto di Pavia, una femmina di questa specie così rara per noi; questo interessante esemplare si conserva ora nel Museo Civico di quella città (*Giglioli*). Accidentale in autunno nella prov. di Cremona (*Ferragni*).

Liguria: Assai raro d'inverno nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana: Di rara comparsa nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

316. *Somateria mollissima* (Linn.) (ex Barth)

EIDER.

Liguria: Accidentale d'inverno nel Nizzardo (*Gal*). Una femmina di questa specie venne trovata semiviva sulla spiaggia del mare presso Arenzano, il 20 novembre 1879 dal dottore Costante Luciani, mercè la cui gentilezza è ora nella Collezione centrale italiana a Firenze. Inoltre il dott. Luciani mi scrive che il maschio adulto ucciso dal signor Queirolo il 24 aprile 1884 (*Avif. Ital.* p. 322) e da lui donato alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani, era in com-

pagnia di una femmina; uno o due giorni prima della uccisione del maschio all'imboccatura del porto di Genova, i due uccelli furono veduti presso la spiaggia ad Arenzano (Giglioli).

317. *Somateria spectabilis* (Linn.)

RE DEGLI EIDER.

Nel « *Bollettino del Naturalista* » edito a Siena da S. Brogi (vol. VIII, n. 9-10, p. 137), il conte dott. Alessandro P. Ninni annunzia che il 21 agosto 1888 venne ucciso dal cacciatore Giovanni Minotto alle Pignatelle (Laguna Veneta), un maschio non perfettamente adulto di questa specie artica, che ora per la prima volta sarebbe capitata in Italia. Il conte Ninni trovò lo stomaco e l'esofago pieni di *Carcinus maenas*, e seppe dal Minotto che quell'uccello non era punto diffidente e che per impossessarsi della preda si tuffava ricomparendo a galla dopo lunghi intervalli, come usa fare la *Bucephala clangula*. Con lettera in data del 24 settembre 1888, il conte Ninni mi conferma quanto sopra: egli gentilmente mi mandò uno schizzo della testa di quell'Anatra interessantissima, dal quale risulta in modo evidentissimo che è un maschio semi adulto. Il conte Ninni ha fatto dono di questo rarissimo uccello al Museo Civico di Venezia che già tanto deve alla sua attiva generosità e di cui egli è il direttore. Ho potuto avere lo sterno e la trachea per la Collezione centrale dei Vertebrati italiani a Firenze.

La *Somateria spectabilis*, che viene così per la prima volta a far parte dell'avifauna italica, è un uccello prettamente boreale; vive lungo le coste europee ed asiatiche dell'Oceano glaciale, alla Groenlandia, allo Spitzbergen e alla Novaia Zemlia; trovasi abbondante anche sulle due coste dell'America boreale, ove sembra scendere più in basso che non nel Vecchio Continente. Qui è rara specie invernale sulle spiagge settentrionali e medie delle isole Britanniche, sebbene qualche coppia sembri essere sedentaria nelle più

lontane Orcadi; in Scandinavia è raro anche a Tromsö; nella Danimarca la sua comparsa è accidentale affatto e forse colla eccezione del nostro, l'esemplare più meridionale sinora ricordato in Europa sarebbe quello ucciso presso Boulogne in Francia e ricordato da Degland e Gerbe.

318. *Erismatura leucocephala* (Scop.)

GOBBO RUGGINOSO.

Starna d'acqua (*Nap.*) — Anari de Spagna (*Sardegna*).

Lombardia : Un secondo individuo, oltre quello citato (*Avif. Ital.* p. 323), venne ucciso sul Po in prov. di Pavia nell'inverno 1881-82 (*Pavesi*). Raro nella prov. di Mantova (*Paglia*). Di accidentale comparsa in Lombardia (*Turati*).

Veneto : Rarissimo nella prov. di Padova; un maschio giovane vi fu preso il 25 febbraio 1884, si conserva nella mia raccolta (*Arrigoni*).

Emilia : Di comparsa accidentale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Una sola cattura è nota nel distretto di Spezia, avvenne nel dicembre 1856 e l'esemplare si conserva nel R. Liceo di Pistoia (*Carazzi*).

Toscana : Raro nella prov. di Lucca; ne uccisi due a Massaciuccoli nell'inverno 1888 (*Gragnani*). Accidentale d'inverno nella prov. di Grosseto (*Ademollo*). In Toscana questa specie è comparsa piuttosto numerosa alcuni anni, p. e. nel 1882 e 1883; ma è generalmente assai rara (*Roster*).

Sardegna : È specie di doppio passaggio ed invernale, ma pure nidificante: onde è anco sedentaria nell'isola. Non poche coppie nidificano nello stagno di Sorso nel Sassarese, e spesso vedonsi insieme alla Volpòche ed ai Germani turchi attraversare le dune per recarsi dallo stagno al mare o viceversa (*Bonomi*).

MERGIDÆ

(*Smerghi*).

--

319. *Mergus Merganser*, Linn. ex Gesn.

SMERGO MAGGIORE.

Pescaréu grôs, Pescaròn, An-nia pescareula, An-nia pescadura (*Basso-Piem.*) — Resegott (*L. Maggiore*) — Aneròn dal bèch sotil (*Feltre*) — Sérule (*Friuli*) — Imperga (*Rovigo*) — Segheta, Margùn (*Spezia*).

Piemonte: Accidentale nella prov. di Cuneo; ne venne ucciso uno nel 1855 vicino a Saluzzo (*Abre*). Di comparsa casuale nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Scarso nella prov. di Milano (*Brambilla*). Invernale in quella di Cremona; ogni anno capitano sul Po, ma sono quasi sempre giovani (*Ferragni*). Poco comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di scarso passaggio in dicembre e gennaio nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Raro ed invernale nel Friuli; ebbi un maschio adulto ucciso sul Natisone il 27 gennaio 1883 (*Vallon*); ne ebbe pure uno il signor Condotti di Premariacco, ucciso in quei pressi sul Natisone (*Del Torre*). È quasi raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro assai in quella di Rovigo; ne vidi due uccisi nell'inverno 1883 (*Dal Fiume*).

Emilia: Di comparsa accidentale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Accidentale in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Invernale e assai scarso nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale d'inverno a Massaciuccoli, Lucca (*Uraghani*). Rarissimo nella prov. di Firenze; ne conservo uno (*Avif. Ital.* p. 325) ucciso a Borgo S. Lorenzo il 28 dicem-

bre 1878 (*Giglioli*). Accidentale in Val di Chiana, ebbi una femmina nel dicembre 1881 (*Griffoli*). Raro assai nella prov. di Grosseto (*Ademollo*); ne ebbi un maschio da Orbetello il 24 dicembre 1862 (*Dei*).

Sicilia: Accidentale nel distretto delle Madonie, Palermo; è stato ucciso sul Monalo e sull'Imera (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Raro in autunno e nell'inverno (*Bonomi*).

320. *Mergus Serrator*, Linn.

SMERGO.

Resegott (*L. Maggiore*) — Sérule (*Friuli*) — Spérgea (*Padova*) — Imperga (*Rovigo*) — Margùn, Segheta (*Spezia*) — Seghettone (*Fucecchio*) — Pesciajola grossa (*Valdich.*) — Svasso grosso (*Marche*) — Secone, Mergo (*Nap.*) — Serra (*Mess.*) — Anitra sirretta (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Molto scarso nella prov. di Torino (*Gasca*).

Lombardia: Accidentale nella Valtellina, un maschio giovane venne ucciso presso Sondrio il 1° novembre 1886 (*Galli*). Meno scarso della precedente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Raro in quella di Cremona, di doppio passaggio, nel tardo autunno e nell'aprile (*Ferragni*). Invernale e comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso ed invernale nel Friuli; ne ebbi un maschio adulto il 20 marzo 1885 (*Vallon*); ne vidi sul mercato di Udine (*Del Torre*). Frequente, eccetto gli adulti, nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di passaggio scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio, specialmente autunnale, nel Nizardo (*Gal*). Alquanto scarso nel distretto di Savona, ove l'ho veduto in novembre, dicembre, aprile e anche il 29 mag-

gio (*Piccone*). Comune di passo in novembre-nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Piuttosto scarso ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Assai frequente d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli*); passa in novembre (*Gragnani*). Scarso ed invernale nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Giglioli*). Invernale, ma scarso in Val di Chiana (*Griffoli*). Raro nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*). Invernale e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso d'inverno (*Paolucci*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Invernale e frequente di doppio passo (*De Romita*).

Calabrie: Accidentale nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Raro d'inverno nella prov. di Messina (*Ruggieri*). Invernale, non abbondante; arriva in novembre-dicembre e parte in marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvata*). Scarso assai in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Comune, giunge in autunno e parte in primavera (*Bonomi*).

321. *Mergellus Albellus* (Linn.)

PESCIAIOLO.

Pescareù, Pescapess, An-nia pescadura. An-nia pescareula (*Basso-Piem.*) — Pisagrù (*Padova*) — Imperga (*Rovigo*) — Smergo (*Arenzano*) — Pescina (*Fucecchio*) — Seereo (*Lago Trasimeno*) — Secariello (*Nap.*) — Strallera bianca (*Sard.*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, di solo passaggio nella prima metà del dicembre (*Abbi*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*). Di rara comparsa durante l'in-

verno nella prov. di Alessandria, rarissimi gli adulti (*Camusso*).

Lombardia: Invernale nella prov. di Cremona; sono scarsi gli adulti (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova, ove giunge d'inverno e fa breve sosta (*Paglia*). Generalmente rara (*Turati*); piuttosto frequente in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto: Scarsa, ma capita ogni inverno nel Friuli (*Valon*, *Del Torre*). Frequenti i giovani, assai meno gli adulti nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di scarso passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Rara assai nel distretto di Savona, ove ne ebbi un solo l'8 dicembre 1875 (*Piccone*). Rara ed invernale in quello di Arenzano (*Luciani*). Invernale e molto scarsa nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Frequenti i giovani e le femmine d'inverno, rari i maschi adulti nella prov. di Lucca (*Martorelli*); divenuta rara nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Frequente in febbraio-marzo nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*): scarsa in quello di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Accidentale in marzo nel Casentino, Arezzo (*Beni*). I giovani sono piuttosto comuni negli inverni rigidi in Val di Chiana; l'ho vista sui nostri laghi tuffarsi sotto il ghiaccio per fori che accidentalmente vi si trovavano (*Griffoli*). Non comune, rarissimi gli adulti, nelle prov. di Siena e di Grosseto; giunge in novembre e parte in febbraio (*Dei*); si vede alla foce dei fiumi in Maremma da gennaio a marzo (*Ademollo*). Invernale e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarsa d'inverno (*Paolucci*).

Puglie: Invernale, non frequente, ma neanche rara (*De Romita*).

Calabrie: Rara nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Rara d'inverno nella prov. di Messina (*Ruggeri*).

Sardegna: Piuttosto scarsa ed invernale (*Bonomi*).

SCHIZOGNATHÆ.

COLUMBÆ.

COLUMBIDÆ

(Colombe).

322. *Columba Palumbus*, Linn. (ex Gesn.)

COLOMBACCIO.

Coulumb favè (*Alba*) — Favàs, Colásso, Crombo sarvaego. Pivion sarvaigh, Pevion sarvà (*Basso-Piem.*) — Favaz (*Novara*) — Colombo salvarégo, Grotón (*Feltre*) — Favarásso (*Padova*) — Clumbazz, Favazz (*Bol.*) — Clumb favazz (*Vergato*) — Gulasso (*Arenzano*) — Cümbo sarvaego (*Savona*) — Coombo (*Spezia*) — Favazo (*Sarzana*) — Palomba (*Marche*) — Colombo favaccio (*Garf.*) — Collarone (sedentari). Colombaccio (passaggieri) (*Sarzano*) — Piccione (*I. di Giglio*) — Palombaccio (*Viterbo*) — Turchiato (*Nap.*) — Lumbarda (*Puglie*) — Palumba collata, Palumba servaggia, Fassa (*Calabr.*) — Tiruni (*Modica*) — Tidòri (*Fonni, Sard.*).

Piemonte : Frequente al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). In prov. di Torino è assai numeroso (*Gasca*). Tra febbraio ed ottobre abbonda; lo vidi accoppiarsi anche in febbraio sugli alti alberi del giardino reale di Torino (*Martorelli*). Passa in numerosi stuoli nell'autunno nella prov. di Alessandria, in mi-

nor numero in primavera; vi nidifica, ma non isverna (*Camusso*). Non comune nell'Ossola, ove giunge in maggio ed ove nidifica (*Bazetta*). Raro di passaggio in agosto nel distretto di Crodo (*Demori*); erratico in quello di Piedimulera (*Danisi*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Raro assai nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Nidifica entro la città di Milano (*Magni*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di passaggio in marzo ed aprile ed in settembre e ottobre nella prov. di Cremona, ove poche coppie rimangono a nidificare (*Ferragni*). Estivo e nidificante, non sverna nella prov. di Mantova (*Paglia*). Comunissimo nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non raro nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno; alleva due covate, in maggio e luglio; fa passaggio in aprile ed ottobre (*Tissi*): così nel distretto di Feltre, ove passa pure nel marzo (*Delaito*). Frequente e nidificante nel Friuli; ebbi il nido colle uova da Codroipo il 25 maggio 1885 (*Vallon*); comune (*Del Torre*). Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima in Romagna nelle stagioni del passo soltanto; sul Bolognese dicesi sedentario e nidificante (*Bacchi della Lega*). Poco comune, di passaggio e anche nidificante nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Nidificante, ma scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Abbondante nel distretto di Savona durante il passo, cioè dalla metà di ottobre alla metà di novembre e nel marzo (*Piccone*). Così in quello di Arenzano, ove passa da E. ad O. in ottobre e novembre e da O. ad E. in marzo (*Luciani*). Nel distretto di Spezia nidifica, ma si vede più abbondante nel passo autunnale alla fine di ottobre, il ripasso in febbraio e marzo è scarso (*Carazzi*).

Toscana: Comune durante il passo tra la fine di settembre ed il novembre, e fors'anche nidificante nella prov. di

Lucca (*Martorelli, Gragnani*; comune anche al ripasso (*Fontebuoni*). Comune di passo e nell'inverno nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*): scarso assai in primavera, più abbondante in ottobre, specialmente nella seconda metà, nel distretto di Lavajano (*Papasogli*); nidifica in Val d'Era (*Degli Alessandri*). Frequente al passo in ottobre-novembre e nel marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*; scarso nel distretto di Fiesole (*Gargioli*). Nel Casentino. Arezzo, è frequente nel passo d'ottobre. scarso in quello di marzo; vi nidifica (*Beni, Pauer*); vi è anche sedentario (*Fiorini*). Abbondante di doppio passo e anche sedentario in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena, ove agli ultimi di settembre od ai primissimi di ottobre cominciano a vedersi i primi branchi di Colombacci che in qualche anno sono numerosissimi. Nei dintorni di Sarteano si fa loro la caccia col fucile in varie località aspettandoli nelle ore del passo, che sono generalmente quelle della mattina e talvolta anche verso sera, ma allora sempre in minor numero. Qualche volta è stata fatta con discreto successo anche la caccia coi così detti volantini o richiami sulle cime degli alti cerri. Ma dove questa caccia è molto in uso è nei monti dell'Umbria: ed anche più vicino cioè nel Comune di Chianciano, vi è una celebre caccia dei Colombacci presso una Villa detta Poggio alla Sala della famiglia Casuccini. I cacciatori locali distinguono i Colombacci in Collaroni e Colombacci di passo, ed affermano che i Collaroni sono i Colombacci stazionari; questo evidentemente ha relazione invece coll'abito degli adulti e dei giovani. I Colombacci che passano dai monti di Sarteano sarebbero quelli dei quali parla il Savi, citato anche dal Salvadori, quando dice: « Entrano » in Toscana varcando l'Appennino: alcuni continuano il » loro viaggio verso mezzogiorno seguendo questa catena » di montagne; ma un gran numero si porta verso ponente. » e riunitisi sugli alberi della montagna di S. Fiora, tutti » si dirigono verso il monte Argentaro, passando sulle » folte boscaglie che guarniscono il confine romano e toscano. » Questi dunque farebbero parte del ramo che va

verso il vicino Monte di S. Fiora od Amiata. Passa anche in marzo (*Bargagli*). In scarso numero sedentario e di passo copioso in ottobre nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci, Marri*). Sedentario e di passo copioso in ottobre e marzo nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo abbondante in marzo ed ottobre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche : Frequente, sedentario ai monti e di passaggio in ottobre e marzo (*Paolucci*).

Lazio : Pochi sedentari, molti di passaggio, nel distretto di Montefiascone, Viterbo ; passa dal 29 settembre al 20 ottobre, e dal 15 febbraio al 15 marzo (*Mimmi*).

Campania : Frequente di passo nella prima metà di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Invernale e di passo regolare in autunno e primavera (*De Romita*).

Calabrie : Sedentario, ma più abbondante in autunno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Abbonda in branchi al piano nella prov. di Reggio in ottobre e novembre (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Comune e sedentario ai monti nella prov. di Messina, ove è di passo in febbraio-marzo ed ottobre (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, sedentario e di passo in ottobre e febbraio-marzo nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellufonte, Garofalo*). In scarso numero sedentario, abbondante da ottobre a marzo in quello di Terranova, Caltanissetta (*Caravana*). Sedentario ai monti nel distretto delle Madonie, Palermo ; scende agli uliveti col freddo (*Palumbo, Morici*). Passa dalla metà di ottobre alla fine di novembre e dalla metà di marzo ai primi d'aprile nel distretto di Palermo (*Gian-nattasio*).

Sardegna : Di passo copioso in autunno e primavera ; anche invernale e sedentario e nidificante nelle foreste del Capo settentrionale ; ebbero i pulcini da Nuoro (*Bonomi*).

323. Columba Oenas, J. F. Gmel (ex Gessn.

COLOMBELLA.

Cromb salvà, Cromb sarvaig, Pivion sarvaigh, Pevion sarvà, Crombo sarvaego (*Basso-Piem.*) — Pevion salvadegh (*Valt.*) — Colombazzo (*Veron.*) — Colombo salvarégo (*Feltre*) — Coombo (*Spezia*) — Favazo (*Sarzana*) — Colombo (*S. Gimignano*) — Palumba servaggia, Palumba collata marina (*Calabr.*) — Tutone (*Sicilia*) — Palumma sarvagia (*Mess.*) — Ciucella (*Modica*) — Marinedda (*Terran. Sicil.*) — Palumba roccalora (*Petralia*) — Colombella (*Sard.*).

Va rammentato che la *Columba Oenas* di Linneo (*Syst. Nat.* edit. XII, I. p. 279, n. 1) non è altro che la *C. livia*, cioè il Piccione comune!

Piemonte: Frequente al piano e al monte in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio ed in giugno; il 10 ottobre 1885 ebbi un ibrido maschio tra questa specie e la *T. tenera*, l'inviai alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani a Firenze (*Abre*). In prov. di Torino ne vidi spesso fortissimi branchi anni or sono, poi non vidi più che scarsi branchetti o individui isolati: nei boschi presso Saluggia la incontrai anche in novembre inoltrato, e mi si disse restarvene anche in tutto l'inverno (*Martorelli*). Frequente nel distretto di Torino (*Gasca*). Nella prov. di Alessandria giunge a branchetti, e spesso a coppie isolate, dalla fine di marzo alla metà di aprile; non vi nidifica, ma ripassa in stuoli numerosissimi dalla metà del settembre al principio del novembre (*Camusso*). Nidifica nella Valsesia, e ne ebbi in giugno presi a poca distanza da Varallo (*Guarimoni*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Invernale nella prov. di Cremona, giunge in settembre e ottobre e parte o ripassa nel maggio (*Ferragni*). Sedentaria e di doppio pas-

saggio nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune nel distretto di Caprino, Verona; vi è anche sedentaria (*Pellegrini*). Nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno; alleva due covate in giugno e luglio: passa in aprile ed ottobre (*Tissi*); scarsa nel distretto di Feltre, ove passa in aprile e settembre e non nidifica (*Delaito*). Non rara nel Friuli, ove deve pure nidificare giacchè ne incontrai il 19 maggio 1883 (*Vallon*). La credo frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Scarsa, di passaggio, nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Non comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passo autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Abbondante alle epoche del passo nel distretto di Savona, cioè nel marzo e dalla metà di ottobre a quella di novembre e anche più tardi (*Piccone*). Così in quello di Arenzano, ove passa da E. ad O. in ottobre e novembre, e da O. ad E. nel marzo (*Luciani*). Nel distretto di Spezia passa a branchi dalla fine di settembre in poi; qualcuna sverna (*Carazzi*).

Toscana : Più comune durante le due epoche del passo verso il litorale nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa si vede in ottobre (*Gragnani*). Comune di passo e nell'inverno nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); anticipa di qualche giorno sul Colombaccio e ripassa in marzo in quello di Lavajano (*Papasogli*). Frequente di passo in ottobre-novembre e marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Non comune, forse nidificante, nel Casentino, Arezzo (*Beni*); di doppio passo (*Fiorini, Pauer*). Invernale e abbondante di doppio passo in Val di Chiana, ove non mi consta che nidifichi (*Griffoli*). Invernale al piano nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Nelle prov. di Siena e di Grosseto è scarsamente sedentaria, passa in settembre e rimane abbondante sino al marzo (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di abbondante passo in ottobre all'isola di Gi-

glio (*Bianchi*). Comune al passo in Toscana, alcuni vi svernano e probabilmente vi nidifica pure (*Roster*).

Marche: Frequente, passa dalla metà di settembre alla metà di ottobre, e nel marzo (*Paolucci*).

Abruzzi: Frequente di passo in novembre e febbraio-marzo nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Puglie: Invernale e di copioso doppio passaggio (*De Romita*).

Calabrie: Sedentaria e di passo nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Autunnale e comune nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune, sedentaria ai monti e di passo in marzo e settembre-ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente da ottobre a marzo nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondantissima e sedentaria in quello di Terranova, Caltanissetta, nidifica tra le roccie (*Carvana*). Sedentaria, frequente ai monti, e di passo in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*). Nel distretto di Palermo passa dalla metà di ottobre alla fine di novembre, e ripassa in marzo-aprile (*Giannattasio*).

Sardegna: Giunge in autunno parte in primavera, ma ritengo che sia anche sedentaria e nidificante, giacchè al Capo settentrionale ne uccisi in luglio (*Bonomi*).

324. *Columbia livia*, Bonnat. ex Gesn.

PICCIONE SELVATICO.

Cromb salvà, Cromb sarvaig, Crombo sarvaego, Pivion sarvaigh, Pevion sarvà (*Basso-Piem.*) — Colombo salvadego (*Vicenza*) — Colomb salvadi (*Friuli*) — Cûmbo turraieu (*Arenzano*) — Colombo sassaiolo (*Garf.*) — Piccione marino (*I. di Giglio*) — Palummella de la cava (*Napoli*) — Palumba collata marina (*Calabr.*) — Palumma sarvaggia o roccalora

(*Mess.*) — Marinedda (*Lentini*) — Palumma servaggia (*Moldica, Terran.*) — Colombu de is arrocas (*Sard.*).

Piemonte : Scarso al monte in prov. di Cuneo, ove nidifica due volte in maggio ed in giugno (*Abre*). Osservai una volta un grosso branco di Piccioni dal groppone bianco in certi boschi non lungi da Torino; ne rimasi sorpreso, ma non mi fu dato costatare nulla in proposito; mi parvero però selvatici sia pel modo di comportarsi, sia per il luogo in cui erano. Qualche volta ne vidi sul mercato di Torino insieme alle Colombelle (*Martorelli*). Nella parte montuosa della prov. di Alessandria, confinante con quella di Genova, ho notato un vero passaggio di questa specie durante l'autunno; sono branchetti che si dirigono dal N. al S., ma prima di giungere alla parte piana della provincia si fermano e quindi ripiegano nella direzione del Mediterraneo da E. a SSE. Ne incontrai ogni anno dalla metà del novembre a tutto dicembre (*Camusso*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Milano¹ (*Brambilla*); di passaggio talora frequente in marzo ed ottobre (*Magretti*). Le colombe riferibili a questa specie nella prov. di Cremona sono dubbiosamente selvatiche (*Ferragui*). Generalmente comunissimo (vedi però nota) in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Nidificante nella prov. di Vicenza (*Molari*). È sedentario nel Friuli lungo le sponde alte e rocciose del Natisone (*Vallon*); vi nidifica nelle caverne (*Del Torre*). Nella prov. di Padova sembra essere di passo casuale; un individuo, che conservo nella mia raccolta, venne ucciso in un grosso branco di *C. Oenas*, presso Monselice il 15 ottobre 1883 (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Sedentario e anche di passaggio nel Nizzardo (*Gal.*). Raro nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarso nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

¹ Il signor Brambilla dà il nome volgare milanese di *Puvioân de colombèra*, onde non è improbabile che egli intenda la razza semi-domestica.

Toscana: Abbondantissimo e sedentario nel distretto di Sarteano, Siena; vive nelle torri, piccionaie e campanili e specialmente nelle torri del castello di Sarteano ¹ (*Bargagli*). Il Piccion torraio era una volta sedentario e assai comune nel distretto di S. Gimignano, ove ora è quasi sterminato (*Marri*). Sedentario tra le rupi del Monte Argentario nella prov. di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Sedentario e nidificante sull'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario sul litorale in Toscana (*Roster*).

Marche: Frequente (*Paolucci*).

Abruzzi: Comune e sedentario nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Passa nella prima quindicina di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in branchi alla fine di aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Frequente e sedentario, abita gli edifizi (*De Romita*).

Calabrie: Sedentario e abbondante al piano d'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*); ed in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondantissimo e sedentario nel distretto di Terranova, Caltanissetta; nidifica tra le rupi e sui vecchi edifizi, e una grande colonia vive entro la città di Terranova (*Curran*). Sedentario, frequente ai monti e balzi, nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Abbondantissimo e sedentario lungo il litorale roccioso, ma ve ne sono di passo colla specie precedente (*Bonomi*).

¹ Andrebbe accertato se questa non è la razza semi-domestica o torraiola, *C. turricola* di Bonaparte (*Avif. Ital.* p. 330).

325. Turtur tenera (C. L. Brehm) ¹

TORTORA.

Turtur communis, Salvad.

Túrtura, Turdra, Turtra, Túrdua (*Basso-Piem.*) — Duldra (*Casteggio*) — Tourtora, Tourtorella (*Mil.*) — Tortorèle (*Friuli*) — Turturèna (*Ravenna*) — Tortorina (*Vergato*) — Tourdourelle (*Nizza*) — Tortóa (*Savona*) — Turduinna (*Arenzano*) — Tortoèla (*Spezia*) — Tortorella, Tortola (*Nap.*) — Turtura, Tortorelle, (*Calabr.*) — Tortora (*Lanusei*).

Piemonte: Frequente al piano e al monte in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in maggio ed in giugno (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*); giunge agli ultimi di aprile o ai primi di maggio, nidifica in abbondanza e parte entro il settembre (*Martorelli*). Nella prov. di Alessandria arriva a primavera inoltrata, annida in abbondanza, e parte tra la seconda metà di agosto e la fine del settembre (*Camusso*). Erratica nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*); nidifica in Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia: Non tanto comune in pianura nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Comune dalla metà di aprile a quella di settembre nella prov. di Cremona

¹ Va rammentato che un esemplare del *Turtur risorius* (Linn.) così comunemente tenuto in schiavitù, venne citato dal Doderlein come preso nel Modenese presso Lesignana (*Avif. Sicil. e Mod.* p. 345); più tardi il dott. Picaglia (*Rend. Atti Soc. Nat. Mod.* ser. 3, vol. III, p. 44) lo riferisce al *T. douraca*, Hodgs., altro nome per la medesima specie; quell'esemplare, conservato vivo per parecchi anni, sarebbe poi fuggito. Io sono pienamente d'accordo col Salvadori (*Ucc. ital.* p. 193) che è difficile poter affermare recisamente che quell'individuo fosse selvatico o non fuggito di schiavitù. Va però detto che il *T. risorius* vive allo stato libero affatto anco nei pressi di Costantinopoli, onde non è impossibile che possa casualmente giungere in Italia.

(*Ferragni*). Estiva e comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente assai comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Comune sui monti nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*); ove è comune (*Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno; giunge in aprile e parte in agosto (*Tissi*); scarsa nel distretto di Feltre, ove nidifica e passa pure in settembre (*Delaito*). Comune ovunque e nidificante nel Friuli; cova già alla metà di maggio e parte in ottobre (*Vallon*); nidifica pure tra le roccie lungo il Natisone (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comunissima ed estiva nelle prov. di Ravenna e di Bologna (*Bacchi della Lega*); così nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del. Prato*).

Liguria: Estiva, ma specialmente di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Abbastanza frequente nel distretto di Savona, giunge in aprile od ai primi del maggio, nidifica e parte in settembre. Per 4 anni di seguito questi uccelli nidificarono sopra uno dei promontorii che sovrasta al mare tra Albissola e Savona; andando in barca si vedevano svolazzare tra uno scoglio e l'altro come fossero uccelli marini (*Piccone*). Comune in aprile e maggio, rara d'autunno nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Nel distretto di Spezia giunge in maggio, nidifica e parte alla fine di settembre (*Carazzi*).

Toscana: Passa alla fine d'aprile ed in maggio nella prov. di Lucca: pochi vi rimangono a nidificare; ripassa in settembre (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Graguani*). Frequente ovunque; giunge in maggio e parte in settembre nei distretti di Fauglia, Lari e Peccioli, Pisa (*Ott*, *Papasogli*, *Degli Abs-sandri*). Frequente da aprile a settembre nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Gargioli*, *Fontebuoni*). Abbondante nel Casentino, ove giunge in aprile e parte in settembre-ottobre (*Boni*, *Fiorini*, *Pauer*). Abbondante in Val di Chiana, giunge in aprile e parte alle prime piogge del settembre

(*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); ed in quello di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*). Comune da aprile a settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Di passo abbondante in maggio all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Frequente; passa in aprile-maggio ed in settembre (*Paolucci*).

Lazio: Nel distretto di Montefiascone, Viterbo, giunge in aprile, nidifica e parte ai primi di ottobre (*Minni*).

Abruzzi: Frequente; giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in branchi in aprile e maggio all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Estiva, ma specialmente di passo, in branchi numerosi in aprile e maggio e meno abbondante nel settembre (*De Romita*).

Calabrie: Comune, specialmente in maggio, passa anche in ottobre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune al passo primaverile in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Estiva e comune nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente da aprile a settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Estiva; giunge in aprile e parte in settembre, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente; giunge in aprile, e nidifica nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo ed estiva e nidificante; parte dai primi di settembre ai primi di ottobre (*Bonomi*).

PTEROCLETES.

PTEROCLIDÆ

(*Pterocli*).

326. *Pterocles Alchata* Linn.) ex Gesn.

GANGA.

Emilia : In questi giorni il dott. Alberto Bacchi della Lega, bibliotecario della R. Università di Bologna, mi dà notizia della cattura di una *P. Alchata*, avvenuta nell'agosto 1885, nei pressi di Faenza, nelle seguenti circostanze: il signor Giuseppe Morri di questa città tendeva le reti alle Strisciaiole di passo nei prati di Merlaschio, a sette miglia da Faenza, quando vide arrivare da lontano un singolare uccello che si posò a poca distanza dalle sue reti. Prese il fucile che aveva seco, e poté uccidere quell'uccello che riuscì nuovo affatto e sconosciuto a lui: studiatolo poi poté determinarlo per un esemplare della Ganga; aveva lo stomaco quasi vuoto, con pochi fili d'erba. Questo esemplare interessante, che è un maschio giovane, si conserva nella raccolta del signor Morri a Faenza (*Giglioli*).

Liguria : Di rara comparsa nel Nizzardo in primavera ed autunno (*Gal*).

Toscana : A Livorno circa il 1863, un contadino dei dintorni portò sul mercato quattro esemplari di questa specie *in carne*; uno di questi, il più bello, venne acquistato e poi preparato dal signor De Lamotte, padre: un altro sarebbe stato acquistato dal dott. cav. F. Castelli di Livorno. Il primo di essi, veduto ultimamente dal prof. D. Carazzi nella raccolta del signor De Lamotte, figlio, a Sarzana, ove

figurava col nome di *P. arenarius*, è passato, per dono generoso di questi, nella Collezione italiana centrale a Firenze: è un maschio giovane in condizioni abbastanza buone di conservazione; è peccato davvero che non sia stato tenuto conto esatto della data della cattura. Il prof. Carazzi ha poi pubblicato (*Boll. Soc. Nat. Napoli*, I, fasc. 1, 1887) una nota in proposito (*Giglioli*).

327. *Syrnhaptes paradoxus* (Pall.)

SIRRATTE.

Nella primavera del 1888 una nuova invasione di questa interessantissima specie asiatica avvenne in Europa, e dalle steppe della Mongolia una enorme colonna migrante si spinse ad occidente attraversando l'Europa dalla Scandinavia al Mediterraneo, e raggiungendo in numero ragguardevole le lontane isole Britanniche; il primo ad avvertire questo singolare esodo fu l'illustre Ornitologo di Varsavia Taczanowski; egli aveva ricevuto un primo Sirratte ucciso a Plock in Polonia il 21 aprile; dalle notizie raccolte dal dott. A. B. Meyer risulta però che già nella seconda quindicina di febbraio fu veduto un Sirratte isolato a Trebnitz¹ nel Bradenburgo. L'Italia fu attraversata obliquamente nelle sue provincie N. E. e centrali soltanto, dal lembo inferiore estremo della massa migrante; ma anche per noi è stato un avvenimento ornitologico di non piccola importanza.

Per ciò che ci riguarda il mio carissimo amico e collega conte Tommaso Salvadori ha pubblicato già due interessanti note,² nelle quali egli ha raccolto con pochissime omissioni tutte le notizie sulla irruzione del Sirratte in

¹ A. B. MEYER u. F. HELM, III. *Jahresbericht* (1887) *der ornithologischen beobachtungstationen im Königreich Sachsen. Nebst über das vorkommen des Steppenuhns in Europa im jahre 1888*. p. 119. DRESDEN, 1888.

² T. SALVADORI. *Il Sirratte in Italia nella primavera 1888* (*Boll. dei Musei di Zool. ed Anat. Comp. della R. Università di Torino*, III, N. 47). — ID. *Nuove notizie intorno al Sirratte in Italia nel 1888* (*Ibid.* III, N. 52) TORINO, 1888.

Italia. Altre notizie isolate furono pubblicate dal « *Bollettino del Naturalista* » di Siena, e da periodici cinegetici ed anco politici. Io non darò che un riassunto complessivo di questa singolare invasione, per la parte che riguarda l'Italia e lo darò in ordine geografico e cronologico.

Veneto: Il 24 aprile un branchetto di 8 a Montagnana, Padova, 2 vennero presi. Il 28 aprile uno preso vivo a Palmanuova, Udine. Il 3 maggio uno ucciso a Villabartolomea, Verona. Il 6 maggio un branco di 20 e due branchetti di 4 e 2 individui a Schio, Vicenza; tre catturati. Alla metà di maggio uno preso vivo presso Trieste. Il 23 maggio uno ucciso a Camposampiero, Padova. Il 27 maggio uno preso vivo a Cavanella Po, Rovigo. Alla metà di luglio uno fu preso vivo a Lanischie, Istria. Il 10 ottobre, un maschio morto fu acquistato sul mercato di Padova dal signor D. Stefanoni, era stato preso vivo colle reti qualche mese addietro (maggio?) da un contadino, nel comune di Cervarese, ove se ne erano veduti 8 o 10 (*Boll. Naturalista* VIII, p. 156). Il 29 novembre sopra una spianata a circa 1 chilometro ad O. di Verona un maschio isolato venne ucciso da un cacciatore ed andò in possesso del conte F. Cipolla di quella città (*Boll. Naturalista* VIII, p. 164); il 6 gennaio 1889, una femmina venne uccisa a Vallese, Verona; anch'essa fu preparata dal signor V. Dal Nero ed è in possesso del conte Cipolla (*Boll. Nat.* IX, p. 38). Uno è stato ucciso a Cavalese in Val di Fiemme, senza data, quindi dubbioso (*Soc. ornit. Vienna in Boll. Naturalista*, VIII, p. 137). Anche in Dalmazia è indicata in modo dubbioso la comparsa di un branchetto, il 9 maggio dal Meyer (*Op. cit.* p. 122).

Lombardia: Alla metà di maggio uno preso vivo nel Mantovano. Il 25 ottobre una femmina uccisa a Montechiari, Brescia, dal signor A. Fortunato, donata al signor E. Mettica di Gambara (*Boll. Naturalista*, VIII, p. 164).

Emilia: Principio di maggio, 3 veduti a Mercato Saraceno, Forlì; 1 preso vivo. Il 13 maggio 16 veduti a Solarolo, Faenza; 7 catturati. Ancora il 13 maggio 3 veduti a Casanola, Faenza: 2 presi. Pure il 13 maggio, 3 veduti a Bellaria,

Cesenatico; 2 catturati. Il 27 *maggio* uno ucciso presso Pannocchia a 15 chilometri da Parma. Il 9 *settembre* due veduti a Budrio, Bologna; uno ucciso.

Marche: A Fano, Pesaro, il 1 *maggio* un branchetto di 6, di cui due presi; il 3 *maggio* uno veduto e colto vivo; il 5 *maggio*, veduti 4; uno preso. Si hanno notizie incerte del passaggio di SIRRATTI anche più a mezzogiorno verso Porto S. Giorgio alla fine d'aprile e nel maggio.

Lazio: Il 15 *maggio* uno venne catturato vivo a S. Severa, tra Palo e Civitavecchia; era isolato.

Umbria: Il 28 *maggio*, 7 veduti ed uno preso a Orvieto.

Toscana: Il 28 *maggio* 4 furono veduti e due uccisi nella R. tenuta di S. Rossore presso Pisa; fu il dott. A. B. Meyer che diede per primo questa notizia senza indicare la sorgente; ho poi saputo che effettivamente il professore Richiardi ebbe un maschio ed una femmina di questa specie presi a S. Rossore e li conserva nel Museo Zoologico della R. Università di Pisa.

Liguria: Il 25 o 26 *maggio*, 4 veduti e due uccisi, in riva alla Magra presso Sarzana; uno venne portato su quel mercato, ma poi fatto scomparire per tema di contravvenzione. Ebbi questa notizia dal signor C. De Lamotte, il quale mi descrisse in modo preciso quel SIRRATTE.

Sarebbero in complesso circa 110 individui veduti e 41 catturati in Italia: non pare che il SIRRATTE si facesse vedere nelle nostre provincie meridionali, e neppure nelle nostre isole: debbo però rammentare che il dott. Meyer (*Op. cit.* p. 123) cita in modo dubbioso una comparsa di SIRRATTI nei pressi di Palermo verso la metà di maggio, della quale nè il Salvadori nè io abbiamo potuto avere notizie. Credo anch'io col Salvadori che i pochi individui presi o veduti in Italia nell'estate, nell'autunno e debbo aggiungere nell'inverno, siano individui spersi e rimasti indietro anzichè segnanti un ripasso. Infine non mi consta che questa specie abbia nidificato da noi: ciò pare però essere avvenuto altrove nell'Europa centrale od occidentale, durante l'estate del 1888.

GALLINÆ.

PHASIANIDÆ

(Fagiani).

328. *Phasianus colchicus*, Linn. (ex Gesn.)

FAGIANO.

Calabrie : Questa specie viveva allo stato libero in Calabria ai tempi dello storico calabrese padre Fiore, monaco di Lopani, e sarebbe estinta da circa un secolo (*De Fiore*).

PERDICIDÆ

(Pernici).

329. *Fringilla vulgaris*, Steph. (ex Gesn.)

FRANCOLINO.

Il Salvadori (*Ucc. Ital.* pag. 108) crede non improbabile che questa specie sia stata importata in Sicilia al tempo delle Crociate; io non sarei di tale avviso.

Calabrie : Questa specie è interamente scomparsa da noi, da quanto ho potuto sapere gli ultimi due furono uccisi a Gerace, prov. di Reggio, sull' Ionio, nel 1857 circa. Molto probabilmente questa specie è la « *Pernice gallo* » che i vecchi cacciatori ricordano e dicono specie scomparsa (*De Fiore*).

Sicilia: Nel distretto di Terranova, prov. di Caltanissetta, un tempo era comune questa specie, e sino ai primi del presente secolo si trovava in grande abbondanza nell'ex-feudo Cutomino, ai confini del territorio di Caltagirone. Di là, lungo il fiume Gela ed il torrente Cimia il Francolino, scendeva sino nei pressi di Terranova, ed in quell'epoca, secondo la testimonianza di vecchi, se ne uccidevano spesso lungo quei corsi d'acqua e anco nella contrada Pezza di Iungi in prossimità all'abitato. In abbondanza si trovava pure nei terreni umidi degli ex-feudi Falconara, Desusino e Carrubba, già proprietà dei principi di Butera, poi del principe Radali Wilding ed oggi del barone Gabriele Chiaramonte Bondonaro, in territorio di Butera, non discosti dal mare e da Terranova. Colà i Francolini trovavano condizioni favorevoli nelle estese terre basse attraversate da torrenti, canali e fossati, e coperte tutte di canne, giunchi e cespugli. A cagione della sua bellezza e della squisitezza delle sue carni il Francolino era molto ricercato, gli si dava caccia accanita, e se ne uccidevano in buon numero. — Verso gli anni 1844 e 45 trovandomi per qualche tempo nel Castello Falconara, non vi era giorno che i campieri di quella Baronìa non ce ne portassero uccisi parecchi. Io ne ebbi ad uccidere molti; ma non mi fu dato mai averne uno vivo: nè potei far vivere quelli che mi riuscì prendere feriti. — Diverse persone ne ebbero vivi, e li tennero in gabbia per molti anni. Li nutrivano di grani di frumento.

Si diceva che il Francolino dopo essere stato sorpreso per tre volte consecutive non poteva più volare, e si faceva prendere con le mani. — Ciò non era facile, dappoichè il Francolino ha un volo celere e basso più della pernice, e mentre pare voglia posarsi ad ogni istante, percorre un lunghissimo tratto pria di risolversi; poi non si trova mai nel punto dove si è visto posare, perchè ha un cammino molto celere, e va a cercare i luoghi adatti ad appiattarsi. Il Francolino se non è inseguito dall'Uomo o dai cacciatori, non vola mai. — Spesso trovandomi a cavallo mi fu dato, varie volte, vederne qualcuno camminare, o ac-

covacciato a terra a pochi passi da me. Esso è simile alla quaglia, che preferisce accovacciarsi, anzichè volare quando le passa un uomo vicino.

Dopo che tutti quei terreni furono dissodati e messi a coltura incominciarono i Francolini a diminuire di numero; ma si sarebbero mantenuti ancora per molti anni, giacchè sarebbero loro bastate le canne palustri, i giunchi, i cespugli e tante altre piante, che rimanevano ancora ai margini dei torrenti, fossati, corsi d'acqua, ecc., colà esistenti se non fossero stati dall' Uomo sterminati. Credo che non vi fosse una legge che ne vietava la caccia al tempo della cova, e se vi era, non veniva osservata, come non si osserva adesso in alcuni paesi. — In quell' ultima epoca (credo sia stato nel 1847) un giorno nel mese di maggio mi trovava a far seminare a cotone un pezzo di terra che io tenea a gabella a Desusino. In mezzo ai seminati di frumento che si avvicinavano alla maturazione, da ogni punto si sentivano cantare Francolini in gran numero come fanno le quaglie nei campi all'istesso mese. Da principio non mi lasciai vincere perchè era il tempo della cova e capiva il danno che si faceva uccidendo una femmina. Ma non cessavano di cantare, ed alcuni vicinissimi al punto dove stava; e la provocazione permanente finì coll'essere più forte di me: presi il fucile, i cani, e con un individuo ch'era con me, sperando di uccidere qualche maschio, ci dirigemmo verso dove veniva il canto. Appena fatti tre o quattrocento passi, venne fuori un Francolino, gli si tirò, e cadde: con dispiacere osservai essere una femmina. Di seguito in meno di mezz'ora ne uccidemmo altri due, ed erano pure femmine, e portavano tutte al petto ed all'addome i segni che erano sulle uova. Vidi il danno che avea fatto e tornai indietro dispiacentissimo.

Ad affrettarne la sparizione poi molto contribuì il capriccio di un uomo. — Esso fu il canonico vicario Don Paolo Ventura di Terranova, il quale prefissosi di addomesticare il Francolino pensò di farne covare da galline domestiche le uova, e quindi farne allevare i pulcini, senza

calcolare l'impossibilità della riuscita. Per un corso di anni tre si faceva portare dai contadini, che ben remunerava, quante nidiate potean capitare. Varie volte gli riuscì vederli schiudere, ma subito li vedeva morire. — È la madre quella che per un istinto naturale porta i pulcini appena nati in quel terreno, ove in abbondanza si trovano formiche ed altri insetti che servono alla prima nutrizione di questi uccelletti: non potendo i medesimi nutrirsi di grani nei primi giorni di loro vita, come pretendea il suaccennato canonico Ventura.

Grado grado i Francolini andarono diminuendo sino che sparirono del tutto. — L'ultima coppia che io vidi fu nel 1864. In ogni anno per tre o quattro giorni io era avvezzo, con alcuni amici e cacciatori, a far la caccia per il Natale. — Il 24 dicembre di quell'anno, passando per le terre del Desusino per la caccia al coniglio ed alla lepre, inaspettatamente (chè da qualche tempo non se ne vedea più) volò una coppia di Francolini, un maschio ed una femmina, che furono entrambi uccisi. Da allora non se ne videro più e non fu a mia conoscenza ciò che rapporta l'egregio professore Doderlein che l'ultimo Francolino sia stato ucciso nella tenuta Falconara, presso Terranova nell'autunno 1869, e che sia stato mangiato in un banchetto dato a Terranova. — Ciò ha dovuto esser vero perchè il distinto naturalista non l'avrebbe detto certo; ha dovuto essergli riferito quando verso il 1870 egli nelle sue escursioni fu qui in Terranova di passaggio. — In quei tempi, quando il Francolino era in abbondanza come ho detto avanti, non vi era casa di persone agiate che non avesse una o due coppie di questi volatili, ed io ne avea pure un paio. Per essere male preparati e non preservati dalla polvere, perchè tenuti da tutti sui comò od altri mobili, andarono tutti perduti. Per quante ricerche io abbia fatte in quest'ultimi tempi per avere qualche avanzo di tali animali preparati non mi è riuscito ritrovare che un solo maschio, bastantemente in cattivo stato, nella casa qui appartenente al comm. Giuseppe Di Menza, Consigliere di

Corte di Appello in Palermo. Lo richiesi al di lui cognato sig. Giuseppe Di Bartolo che abita quella casa. Mi rispose che quello avea un gran valore, dappoichè anni addietro quando avea pure la femmina, che fu distrutta da un gatto, gli fecero comprendere che glie l'avrebbero pagati ad un prezzo elevatissimo, e perciò non ho creduto di insistere per ottenerlo. Io voleva avere questo avanzo di Francolino, per poterlo spedire al commendatore prof. Giglioli Direttore dell' Ufficio Ornitologico in Firenze, onde poterlo conservare come reliquia dei Francolini di Terranova.

Sono di opinione che il Francolino non fosse originario di Sicilia, ma importato invece nel secolo precedente a questo od anche prima, da proprietari di grandissime estensioni di terre, che restavano in parte inculte. giacchè allora la coltivazione in Sicilia era ben limitata, e diventavano le loro bandite. — A sostegno di tale mia opinione, domando: dove si trovava il Francolino? Lo dissi in principio di questo mio scritto, e lo ripeto ancora: nell'ex-feudo Cutomino tra Caltagirone e Terranova. feudo appartenente ai principi di S. Elia; e nei feudi Carrubba, Desusino, Falconara. alla parte Ovest da Terranova, e distanti da questa città dieci chilometri, di proprietà un tempo, con altre tenute, della Casa dei principi di Butera. Il Francolino è uccello sedentario nel vero senso della parola, e circoscritto in quelle poche terre in cui trova le condizioni proprie per star bene; e può applicarsi ad esso quella frase usata dai nostri cacciatori per il coniglio: *muore dove nasce*. Non fa uso delle ali, se non quando vi è costretto dai cani e dal cacciatore. Mai fu veduto volare un Francolino di moto proprio: quindi questo uccello per mutar luogo non può traversare grandi estensioni che non abbiano le condizioni istesse in cui vive, per andare a ritrovare queste condizioni a molta distanza. Infatti verso Licata e al di là dalla parte Ovest di Falconara e delle altre tenute, come pure dalla parte Est verso Siracusa non mancano terreni confacenti e conformi a quelli di Falconara, Desusino, ecc., anche per clima, e distanti da questi in modo che un vo-

latile di qualunque altra specie che non sia il Francolino, potrebbe andarli ad occupare; eppure il Francolino non vi andava.

Ma qui mi si potrebbe fare la seguente domanda. Avete detto in principio che il Francolino esisteva un tempo nel feudo Cutomino, che è distante circa 20 chilometri da Terranova, e che di là molti individui nel principio del presente secolo vennero sin sotto questa città? Come avveniva ciò? Rispondo con ciò che implicitamente dissi in principio di questo scritto. Che i Francolini vi scendevano per mezzo del fiume Gela e del torrente Cimìa, alle sponde dei quali, piene di canneti, giunchi e cespugli d'ogni sorta trovavano i luoghi opportuni per poter dimorare e camminare senza bisogno di adoprare le ali per venire sino alle vicinanze di Terranova. Ugualmente, se dalle terre Falconara e dalle altre tenute vi fossero stati fiumi, torrenti, o terre nelle eguali condizioni in continuazione di quelle esistenti nelle vicinanze di Licata cosicchè i Francolini avessero potuto recarvisi facilmente camminando, essi si sarebbero trovati anche colà. Ma non essendovene, sta la mia opinione che il Francolino non è originario di Sicilia, e che in Cutomino e Falconara fu importato da quei ricchi signori proprietari d'allora, per arricchirne le loro bandite.

Il Francolino è onnivoro. Nidifica in mezzo ai cespugli facendo una leggera escavazione nella terra, e rivestendola rozzamente di foglie, di steli ed erbe secche; ivi depone le uova che non sono mai meno di dieci, ed arrivano spesso a sedici. Non credo che il maschio prenda parte alla covatura; sono anzi piuttosto di parere contrario, perchè credo che i Francolini siano in ciò simili alle pernici ed alle quaglie.

Spero che questi brevi cenni non saranno fuor di luogo ed inopportuni, per togliere in alcuni il dubbio che in Terranova abbia esistito il Francolino (*Carvana*).

Il nome volgare di *Tritarè* deriva dal fatto che il Francolino si vendeva tre tarì (L. ital. 1,27), quando era comune nella piana di Finale, proprietà dei marchesi Gera-

ci; da molti anni è scomparso dal distretto delle Madonie. Potei disegnare a colori un Francolino ucciso a Terranova nel 1858. In Sicilia non esiste più (*Minà-Palumbo*).

330. *Perdix rufa* (Linn.) ex Gesn.

PERNICE.

Caccabis rufa, Salvad.

Pernis rossa, Pernixe rossa, Gambarossa, Marénga, Guastèsa, Parnis rossa, Pernis marenca (*Basso-Piem.*) — Cotourno, Cotornis (*Milano*) — Pernise rosso (*Vivenza*) — Spernisa foresta, Cotorno (*Padova*) — Pernise (*Spezia*) — Pernice, Coturnice (*Lucca*) — Pernice (*Marche*).

Piemonte: Frequente e sedentaria al piano e al monte in prov. di Cuneo; vi nidifica due volte, in aprile ed in giugno e ciascuna covata consta di 12 a 14 uova; la sola femmina le incuba per 18 a 20 giorni (*Albre*). Questa specie, una volta abbondantissima nel territorio di Voltaggio, Alessandria, da circa otto anni tende a scomparire affatto; la causa di ciò sta nella caccia micidiale che fanno sulla neve a questo uccello i montanari e nella distruzione dei nidi. Non è improbabile che durante gl'inverni rigidi quando per più settimane la neve cuopre il suolo ovunque, molte Pernici muoiano di fame; il 26 gennaio 1887 alcuni contadini mi recarono una Pernice uccisa a pallottolate di neve sui monti presso Voltaggio, essa era incapace di volare e pesava 198 grammi! Due della stessa nidata da me uccise il 22 dicembre 1886 pesavano 497 e 503 grammi. Nella parte montuosa della prov. di Alessandria trovai una varietà di questa specie, che si distingue sempre e in tutte le età per avere i piedi di color giallo-arancione e non rosso-corallini; sembra pure essere di dimensioni alquanto superiori (4 centimetri nella lunghezza) agli individui normali (*Camusso*).

Lombardia: Ebbi un esemplare la cui cattura in Val-

tellina non potè essere accertata con sicurezza (*Galli*). Frequente ai monti nella prov. di Milano (*Brambilla*). Piuttosto scarsa in Lombardia ove ha pure nidificato (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nidificante ed erratica nella prov. di Vicenza (*Molari*). Rarissima nella prov. di Padova; ne ebbi una in carne presa nelle vicinanze della città nel settembre 1882 (*Arrigoni*).

Emilia: Sedentaria, ma scarsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentaria, ma scarsa in collina nel Nizzardo (*Gal*). Comune e sedentaria nelle valli montuose nel distretto di Savona (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente e sedentaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Quasi scomparsa dalla prov. di Lucca, ove in certe località ai monti era sedentaria (*Martorelli*); nel marzo 1883 presso Monte S. Quirico, ne incontrai una brigata che sembrava essere di passo (*Fontebuoni*). Accidentale in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentaria, ma non abbondante nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci, Marri*). Comune e sedentaria ai monti nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*).

Marche: Sedentaria e comune (*Comizio agrario Fabriano*).

331. *Perdix saxatilis*, Meyer

COTURNICE.

Caccabis saxatilis, Salvad.

Crombera, Cômbéa, Pernixe cômbéa (*Basso-Piem.*) — Parnigia (*Nov.*) — Coatòrn (*Feltre*) — Cotòr, Catòr (*Friuli*) — Perdis couloubana (*Nizza*) — Cotórnesa (*Spezia*) — Pernice (*Marche, Abruzzo*) — Pernici (*Calabr.*) — Telytza (*Albanesi italici*) — Pernici, ad., Pirnicaru, giov. (*Modica*).

A proposito di quanto ho già detto intorno alla presunta presenza della *P. chukar* alle frontiere orientali della regione italica (*Arif. Ital.* p. 339) debbo una rettificazione a Lord Lilford, il quale mi scrive che la Pernice di Corfù, Cefalonia e Santa Maura (Isole Ionie), è senza dubbio la *P. sawatilis*; mentre che a Candia ed a Cipro (e, posso dire per esame di esemplari, nelle isole vicine ed in quelle orientali dell'Arcipelago greco, come Karpatos), vive la *P. chukar*.

Piemonte : Frequente e sedentaria in montagna nella prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta, nel maggio; le uova deposte sono da 10 a 14, la incubazione, fatta dalla femmina, dura da 18 a 20 giorni (*Abre*). Comune e sedentaria sulle Alpi, in prov. di Torino (*Martorelli*). Da circa 10 anni è quasi affatto scomparsa dal territorio di Valtaggio, Alessandria, ove era abbastanza comune; e ciò in seguito a caccia spietata, specialmente in tempo di neve. Ora qualche coppia trovasi nei monti a S. E. ed in quelli ad O. della prov. di Alessandria (*Camusso*). Comune e sedentaria nell'Osola (*Bazetta*). Così nella Valsesia e nei distretti di Crodo e Piedimulera, Novara (*Guarinoni, Demori, Danisi*).

Lombardia : Comunissima sui monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nel Comasco è specie sedentaria, ma diventa erratica nella prima metà del novembre (*Regazzoni*; di casuale comparsa nel novembre (*Bernasconi*). Scarsa ai monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Generalmente comune ai monti in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune sui monti elevati nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Nidificante ed erratica nella prov. di Vicenza (*Molari*; sedentaria ai monti nel distretto di Bassano (*Ferrari*). Frequente tuttora, ma in diminuzione, nel Cadore, Belluno, ove è sedentaria ai monti: alleva una o due covate di 16 a 18 uova in giugno e luglio (*Tissi*; così nel distretto di Feltre, ove è in aumento (*Delaito*). Comune assai e sedentaria ai monti ed ai colli nel Friuli; nidifica nel maggio (*Vallon*); diventa erratica nell'inverno e va diminuendo (*Del Torre*). Rarissima nella prov. di Padova: ne ebbi una colta sui colli presso Padova nell'ottobre 1875 (*Arrigoni*).

Emilia: Abbastanza frequente e sedentaria sugli alti monti nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Sedentaria e abbastanza comune sui monti nel Nizzardo (*Gal*). Rarissima oggi e forse scomparsa dal distretto di Spezia, ove una volta era sedentaria, sui monti di Biassa e all'estremità dei monti fra il mare e la Magra, capo Corvo (*Carazzi*).

Toscana: Rara sui monti nel Casentino, Arezzo (*Beni*).

Marche: Scarsa, ma sedentaria ai monti (*Paolucci*).

Puglie: Di comparsa accidentale, giunge dalla vicina Basilicata ove è sedentaria, ma scarsa (*De Romita*).

Calabrie: Comune e sedentaria nella prov. di Reggio: va però scarseggiando; diventa erratica dal novembre al gennaio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune e sedentaria ai monti e colli nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Frequente e sedentaria ai monti in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Comune e sedentaria ai monti e colli nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente e sedentaria ai monti e colli nel distretto delle Madonie, Palermo; in un nido si trovarono 39 uova, probabilmente deposte da due femmine (*Palumbo, Morici*).

332. *Perdix petrosa* (J. F. Gmel.)

PERNICE SARDA.

Caccabis petrosa, Salvad.

Predixi, Predixis (*Sardegna*) — Pudda de mata (*Fonni*).

Sardegna: Comune e sedentaria in tutta l'isola; ebbi due esemplari del tutto sbiaditi, tendenti cioè all'isabellismo od albinismo (*Bonomi*).

333. *Starna Perdix* (Linn.) (ex Gesn.)

STARNA.

Perdix cinerea, Salvad.

Sterla, Sterlùs (*Alba*) — Stèrletta, Pernis stèrna, Pernis grisa, Stèrna, Parnis grisa (*Basso-Piem.*) — Perniss (*Mantov.*) — Perniseta (*Valt. Como*) — Pernise (*Cadore*) — Spernisa (*Padova*) — Pernisoto, Pernise piccola (*Vicenza*) — Pernis, Parnis (*Feltre*) — Sterla (*Savona*) — Starna (*Spezia, Marche*) — Starna (*Calabr.*).

Piemonte : Frequente e sedentaria al monte e al piano in prov. di Cuneo; nidifica due volte, in aprile ed in giugno, ciascuna covata consta di 8 a 14 uova che la femmina incuba per 18 a 20 giorni (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca, Pezzi*); in autunno è più abbondante e anche di passaggio, secondo i cacciatori, certo scende in questa stagione dai monti più alti alle colline ed al piano (*Martorelli*). Comune ed ancora abbondante in tutta la prov. di Alessandria, più però al colle che al monte ed al piano, e sedentaria ovunque. I cacciatori tutti della regione montuosa ammettono quale *specie distinta* una varietà più piccola di questo uccello, da essi chiamato *Stèrletta* od anche *Stèrna di passaggio*, che ha infatti abitudini nomadi; oltre alle dimensioni minori si distingue dalla Starna normale per la mancanza della macchia castagna sul petto, pel becco più breve, per il tarso più corto e colorato di giallo-sudicio ¹ (*Camusso*). Comune al piano nell'Ossola, rarissima al monte (*Bazetta*). Sedentaria in Valsesia (*Guarinoni*).

¹ Anch'io credo coll'egregio Camusso che questa sia quella che venne distinta da antichi Autori col nome di *Perdix Damascena*, ma non la ritengo specie distinta, e neppure una varietà; credo che trattisi semplicemente di individui giovani i quali anche in altre specie di uccelli sogliono vivere a parte ed avere abitudini alquanto diverse dagli adulti.

Lombardia: Comunissima in collina nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nel Comasco si verifica un passo di Starne nella prima metà di ottobre, vi è anco specie sedentaria e nidificante (*Regazzoni*); è nidificante in provincia, ma passa altresì in numerosi stormi verso la prima metà di ottobre (*Bernasconi*). Scarsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Abbondante e sedentaria nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Comunissima nel distretto di Caprino, Verona (*Pellegrini*). Piuttosto frequente nella prov. di Vicenza (*Molari*); ove è sedentaria (*Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno: ove fa un passaggio in aprile e settembre (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove è in aumento (*Delaito*). Comunissima e sedentaria nel Friuli; nidifica già l' 11 aprile (*Vallon*); diventa erratica nell'inverno (*Del Torre*). Sedentaria nella prov. di Padova, ove è divenuta rara e localizzata in pochi punti dei Colli Euganei (*Arri-goni*). Rara, ma sedentaria nella prov. di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Frequente e sedentaria nella zona delle Quercie nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: È assai dubbioso se questa specie giunga spontaneamente nel Nizzardo (*Gal*). Comune e sedentaria nelle valli, anche coltivate, nel distretto di Savona (*Piccone*). Rara in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente e sedentaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Poco comune e sedentaria nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune e sedentaria in collina nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*): scarsa in quello di Lavajano (*Papasogli*); vive sedentaria e si riproduce in gran numero nel distretto di Cedri, attesa la cura che si ha di distruggere le Volpi, le Gazzere ed altri nemici diretti, e col procurare che nell'estate le Starne trovino acqua sulle colline ove vivono; nell'ottobre forti brigate di 30 e 40 individui si mostrano erratiche o compiono una migra-

zione parziale (*Degli Alessandri*). Accidentale in poggio nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*), piuttosto frequente ai monti (*Turchetti*); sedentaria in quello d'Empoli (*Fucini*); frequente e sedentaria nei distretti di Fiesole e Signa (*Gargioli*, *Fontebuoni*); si distingue in « bottaccia » e « scopina; » in novembre alcune viaggiano (*Fontebuoni*). Comune e sedentaria nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*); si distingue la razza « stipajola » che fu assai abbondante nel 1887 (*Fiorini*). Comune e sedentaria in Val di Chiana, scende al piano nel tardo autunno (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena; abbonda più in Val d'Orcia (*Bargagli*); sedentaria in quello di S. Gimignano (*Paolucci*, *Marri*). Comune e sedentaria nelle prov. di Siena e di Grosseto, meno però in questa (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*); quelle che covano sul monte Amiata scendono in basso col freddo, si dice siano una razza più piccola (*Dei*). Abbondantissima e sedentaria in Toscana: in novembre e dicembre diventa erratica in piccoli branchetti di 10 a 15 individui (*Roster*).

Marche : Comune e sedentaria in collina (*Paolucci*).

Lazio : Abbondante e sedentaria al piano ed in collina nel distretto di Montefiascone, Viterbo; distinguonsi due razze, una grande o « reale, » l'altra piccola detta « naturale » (*Mimmi*).

Abruzzi : Frequente ovunque e sedentaria nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Puglie : Sedentaria, non infrequente, ma neanche abbondante (*De Romita*).

Calabrie : Comune ovunque e sedentaria nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune una volta nella piana di Palme, è ora affatto scomparsa (*Moretti*).

334. *Coturnix communis*, Bonnat. ex Gessl.)

QUAGLIA.

Quaia, Quágia (*Basso-Piem.*) — Maggenghi giov., Quagliastro, Pitte (*Milano*) — Quaia, Quaiat, Palpaquà (*Andora*)

— Quajót (*Feltre*) — Quajo, Quagio, Quajastróni (*Padova*)
— Caglera (*Nizza*) — Quaggia (*Savona*) — Quagia (*Spezia*) —
Quaggia, Quaija (*Calabr.*) — Quagliari (*Sard.*).

Piemonte: Nella prov. di Cuneo è frequente al piano e al monte: si riproduce due volte, in maggio ed in luglio, depone da 6 a 10 uova per covata, incubate dalla sola femmina per 16 a 18 giorni. Tutti gl'inverni si trova qualche Quaglia nell'alveo del fiume Stura nei cespugli di Tamarici; il 24 dicembre 1880 io stesso ne uccisi due nella Stura di fronte alla stazione ferroviaria di Cuneo; il 15 febbraio 1886 ne trovai una in una stoppia di grano saraceno e poco distante da Cuneo (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino; ne ebbi una isabellina (*Gasca*); giunge agli ultimi di aprile o ai primi di maggio e nidifica in abbondanza (*Martorelli*). Nella prov. di Alessandria giunge in gran copia al piano a primavera inoltrata, nidifica e rimane a tutto settembre (*Camusso*). Nell'Ossola giunge in maggio, nidifica anche ai 1000 metri e parte in settembre (*Bazetta*). Rara di passaggio primaverile nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*); in Valsesia fa una sola covata di 10 a 16 uova nel giugno (*Guarinoni*).

Lombardia: Comunissima, specialmente al piano, nella prov. di Sondrio (*Galli*). Nel Comasco giunge in aprile, in abbondanza, viaggia di notte; poche coppie rimangono a nidificare e tra il 15 agosto ed il 15 settembre ha luogo un copioso ripasso (*Rosales*). Frequente ovunque nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*). Abbondante dall'aprile al novembre nella prov. di Cremona; poche rimangono a svernare (*Ferragni*). Comunissima in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*,¹ *Borromeo*); colta due volte nel gennaio (*Turati*).

Veneto: Piuttosto frequente in autunno nel distretto di

¹ Il conte Turati annovera pure l'esemplare del *Syncoicus Lodoisic*, Verr. che egli esaminò in carne il giorno dopo la sua presa. Io ritengo che quell'uccello non fosse che una varietà melanica della Quaglia comune (Vedi *Avifauna Italica* p. 342).

Caprino, Verona (*Pellegrini*). Nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*); ove è ovunque frequente (*Ferrari, Vittorelli*). Frequente e nidificante nel Cadore, Belluno, ove fa passaggio in maggio ed agosto (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, ove passa anche nel luglio: rare volte si rinvencono individui durante l'inverno (*Delaito*). Comune assai nel Friuli; in gran copia arriva in aprile, nidifica in maggio ed in luglio, parte o ripassa in ottobre assai numerosa; qualcuna si vede in novembre e dicembre (*Vallon, Del Torre*). È assai comune nella prov. di Padova, generalmente estiva, ma qualcuna rimane l'inverno: ne furono prese nel gennaio del 1883 e 1887 e nel dicembre 1886 (*Arrigoni*). Abbondante in quella di Rovigo, ove qualcuna sverna (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarsa ed estiva nel distretto di Vergato, Bologna; nel 1886 vi fu però un passaggio straordinariamente abbondante (*Lorenzini*). Estiva e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Mediocrementemente abbondante, ma solo durante il passo primaverile nel distretto di Savona: casualmente ne furono presi due alla fine del dicembre 1874 presso Zinola, Vado, e ancora nella stessa località il 22 ottobre 1877 (*Pecorelli*). Comune da aprile a giugno nel distretto di Arenzano: qualche coppia delle più tardive vi rimane a nidificare: non si vede nell'autunno (*Luciani*). Giungono alla fine d'aprile e ripassano in settembre nel distretto di Spezia: una fu presa il 16 marzo 1887 a Sarzana (*Carazzi*).

Toscana: Nella prov. di Lucca è abbondante: giunge agli ultimi d'aprile ed ai primi di maggio, e al ripasso predilige le risaie (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comunissima, ma più al piano, e anche sedentaria nei distretti di Fauglia e Peccioli, Pisa (*Ott, Venerosi*). In quello di Lavajano le prime giungono alla fine di aprile, la massa nella prima metà di maggio; riparte in settembre: il passo primaverile è abbondante, quello d'autunno nullo in confronto a ciò che avviene nel prossimo litorale Livornese, ove nei

giorni di vento S. E., trovansi in quantità nel settembre (*Papasogli*). Comune nel distretto di Fucecchio, ove giunge in marzo-aprile-maggio e nidifica; qualcuna rimane anche l'inverno (*Lenzi, Turchetti*); nel distretto d'Empoli partono o ripassano isolate dalla metà di agosto a tutto settembre; quelle che non covarono nel distretto vi si fermano assai poco (*Fucini*); frequente e nidificante nei distretti di Fiesole, Sesto e Signa, Firenze (*Gargioli, Fontebuoni*). Frequente nel Casentino, Arezzo, passa alla fine d'aprile ed in settembre (*Beni, Fiorini*): vi è anche nidificante (*Pauer*). Comunissima in Val di Chiana, giunge in aprile, nidifica in copia e parte alla fine d'agosto; qualcuna rimane l'inverno (*Griffoli*). Comune in estate al piano nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); estiva, ma non abbondante nel distretto di S. Gimignano (*Marri*). Abbondante dall'aprile al settembre, alcune svernano e sono sedentarie nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*); il grosso del passo primaverile è tra la metà d'aprile e quella di maggio, in agosto incominciano a partire i vecchi ed i giovani già robusti, gli ultimi a partire sono i giovani della seconda covata (*Dei*). Passa abbondante in maggio-giugno e nella prima metà di settembre all'isola di Giglio (*Bianchi*). Estiva e comune in Toscana, alleva due e forse tre covate (*Roster*).

Marche: Comune ovunque, giunge in aprile-giugno, nidifica in giugno e luglio, e parte in agosto-ottobre (*Paolucci*).

Lazio: Abbondante al piano nel distretto di Montefiascone, Viterbo; qualcuna vi è sedentaria: le più passano tra il 15 aprile ed il 15 maggio e dal 25 agosto al 10 novembre (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente; poche svernano nel distretto di Ielsi, Campobasso; le più giungono nella prima metà di aprile e partono in settembre e ottobre (*D'Amico*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). All'isola di Capri passa in copia dalla fine di marzo a tutto giugno e nel settembre; di rado qualcuna rimane a nidificare. La caccia delle Quaglie colle

reti costituisce una industria molto importante per l'isola: nel passaggio di maggio e in quello di settembre se ne prendono da 50 a 60 mila. Un solo dei varî incettatori nel 1886 ne mandò ai mercati di Napoli 11 mila in maggio e circa 10 mila in settembre (*Cerio*).

Puglie: Abbondantissima dalla seconda metà di aprile alla metà di maggio e anche nel giugno: molte rimangono a nidificare; partono e ripassano in settembre ed ottobre (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante, passa in maggio ed in ottobre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio, ove è pure nidificante; se ne fa strage in primavera al litorale ed in autunno nei vigneti (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Abbondantissima al piano alle epoche del passo e anche sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Abbondante di passo in aprile ed ottobre e anche sedentaria nel distretto di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Abbondante: giunge alla fine d'aprile e primi di maggio e parte in settembre-ottobre; non poche rimangono l'inverno sui piani litoranei. nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carcano*). Abbondante e nidificante nel distretto delle Madonie, Palermo; giunge in maggio e qualcuna rimane a svernare (*Palumbo, Morici*). Passa abbondante al litorale della prov. di Palermo tra il 15 aprile ed il 15 maggio: assai più scarso è il passo autunnale che s'inizia verso la metà di settembre (*Giannattasio*).

Sardegna: Comune di doppio passaggio e nidificante: ebbi un individuo isabellino (*Bonomi*).

TETRAONIDÆ

(Galli di monte).

335. Tetrao Urogallus, Linn. (ex Gesn.)

GALLO CEDRONE.

Urogallus vulgaris, Salvad.

Cedroun, Gall cedrôun (*Milano*) — Galzhedron, Grotòn (*Cadore*) — Zhédron (*Feltre*) — Giall çedron (*Friuli*).

Nel Museo Civico di Rovereto, Trentino, ho veduto un altro bell'individuo maschio, ibrido tra questa e la specie seguente; era stato ucciso su quei monti.

Piemonte: A proposito della estinzione dell'Urogallo nelle nostre Alpi occidentali il capitano (†. Bazetta riferisce che da un libro intitolato « *Il padre di famiglia* » di Jacopo Antonio Albertazzi, edito a Vercelli nel 1740, risulta che a quell'epoca questo magnifico uccello era comune nell'Ossola, ove oggi neanche i più vecchi lo ricordano. Questa specie è annoverata nell'elenco degli uccelli della prov. di Novara, inviato dal cav. Rodino, senza notizie; solo il signor Guarinoni la menziona tra le specie rare in Valsesia (*Giglioli*).

Lombardia: Trovasi ancora sulle montagne nella prov. di Milano (*Brambilla*). Raro ai monti nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Scarso e sedentario sui monti nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Scarso in montagna e sedentario nel Cadore, Belluno; ove preferisce i boschi di abete bianco; vi nidifica a terra al riparo di qualche cespuglio, depone 5 a 6 uova nel giugno ed alleva una sola covata; ogni anno nel Cadore ne vengono presi circa 800; è in diminuzione

(*Tissi*). Così nel distretto di Feltre, ove nidifica nel maggio ed ove ben pochi si prendono (*Delaite*). Nel Friuli è scarso e sedentario in montagna, e va diventando più raro; nell'autunno inoltrato molti individui vengono uccisi e non pochi compaiono sul mercato di Udine (*Vallon*). Nidifica sopra Paluzza ed in diversi punti della Carnia; è ancora abbastanza frequente in quei boschi, ove è affatto sedentario, ma i pastori ed i loro cani fanno strage dei giovani (*Del Torre*).

336. *Lyrurus Tetrix* (Linn.)

FAGIANO DI MONTE.

Tetrao tetrix, Salvad.

Fasan (*Piem.*) — Sterlea, Gall d'muntagna, Gall salvadegh, Gallina, fem. (*Valt.*) — Gallina de montagna, Fasanello de montagna, femm. (*Milano*) — Gal forzhel, Gal lauriot (*Cadore*) — Forzhel (*Feltre*) — Gialine forcèle (*Friuli*) — Gallo marino (*Garf.*).

Piemonte: Scarso e sedentario in montagna nella prov. di Cuneo; si riproduce una sola volta, nel giugno; le uova deposte sono da 6 a 10 e vengono incubate dalla femmina soltanto per 18 a 20 giorni (*Albre*). Comune nella prov. di Torino nelle alte foreste alpine, va però diminuendo di numero (*Martorelli*). Sui monti dell'Ossola, Novara, questa specie si fa ogni anno più scarsa e scomparirà affatto se non si provvede (*Pertusi*); comune e sedentaria nell'Ossola (*Bazzetta*). Mediocrementemente comune, e sedentario nei distretti di Varallo, Crodo e Piedimulera; nella Valsesia fa una sola covata di 6 a 10 uova nel maggio (*Guarisoni, Demori, Davisio*).

Lombardia: Comune, ma in diminuzione, e sedentario sugli alti monti nella Valtellina (*Galli*). Di accidentale comparsa nel Comasco (*Regazzoni*); due individui furono presi a Pallanza, Novara, nell'autunno 1872 (*Bernasconi*). Scarso

ai monti nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in montagna nella prov. di Milano (*Brambilla*). Generalmente raro in montagna nella Lombardia; (*Turati*); frequente (*Borromeo*).

Veneto : Raro se non scomparso sul monte Baldo nella prov. di Verona, circa quattro anni fa vi era alquanto frequente; la caccia spietata ed il diboscamento lo hanno distrutto (*Pellegrini*). Scarso e sedentario sui monti nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Scarso e sedentario ai monti nel Cadore, Belluno; predilige i boschi di pino mugo, vi nidifica a terra al riparo di cespugli, depone 7 a 9 uova nel giugno ed alleva una sola covata; è in diminuzione (*Tissi*); così nel distretto di Feltre (*Delaito*). Abbastanza frequente ai monti nel Friuli, ove è sedentario (*Vallon*); ne uccisi sopra Paularo in Carnia, ove è sedentario (*Del Torre*). A proposito della cattura di due individui di questa specie a S. Giorgio di Lesina (*Avif. Ital.* p. 344), l'amico mio professor G. Kolombatovic' mi scrive: « Dei due *L. Tetrix* di cui menzionai la cattura avvenuta a S. Giorgio di Lesina, aveva avuto la caratteristica coda pochi giorni dopo che erano stati uccisi » (*Giglioli*).

Liguria : Sedentario in montagna nel Nizzardo, verso il Colle di Tenda specialmente (*Gal*).

337. *Bonasa betulina* (Scop.)

FRANCOLINO DI MONTE.

Francolîn (*Milano*) — Francolîn (*Cadore, Feltre, Friuli*).

Nella raccolta ornitologica del conte senatore G. B. Camozzi Vertova alla Ranica presso Bergamo, ho recentemente veluto un uccello che pare essere un ibrido tra questa specie ed il *Lagopus mutus*; fu ucciso in Val Seriana superiore, sopra ad Ardesio, nella primavera 1845 o 1846. È il primo caso di un tale ibridismo che vedo e di cui ho notizia. Sono ben noti gli ibridi tra il *Tetrao Urogallus* ed il *Ly-*

rurus Tetræ di cui ho fatto menzione anche qui; ed il mio amico prof. R. Collett mi ha fatto vedere a Cristiania una bella serie di ibridi tra il *Lyrurus Tetræ* ed il *Lagopus albus*, che furono oggetto di un interessante suo scritto (*Proc. Zool. Soc. London*, 1886, p. 224, pl. XXI, XXII). Ma per quanto mi risulta nessuno sino ad oggi ha dato notizia dell'ibrido tra la *Bonasa betulina* ed il *Lagopus mutus*; il Collett (*Op. cit.* p. 237) rammenta però il caso da lui veduto di un ibrido tra la *B. betulina* ed il *Lagopus albus*; questo interessante esemplare si conserva nel Museo di Upsala e venne preso nel Jemtland (Svezia) nel dicembre del 1884.

Piemonte: Specie non abbondante, ma sedentaria nel distretto di Piedimulera, Novara (*Danisi*).

Lombardia: Comune, ma va diminuendo nella prov. di Sondrio: sedentario sui monti, scende talvolta al piano (*Galli*). Frequente in montagna nella prov. di Milano (*Brambilla*). Generalmente raro sui monti in Lombardia (*Turati*): sedentario e piuttosto frequente (*Borromeo*).

Veneto: Scarso e sedentario sui monti nella prov. di Vicenza (*Molari, Ferrari*). Frequente e sedentario ai monti nel Cadore, Belluno; abita i boschi di alto fusto e vi nidifica a terra allevando due covate di 10 a 12 nel giugno e luglio; fa una specie di passo nel marzo e nel settembre; è in diminuzione (*Tissi*). Scarso nel distretto di Feltre, ove alleva una sola covata nel giugno (*Delaito*). Non tanto raro e sedentario sui monti nel Friuli: nidifica nel maggio e scende più in basso nell'inverno (*Vallon*); nidificante in Carnia (*Del Torre*).

Liguria: Se non è scomparso affatto, è divenuto eccessivamente raro sulle Alpi Marittime nel Nizzardo (*Gab*).

338. *Lagopus mutus* (Montin) (ex Gesn.)

RONCASO.

Albèina, Albègna (*Val Soana*) — Francolin, Culmastur, Berna, Francoulin (*Nov.*) — Erbolana (*Lomb.*) — Roncass (*Berg.*) — Pernisa bianca, Gallinella de montagna (*Veron.*) — Pita da giara, Pita bianca (*Cadore*) — Galinèta, Bianchèta (*Feltre*) — Francolin blanc (*Friuli*).

Piemonte: Frequente e sedentario in montagna nella prov. di Cuneo; nidifica una sola volta, nel maggio; le uova deposte, da 8 a 10, sono incubate dalla femmina soltanto per 18 a 20 giorni (*Abre*). Lo trovai assai numeroso in alcuni punti delle Alpi Graie (Valle di Lanzo) nella prov. di Torino: alla metà di agosto i pulcini di una coppia erano poco più grossi di una Quaglia, per cui ho il dubbio che fossero di una seconda covata. In estate questa specie trovai solo nei luoghi più aspri e sassosi (*Martorelli*). Comune e sedentario sui monti nell'Ossola (*Bazetta*). Così nei distretti di Varallo e Crodo, Novara: nella Valsesia fa una sola covata di 8 a 15 uova nel maggio (*Guarinoni, Demori*).

Lombardia: Comune e sedentario sugli alti monti nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso sui monti in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in montagna nella prov. di Milano (*Brambilla*). Generalmente comune sui monti più alti nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non raro sul Monte Baldo nella prov. di Verona (*Pellegrini*). Scarso e sedentario sui monti nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e sedentario in montagna nel Cadore. Belluno: vive sulle vette tra le nude roccie, vi nidifica al riparo di un sasso, depone 7 a 8 uova ed alleva una sola covata in giugno e luglio (*Tissi*). Così nel distretto di Feltre, ove sembra essere in aumento (*Delaito*). Abbastanza frequente sugli alti monti nel Friuli, ove è sedentario (*Val-*

lon). Ne vidi in Carnia, ove abitano molto più in basso di quanto si crede; difficilmente si scosta dai luoghi prediletti, ma ne ebbi uno ucciso presso Cividale (*Del Torre*). Nell'inverno 1875 nelle Valli Veronesi, e precisamente nella località chiamata « la Torretta », vennero uccisi due individui di questa specie, io ne vidi uno a Legnago in carne (*Dal Fiume*).

Liguria: Sedentario e ancora abbastanza frequente sulle alte montagne nel Nizzardo (*Gal*).

HEMIPODII.

TURNICIDÆ

(*Turnici*).

339. *Turnix sylvatica* (Desfont.)

QUAGLIA TRE UNGHIE.

Taureddu (*Spaccaforro*) — Triungnia (*Terran. Sicil.*).

Calabrie: Rarissima; una venne uccisa presso Maida, prov. di Catanzaro, dal signor Attilio Callegari, nel settembre 1885, mentre cacciava le Quaglie (*De Fiore*).

Sicilia: Sedentaria nei piani arenosi nella prov. di Messina (*Pistone*). Scarsa, ma sedentaria nel distretto di Modica. Siracusa; nell'autunno sale ai monti e d'inverno scende al litorale (*Dellafonte, Garofalo*). Non tanto abbondante, ma sedentaria nel distretto di Terranova, Caltanissetta; abita il piano lungo il litorale, ove sono scopeti e cespugli (*Carvana*).

FULICARIÆ.

RALLIDÆ

(Gallinelle).

340. *Rallus aquaticus*, Linn. ex Aldrov.

GALLINELLA.

Pulétta d'acqua, Galinetta d'acqua (*Basso-Piem.*) — Grugnett (*Berg.*) — Giarègule (*Friuli*) — Sforzzhanòn, Sforzzhana (*Bell., Cadore*) — Viatara, Beccarossa (*Rovigo*) — Galinetta (*Arenzano*) — Galinetta du becco russo (*Savona*) — Polastra d'inverno, Folenga (*Spezia*) — Gambetta (*Pisa*) — Sporciglione (*Marche*) — Quaglia marina (*Foggia*) — Sporcighiune, Cosmeu (*Calabr.*) — Marranzanu, Jaddineddu di acqua (*Mess.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, vi nidifica una sola volta, nel maggio (*Abbré*). Così in quella di Torino, ove è specie sedentaria (*Gasca, Martorelli*). Comune nella prov. di Alessandria, ma di solo passo al piano (*Camusso*). Non comune nell'Ossola, alcune coppie vi nidificano; emigra (*Bazetta*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in pianura nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*; di passaggio nella prima metà di aprile e in ottobre (*Magretti*). Stazionaria e nidificante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Così in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*; vi nidifica ed il nido a cui

lavorano il maschio e la femmina sin dai primi di maggio, è fatto con erbe acquatiche poco intrecciate, di forma concava e alto un 16 centimetri: è appoggiato ai rialzi di terra in riva ai laghi e nel mezzo dei canneti o a folte di alte erbe acquatiche. Le uova da 7 ad 11 in numero, sono covate alternativamente dal maschio e dalla femmina; i pulcini si nutrono di piccoli molluschi e d'insetti (*Turati*).

Veneto : Di passaggio al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e nidificante al piano nel distretto di Feltre, Belluno, ove passa in marzo, aprile e settembre ed ottobre (*Delaito*). Comune durante l'inverno nel Friuli; giunge in settembre e parte in marzo; qualcuna però vi nidifica pure (*Valloni*); nel distretto di Cividale è invernale e di passo (*Del Torre*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Abbastanza comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gali*). Comune, ma non abbondante nel distretto di Savona, ove si vede dall'ottobre al marzo (*Piccone*); in quello di Arenzano è pur frequente, ma di passo in ottobre e novembre, rara in primavera (*Luciani*). Invernale nel distretto di Spezia, ma più frequente ai passi (*Carazzi*).

Toscana : Comune d'inverno nella prov. di Lucca; vi ebbi però un maschio giovane alla metà d'agosto (*Martorelli*); sedentaria (*Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune al piano nel distretto di Fauglia, Pisa. *Out* : scarsa in quello di Lavajano, ove giunge in ottobre e novembre e ripassa in marzo (*Papasogli*). Generalmente abbondante durante il passo in marzo-aprile e settembre-novembre nel distretto di Fucecchio, prov. di Firenze, ove è anco sedentaria (*Lenzi*, *Turchetti*); scarsa in quello di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*). Comune di passo in marzo nel Casentino, Arezzo *Beni*; ed in autunno (*Fiorini*, *Pauer*). Piuttosto comune ed apparentemente sedentaria in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale e scarsa nel distretto di Sarteano, Siena (*Barpagli*). Comune, sedentaria e di passo in ottobre nella prov. di Grosseto (*Del*.

Ademollo, Cambi. Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e anche sedentaria in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune al piano (*Paolucci*).

Lazio : Frequente, di doppio passo nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania : Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Di passo nell'aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Sedentaria, ma specialmente di passo in aprile-maggio e nell'autunno; non è abbondante (*De Romita*).

Calabrie : Sedentaria e nidificante, comune d'inverno e di passo in aprile ed ottobre, nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Comune di passo in marzo-aprile e anco sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Così pure in quello di Modica, da ottobre ad aprile (*Dellafonte, Garofalo*). Sedentaria, ma più abbondante d'autunno e d'inverno nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Frequente in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune e sedentaria (*Bonomi*).

341. *Ortygometra Porzana* (Linn.) (ex Aldrov.)

VOLTOLINO.

Porzana fulicula, Salvad.

Pula d'acqua, Pulétta, Galinetta (*Basso-Piem.*) — Giliardina (*Berg.*) — Requajo negro. Girardela (*Vicenza*) — Ral, Ralét, Realét (*Feltre*) — Cuèrin (*Friuli*) — Quajna (*Padova*) — Gallinetta (*Arenzano*) — Folenga de marso, Polastrela (*Spezia*) — Schiribilla (*Casentino*) — Gallinella (*Viterbo*) — Ruoci (*Nap.*) — Gajineja d'acqua (*Calabr.*) — Marranzanu. Jaddineddu di acqua (*Mess. Modica*) — Adduzzu d'acqua pedi virdi (*Terran. Sicil.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove si vede soltanto di passo in aprile ed in ottobre (*Abre*). Frequente in quella di Torino: vi nidifica, ebbero i pulcini ancora inetti al volo il 1° agosto (*Gasca*); vedesi specialmente in settembre ed ottobre ed in marzo ed aprile (*Martorelli*). Non raro nella prov. di Alessandria, al piano e durante le epoche del passo (*Camusso*). Non frequente, ma nidificante nell'Ossola; emigra (*Bazetta*).

Lombardia : Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così in quella di Bergamo (*Stefanini*). Ed in quella di Milano (*Brambilla*); di passo nella prima metà di febbraio e di settembre (*Magretti*). Estivo e di copioso passaggio in autunno e primavera, fors'anche sedentario nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Abbondante alle due epoche del passo nella prov. di Mantova, ove nidifica (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Di passaggio al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e nidificante al piano nel distretto di Feltre. Belluno, ove passa in marzo, aprile, luglio ed agosto (*Delaito*). Comune nel Friuli, specialmente in aprile quando arriva; nidifica nel maggio e giugno e parte in settembre ed ottobre (*Vallon*, *Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Del Fiume*).

Emilia : Comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Abbastanza frequente nel distretto di Savona, ove passa dal marzo al maggio e ripassa in ottobre e novembre (*Piccone*); così nel distretto di Arenzano, ove però non si rivede nell'autunno (*Luciani*). Frequente nel distretto di Spezia, specialmente in marzo ed aprile (*Carazzi*).

Toscana : Comune in marzo ed aprile ed in settembre-ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa vedesi già in febbraio (*Grappani*). Comune al piano nel distretto di Fauglia. Pisa (*On*): scarso assai in ottobre, frequente in aprile e maggio in quello di Lavajano (*Papasogli*). Comune di passo in marzo-aprile e settembre, e anche nidificante nella prov. di Firenze (*Len*).

zi, *Turchetti, Fontebuoni*). Non comune in aprile nel Casentino. Arezzo (*Beni, Paier*). Comunissimo in primavera, forse nidificante, più scarso in autunno in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune dal marzo al settembre nel Senese (*Dei*); specialmente abbondante al passo in primavera nella Maremma (*Ademollo, Cambi*). Comune ed estivo in Toscana; si trattiene sino ad ottobre e anche più tardi (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Lazio: Comune, di passo in aprile ed in ottobre nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Sedentario e frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di passo piuttosto scarso, si vede ordinariamente in aprile e maggio (*De Romita*).

Calabrie: Comune nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile e ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente da marzo a novembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Delafonte, Garofalo*). Non comune in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrana*). Frequente in marzo nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo, ma anche sedentario e nidificante. specialmente al Capo settentrionale (*Bonomi*).

342. *Ortygometra Bailloni* (Vieill.)

SCHIRIBILLA GRIGIATA.

Porzana Bailloni, Salvad.

Pulétta d'acqua, Pulétta, Galinetta peita (*Basso-Piem.*) — Gerardélo (*Padova*) — Pisoca (*Vicenza*) — Folenghéta, Girardina (*Spezia*) — Occhio rosso, Voltolino piccolo, Gambettino (*Pisa*) — Monachella (*Sesto fiorentino*) — Ruocio (*Capri*) — Jaddineddu a pedi gialli, Jadduzzeddu d'acqua (*Mess.*) — Gadduzzeddu d'acqua pedi giarni, Surciteddu

(*Terran. Sicil.*) — Jaddinedda d'acqua cu li piedi giarni (*Modica*). — Gaddinedda d'acqua surcera (*Castelb.*).

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo, e soltanto di passaggio in aprile ed in ottobre (*Abrej.*). Ne ho ucciso un individuo maschio il 29 dicembre 1884 sopra un letamaio nel cortile di una casa rurale a Settimo Torinese: è specie frequente in provincia (*Gasca*): abbonda come la specie precedente alle due epoche del passo (*Martorelli*). Piuttosto rara alle epoche di passo nella prov. di Alessandria, ove più facilmente si vede nell'autunno (*Camusso*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Estiva, ma non abbondante in quella di Cremona (*Ferragui*). Comune alle due epoche del passo nella prov. di Mantova (*Paglia*). Non comune nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto : Di passaggio al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarsa al piano nel Bellunese, ove non nidifica e passa in marzo e settembre (*Soravia*). Di passo in primavera nel Friuli (*Del Torre*). Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Non rara nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gali*). Scarsa nel distretto di Savona, ove si vede irregolarmente in aprile e maggio (*Picconer*); così in quello di Arenzano, ove però è comune (*Luciani*). Scarsa di doppio passo nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune in marzo-aprile ed in settembre-ottobre nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Grajani*). Scarsa al piano in marzo ed aprile nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Frequente nella prov. di Firenze, ove giunge in marzo-aprile, nidifica e parte o ripassa in settembre (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Non comune in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Paueri*). Non comune in Val di Chiana (*Griffoli*). Passa in aprile nella prov. di Grosseto, e vi nidifica (*Ademollo*). Estiva e comune in Toscana (*Roster*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa in aprile all'isola di Capri (*Cerio*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa: giunge in marzo e parte in settembre nel distretto di Modica. Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Scarsa e apparentemente sedentaria in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carraia*). Rara nel distretto delle Madonie, Palermo; una venne presa nel 1886 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di doppio passo e forse sedentaria, ma scarsa (*Bonomi*).

343. *Ortygometra parva* (Scop.)

SCHIRIBILLA.

Porzana parva, Salvad.

Puletta d'acqua, Galinetta (*Basso-Piem.*) — Cuérin piz-zul (*Friuli*) — Sforzhanèla (*Feltre*) — Gerardòlo (*Padova*) — Gallinetta piccina (*Arenzano*) — Girardina (*Spezia*) — Occhio rosso, Voltolino piccolo, Gambettino (*Pisa*) — Monachella (*Sesto fiorentino*) — Sporciglione piccolo (*Marche*) — Quaglia di mare (*Capri*) — Jadduzzeddu d'acqua, Jaddineddu surcera (*Mess.*) — Surciteddu, Perciabudi picciulu (*Terran. Sicil.*) — Jaddinedda d'acqua surciera (*Modica*) — Gaddinedda d'acqua surcera (*Castell.*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove è di passo in aprile ed ottobre (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*), alle due epoche del passo (*Martorelli*). Piuttosto rara nella prov. di Alessandria e solo alle epoche del passo; vedesi facilmente in primavera (*Camusso*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Poco comune di doppio passo nella prov. di Cremona, fors'anche nidificante (*Ferragni*). Poco comune in aprile nella

prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune nella Lombardia (*Turati*, *Borromeo* ; vi nidifica, ma è difficile assai scoprire il nido sempre molto ben nascosto nel più folto dei canneti e posto tra alte erbe acquatiche fra loro intrecciate; è fatto di tali erbe poco riunite, ha forma concava e misura circa 14 centimetri di altezza. Le uova, da 6 a 10, sono covate dal maschio e dalla femmina; i pulcini sono rivestiti di peluria nera, lucente (*Turati*).

Veneto : Di passaggio al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarso passaggio in marzo, aprile e settembre al piano nel distretto di Feltre, Belluno, ove non è accertata la sua nidificazione (*Delaito*). Nel Friuli giunge talvolta abbondante nel maggio: fu così nel 1885, nel 1882 non se ne videro, e furono scarse nel 1883 e nel 1884: poche passano in settembre (*Falloni*): di passo primaverile nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Non rara nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gali*). Scarsa nel distretto di Savona: ne ebbi in marzo e maggio (*Piccone*); in quello di Arenzano passa in marzo ed aprile ed è frequente (*Luciani*). Più scarsa della specie precedente e di doppio passo nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune in marzo-aprile ed in settembre-ottobre nella prov. di Lucca (*Martarelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Scarsa al piano in marzo ed aprile nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Oni*, *Papasogli*). Frequente nel distretto di Fucecchio, ove giunge in aprile, nidifica e parte o ripassa in settembre (*Lenzi*, *Turchetti*): non è comune nel distretto di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Non comune in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*). Abbondante per pochi giorni in primavera, scarsa nell'autunno in Val di Chiana (*Griffoli*). Specialmente di passo in aprile nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Comune ed estiva in Toscana (*Roster*).

Marche : Scarsa al piano (*Paolucci*).

Campania : Frequente: passa in aprile nella prov. di Na-

poli *Fraanceschini, Monticelli*). Di scarso passo in aprile nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Poco frequente, di passo in aprile e maggio (*De Romita*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso: giunge in marzo e parte in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Scarso ed apparentemente sedentaria in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carvanti*). Rara al piano nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di doppio passo, ma forse anche sedentaria (*Bonomi*).

344. *Crex pratensis*, Bechst. (ex Gesn.)

RE DI QUAGLIE.

Re da quaje, Re der quâj, Requaggio, Re dle caje (*Basso-Piem.*) — Re de quai (*Valt.*) — Re ñe quae (*Berg.*) — Requagio rosso (*Vicenza*) — Requajo, Requaio rosso (*Padova*) — Baréch (*Feltre*) — Reicaglieri (*Nizza*) — Re dee quagie (*Spezia*) — Re quaglio (*Pisa, Lucca, Garf.*) — Rre di quagghi (*Calabr.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, di passaggio soltanto, in maggio ed in agosto e settembre (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*), alle due epoche del passo (*Martorelli*). Non comune; capita isolato alle epoche del passo, ma qualche coppia rimane a nidificare nella prov. di Alessandria (*Canusso*). Nell'Ossola giunge in maggio, nidifica e parte in settembre (*Bazetta*). Raro di passo autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così in quella di Bergamo (*Stefanini*). Ed in quella di Milano (*Brambilla*); di passo in aprile e settembre (*Ma-*

gretti). Comune alle due epoche del passo, aprile-maggio e settembre-ottobre: qualche coppia rimane a nidificare nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune dal settembre al novembre in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Nidificante e di passo nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente, nidificante e di passo in maggio e settembre nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Comune nel Friuli durante l'estate, nell'ottobre parte e molti passano (*Vallon*); non comune, ma nidificante nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arri-goni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Estivo, scarso, ma nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passo in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, durante i passi, in aprile e maggio ed in settembre ed ottobre (*Piccone*): in quello di Arenzano è comune in primavera, aprile, raro in autunno (*Luciani*). Abbastanza frequente in aprile ed ottobre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Assai comune in primavera ed autunno: qualcuno vedesi anche d'inverno nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*): nel distretto di Massarosa era una volta più frequente e l'ho veduto anche in agosto (*Gragnani*). Comune al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in ottobre, più frequente in aprile e maggio in quello di Lavajano (*Papasogli*). Scarso e di doppio passo nella prov. di Firenze (*Turchetti, Fontebuoni*). Scarso in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*); passa anche in autunno (*Fiorini, Pauer*). Poco frequente in Val di Chiana: passa in aprile ed in agosto e settembre (*Griffoli*). Così nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Marri*). Punttosto scarso nel Senese (*Dei*); di doppio passo in Maremma (*Ademollo, Cambi*). Comune ed estivo in Toscana: nel passo primaverile predilige i paduli, in quello autunnale i prati e campi asciutti (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Campania: Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Fran-*

eschini, Monticelli). Di scarso passo in aprile nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Molto scarso, non ho notizia di catture avvenute in autunno ed inverno (*De Romita*).

Calabrie: Comune alle due epoche del passo, ma specialmente in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Non comune in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune di passo in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*). Scarso, giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Della-forte, Garofalo*). Di passo soltanto in aprile-maggio in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Raro in primavera nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di accidentale comparsa in primavera ed in autunno (*Bonomi*).

345. *Gallinula chloropus* (Linn.) ex Aldrov.

SCIABICA.

Galinetta d'acqua, Galinetta neigra (*Basso-Piem.*) — Grugnetù (*Berg.*) — Grugnetton gainée, il masch., Gilar-dina gainèra, la femm. (*Milano*) — Re di Giarègule (*Friuli*) — Sfoglio (*Adore, Feltre*) — Sforzàna (*Padova*) — Gallinetta grossa (*Arenzano*) — Fulega, Fuleghetta (*Gen.*) — Folengòn (*Spezia*) — Scepita (*Lucca*) — Sciabiga (*Casentino*) — Cian-fruscola (*Maremma*) — Gallenèlla riàle (*Nap.*) — Gallinella, Fulica, Follaca (*Calabr.*) — Gaddinedda di boscu, Jadduzzu d'acqua (*Mess.*) — Jaddina d'acqua (*Modica*) — Gaddinedda pizzu giarnu (*Terran. Sicil.*) — Gaddinedda d'acqua (*Castell.*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in aprile e novembre (*Abbr.*). Frequente e nidificante in quella di Torino (*Gasca*); comune alle epoche di passo (*Martorelli*). Capita di rado e soltanto durante il passo autunnale nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Non comune nell'Ossola, ove non consta che abbia nidificato (*Bazetta*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa in pianura in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Stazionaria, più scarsa nell'inverno, nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Comune, sedentaria e nidificante nella prov. di Mantova (*Paglieri*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Di passaggio al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente e nidificante al piano nel distretto di Feltre, ove passa in marzo, aprile e settembre (*Delaito*). Nel Friuli è comune e sedentaria; nidifica in maggio e giugno (*Vallon*); vedesi raramente in primavera nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Sedentaria, ma scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio in primavera nel Nizzardo (*Gali*). Comune nel distretto di Savona dalla fine di marzo al maggio: si rivede in settembre; ne ho una varietà isabellina presa a Vado il 1 luglio 1881 (*Piccone*). Comune in marzo ed aprile nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Abbastanza frequente in aprile; ripassa in ottobre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non molto abbondante, ma sedentaria nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Oni*); scarsa alla fine d'aprile in quello di Lavajano (*Papaisogli*). Frequente di passo in marzo-aprile e settembre, ma anche sedentaria nel distretto di Fucecchio (*Lenzi*, *Turchetti*); scarsa in quello di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Non comune in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Sedentaria in Val di Chiana, ma più abbondante in marzo ed aprile (*Griffoli*). Comune nella prov. di Grosseto, specialmente ai due passi (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Comune e sedentaria in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Campania : Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Sedentaria e comune (*De Romita*).

Calabrie : Sedentaria, ma più comune d'inverno e di passo in marzo e novembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Di passo nel settembre in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia : Comune di passo in aprile-maggio e anco sedentaria nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Frequente, sedentaria e di passo in marzo e settembre nel distretto di Modica. Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Di passo soltanto in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Rara nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune e sedentaria (*Bonomi*).

346. *Hydrornia Alleni* (Thomps.)

POLLO SULTANO DI ALLEN.

Jonocicca Alleni, Salvad.

Nella mia « *Avifauna Italica* » (p. 354) menzionai un esemplare presumibilmente riferibile a questa specie che si conservava nel Museo Civico e Liceale di Lucca sotto il nome di *Gallinula Porzana*. Lo vidi in fretta il 31 gennaio 1886 e notai l'abito suo singolare che me lo faceva sembrare una giovane *H. Alleni*, tinto artificialmente di verde chiaro. Qualche mese dopo, mercè la gentile amicizia del conte Minutoli, potei avere quell'uccello in esame; lo studiai accuratamente ed ho potuto convincermi in modo positivo che è un esemplare dell'*Jonornis parva* (Bodd.) della Guiana! Rimangono dunque *tre* gli esemplari noti della *H. Alleni* presi in Italia. Però il prof. G. Martorelli mi fece sapere che un cacciatore gli diede la minuta descrizione di una Gallinella da lui uccisa in Bientina nell'autunno 1885. descrizione che corrisponderebbe a quella della *Hydrornia*

Alleni. Seppi poi dal signor Raimondo Gragnani che nei tempi addietro sarebbero stati presi tre o quattro individui di questa specie a Massaciuccoli.

347. *Porphyrio caeruleus* (Vandelli)

POLLO SULTANO.

Fascianu (*Lentini*).

Liguria : Accidentale nel distretto di Spezia; uno fu ucciso alla Marinella, Bocche di Magra, e lo ebbe il prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana : Accidentale a Massaciuccoli nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Accidentale in primavera nel pian di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*).

Campania : Accidentale nella prov. Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Avuto nel dicembre 1884 dal Lago di Lesina: io però non ne ebbi (*De Romita*).

Sicilia : Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Comune e sedentario nel distretto di Lentini e Carlentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Trovasi non abbondante e dubbiosamente nidificante nel lago Cuccanico nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna : Sedentario; ne ebbi in tutte le stagioni, ed i giovani nell'estate: sempre gli ho uditi nei folti canneti dello stagno di Cagliari. Ne ebbi pure da Lanamatrona (*Bonomi*).

348. *Porphyrio smaragdonotus*, Temm.

POLLO SULTANO A SCHIENA VERDE.

Pollo sultano dal dorso verde (*Aut. Ital.*).

Sicilia : Accidentale nella prov. di Messina (*Pistone*).

349. Fulica atra, Linn. (ex Gesn.)

FOLAGA.

Fulaga (*Basso-Piem.*) — Goba (*Spezia*) — Fòlighe (*Friuli*) — Folga (*Vergato*) — Germano nero (*Pisa*) — Fuliga (*Marche*) — Follaca (*Brindisi, Calabr.*) — Murguni (*Reggio, Calabr.*) — Jaddinazzu (*Mess.*) — Jaddinazza (*Modica*) — Addinazza (*Terran. Sicil.*) — Fuliga, Folaga (*Sard.*).

Piemonte: Qualche raro individuo s'incontra nell'inverno lungo i ristagni d'acqua dei fiumi della provincia di Cuneo (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). Di solo passaggio al piano e abbastanza rara nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Non comune nell'Ossola, ove non pare abbia nidificato (*Bazetta*).

Lombardia: Non abbondante al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*): di passo in marzo e settembre (*Magretti*). Stazionaria in scarso numero e di doppio passaggio, marzo-aprile e settembre-novembre, nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Abbondante, sedentaria e nidificante nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Accidentale al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di casuale comparsa in seguito a burrasche, nel Cadore, Belluno (*Tissi*): di scarso passaggio in marzo ed ottobre nel distretto di Feltre (*Delaito*). Non comune nel Friuli, anche nell'inverno quando giungono gli immigranti d'oltre Alpe; non ho potuto accertare se nidifichi in provincia (*Vallon*); non comune, ma nidificante nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comunissima e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nel distretto di Vergato, prov. di Bologna (*Lorenzini*). Sedentaria nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio in autunno nel Nizzardo (*Gal.*). Alquanto scarsa ed autunnale od invernale nel circondario di Savona; il 10 gennaio 1879 con freddo e neve ne fu presa una sulle colline di Albissola Marina (*Piccone*). Invernale e frequente nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Comune durante l'inverno in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune assai nella prov. di Lucca, ove è in parte sedentaria in parte migrante (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Frequente, sedentaria e di passo in settembre-novembre e marzo nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*); non comune in quello di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Rara in marzo e nell'autunno nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Sedentaria in Val di Chiana, ma abbondante soltanto alle due epoche del passo (*Griffoli*). Comune e sedentaria nella prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*); molte inoltre giungono a svernare in Maremma (*Ademollo*). Comune e sedentaria in Toscana, in alcune paludi forma colonie (*Roster*).

Marche: Scarsa al piano (*Paolucci*).

Campania: Sedentaria e frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Di scarso passaggio in aprile e maggio all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Abbondantissima nelle località adatte (*De Romanita*).

Calabrie: Scarsamente nidificante, abbondante nell'inverno e di passo in aprile e novembre nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Non comune in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune in marzo ed in ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Abbondantissima e ancor sedentaria nel distretto di Lentini, ove oltre 24,000 sono state uccise in una stagione (*Bonfiglio*). Così in quello di Modica, ove è pure di passo in agosto ed aprile (*Dellafontè, Garofalo*). Poche sono sedentarie: giungono in abbondanza in agosto-ottobre e partono in marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Frequente al piano nel-

l'autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Abbondantissima; sedentaria, di doppio passaggio ed invernale (*Bonomi*).

350. *Fulica cristata*, J. F. Gmel. (ex Lath.)

FOLAGA AFRICANA.

Jaddinazzu, Forgia (*Mess.*) — Puliga a chighirista o inchighiristada (*Sard.*).

Sarei curioso di sapere perchè il Salvadori (*Ucc. ital.*, pag. 239) persiste a ritenere che questa Folaga possa essere non rara in Sardegna: nessun fatto bene accertato può essere addotto in appoggio di tale asserzione; pochissimi sono gli esemplari che si conoscono catturati in quell'isola, e tutto ci dimostra che la *F. cristata* vi capita accidentalmente soltanto, come altrove in Italia è capitata.

Campania: Di accidentale comparsa all'isola di Capri (*Cerio*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Accidentale affatto e di rarissima cattura (*Bonomi*).

ALECTORIDES.

GRUIDÆ

(Grue).

351. *Grus communis*, Bechst.

GRUE.

Grú, Grúa (*Basso-Piem.*, *Padova*) — Gru (*Rovigo*) — Grü (*Spezia*) — Gruga (*Lucca*) — Ruòjo, Gruòjo, Ngroia (*Napoli*) — Gru, Agroi (*Calabr.*) — Grue (*Sard.*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, e di solo passo dalla metà di novembre a quella di dicembre (*Alba*). Accidentale nella prov. di Torino (*Gasca*); si trova spesso nelle isole sul Po, dove si sofferma qualche poco (*Martorelli*). Rarissimamente nei più rigidi inverni se ne vede in prov. di Alessandria qualche branchetto: una giovane venne uccisa presso Novi il 9 gennaio 1889 (*Camusso*). Di comparsa casuale nell'Ossola (*Bazetta*).

Lombardia: Rara, di solo passaggio in Valtellina (*Galli*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di passaggio in quella di Cremona, ove però sosta di rado (*Ferragni*). Rara nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*); in grossi branchi (*Ferrari*). Di casuale comparsa nel Cadore, Belluno (*Tissi*); così nel distretto di Feltre, nell'ottobre (*Delaito*). Accidentale nel Friuli ove non so che di una sola cattura nella primavera del 1875 (*Fallon*). Quantunque sia di passaggio regolare nella prov. di Padova, pure è

raro averne (*Arrigoni*). Di passaggio accidentale in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Nel distretto di Vergato, Bologna, passa a stormi in alto, in ottobre e novembre (*Lorenzini*).

Liguria: Di passaggio specialmente in primavera nel Nizzardo, ma è raro averne (*Gal*). Nel circondario di Savona passa alta e si ferma casualmente soltanto; due furono prese nel letto del torrente di Albissola il 16 marzo 1868; contemporaneamente altre tre si posarono nel torrente di Vado; il tempo era cattivo con venti gagliardi da grecale (*Piccone*). Comune di passo nel distretto di Arenzano, in autunno va ad O., in primavera ad E. (*Luciani*). Rara nel distretto di Spezia (*Carazzi*). L'8 aprile 1887 fu veduto un branco di questi uccelli posati nel letto della Magra; partendo presero la direzione di tramontana (*Lamotte*).

Toscana: Comune di passo nella prov. di Lucca, ove però assai di rado sosta (*Martorelli, Gragnani*). Scarsa nel distretto di Fucecchio ed in quello di Sesto (*Turchetti, Fontebuoni*): una volta si vedevano spesso, specialmente in marzo in quello d'Empoli (*Fucini*); ne conservo una, uccisa a Prato, Firenze, il 6 dicembre 1879 (*Figlioli*). Di passaggio regolare in Val di Chiana, ma raramente vi sosta (*Griffoli*). Di passo irregolare nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*); avuta in marzo ed in dicembre (*Dei*).

Marche: Di scarso passaggio (*Paolucci*).

Campania: Accidentale, una venne uccisa nel 1882 in novembre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa di rado a branchi sopra l'isola di Capri, foriera di forti temporali (*Cerio*).

Puglie: Di passo regolare in autunno e in primavera, nelle paludi delle Saline e di Capitanata: vi si trova anche nell'inverno (*De Romita*).

Calabrie: Frequente di doppio passaggio, specialmente in aprile, nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Di passo a branchi in quella di Reggio (*Moretti*); una venne uccisa a Sbarre nell'aprile 1886 (*Moschella*).

Sicilia: Comune in novembre-dicembre nella prov. di

Messina (*Ruggeri*); di passo regolare in marzo-aprile ed in ottobre (*Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Passa a grossi branchi in ottobre-novembre e marzo-aprile, di rado si posa a terra nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Di passo ai monti nell'autunno in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Di passo invernale irregolare, ne ebbi talvolta anche in primavera e dall'interno dell'isola (*Bonomi*).

352. *Anthropoides Virgo* (Linn.)

DAMIGELLA.

Veneto: Noto questa specie tra le avventizie nel Padovano per l'esemplare che si trova nel Museo universitario con quella indicazione (*N. Arif. Ital.*, p. 361), la quale non è però confermata da alcuna notizia nei Cataloghi di quel Museo (*Arrigoni*).

OTIDIDÆ

(*Otarde*).

353. *Otis Tarda*, Linn. (ex Aldrov.)

OTARDA.

Otarde, Pulin salvadigh (*Basso-Piem.*) — Outarde (*Nizza*) — Gallinaccio salvaggio (*Bari*) — Vecchia (*Reggio, Calabria, Mess.*) — Pitarra (*Modica*).

Piemonte: Nei primi giorni del dicembre 1871 ne venne uccisa una femmina in prossimità di Cuneo (*Albre*). Accidentale anche nella prov. di Torino (*Gasca*). Di comparsa casuale nella prov. di Alessandria, un maschio venne ucciso presso Pozzolo nel novembre 1879 (*Camusso*).

Lombardia: Accidentale nella prov. di Bergamo, ove un esemplare venne ucciso in riva al Serio nel 1870, si conserva in Bergamo nel Museo Sarpi (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di casuale comparsa in quella Cremona (*Ferragni*). Rara, presa a Cizzolo ed a Castellaro nella prov. di Mantova (*Paglia*). Di comparsa accidentale in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Il 7 gennaio 1887 venne ucciso un bellissimo maschio giovane presso Codroipo nel Friuli; lo ebbe il signor G. Vallon, il quale gentilmente cedeva anche questa rarità alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani: pesava 3950 grammi e nello stomaco aveva 320 grammi d'erbe. Quasi contemporaneamente il conte Ninni di Venezia ebbe una femmina (*Giglioli*). Accidentale nel Friuli (*Del Torrè*). Accidentale nella prov. di Padova: un esemplare preso a Giarabassa era nella raccolta Benazzato a Camisano Vicentino (*Arrigoni*).

Emilia: Il 1° febbraio 1889 una femmina di questa specie venne uccisa presso Molinella, Bologna, ed il maschio sarebbe poi stato preso nelle risaie di Portonuevo: la notizia è data dal signor A. Gulcinelli in « *Caccia e Corse* », III, p. 70 (*Giglioli*). Un individuo di questa specie fu ucciso presso Novi, Modenese, nell'autunno 1885 (*Picaglia*). Di accidentale comparsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Capita raramente in primavera ed in autunno nel Nizzardo, da almeno 4 anni non se ne son vedute (*Gal*). Rara nel distretto di Spezia, ne ebbe una da Prata nel dicembre 1860 il prof. Magni-Griffi (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Nel 1884 venne ucciso e mangiato dai contadini nel distretto di Lari. Pisa, un individuo di questa specie (*Papasogli*). Accidentale nella prov. di Firenze, ne conservo un maschio adulto preso vicino a Firenze nell'inverno 1830; V. SAVI, *Orn. Tosc.*, III, p. 231 (*Giglioli*). Di casuale comparsa nell'inverno nel Senese ed in Maremma (*Dei, Ademollo*); una venne presa a Lucignano d'Arbia il 5 febbraio 1842 (*Dei*).

Marche: Rarissima; avuta da Musone (*Paolucci*).

Campania: Accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*)

Puglie: Accidentale, ma non rara; agli ultimi di febbraio 1886 ne ebbi una femmina uccisa presso Foggia (*De Romita*).

Sicilia: Rara assai nella prov. di Messina (*Pistone*). Accidentale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

354. *Otis Tetrax*, Linn. (ex Bellon)

GALLINA PRATAIOLA.

Otardinn-a, Galina sarvaiga, Galinn-a sarvaega (*Basso-Piem.*) — Dinzio salvàrego (*Feltre*) — Outarda (*Nizza*) — Gallina faggiana (*Foggia*) — Turrottu (*Calabr.*).

Piemonte: Vari esemplari sono stati colti nei pressi di Cuneo durante l'inverno: uno nel novembre 1874, uno il 18 dicembre 1877 ed uno il 24 dicembre 1885 (*Abre*). Di rara comparsa al piano nella prov. di Alessandria; una femmina venne da me uccisa presso Gazzo, Novi, il 17 dicembre 1873, e nell'autunno 1879 un maschio fu preso presso Pozzolo (*Camusso*).

Lombardia: Di casuale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Rara in quella di Milano (*Brambilla*). Accidentale, presa a Castellaro nella prov. di Mantova (*Paglia*). Di rarissima comparsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di casuale comparsa nel tardo autunno od al principio della primavera nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Rara assai nel Friuli, ove non so che di due catture, l'ultima il 25 dicembre 1884 presso Cividale (*Valloni*): accidentale (*Del Torre*). Di passaggio irregolare nella prov. di Padova, ove diversi individui sono stati presi: due si conservano anche nella Collezione Gallo a Monselice (*Arrigoni*).

Emilia: Di comparsa accidentale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Giunge irregolarmente in primavera ed in autunno nel Nizzardo (*Gal.*). Rara nel distretto di Spezia, ove il prof. Magni-Griffi l'ebbe due volte, in ottobre e novembre (*Carazzi*).

Toscana: So di quattro individui presi nella prov. di Lucca (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa è di scarso passaggio nel maggio (*Gragnani*). In due occasioni, sempre in ottobre, vidi questa specie nel distretto di Lari, Pisa (*Papasogli*). Accidentale nel distretto di Fucecchio. Firenze (*Turchetti*). Di accidentale comparsa in Val di Chiana (*Griffoli*). Accidentale d'inverno nelle prov. di Siena e di Arezzo (*Dei*, *Adenollo*); una venne uccisa nel Senese il 20 dicembre 1878 (*Dei*). Il signor G. Damiani mi dà la notizia della cattura di due individui di questa specie nell'isola d'Elba; furono entrambi uccisi dal suo fratello, uno nel marzo 1887, l'altro nell'aprile 1888 (*Giglioli*).

Marche: Rara, avuta nei pressi di Ancona (*Paolucci*).

Campania: Accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Non rara nei piani di Capitanata, ove nidifica: e anco sulle colline pugliesi (*De Romita*).

Calabrie: Scarsa ed invernale nella « piana » di Palme prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Non tanto scarsa nella prov. di Messina (*Pistone*). Sedentaria, ma abbondante soltanto in marzo-aprile, quando s'incontra a branchetti: nelle altrè stagioni vedesi a coppie nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvina*). Dicesi non rara intorno al lago di Pitarra nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Giunge in autunno e parte in primavera: poche coppie sono sedentarie e nidificanti (*Bonomi*).

355. *Houbara undulata* (Jacq.)

UBARA AFRICANA.

Oubara, (*Aut. Ital.*).

Non avrei nulla di nuovo da aggiungere a quanto dissi nella mia AVIFAUNA ITALICA (p. 364), intorno alla comparsa accidentale di questa specie nell'estremo lembo della regione italica, se non che in una sua recente pubblicazione ¹ il professore Carruccio afferma la presenza di due esemplari della *H. undulata* nella Collezione provinciale del Museo zoologico della R. Università di Roma, asserendo che entrambi furono catturati nella provincia: uno donato nel 1860 dal prof. Pozzi, l'altro avuto in carne nel 1879 dal signor Venturi di Campagnano, ove sarebbe stato preso. Io ritengo erronea l'asserzione e conosco da lungo tempo i due uccelli suddetti; il primo non fu mai sinora ritenuto per preso in Italia e nè la data nè il luogo della sua cattura si conoscono; il secondo fu da me ceduto in cambio al prof. De Sanctis, nel 1877 ed apparteneva al R. Museo zoologico di Firenze, ove portava il n. 1685 del Catalogo ornitologico del 1843; proveniva dall'Algeria! Suppongo che, siccome i due individui della *H. Macqueeni* presi nella prov. di Roma e conservati entrambi in quel Museo sino al 1877 (quando uno andava a Firenze), furono, sino a che io ne rettificai la determinazione, ritenuti per *H. undulata*, da ciò abbia avuto origine l'erronea asserzione del prof. Carruccio.

356. *Houbara Macqueeni* (J. E. Gray)

UBARA ASIATICA.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie.

¹ *Bollettino del Museo zoologico della R. Università di Roma*, vol. I. Dispensa 1-8 (*Fauna locale*) p. 22. ROMA, 1888.

LIMICOLÆ.

ÆDICNEMIDÆ

(Occhioni).

357. *Ædicnemus scolopax* (S. G. Gmel.)

OCCHIONE.

Turlù, Turlurù, Scoralon, Gambavret (*Basso-Piem.*) — Legorot (*Berg.*) — Oggioun (*Mil.*) — Clàme ploè, Còu (*Friuli*) — Ciurlicón (*Padova*) — Massucco, Grixeloun, Curridon, Rostabò (*Spezia*) — Martinellone (*Fucecchio*) — Regino (*Sesto fiorentino*) — Piviere reale (*I. di Giglio*) — Reverzino (*Nap.*) — Tretari (*Capri*) — Riversinu, Riversinu rande (*Calabr.*) — Riversino (*Foggia*) — Circiu. ad., Librazinnu, giov. (*Modica*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica una sola volta, nel maggio: depone 1 o 2 uova, e maschio e femmina prendono parte alla incubazione che dura da 16 a 18 giorni (*Abre*). Questa specie giunge nella prov. di Torino assai numerosa in marzo, e vi nidifica costantemente, specialmente sugli isolotti del Po (*Martorelli*); comune e nidificante (*Gasca*). Nella prov. di Alessandria è frequente al piano, ove giunge a primavera, nidifica e parte alla fine dell' autunno (*Camusso*). Accidentale nell' Ossola: un solo individuo veduto e preso, nel giugno (*Bazetta*). Raro di passaggio in luglio e agosto nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*).

Lombardia: Di casuale comparsa nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Non frequente in quella di Milano (*Bram-*

lilla; di passo in marzo e ottobre (*Magretti*). Comune da marzo a novembre nella prov. di Cremona, ove non sverna (*Ferragni*). Raro in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneio: Scarso, ma nidificante e di passaggio in aprile ed agosto, nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Comune e nidificante nel Friuli: nidifica nel maggio (*Vallon*). Abbastanza frequente e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Estivo e nidificante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona da settembre a fine novembre e da marzo a metà maggio (*Piccone*). Frequente in marzo ed aprile nel distretto di Arenzano, raro nell'autunno (*Luciani*). Frequente in primavera, a cominciare dal marzo, raro nell'autunno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune nella prov. di Lucca, specialmente tra i colli ed il mare (*Martorelli*); nel distretto di Massarosa passa in marzo, ma è divenuto raro (*Gragnani*). Assai frequente ovunque nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*: scarso in aprile ed ottobre in quello di Lavajano (*Papasogli*: nidifica nel distretto di Cedri, ed in grossi branchi si trova sulle aride colline anche in dicembre (*Degli Alessandri*). Scarso nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*: poco frequente in quello di Sesto, Firenze, giunge in aprile e parte in settembre-ottobre: nidifica sulle colline del Chianti (*Fontebuoni*). Non comune in marzo nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*). Di doppio passo, ma in scarso numero in Val di Chiana (*Griffoli*). Sedentario e pare anche di doppio passo nel distretto di Sarteano, Siena: in Val d'Orcia vedesi talvolta in branchi numerosi (*Bargagli*). Comune sulle crete, ove cova, nel Senese (*Dei*): sedentario in Maremma (*Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario in Toscana: nidifica nei luoghi aridi e sconde in agosto nei paduli (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Campania: Scarso al piano nella prov. di Napoli (*Franco-schisci, Monticelli*). Di scarso passo in aprile nell'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Sedentario, ma non abbondante (*De Romita*).

Calabrie: Nidificante, ma scarso, vedesi a branchi in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Di passo in aprile ed in settembre-ottobre in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune di passo dalla metà di ottobre ai primi di dicembre ed in marzo-aprile, nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistonei*). Frequente, sedentario e di passo in febbraio e settembre, nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Frequente e sedentario in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Frequente d'inverno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune e sedentario (*Bonomi*).

358. *Œdicnemus senegalensis*, Swains.

OCCHIONE DEL SENEGAL.

Mantengo quanto ho scritto intorno alla possibile comparsa di questa specie in Italia (*Arif. Ital.* p. 367), e ciò malgrado il punto ammirativo suscitato dalla creduta mia ingenuità ornitologica.

CHARADRIIDÆ

(*Pivieri*).

359. *Cursorius gallicus* (J. F. Gmel.)

CORRIERE BIONDO.

Piemonte: Un esemplare di questa specie venne preso in Ossola, Novara, nel 1875 (*Bazetta*). Di comparsa accidentale nella Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia: Di accidentale comparsa (*Turati*). Un esemplare adulto venne ucciso il 18 o 19 settembre 1881. dal signor Lardera sopra un'aja alla Cascina Favina di Meda nella prov. di Pavia (*Pavesi*).

Veneto: Accidentale affatto nella prov. di Padova: un giovane catturato a Vescovana nel giugno 1882. è nella mia raccolta (*Arrigoni*).

Liguria: Raro nel distretto di Spezia, ove una sola cattura, agli Stagnoni nel maggio 1865, è registrata (*Garuzzi*).

Toscana: Nella prov. di Lucca, vidi un solo esemplare, preso presso Viareggio (*Martorelli*). Accidentale in primavera nel pian di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Accidentale affatto in Maremma (*Ademollo*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Pistone*). Accidentale nel distretto di Modica. Siracusa (*Dellafonte*, *Garajala*).

360. *Charadrius Pluvialis*, Linn. ex Gesn.

PIVIERE.

Arluròt, Pivè, Testonotto (*Basso-Piem.*) — Pivè dorè, Codur (*Mil.*) — Coridor (*Feltre*) — Piviere (*Rovigo*) — Corridor clâme ploè (*Friuli*) — Pivir (*Bol.*) — Testonotto (*Arenzano*) — Massuccotto (*Savona*) — Pivièò (*Spezia*) — Priviere (*Pisa*) — Piviero (*Viterbo*) — Peliere (*Nap.*) — Riversinu, Riversinieddu (*Calabr.*) — Marteddu (*Mess.*) — Maisòlu (*Lentini*) — Ammazza-cani (*Modica*) — Vujarottu (*Castellb.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in aprile ed in novembre (*Abbr.*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*, *Martorelli*). Comune al piano nella prov. di Alessandria durante le epoche della migrazione: abbonda più specialmente in autunno, ottobre e novembre; è piuttosto scarso in primavera (*Camusso*). Accidentale affatto nell'Ossola, ove due esemplari furono presi nel 1871 (*Bazzetta*). Di passaggio in ottobre nella Valsesia (*Guarìnoni*).

Lombardia : Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio in marzo e settembre (*Magretti*). Di doppio passo nella prov. di Cremona, ove pochi svernano (*Ferragni*). Comune di primavera in prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente frequente in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Di scarso passaggio in aprile ed ottobre nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Abbastanza frequente nel Friuli; arriva in settembre e parte in marzo (*Vallon*). È secondo le annate più o meno frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Raro nell'inverno nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Di passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona dalla fine d'ottobre al principio di dicembre e dalla fine di marzo ai primi di maggio (*Piccone*). Raro, di doppio passo, nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Frequente d'inverno nel distretto di Spezia; uno venne preso lungo la Magra il 16 settembre 1887 (*Carazzi*).

Toscana : Comune dall'autunno alla primavera inoltrata nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Comune, ma di solo passo in ottobre e marzo, specialmente al piano, nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Frequente di passo nella prov. di Firenze, specialmente nel marzo (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*). Di scarso passaggio in marzo nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Abbondante, ma non tutti gli anni, al passo primaverile in Val di Chiana: più scarso in quello autunnale; pochi svernano (*Griffoli*). Raro di passo al piano nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*). Nel Senese, ma più ancora in Maremma è invernale, giunge a branchi in ottobre e rimane sino all'aprile (*Dei, Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Invernale e comune in Toscana (*Roster*).

Marche : Frequente al piano, passa in marzo-aprile ed in ottobre-novembre (*Paolucci*).

Lazio : Scarso, di passo, in aprile e novembre, nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania : Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa alla fine di marzo all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie : Invernale: giunge in frequenti branchi dalla seconda metà di settembre, parte in aprile; rarissimi gli individui in abito nuziale (*De Romita*).

Calabrie : Abbondante d'inverno al piano nella prov. di Catanzaro, di passo in marzo, aprile e maggio (*De Fiore*). Comune di passo nella prov. di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Comune di passo in marzo ed ottobre-novembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Scarso, di passo, in novembre e marzo, in quello di Modica (*Dellafonte, Garofalo*). Giunge a stormi in ottobre e parte agli ultimi di febbraio e primi di marzo, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carcano*). Poco frequente in autunno nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Comune: giunge in autunno e parte in primavera: abbonda nell'inverno sui piani di Chilivani ed Ozieri (*Bonomi*).

361. *Charadrius fulvus*, J. F. Gmel.

PIVIERE MINORE.

Piviere orientale (*Aut. Ital.*).

Non ho nulla da aggiungere a quanto ho detto nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie, rarissima per noi.

362. *Squatarola helvetica* (Linn.) ex Briss.

PIVIERESSA.

Squatarola (*Aut. Ital.*) — Piviè, Piviè dorè (*Basso-Piem.*) — Pluviè (*Nizza*) — Piviere di scoglio (*Lucca*) — Turdo (*Nap.*) — Olivedda od Uvaredda de margi (*Mess.*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, e soltanto di passaggio nella prima quindicina del novembre (*Abre*). Accidentale affatto nella prov. di Alessandria: una femmina venne uccisa presso Gazzo, Novi, il 19 novembre 1871 (*Camusso*).

Lombardia: Di scarso passaggio nella prov. di Cremona, ne vidi una ancora in abito nuziale il 20 agosto 1884 sul Po (*Ferragni*). Comune in prov. di Mantova (*Paglia*). Di rara comparsa nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Piuttosto rara nel Friuli: l'ebbi in gennaio, ma più facilmente si vede al ripasso nel marzo (*Tallon*). Il 22 settembre 1888. comparvero nella Laguna Veneta in grandi branchi, gli adulti erano in muta e mostravano ancora qualche penna nera sull'addome (*Ninni*). Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di scarso passaggio in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Avventizia nel distretto di Savona: ne ebbi due in maggio (*Piccone*). Scarsa ed invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non rara; passa in maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Gragnani*). Di rara comparsa in maggio e giugno in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarsa nell'inverno in Maremma (*Ademollo*).

Campania: Scarsa al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Invernale e di doppio passaggio; il 20 maggio 1887 ed il 19 maggio 1888 ne ebbi due individui in completa veste nuziale (*De Romita*).

Sicilia: Comune di passo, in marzo ed ottobre-novembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*).

Sardegna: La credo invernale, l'ebbi alla fine di ottobre ed in primavera; non l'ho mai incontrata col *C. Pluvialis*, ma sempre lungo le spiagge marine e sulle saline di Cagliari (*Bonomi*).

363. Eudromias Morinellus (Linn. ex Gesh.

PIVIERE TORTOLINO.

Arlurotin, Pivè d'està, Pivè d'entura (*Basso-Piem.*) — Coridòr (*Padova*) — Capocchino (*Sesto fiorentino*) — Martidduzzu (*Mess.*) — Culingioni de terra, Pivieri (*Sard.*).

Piemonte: Avuta una sola volta nella prov. di Torino durante l'inverno (*Martorelli*). Nella prov. di Alessandria era più comune vent'anni fa: compare irregolarmente sul finire dell'estate, di rado assai nella primavera (*Camasso*).

Lombardia: Di comparsa non comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Di scarso passaggio in aprile ed agosto nel Bellunese (*Soravia*). Ora più ora meno frequente. giunge nel Friuli in settembre e parte nel marzo (*Vallon*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Accidentale nella prov. di Parma, ebbi soltanto una femmina colta il 20 novembre 1887, dopo forte nevicata (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passo autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Raro in primavera nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarso, invernale e di doppio passaggio in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Una volta si vedeva di passo nella prov. di Lucca; ora pare essere affatto scomparso (*Graquani*). Scarso di passo al piano in settembre-ottobre e marzo-aprile, nel distretto di Lari, Pisa (*Papasogli*). Scarso al passo nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); divenuto di irregolare comparsa nei distretti di Sesto e Signa, Firenze: anni fa ne incontrai sui monti di Starniano (*Fontebuoni*); avuto di rado in marzo e settembre nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Non tanto raro di passo nel Casentino, Arezzo (*Pauer*). Di passaggio scarso ed irregolare in agosto e settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Così nel distretto di Sarteano, Siena (*Bar-*

gagli. Invernale e scarso nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Adenollor*); avuto in settembre e novembre (*Dei*). Non raro nell'inverno in Toscana: passa a branchetti e si trattiene poco (*Roster*).

Campania: Di passaggio in aprile ed ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale e comune alle Saline ed in Capitanata (*De Romita*).

Sicilia: Scarso, di passo in marzo ed ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Giunge in autunno e rimane l'inverno; li ho sempre trovati in branchetti, anche su altipiani (*Bonomi*).

364. *Ægialitis Geoffroyi* (Wagl.)

CORRIERE DEL GEOFFROY.

Il Salvadori non enumera questa specie tra quelle che possono capitare accidentalmente in Italia; io non posso essere del suo avviso e confermo quanto ho scritto in proposito nella mia AVIFAUNA ITALICA.

365. *Ægialitis asiatica* (Pall.)

CORRIERE ASIATICO.

Ecco un'altra delle specie che io avevo annoverato tra quelle « che potrebbero capitare in Italia accidentalmente » (Vedi *Avifauna Italica*, p. 472), e che ora vi è capitata davvero!

In data del 16 novembre 1887, il signor Enrico Marchisio di Torino mi scriveva che il giorno innanzi egli aveva trovato sul mercato di quella città un Piviere che sulle prime gli parve un individuo rachitico dell' *Eudromias Morinellus*; ma veduto, al confronto con individui di quella specie, che v'erano differenze importanti, portò quell'uccello al conte T. Salvadori che riconobbe in esso

un esemplare della *Ægialitis asiatica*; è una femmina in abito giovanile. Queste notizie mi vennero confermate il 27 novembre dal Salvadori stesso, il quale aveva già fatto alla R. Accademia di Scienze di Torino una comunicazione sulla nuova specie venuta così ad aggiungersi a quelle dell'avifauna italiana.¹

Questo interessantissimo uccello proveniva dalle vicinanze di Fano, e venne ucciso circa il 12 novembre lungo il fiume Metauro. Il signor Marchisio ha voluto generosamente farne dono alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo Zoologico di Firenze.

L' *Ægialitis asiatica* vive nell'Asia occidentale e sverna nell'Africa australe: di rado appare nella Russia ed è sinora stata colta due volte soltanto nell'Europa occidentale ed ambedue a Helgoland: un giovane il 16 novembre 1850, ed un maschio adulto in abito nuziale il 19 maggio 1859.

366. *Ægialitis cantiana* (Lath.)

FRATINO.

Piò-piò, Curentin, Curentinin (*Basso-Piem.*) — Buulin (*Friuli*) — Coridorèto (*Padova*) — Bulgaria, Ovivà (*Savona*) — Giaèu (*Arenzano*) — Marioli boaròi (*Spezia*) — Pretino, Prillo (*Lucca*) — Corriere (*Sesto fiorentino*) — Occhio di bove (*Valdich.*) — Occhialuni (*Mess.*).

Piemonte: Assai rara e di solo passo, specialmente in primavera, nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Avventizio nella prov. di Cremona: ne ebbi uno il 10 marzo 1885 (*Ferragnù*).

Veneto: Non comune, ma sedentario nel Friuli: non ne ebbi ancora però le uova (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

¹ T. SALVADORI, *La Æ. asiatica trovata per la prima volta in Italia*. (Atti Accad. Sc. Torino, XXIII, p. 44) TORINO, 1887.

Liguria: Di passaggio, in primavera specialmente, nel Nizzardo (*Ital.*). Alquanto scarso nel distretto di Savona, ove passa in aprile e maggio (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso nel distretto di Spezia ove giunge alla fine di marzo (*Carazzi*).

Toscana: Comune di passo in maggio nella prov. di Lucca (*Gragnani, Fontebuoni*). Non comune nel distretto di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*); ne ebbero in marzo, aprile e maggio (*Giglioli*). Piuttosto raro in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarso di passo in Maremma (*Ademollo*). Raro in Toscana, di passo in marzo ed aprile (*Roster*).

Marche: Comune al piano, ma soltanto nel passo autunnale, in agosto e settembre (*Paolucci*).

Puglie: Sedentaria e frequente, ma più abbondante nell'inverno (*De Romita*).

Sicilia: Comune nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Frequente e sedentaria (*Bonomi*).

367. *Ægialitis cunonica* J. F. Gmel. ex Beseke

CORRIERE PICCOLO.

Tiliou (*Alba*). — Piò-piò, Curenin, Scuratagéri (*Basso-Piem.*) — Stornoun (*Lago Maggiore*) — Culbianc d'acqua (*Bergamo*) — Corlich (*Feltre*) — Piviere (*Rovigo*) — Zurlichéto, Coridoréto (*Padova*) — Giàèn (*Arenzano*) — Bulgaria, Ovivà (*Savona*) — Marioli boardi (*Spezia*) — Pretino, Prillo (*Lucca*) — Corrierino (*Valdich.*) — Acquaroletto (*Marche*) — Ghirlino (*Foggia*) — Occhialuni, Cirrivì (*Mess.*) — Curripraia, Accidduzzu d'acqua (*Terran. Sicil.*) — Zurruliu conca molenti (*Sard.*).

Piemonte: Frequente nella prov. di Torino ove nidifica (*Gasco*); trovasi da marzo ad ottobre: ne vidi però due giovani nell'inverno 1886 (*Martorelli*). Non è abbondante nella prov. di Alessandria, giunge a primavera inoltrata, nidifica e scompare alla fine dell'autunno (*Camusso*).

Lombardia : Non comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Raro in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Estivo e comunissimo nella prov. di Cremona; giunge verso il 20 marzo, nidifica, e parte tra il settembre e l'ottobre (*Ferragni*). Raro di primavera, nella prov. di Mantova (*Pagliai*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Scarso, ma nidificante e di passo in maggio ed agosto nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Abbastanza frequente nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di regolare passaggio, in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gali*). Comune nel distretto di Savona, ove nidifica sul greto dei torrenti; passa da marzo a tutto maggio e dal settembre al novembre (*Piccone*). Comune di doppio passo in quello di Arenzano, più abbondante in primavera (*Luciani*). Frequente in primavera, dalla fine di marzo, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune da marzo ad ottobre sulle ghiaie del Serchio nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa passa specialmente in maggio (*Gragnani*). Comune, estivo e nidificante nei distretti di Sesto e Signa. Firenze (*Fontebuoni*). Non frequente in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*); vi nidifica però, giacchè il 30 agosto 1886 lungo l'Arno presso Pratovecchio presi un pulcino (*Pauer*). Di scarso doppio passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Non comune nel Senese (*Dei*); sedentario in Maremma (*Ademollo*). Comune e anche sedentario e nidificante in Toscana (*Roster*).

Marche : Frequente (*Paolucci*).

Campania : Di scarso passaggio nella prima quindicina di aprile nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Sedentario, ma frequente soltanto alle due epoche del passo e specialmente in aprile e maggio (*De Romita*).

Calabrie: Sedentario, ma specialmente comune di passo in aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile e dalla metà di ottobre a quella di dicembre (*Ruggeri, Pistone*). Non comune: giunge in primavera e qualche coppia rimane e nidificare nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvato*). Frequente in maggio nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Piuttosto raro di passo: dubito sia nidificante; ne ebbi soltanto tre (*Bonomi*).

368. *Aegialitis Hiaticula* (Linn. ex Aldrov.)

CORRIERE GROSSO.

Piò-piò, Curentinon (*Basso-Piem.*) — Pivaréto, Muneghéta da la colana, Ocio d'oro, Zurlichéto, Corlicoréto (*Padova*) — Pernis di pràd (*Friuli*) — Coridorón (*Feltre*) — Bulgaria, Ovivà du testun (*Savona*) — Marioli boaròi (*Spezia*) — Pretino, Prillo (*Lucca*) — Corriere (*Valdich.*) — Ciurlino (*Marche*) — Ghirlino grande (*Foggia*) — Jadduzzeddu d'acqua, Occhialuneddu (*Mess.*) — Curripraia granni (*Terran. Sicil.*) — Zurruliu conca de molenti, Zurruliu de mari a camracca (*Sard.*).

Piemonte: Scarso in prov. di Torino (*Gasca*). Il 7 luglio 1887 incontrai lungo il torrente Lemmo, presso Voltaggio, un individuo di questa specie, il quale pel suo contegno mostrava di avere le uova od i piccini in quei pressi. Non è specie comune nella prov. di Alessandria e usualmente si vede soltanto alle epoche del passo, specialmente in primavera (*Camusso*).

Lombardia: Di scarso passaggio dal marzo al maggio e anche al giugno. più abbondante in settembre nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Poco comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Scarso di passaggio in aprile e maggio nel distretto di Feltre, Belluno, ove non nidifica (*Delaito*). Frequente nel Friuli alle due epoche del passo, cioè in maggio e settembre (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente di passo primaverile nel Nizardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove alcuni nidificano sul greto dei torrenti; passa da marzo a tutto maggio e ripassa in settembre ed ottobre (*Piccone*). Di doppio passo nel distretto di Spezia, ma più scarso della specie precedente (*Carazzi*).

Toscana: Comune nell'aprile e maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Non comune nel distretto di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*); lo ebbi nel marzo (*Giglioli*). Abbastanza comune; ne ho veduto dei grossi branchi in primavera in Val di Chiana: è più scarso nell'autunno (*Griffoli*). Piuttosto raro in maggio nel Senese (*Dei*); sedentario, nidificante e di abbondante passo in maggio in Maremma (*Ademollo*). Di doppio passo in Toscana, più frequente in primavera che nell'autunno (*Roster*).

Marche: Raro (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie: Frequente di passo alla fine d'aprile ed in maggio; meno frequente, ma non scarso, in settembre ed ottobre (*De Romita*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile ed ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*). Di passo primaverile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Caravana*).

Sardegna: Comune, nidificante e di passo autunnale (*Bonomi*).

369. Chettusia gregaria (Pall.)

PAVONCELLA GREGARIA.

Non so perchè il Salvadori voglia ignorare il quarto esemplare di questa specie colto in Italia, quello cioè preso alla foce del Varo il 12 aprile 1883; egli lo ha veduto nella Collezione italiana a Firenze, ed io l'ho citato (*Avif. Ital.* p. 375).

Liguria: Di accidentale comparsa nel Nizzardo (*Gal.*).

Toscana: Rarissima, una sola fu presa nel Senese, presso Montepulciano nell'aprile 1856 (*Dei.*).

370. Chettusia leucura (Licht.)

PAVONCELLA A CODA BIANCA.

Chettusia codabianca (*Aut. Ital.*).

Non ho nulla da aggiungere a quanto dissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa rara e bellissima specie, che registrai allora col nome di *Chettusia Villotai* Aud. nella persuasione, dopo le ricerche speciali in proposito fatte dall'amico Salvadori, che quel nome avesse la priorità.

371. Hoplopterus spinosus (Linn.)

PAVONCELLA ARMATA.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie di accidentalissima comparsa nella regione nostra.

372. Vanellus Capella, Schöff. ex Bellon.

PAVONCELLA.

Galinétta, Busta d' fér, Marzeu, Vanetta (*Basso-Piem.*)
— Pavunzin (*Valt.*) — Paunsi (*Berg.*) — Pavonzina (*Mil.*) —

Pavonzhin, Paonzhin (*Feltre*) — Ciuiga (*Rovigo*) — Pavoncin (*Friuli*) — Gallinella (*Vergato*) — Vaneu (*Nizza*) — Pavonetto, Vi-Vi, Boün (*Sarona*) — Pia (*Spezia*) — Nugola (*Pisa*) — Bigioncella (*Garf.*) — Galluzzo (*Marche*) — Pavoncella (*Viterbo*) — Cagiana (*Campobasso*) — Nivalora, Mbi-vula, Pivula (*Calabr.*) — Paounieddu, Nivaluoru (*Modica*) — Pavuncellu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo, di passaggio nella prima metà di ottobre (*Abrej.*). Frequente in prov. di Torino (*Gasca, Martorelli*). In quella di Alessandria giunge in grandi stuoli nell'autunno, scompare alle prime nevi e ripassa più scarsa assai in primavera (*Camusso*). Di passo non comune nell'Ossola (*Bazetta*). Così nella Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia : Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarsa al piano in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passo abbondante in marzo e settembre (*Magretti*). Invernale e abbondante nella prov. di Cremona; arriva dopo la metà di ottobre e parte in marzo ed aprile. Forse qualche coppia rimane a nidificare, giacchè ne uccisi una giovanissima che appena poteva volare, il 7 luglio 1880, sul Po (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Abbondantissima nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Frequente di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarsa, di passaggio in autunno, inverno e primavera nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaitoj*). Comunissima ai due passi, nel Friuli, giunge in ottobre e parte nel marzo o nell'aprile (*Vallon*); scarsa in autunno, abbondante in marzo nel distretto di Cividale (*Del Torren*). Comune, dubbiosamente sedentaria, nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune, alcuni anni abbondante, in quella di Rovigo (*Del Fiume*).

Emilia : Rara nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Di passaggio abbondante nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio regolare nel Nizzardo, specialmente nell'autunno (*Gal.*). Comune, ma non abbondante nel distretto di Savona: giunge in ottobre e novembre, alcuni svernano: parte o ripassa in marzo ed aprile (*Piccone*): così nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Invernale, dal settembre a tutto marzo, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Nella prov. di Lucca giunge in copia in novembre per svernare, ma un anno ne trovai sul Serchio nella seconda metà di settembre (*Martorelli*): passa in ottobre (*Fontebuoni, Gragnani*). Invernale e di passo al piano nel distretto di Fauglia. Pisa (*Ott*): frequente in ottobre e marzo in quello di Lavajano (*Papasogli*). Frequente di passo in marzo ed aprile nella prov. di Firenze (*Lenzi, Turchetti, Fontebuoni*): sverna da noi giungendo in ottobre-novembre (*Giglioli*). Non comune di passo in marzo ed in autunno nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Invernale e comune ai due passi in Val di Chiana; ne uccisi una in giugno nelle colmate cortonesi (*Griffoli*). Avuta in dicembre nel distretto di S. Gimignano, Siena (*Paulucci*). Invernale e comune nelle prov. di Siena e di Grosseto, e specialmente in questa (*Dei, Ademollo*). Invernale e abbondante in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano, passa in marzo-aprile ed in ottobre-novembre (*Paolucci*).

Lazio: Abbondante nell'inverno al piano nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente, di passo, in novembre e marzo-aprile nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Frequente al piano nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Qualche individuo isolato passa all'isola di Capri nell'aprile (*Cerio*).

Puglie: Abbonda in grossi branchi tutto l'inverno, giunge in settembre e parte in aprile (*De Romita*).

Calabrie: Abbondantissima nell'inverno: di passo in novembre e marzo nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Così in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune in marzo-aprile e novembre-dicembre in prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa, invernale e

di passo in aprile ed ottobre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Giunge a branchetti in ottobre-novembre e parte in febbraio nel distretto di Terranova. Caltanissetta (*Carrara*). Frequente al piano l'inverno in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Invernale e di passo abbondante in autunno (*Bonomi*).

373. *Strepsilas Interpres* Linn.

VOLTAPIETRE.

Voltapière (*Padova*) — Pescairolla (*Nizza*) — Voltaprie (*Arenzano*) — Papunceddu (*Mess.*) — Turturi de mari (*Sard.*).

Lombardia: Veduto nella prov. di Cremona, ove la sua comparsa è affatto accidentale, il 10 maggio 1855 (*Ferragui*). Un esemplare venne ucciso il 16 maggio 1879, all'Isona presso la foce del Ticino in Po (*Pavesi*).

Veneto: Nella prov. di Padova qualche individuo si vede quasi tutti gli anni (*Arrigoni*).

Liguria: Di scarso passaggio, specialmente in primavera, nel Nizzardo (*Gal.*). Raro in primavera nel distretto di Arenzano e Cogoleto. Genova (*Luciani*). Raro nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Specie rara nella prov. di Lucca, ma quasi ogni anno in maggio se ne prendono alle reti nel padule di Massaciuccoli, ove molti uccelli acquatici e di ripa si pigliano in quel modo in quella stagione; una sola volta l'ebbi in settembre (*Gragnani*). Accidentale nel Senese ed in Maremma (*Dei, Ademollo*); ne ebbi uno da Orbetello nel maggio 1847 (*Dei*).

Marche: Raro di passo (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie: Scarso, ma non raro; si vede in autunno, ma più facilmente in primavera, aprile (*De Romita*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Ruggieri, Pistone*).

Sardegna : Ne uccisi in agosto, autunno, inverno e primavera: il 18 agosto 1888 ne presi due, maschio e femmina non lungi dal ponte della Scaffa, Cagliari (*Bonomi*).

374. *Hæmatopus Ostralegus*, Linn. (ex Bellon)

BECCACCIA DI MARE.

Beccassa d' ma (*Basso-Piem.*) — Galinazza de mâr (*Milano*) — Caenâno (*Padova*) — Becassa de mae (*Spezia*) — Facianotta (*Mess.*) — Beccaccia de mari (*Sard.*).

Piemonte : Di casuale comparsa nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Rarissima nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di rara comparsa in aprile nella prov. di Cremona; nell'anno 1886 fu però straordinario il passo di questa specie sul Po: il 3 aprile un branco di 10 individui venne sterminato dal cacciatore G. Premoli, ed erano tutti maschi; nello stesso mese un altro branco di oltre 20 individui venne osservato, ed altri isolati (*Ferragni*). Rara: presa ad Ostiglia nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente di comparsa accidentale in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Accidentale in aprile nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di scarso passaggio in primavera nel Nizzardo (*Gab.*). Rara nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Rara, di doppio passo nel distretto di Spezia (*Carrazzi*).

Toscana : Scarsa in aprile e maggio sul litorale della prov. di Lucca (*Martorelli*); dicesi abbia nidificato alla foce del Serchio (*Gragani*). Scarsa nella prov. di Firenze, ne uccisi una nel marzo 1873 (*Fontebuoni*); ne ebbi una uccisa l'11 aprile 1886 a Sesto fiorentino (*Giglioli*). Rara in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarsa nell'inverno ed in

primavera nel Senese ed in Maremma (*Dei, Ademollo*); avuta in marzo (*Dei*).

Marche : Rara (*Paolucci*).

Campania : Di scarso passo nella seconda metà di aprile nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Di passo regolare e spesso anche copioso a cominciare dalla fine di luglio a tutto l'agosto ed il settembre e sino alla metà di ottobre; rara in primavera (*De Ròmita*).

Calabrie : Non rara sul litorale in aprile e maggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Rara nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna : Invernale e di doppio passo, non nidificante (*Bonomi*).

SCOLOPACIDÆ

(*Scolopacidi*).

375. *Recurvirostra* Avocetta, Linn. ex Gess.

AVOCETTA.

Becc' a lesina (*Lucca*) — Lesina (*Fucecchio*) — Aciedd salvaggio (*Bari*) — Beccu tortu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte : Molto scarsa nella prov. di Torino (*Gasca*).

Lombardia : Nella prov. di Pavia molte furono vedute e varie uccise nella primavera 1877 a Pont' Albera (*Paresi*). Di casuale comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Rara; presa a Cizzolo in quella di Mantova (*Pagliai*). Accidentale in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Rara nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Di rara comparsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di scarso passaggio in primavera nel Nizzardo (*Gal.*). Avventizia nel distretto di Savona: ne ebbi una il 25 maggio 1882 ed un'altra il 19 aprile 1886, in Albissola (*Piccone*). Rara e primaverile nel distretto di Spezia (*Caruzzi*).

Toscana: Scarsa in aprile e maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Gragnani*). Rara nel distretto di Lari, Pisa, ove la vidi una sola volta (*Papasogli*). Accidentale nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*): ne ebbi una uccisa a Campi-Bisenzio, Firenze, il 26 marzo 1883 (*Giiglioli*). Non rara, ma passa soltanto in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarsa in Toscana, ove capita più facilmente in primavera: nel 1885 varie furono prese nei dintorni di Firenze (*Roster*).

Marche: Rara (*Paolucci*).

Campania: Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Scarsa: s'incontra più facilmente nella primavera (*De Romita*).

Sicilia: Scarsa; ma apparentemente di passaggio regolare da marzo a maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Rara: ne vidi una sola uccisa nel dicembre 1878, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Invernale, ma irregolare nelle sue comparse: alcuni anni giunge copiosa, in altri è assai scarsa; parte nel marzo (*Bonomi*).

376. *Himantopus candidus*, Bonnat.

CAVALIER D'ITALIA.

Sgambirlo (*Padova*) — Passegua (*Arenzano*) — Riggitanu (*Calabr.*) — Cavaleri (*Mess.*) — Straccacaccia, Jammi lunghi (*Modica*) — Francisottu (*Terran. Sicil.*) — Piedi-luonghi (*Castell.*) — Cavalier d'Italia (*Sard.*) — Solo (*Cagliari*).

Piemonte: Qualche raro individuo s'incontra nei mesi di maggio e settembre lungo i fiumi Stura e Tanaro, nella

prov. di Cuneo (*Abbr.*). Un esemplare fu preso a Villastellone nella prov. di Torino, il 18 aprile 1886 (*Bainotti*). Molto scarso nel distretto di Torino (*Gasca*). Accidentale nella prov. di Alessandria; due vennero presi nella primavera 1874 presso Gazzo, Novi (*Camusso*).

Lombardia: Nella prov. di Pavia ne vidi due uccisi il 29 e 31 marzo 1878. e vari presi alla fine d'aprile 1882, sempre nelle vicinanze di Pavia (*Pavesi*). Di comparsa accidentale nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Raro in primavera in quella di Mantova (*Pagliu*). Accidentale in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non tanto raro nel Friuli (*Vallon*). Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di rara comparsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio piuttosto scarso in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Di comparsa irregolare nel distretto di Savona, in primavera; non veduto dal 1876 (*Piccinet*); raro in primavera in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Di passo in aprile e maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli*); ha nidificato per molti anni a Massaciucoli (*Gragnani*). Scarso in aprile nella prov. di Firenze (*Lenzi, Fontebuoni*); avuto anche nel marzo (*Giglioli*). Raro in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Ogni anno vedesi in buon numero in Val di Chiana, ma soltanto in marzo ed aprile (*Griffoli*). Di passo non regolare in maggio e giugno nel Senese ed in Maremma (*Dei, Ademollo*). Non raro al passo primaverile in Toscana, ma irregolare nell'epoca e nell'abbondanza (*Roster*).

Marche: Scarso al piano (*Paolucci*).

Campania: Di scarso passaggio nella prima metà di aprile e nella seconda di ottobre, nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di passo irregolare, ma non copioso in aprile. più di rado si vede nell'autunno (*De Romita*).

Calabrie: Non scarso, specialmente in aprile e maggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Accidentale in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Ruggeri*); di passo in marzo-aprile e più scarsamente in settembre (*Pistone*). Scarso, di passo, in marzo e settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte*, *Garofalo*). Di passo regolare in quello di Terranova, Caltanissetta (*Carcano*). Raro; fu abbondante nel 1842 nel distretto delle Madonie, Palermo, ove sembra essere invernale (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Di scarso passo in primavera (*Bonomi*).

377. *Phalaropus fulicarius* Linn.

FALAROPO A BECCO LARGO.

Lombardia: Di accidentale comparsa: un individuo fu preso a Casalmoro nella prov. di Mantova (*Paglia*).

Liguria: Di comparsa accidentale in primavera nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana: Accidentale affatto nella prov. di Firenze: ne conservo uno ucciso a Borgo S. Lorenzo (*Arif. Ital.* p. 381) nell'agosto 1870 (*Giglioli*).

Campania: Di casuale comparsa: due soli sembra siano stati presi nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

378. *Phalaropus hyperboreus* (Linn.)

FALAROPO A BECCO SOTTILE.

Lobipes hyperboreus, Salvad.

Lombardia: Un esemplare di questa specie così rara per noi venne ucciso nei pressi di Cremona il 30 settembre 1887; lo ebbe il signor Odoardo Ferragni già tanto benemerito dell'Ornitologia italiana. Il 4 settembre 1887 fu preso sul Lago di Varese un Falaropo, indicato dal signor E. Bonomi

di Milano col nome di *Ph. lobatus*; probabilmente era compagno dell'individuo citato sopra (*Giglioli*).

Liguria: Di casuale comparsa in primavera nel Nizzardo (*Gal*).

Puglie: Accidentale: una femmina venne presa presso a Bari il 18 ottobre 1881 (*De Romita*).

379. *Limicola platyrhyncha* Temm.

GAMBECCHIO FRULLINO.

Frullino (*Lucca*) — Torolino pedocchiello de Secariello (*Nap.*).

Piemonte: Scarso nella prov. di Torino (*Gasca*).

Lombardia: Di passaggio scarso ed irregolare nella prov. di Cremona; avuto nel settembre 1883 e nell'agosto e settembre 1884 (*Ferragni*).

Veneto: Piuttosto frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di rara comparsa in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Accidentale nel distretto di Spezia: una sola cattura constatata nel maggio 1860, a Sarzana (*Carazzi*).

Toscana: Ne ebbi cinque presi a Massaciuccoli, prov. di Lucca (*Martorelli*); vi capita in maggio, agosto e settembre (*Gragnani*).

Puglie: Non raro; vedesi specialmente in primavera (*De Romita*).

Sicilia: Scarso nella prov. di Messina (*Pistone*).

380. *Pelidna maritima* (Gunn, in Leem., ex Brev.)

PIOVANELLO VIOLETTA.

Arquatella maritima, Salvad.

Pescairolla (*Nizza*).

Liguria : Di accidentale o rara comparsa in autunno nel Nizzardo (*Gal*).

Toscana : Accidentale affatto nella prov. di Firenze: ne ebbi uno da S. Donnino (*Arif. Ital.* p. 384) ucciso il 10 novembre 1883 (*Giglioli*).

Sardegna : Raro assai: ne ebbi un solo individuo nel dicembre 1878 e lo mandai a Torino (*Bonomi*).

381. *Pelidna subarquata* (Guld.)

PIOVANELLO.

Ancylocheilus subarquata, Salvad.

Totantin, Biseghin (*Rovigo*) — Pescairolla rougia (*Nizza*) — Bulgaria, Rosëza (*Savona*) — Pettiruscio (*Arenzano*) — Fis-cion ròsai, Tortoin ròsai (*Spezia*) — Prillo (*Lucca*) — Trolino romano, Romaniello (*Nap.*) — Papióla beccu-stortu (*Mess.*) — Gadduzzu di mare, o ciurluviu (*Terran. Sicil.*).

Piemonte : Due soli esemplari che io sappia furono uccisi nella prov. di Cuneo: uno nel 1860 ed un altro nel 1875 (*Abrev.* Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*). Raramente e soltanto in primavera capita al piano nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia : Ucciso da me una sola volta in autunno nella prov. di Pavia (*Paresi*). Di passaggio regolare dalla fine di aprile al principio di giugno nella prov. di Cremona, ove non venne osservato in autunno (*Ferragni*). Raro nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Assai raro nel Friuli, ove ne ebbi uno soltanto in primavera (*Valtoni*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Di passaggio in primavera ed in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona dalla fine

d'aprile al principio di giugno (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente ai passi nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Molto abbondante in maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); vedesi di passo anche in agosto (*Graquani*). Di copioso passo al piano specialmente in primavera, nel distretto di Fauglia. Pisa (*Ott*). Frequente di passo in aprile e maggio nella prov. di Firenze (*Turchetti, Fontebuoni*); ne vennero uccisi sette od otto a Fucecchio il 22 giugno 1886: passa anche in settembre-ottobre (*Griglioli*). Comunissimo in aprile e maggio in Val di Chiana, più raro assai in autunno; ne ho veduti in agosto (*Griffoli*). Comune di passo in primavera nel Senese (*Dei*); invernale e di passo in grossi branchi nel maggio in Maremma (*Ademollo*). Abbondantissimo, specialmente al passo primaverile, in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Campania: Di passo copioso nella seconda metà di aprile ed in quella di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di passo abbondante alla fine d'aprile e nella prima metà di maggio, scarso in settembre e ottobre (*De Romita*).

Sicilia: Comune di passo in aprile-maggio, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Giunge in settembre-ottobre e parte in marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Comune; arriva in agosto-settembre, abbonda nell'inverno e parte al principio dell'estate (*Bonomi*).

382. *Pelidna alpina* (Linn.)

PIOVANELLO PANCIA NERA.

Gireu, Rivelin (*Lago Maggiore*) — Bisighin (*Friuli*) —
Lodolèta marina (*Padova*) — Pescaro (Rolla) — Nizza — Bulga-

ria, Rósca (Savona — Spilorso (Arenzano) — Fisc-ción rós-sai (Spezia) — Piovanello, Prillo (Lucca) — Bigio ferro (Sesto, Firenze) — Piovanello piccolo (Fucecchio) — Torolino de vierno (Nap.) — Papiuledda (Mess.) — Gadduzzu di mari picciulu (Terran. Sicil.) — Beccaccina differenti (Sard.).

Lombardia : Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Comune di doppio passaggio, in marzo ed aprile ed in settembre ed ottobre, nella prov. di Cremona, ove è meno abbondante nell'autunno (*Ferragui*). Generalmente raro (*Turati*); piuttosto frequente in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto : Comunissimo durante l'inverno nel Friuli (*Val-lon*). L'8 gennaio 1888 ebbi a Venezia un maschio di questa specie col ventre in gran parte nero (*Ninni*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Raro nella prov. di Parma: ne vennero presi quattro il 19 marzo 1888 (*Del Prato*).

Liguria : Specialmente di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona ove passa da marzo a maggio e da settembre a novembre (*Piccone*); non raro in primavera in quello di Arenzano (*Luciani*). Di doppio passo nel distretto di Spezia, ma meno frequente della specie precedente (*Carazzi*).

Toscana : Scarso in primavera nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Abbastanza frequente in aprile-maggio nel distretto di Fucecchio ed in quello di Sesto, Firenze (*Turchetti*, *Fontebuoni*): avuto pure in marzo ed in novembre (*Giglioli*). Non comune nel Senese (*Dei*); giunge d'autunno e sverna in Maremma (*Ademollo*).

Campania : Frequente: passa nella seconda metà di aprile ed in quella di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Invernale e di doppio passo; il 20 agosto 1886 ne ebbi una femmina in perfetto abito nuziale (*De Romita*).

Sicilia : Scarso nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*).

Giunge in settembre-ottobre e parte in marzo, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Comune: giunge in agosto-settembre e rimane l'inverno (*Bonomi*).

383. *Actodromas fuscicollis* VIEILL.

GAMBECCHIO AMERICANO.

Anche sull'esemplare di questa specie che pare essere stata preso in Toscana, il Salvadori (*Ucc. ital.* p. 221) esprime dubbî soverchi; io non posso che confermare quanto ho già scritto in proposito (*Avif. Ital.* p. 386).

384. *Actodromas minuta* (Leisl.)

GAMBECCHIO.

Gambett (*Mil.*) — Pescairolla picouna (*Nizza*) — Giliardinetta (*Arenzano*) — Burgainetto, Strillin (*Savona*) — Fisc-cion (*Spezia*) — Piovanellino (*Lucca*) — Cocchiume (*Fucecchio*) — Gambettino (*Valdich.*) — Torolino pedocchiello de Romaniello (*Nap.*) — Lodula di mari (*Mess.*).

Piemonte: Accidentale nella prov. di Cuneo; ne uccisi uno il 10 settembre 1876 lungo la Stura vicino a Fossano; un secondo lo uccisi il 7 settembre 1879 vicino a Cuneo (*Abre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*). Accidentale e solo di primavera capita nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di passaggio regolare in aprile e maggio e anche oltre la metà del giugno, e ancora dall'agosto all'ottobre, nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Generalmente raro (*Turati*); frequente in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto: Raro nel Friuli: ne ebbi due soltanto presi nei pressi di Marano al basso durante l'inverno (*Vallon*). Co-

mune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di passaggio nella prov. di Parma, osservato tra l'8-10 maggio (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove si vede in aprile e maggio ed in settembre (*Piccone*). Frequente in primavera in quello di Arenzano (*Luciani*). Non molto frequente in primavera e scarso in autunno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune in maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*; veduto di passo anche in luglio (*Gragnani*). Frequente di passo nella prov. di Firenze (*Turchetti*, *Fontebuoni*; avuto anche in settembre (*Giglioli*). Comune in maggio in Val di Chiana, vedesi anco in agosto (*Griffoli*). Passa in maggio ed in settembre nelle prov. di Siena e di Grosseto, ma abbonda più in primavera (*Dei*, *Ademollo*). Comune durante il passo primaverile in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso di passo (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Frequente, passa nella seconda metà di aprile ed in quella di ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Invernale e di passo abbondante in aprile e maggio, meno frequente nell'autunno; ne ebbi in veste nuziale il 20 agosto 1886 (*De Romita*).

Sicilia: Comune alle epoche del passo nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Non raro nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Passa in autunno ed in primavera, ma ne ho ucciso in ogni stagione; che sia nidificante? (*Bonomi*).

385. *Actodromas Temmincki* Leisl.

GAMBECCIO NANO.

Pescairolla picouna (*Nizza*) — Burgainetto, Strillin (*Savona*) — Nano (*Gen.*) — Piovanelino (*Lucca*) — Gambettino (*Valdich.*) — Spiriticchiu (*Mess.*).

Lombardia: Assai più raro della specie precedente nella prov. di Cremona, ove si vede nel maggio e nel settembre (*Ferragni*).

Veneto: Poco comune nella prov. di Padova, è forse confuso colla specie precedente (*Arrigoni*).

Emilia: Di passaggio nella prov. di Parma, osservato il 16 maggio (*Del Prato*).

Liguria: Non frequente, di passaggio, in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto scarso nel distretto di Savona, ove si vede in aprile e maggio (*Piccone*). Scarso assai in quello di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Scarso nel maggio e veduto anche in luglio nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Scarso assai; vedesi in primavera soltanto in Val di Chiana (*Griffoli*). Di scarso passo in maggio nella Maremma (*Ademollo*). Piuttosto comune al passo primaverile in Toscana, si associa generalmente colla specie precedente (*Roster*).

Puglie: Piuttosto scarso: si vede però tutti gli anni in primavera, insieme alla specie precedente (*De Romita*).

Sicilia: Non scarso alle epoche del passo nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Di scarso passaggio in primavera ed in autunno; al Capo settentrionale ne uccisi in maggio ed in dicembre (*Bonomi*).

386. *Tringa Canutus*, Linn.

PIOVANELLO MAGGIORE.

Bulgaria, Rösäza (*Savona*) — Piovanello (*Lucca*) — ? Tirolo (*Napoli*) — Gadduzzu di mari (*Mess.*).

Il prof. R. Collett facendomi vedere a Cristiania la sua splendida Collezione di uccelli della Norvegia, mi assicurò che gli individui bigi di questa specie sono sempre giovani, e non adulti in abito invernale.

Lombardia: Di rara comparsa (*Turati*).

Liguria: Di raro passaggio in primavera ed in autunno nel Nizzardo (*Gal.*). Nel distretto di Savona è assai raro; ne ebbi uno solo preso ad Albissola il 21 maggio 1876 (*Piccone*). Raro, e sempre in autunno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Ne ebbi uno a Massaciuccoli, Lucca, nel maggio 1881 (*Gragnani*). Un maschio adulto ucciso nei pressi di Pisa il 7 maggio 1886, è stato donato alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani dal signor D. A. Roster (*Giglioli*). Raro in aprile nella prov. di Grosseto (*Ademollo*). Raro in Toscana, ove capita più facilmente in primavera alle foci dei fiumi (*Roster*).

Campania: Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Raro, di passo; ne ebbi in novembre ed in febbraio (*Bonomi*).

387. *Calidris Arenaria* (Linn.) (ex Willugh.)

CALIDRA.

Gros Courentin (*Nizza*) — Piovanello (*Lucca*) — Tiro-
lino (*Napoli*) — Zurruliu de mari (*Sard.*).

Lombardia: Di casuale comparsa nella prov. di Cremona, ne ebbi uno sul Po l'11 ottobre 1881 (*Ferragni*). Accidentale nella Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Piuttosto frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di passaggio, specialmente in primavera nel Nizzardo (*Gal.*). Di doppio ma di scarso passaggio, specialmente in autunno, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non comune in maggio a Massaciuccoli, Lucca (*Gragnani*). Di casuale comparsa in Val di Chiana (*Griffoli*). Rara in Maremma (*Ademollo*).

Campania: Di scarso passaggio in ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Scarsa: si vede in primavera e nell'autunno (*De Romita*).

Sicilia : Di passo ora scarso, ora abbondante in marzo-aprile e da ottobre a dicembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna : Non comune, invernale e di passo nell'autunno; ritengo che qualcuna possa nidificare nell'isola. Non solo ne uccisi diversi nell'estate, ma tra essi femmine feconde, che feci osservare al dott. Lepori e che depositai nel R. Museo di Cagliari (*Bonomi*).

388. *Machetes Pugnax* Linn. ex Aldrov.

GAMBETTA.

Becassot (*Basso-Piem.*) — Gambett, Gambettôun (*Milano*) — Puaza (*Mantova*) — Gambetton (*Rovigo*) — Gambetôn (*Padova*) — Pescairolla (*Nizza*) — Lunea, Bulgaria de sciumente (*Savona*) — Lippun (*Arenzano*) — Fisc-cion, Gambèta (*Spezia*) — Gambettone (*Pisa*) — Tofèlla (*Nap.*) — Monacella (*Foggia*) — Jamminu (*Mess.*) — Beccaccina peis gurgus (*Sard.*).

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo, essendovi di passaggio in aprile ed in settembre (*Abre*). Comune da marzo a maggio nella prov. di Torino, scarsa in autunno lungo il Po e nelle risaie; la ebbi anche in dicembre (*Martorelli*). Rare volte alle due epoche del passo si vede nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Accidentale nell'Ossola, ove vennero prese due femmine giovani nel 1878 (*Barzatta*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*): di passaggio, ora scarso ora abbondante, in marzo e settembre (*Magretti*). Di passaggio abbondante in marzo ed aprile nella prov. di Cremona; ne vidi alcuni il 4 giugno 1884; forse erano giovani che rimangono senza però riprodursi. Ripassa in minor numero nell'agosto e settembre

Ferrugini. Frequente nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente scarsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Abbastanza frequente d'inverno e durante le due epoche del passo nel Friuli (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di passaggio piuttosto scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio primaverile nel Nizzardo: rara in abito nuziale (*Gali*). Comune durante il passo nel distretto di Savona; qui abbondano assai più le femmine, e quelle registrate sono il doppio dei maschi: di questi ne ebbi soltanto nel 1871 e nel 1886, sempre in abito invernale (*Piccione*). Comune in primavera nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Frequente nel passo primaverile; qualcuna rimane l'estate, ed io ebbi una femmina adulta il 4 giugno; qualcuna sverna nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comunè da marzo a maggio, scarsa in autunno nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*): di passo anche in febbraio ed agosto nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Di abbondante passo al piano in marzo ed aprile, nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Comune di passo in marzo, aprile e maggio nella prov. di Firenze (*Turchetti, Fontebuoni*): avuta pure in settembre (*Giglioli*). Scarsa in marzo nel Casentino. Arezzo (*Beni*). Assai comune in autunno, inverno e primavera; vedesi anche alla fine di maggio in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo regolare in marzo ed aprile nelle prov. di Siena e Grosseto (*Dei, Ademollo*). Assai comune in Toscana, specialmente al passo primaverile (*Roster*).

Marche: Comune di passo al piano in marzo ed aprile (*Paolucci*).

Campania: Frequente, passa in aprile ed ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Abbondante in primavera; meno nell'autunno; non poche svernano, ed il 9 giugno 1888 ebbi un maschio in completo abito nuziale ucciso presso Bari (*De Roma*).

Sicilia: Passa in marzo-aprile e da ottobre a dicembre, non tanto abbondante, nella prov. di Messina (*Ruggeri. Pistone*).

Sardegna: Di passo regolare, si trova nell'isola da agosto a tutto aprile (*Bonomi*).

389. Bartramia longicauda Bechst.

GAMBETTA AMERICANA.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA, intorno a questa rarissima specie.

390. Tringoides Hypoleucus Linn. ex Gesn.

PIRO-PIRO PICCOLO.

Tiliou (*Alba*) — Piò-piò, Curentin (*Basso-Piem.*) — Gireu de fium (*Lomb.*) — Culbianc d'aqua (*Berg.*) — Gambett (*Mil.*) — Gravotól (*Feltre*) — Culbianco (*Rovigo*) — Viduetta, Bulgarin, Luneu, Fisc-cion (*Spezia*) — Piro-piro, Prillo (*Lucca*) — Tirolì-Tirolì (*Fucecchio*) — Pirullino (*Sestoflorentino*) — Gambettino (*Valdich.*) — Quaglia marina (*I. di Giglio*) — Torolino secariello, Secariello (*Nap.*) — Tirulì (*Calabr.*) — Jadduzzu d'acqua (*Modica*) — Zurrulin de i' spiaggia (*Sard.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo; vi nidifica nel maggio allevando una sola covata di 4 a 5 pulcini; maschio e femmina prendono parte alla incubazione che dura da 15 a 16 giorni (*Abbr.*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*); ivi è comune da marzo ad ottobre e vi nidifica (*Martorelli*). Frequente da aprile ad agosto nella prov. di Alessandria, ove nidifica anche al monte (*Camusso*). Non comune nell'Ossola, ha nidificato lungo il Toca ed elbi le uova (*Pertusi*). Questo fatto è confermato dal cav. G. B. Dell'Angelo di Craveggia, il quale mi ha mandato un pulcino di questa specie colto con un altro lungo il torrente Me-

lezza tra i ponti di Malesco e Majone in Val Vigizzo (Osola il 15 luglio 1888; seppi inoltre da lui che il 7 luglio 1887 vennero presi due altri pulcini simili nella stessa località (*Giglioli*).

Lombardia: Comune al piano lungo i fiumi nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Di doppio passaggio dal marzo al maggio e dal luglio all'ottobre, nella prov. di Cremona, ove qualche coppia rimane a nidificare (*Ferragni*). Raro in primavera nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Frequente, nidificante e di passo in aprile ed agosto nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Non molto frequente nel Friuli; l'ebbi in aprile e giunge però anche in ottobre (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arri-goni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passo in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Comune durante le epoche del passo nel circondario di Savona, ama trattenersi sugli scogli lungo il mare, e si tuffa spesso nell'acqua (*Piccone*). Nidificante e comune in primavera in quello di Arenzano (*Luciani*). Poco frequente in primavera, scarso d'autunno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune da marzo ad ottobre e nidificante nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); sedentario nel distretto di Massarosa (*Graguani*). Di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Comune assai nella prov. di Firenze (*Turchetti*, *Fontebuoni*); nidificante (*Giglioli*). Frequente in marzo-aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune in aprile ed agosto e forse nidificante in Val di Chiana (*Griffoli*). Non comune nel Senese (*Dei*); estivo e nidificante in Maremma (*Dei*, *Ademollo*). Di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso, di passo (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Frequente di passo in aprile ed ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Vedesi in branchi numerosi dalla seconda metà di giugno a tutto agosto; passa anco in primavera, ma in scarso numero (*De Romita*).

Calabrie: Non scarso d'inverno ed in primavera nella prov. di Catanzaro (*De Fiori*). Di passo primaverile in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune. di doppio passaggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarso di passo in aprile ed agosto nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Invernale nel distretto delle Madonie, Palermo: fu più del solito frequente nel 1839 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Comune. sedentario e nidificante: molti giungono in agosto e partono al principio dell'estate (*Bonomi*).

391. *Totanus Ochropus* (Linn.) (ex Gesn.)

PIRO-PIRO CULBIANCO.

Helodromas ochropus, Salvad.

Becassin, Culbianch, Piouravej, Piouravela, Piò-piò, Cugianco d'acqua (*Basso-Piem.*) — Culbianc d'acqua (*Bergamo*) — Travacola (*Milano*) — Piu-piu (*Nov.*) — Pivarina (*Mantov.*) — Totanin (*Vicenza*) — Culbianch da acqua (*Feltre*) — Courentin queu blanc (*Nizza*) — Luneu, Bulgaria (*Sarvona*) — Spilorso (*Arenzano*) — Fisc-cion, Tortoin (*Spezia*) — Pescina, Monachina (*Pisa*) — Piro-piro, Prillo (*Lucca*) — Pirullino (*Sesto-fiorentino*) — Culbianco acquatico (*Casentino*) — Piovanella, Pirulino, Merlino (*Fucecchio*) — Ciuven (*Bol.*) — Torolino riàle (*Nap.*) — Tiruli, Arcignola (*Calabr.*) — Stagnotta (*Mess.*) — Puddicinu di mari (*Lentini*).

Il Salvadori (*Ucc. ital.*, p. 225) non ammette che questa specie possa nidificare in Italia.

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove però nidifica nel maggio allevando una sola covata: le uova de-

poste sono 4 o 5 e la femmina ed il maschio le incubano per 15 a 16 giorni (*Abre*). Di questa specie si vedono individui nella prov. di Torino anche nei più freddi inverni (*Gasca, Pezzi, Martorelli*). Abbastanza comune nel tempo delle migrazioni nella prov. di Alessandria, ove sembra pure nidificare (*Camusso*). Nidifica nel distretto di Crodo, Novara, ove è anco di passaggio in primavera (*Demori*).

Lombardia : Nidifica talvolta nella prov. di Sondrio (*Galli*). Raro assai in quella di Bergamo (*Stefanini*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passo non abbondante in marzo e settembre (*Magretti*). Sedentario nella prov. di Cremona, ma più abbondante nelle epoche del passo; ritengo con certezza che qualcuno si riproduca da noi (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente frequente in Lombardia (*Turati, Borromeo*); vi nidifica (*Borromeo*).

Veneto : Di passaggio al piano nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso in pianura da settembre a maggio nel distretto di Feltre, Belluno, ove non nidifica (*Delaito*). Non raro ed apparentemente sedentario nel Friuli (*Vallon*); Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio specialmente in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Mediocrementemente comune nel distretto di Savona durante il passo in aprile, maggio e settembre; vi deve anche nidificare, giacchè ebbi una femmina il 14 luglio 1874, presa lungo un ruscello in una valle sopra Albissola (*Piccione*). Comune in primavera, più scarso in autunno nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarso, specialmente d'autunno, nel distretto di Spezia, ove è di doppio passo (*Carazzi*).

Toscana : Comune di passo e anche sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*); vedesi anche di luglio a Massaciuccoli (*Gragani*). Di scarso passaggio al piano in primavera nei distretti di Fauglia e Lari, Pisa (*Ott, Papasogli*). Comune e forse nidificante nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*); avuto specialmente in marzo-aprile e settembre (*Gi-*

glioli). Raro in maggio nel Casentino, Arezzo (*Fiorini*). Comune in ogni stagione e sono quasi certo che nidifica in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune nel Senese, ove l'ho veduto anche in agosto e settembre: fui assicurato che cova in Val d'Orcia (*Dei*); di doppio passo e anche nidificante in Maremma (*Ademollo*). Comune e sedentario in Toscana: in alcuni anni però abbonda, mentre in altri scarseggia (*Roster*).

Marche: Frequente (*Paolucci*).

Campania: Frequente di passo in aprile, nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Piuttosto comune: incomincia ad arrivare alla fine di luglio e continua tutto l'autunno; passa pure in marzo ed aprile (*De Romita*).

Calabrie: Comune nella prov. di Reggio (*Moratti*).

Sicilia: Comune di doppio passo nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Lentini, Siracusa (*Bonfiglio*). Invernale in quello delle Madonie, Palermo; fu abbondante nel 1840 (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Di passo, ma pure sedentario e nidificante in abbondanza in tutta l'isola (*Bonomi*).

392. *Totanus Glareola* (J. F. Gmel. ex Linn.)

PIRO-PIRO BOSCARECCIO.

Becassin, Curentin, Piò-piò (*Basso-Piem.*) — Trentin (*Lomb.*) — Pivucce pizzul (*Friuli*) — Totano, Culbianco (*Padova, Rorigo*) — Bulgaria, Luneo (*Sarona*) — Gilardinna (*Arenzano*) — Tortoin (*Spezia*) — Piro-piro, Prillo (*Lucca*) — Pirullino (*Sesto fiorentino, Valdich.*) — Merlino, Pirulino (*Fucecchio*) — Acquarolo (*Marche*) — Torolino siciliano (*Nap.*) — Spiune (*Calabr.*) — Ghirlino (*Foggia*) — Beccaccinu di sciumara (*Mess.*) — Beccaccinu differenti (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in aprile ed in settembre (*Abre*). Un esemplare venne ucciso a Villastellone, Torino, il 18 aprile 1886

(*Bainotti*): scarso in prov. di Torino (*Gasca*); ne obbi uno nell'agosto (*Martorelli*). Abbastanza comune, ma soltanto alle due epoche della migrazione, sino a tutto maggio in primavera, e da agosto ad ottobre, nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Scarso nella prov. di Milano (*Brambilla*). Passa in aprile e maggio e ripassa dal luglio al settembre nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Frequente e forse nidificante nel Friuli; ne ebbi uno il 27 maggio 1882 (*Vallou*). Sembra essere piuttosto comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di scarso passaggio in primavera nel Nizardo (*Gal*). Piuttosto comune nel distretto di Savona, ma soltanto durante il passo in marzo, aprile e maggio (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune di doppio passo, specialmente in aprile nella prov. di Lucca: l'ho veduto anche in giugno e luglio a Massaciuccoli, onde non è improbabile che vi nidifichi (*Gragnani*). Di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Comune e forse nidificante nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*); avuto in marzo-aprile e primi di luglio (*Giglioli*). Comunissimo in aprile, passa anche nel settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Non comune nel Senese (*Dei*); giunge in aprile a branchi nella Maremma e rimane l'estate (*Ademollo*). Comune assai e nidificante in Toscana; sarebbe la specie più comune ed avrebbe nidificato a Fucecchio (*Roster*).

Marche: Scarso di passo (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie: Frequente in primavera, aprile-maggio: meno frequente in autunno a cominciare dalla metà di agosto (*De Romita*).

Calabrie: Frequente al passo primaverile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Non raro di passo in aprile-maggio ed in agosto-settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Talvolta di passo abbondante: ve ne sono nell'isola dall'agosto all'aprile (*Bonomi*).

393. *Totanus stagnatilis*, Bechst.

ALBASTRELLO.

Becassin gambe lunghe, Piò-piò, Curentin, Curentin d'acqua (*Basso-Piem.*) — Bulgaria, Lunea (*Savona*) — Fisce-cion, Tortoin (*Spezia*) — Piro-piro, Prillo (*Lucca*) — Tagliaferro, Gambettone (*Brezzi, Firenze*) — Torolino gam-melonghe (*Nap.*) — Beccaccin jammi longhi (*Mess.*) — Zurrulutedda (*Sard.*).

Piemonte: Accidentale; ne ebbi uno solo nella prima quindicina di ottobre 1876, a Cuneo (*Abbr.*). Non comune e di solo passaggio in primavera nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: È stato preso qualche volta a Colico nella prov. di Sondrio (*Galli*). Non raro nella prov. di Pavia (*Pavesi*). Piuttosto raro, osservato nel maggio e nel giugno nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di dubbiosa comparsa nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Il signor M. Gianese di Lonigo scrive al « *Boll. del Naturalista* » (IX, 1-2, p. 18) di aver avuto un maschio adulto di questa specie in quel distretto nel maggio 1888 (*Giglioli*).

Emilia: Di passo nella prov. di Parma; notato il 7 e 23 aprile; è raro (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Giall.*). Piuttosto scarso nel distretto di Savona e non tutti gli anni (*Piccone*). Scarso nel distretto di Spezia, ove giunge dopo la metà di aprile (*Carazzi*).

Toscana: Non comune, di passo in marzo, nella prov. di

Lucca: ne uccisi anche nella prima metà di agosto 1887 a Massaciuccoli (*Gragnani*). Non raro in primavera nella prov. di Firenze (*Fontebuoni*); avuto in marzo ed aprile (*Giglioli*). Scarso in primavera nella prov. di Grosseto (*Ade-mollo*). In Toscana era in passato raro, ora si sarebbe fatto più comune; passa nel marzo-aprile in branchetti (*Roster*).

Marche: Scarso (*Paolucci*).

Campania: Di scarso passaggio in aprile ed in ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di passo regolare, ma piuttosto scarso in marzo ed ai primi dell'aprile (*De Romita*).

Calabrie: Scarso, di passo, in primavera (*De Fiore*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Ruggeri*); di passo in aprile-maggio ed agosto-settembre (*Pistone*).

Sardegna: Piuttosto raro, ma ne ebbi dalle Saline di Cagliari in aprile ed in settembre (*Bonomi*).

394. *Totanus Calidris* (Linn.) ex Aldrov.

PETTEGOLA.

Fouloun, Piò-piò gross, Courenton (*Basso-Piem.*) — Totanòn (*Padova*) — Courentin a pe rougie (*Nizza*) — Cièuvì (*Arenzano*) — Bulgaria de gambe russe (*Savona*) — Fisc-ciòn (*Spezia*) — Chio-chio (*Lucca*) — Tirolino (*Nap.*) — Spiune (*Calabr.*) — Papiola 'mperiali (*Mess.*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in aprile ed in settembre (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*); la incontrai lungo il Po e la Stura nella prima metà di agosto (*Martorelli*). Piuttosto comune soltanto durante il passo primaverile nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Di doppio passaggio ed invernale nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Non frequente in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente scarsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Non rara e pare sedentaria nel Friuli; l'ho incontrata nel giugno, ma abbonda più dall'ottobre all'aprile (*Vallon*). Comune e sedentaria nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarsa nella prov. di Parma, osservata il 21 marzo e 22 aprile (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove si vede in marzo aprile e maggio, e ancora nel settembre; ne ebbi una il 22 febbraio 1887 (*Piccone*). Comune in primavera nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Assai frequente da marzo a giugno nel distretto di Spezia: ritengo che vi nidifichi, giacchè nel giugno ebbi maschi e femmine (*Carazzi*).

Toscana: Comune di doppio passo nella prov. di Lucca (*Martorelli*); forse nidificante a Massaciuccoli, ove giunge in aprile (*Gragnani*). Di passo al piano nel distretto di Fauglia Pisa (*Ott*). Non rara e forse invernale nella prov. di Firenze, ove l'ebbi in aprile e novembre (*Giglioli*). Invernale, ma specialmente comune in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Non comune nel Senese, ove l'ebbi in febbraio e marzo (*Dei*); è scarsa e passa in primavera in Maremma (*Ademollo*). Comune alle epoche del passo in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarsa (*Paolucci*).

Campania: Di scarso passo in aprile ed ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Comincia a farsi vedere in giugno, prima ancora del *T. Hypoleucus*; in primavera è assai più abbondante che nell'autunno (*De Romita*).

Calabrie: Di passo abbondante dalla metà di marzo a quella di maggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia: Scarsa, di passo in aprile-maggio ed in settembre nella prov. di Messina (*Ruggieri*, *Pistone*). Scarso in primavera nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Comune dall'agosto a tutta la primavera, abbondante di passo e anche nidificante (*Bonomi*).

395. Totanus fuscus (Linn.) (ex Briss.)

GAMBETTA FOSCA.

Totano moro (*Aut. Ital.*) — Piò-piò, Curenton (*Basso-Piem.*) — Totano (*Rovigo*) — Courentin (*Nizza*) — Cieuvi grosso (*Arenzano*) — Fischioncello (*Lucca*) — Gambettone (*Sesto fiorentino*) — Gambetto nero — (*Valdich.*) — Tirolino (*Nap.*) — Papiola nira (*Mess.*).

Piemonte: Qualche raro esemplare capita lungo il fiume Stura verso la fine di agosto, nella prov. di Cuneo (*Abre*). Rara e di solo passaggio in primavera al piano nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Di passaggio poco frequente in marzo e settembre nella prov. di Milano (*Magretti*). Fu ucciso il maschio in abito perfetto il 7 maggio 1882 a Sabbione, prov. di Pavia (*Pavesi*). Piuttosto rara, di doppio passaggio, nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Generalmente rara in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarsa nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di scarso passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Comune in primavera nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Di doppio passo, ma assai scarsa nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune di passo in aprile nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Non rara in marzo, aprile, maggio e settembre nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Piuttosto scarsa in primavera ed autunno in Val di Chiana, ove ne ho ucciso anche in luglio (*Griffoli*). Non comune, avuta in febbraio e marzo nel Senese (*Dei*); passa in primavera nella Maremma (*Ademollo*). Comune assai al passo in primavera e così in ottobre in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Campania : Di scarso passaggio in aprile ed ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Non rara, di doppio passo: quello primaverile dura a tutto maggio (*De Romita*).

Sicilia : Scarsa, di passo in aprile-maggio ed in settembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna : Non molto comune; ne ebbi in primavera ed in autunno (*Bonomi*).

396. *Totanus nebularius* (Gunn. in Leems.)

PANTANA.

Totanus glottis, Salvad.¹

Gambinon (*Parma*) — Pescairolla (*Nizza*) — Bulgaria (*Savona*) — Spilorso (*Arenzano*) — Fisc-cion grosso (*Spezia*) — Fischione (*Lucca*) — Chioco (*Valdich.*) — Acquarolo (*Marche*) — Tirolino (*Nap.*) — Verdatero (*Bari*) — Chiuveppone (*Barletta*) — Jamminu riali (*Mess.*).

Lombardia : Comunissima durante il passo in aprile-maggio ed in agosto-settembre nella prov. di Cremona, ove in scarso numero è anche sedentaria (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Pagliai*). Generalmente scarsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Piuttosto frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia : Non comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gale*). Abbastanza comune durante il passo nel distretto di Savona, cioè in aprile e maggio e dalla fine di agosto a tutto settembre (*Piccone*). Rara in primavera in quello di Aren-

¹ Lo *Scolopax glottis* di Linneo (*Syst. Nat. I* (edit. XII) p. 245 n. 10), è evidentemente il *Totanus fuscus* in abito invernale: « *rostro recto basi inferiore rubro....* »

ziano *Luciani*. Scarsa, ma di doppio passaggio, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune in aprile e ancora di passo in luglio ed agosto nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Non rara in aprile e maggio nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Poco frequente, ma si vede quasi in ogni stagione in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarsa nel Senese; l'ebbi in febbraio (*Dei*); estiva e non comune in Maremma (*Ademollo*). Comune soltanto al passo primaverile in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso di passo (*Comizio agrario Fabriano*).

Campania: Di scarso passaggio in aprile ed ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Frequente, ma non abbondante, di passo dal luglio a tutto settembre ed in marzo ed-aprile (*De Romita*).

Sicilia: Rara assai, passa in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Piuttosto rara, ma ne ebbi in autunno ed in primavera (*Bonomi*).

397. *Terekia cinerea* (Güld.)

PITTIMA NANA.

Terechia (*Aut. Ital.*).

Veneto: Nell'ottobre 1876, andando a caccia di *Lodole* nelle Valli Veronesi in compagnia di mio fratello, questi uccise un piccolo *Trampoliere* che non potei allora determinare; alcuni giorni dopo acquistai l'*Ornitologia italiana* del Savi, e dai caratteri tanto evidenti conobbi esser stato quello una *Terekia cinerea*. Allora io non raccoglievo uccelli e disgraziatamente quel raro esemplare non venne conservato (*Dal Fiume*).

Liguria: Nel suo primo elenco il prof. Carazzi la dice accidentale nel distretto di Spezia, sulla fede del prof. Magni-Griffi, il quale ne avrebbe avuto una a Sarzana nel maggio 1860; più tardi seppe che tale notizia si basava sopra

un equivoco e che la *Terekia* non è per ora stata presa in quel distretto (*Giglioli*).

Toscana: Ne ebbi una a Massaciuccoli, Lucca, nel maggio 1883 (*Gragnani*).

Puglie: Accidentale; due sole catture note: una femmina a Barletta il 20 novembre 1876, ed un maschio a Bari in agosto 1878 (*De Romita*).

398. *Limosa melanura*, Leisl.

PITTIMA.

Limosa belgica, Salvad.

Beccassa d'acqua, Beccassa d'ma, Gambe lounghes (*Basso-Piem.*) — Sgneppôun de mâr (*Mil.*) — Gambetton (*Rovigo*) — Arsega (*Parma*) — Beccassin roux (*Nizza*) — Fiscion reale, Russa (*Spezia*).

Piemonte: Scarsa al piano in prov. di Cuneo, di passaggio soltanto nel maggio (*Abre*). Di comparsa accidentale nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Di passaggio in Valtellina (*Galli*). Rara nella prov. di Milano (*Brambilla*). Di scarso passaggio in marzo ed aprile nella prov. di Cremona (*Ferragioni*). Accidentale nell'inverno in quella di Mantova (*Pagliai*). Generalmente non rara in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di passaggio nella prov. di Parma, è però rara: io la ebbi il 27 aprile (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Galli*). Piuttosto scarsa nel distretto di Savona, vedesi nel marzo (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Di doppio passo, ma poco frequente nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune, specialmente in marzo, nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*): di passo anche in agosto (*Gra-*

gallini. Di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Frequente in marzo ed aprile nella prov. di Firenze (*Turchetti, Fontebuoni, Giglioli*). Rara in maggio nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune in aprile, scarsa nel settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Non comune nel Senese (*Dei*); passa in autunno ed in marzo-aprile in Maremma (*Ademollo*). Comune nella primavera in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarsa (*Paolucci*).

Campania: Di casuale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Non scarsa alle Saline ed in Capitanata in primavera ed autunno (*De Romita*).

Sicilia: Rara, di passo in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Piuttosto rara, ne ebbi in autunno e nell'inverno (*Bonomi*).

399. *Limosa rufa*, Leach ex Briss.

PITTIMA MINORE.

Limosa lapponica, Salvad.

Beccassa d'acqua, Beccassa d'ma (*Basso-Piem.*) — Beccassin roux (*Nizza*) — Russa (*Spezia*) — Arcirota imperiale (*Mess.*).

Nell'autunno 1887 vi è stato in Italia un passo straordinario di questa specie: a Venezia il conte A. P. Ninni ne ebbe diverse e mi scrive che ne comparvero molte; un maschio, in abito giovanile, fu ucciso a Nizza il 3 settembre ed io l'ho esaminato; infine ebbi, pel R. Museo di Firenze una femmina, pure in veste giovanile, uccisa a Portoferraio, Elba, il 12 novembre 1887. In questo individuo il becco è relativamente corto e sottile; dico ciò perchè nella ricca serie di esemplari di questa specie che ho esaminato nei Musei dell'Europa settentrionale e specialmente in quello della

Università di Cristiania, ho sempre veduto le femmine alquanto più grandi dei maschi e con becco notevolmente più lungo; questo fatto si verifica pure usualmente nella *L. melanura* e nei *Numenius*.

Piemonte: Un esemplare venne ucciso a Brà nel settembre 1873 (*Abree*). Avventizia nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Uccisa una volta, nella primavera del 1875, nella prov. di Pavia (*Pavesi*). Avventizia nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Di rara comparsa nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Di passaggio irregolare e scarso nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Rara, di comparsa primaverile ed autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Di comparsa accidentale nel distretto di Spezia (*Avif. Ital.* p. 401), in primavera ed autunno (*Carazzi*).

Toscana: A Massaciuccoli, Lucca, ne ebbi una in abito nuziale il 16 maggio 1888: era femmina: un'altra l'aveva avuta nel settembre 1887 (*Gragnani*). Accidentale nella prov. di Firenze; ne conservo una (*Avif. Ital.* p. 401), uccisa presso Firenze nell'autunno 1839 (*Giiglioli*). Rara sulla fine d'estate nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*); avuta il 29 agosto ed in settembre (*Dei*).

Campania: Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Sicilia: Accidentale nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Rara nell'autunno ed inverno (*Bonomi*).

400. *Scolopax Rusticula*. Linn. ex Gesn.

BECCACCIA.

Gallinassa (*Basso-Piem.*) — Pola (*Bergamo*) — Galinazha (*Feltre*) — Arcera (*Campobasso*) — Beccaccia, Arcera (*Calab.*) — Shapüctôre (*Albanesi italici*) — Jadduzzu (*Modica*).

Piemonte: Frequente ovunque in prov. di Cuneo: ove negli ultimi giorni del maggio 1875, presso Sommariva-Perno, un contadino rinvenne un nido con due pulcini. È usualmente di passo dalla metà di marzo a quella di aprile e dalla metà di ottobre a quella di novembre (*Abre*). Ebbi a notare due individui di questa specie color isabella in prov. di Torino: so inoltre di due casi bene accertati della nidificazione della Beccaccia, avvenuta nei boschi di Santa Cristina e di Settimo Torinese (*Gasca*). È frequente in questa provincia, ove giunge per lo più dopo il 20 ottobre e ripassa meno numerosa in primavera; per caso eccezionale qualcuna si trova dopo l'aprile (*Martorelli*). Comune in ambedue i passaggi nella prov. di Alessandria, ove qualche rara volta ha pure nidificato (*Camusso*). Nell'Ossola giunge in marzo ed in ottobre; vi ha nidificato (*Bazetta*). Nell'aprile 1871 ebbi occasione di scoprire in un bosco di Ontani presso il fiume Toce un nido di Beccaccia. Le uova erano cinque, depositate in terra su poche foglie secche senza cura; ne nacquero cinque pulcini che visitai per ben tre volte, accarezzandoli e baciandoli.... Vi era la madre affezionatissima. Non poteva allontanarsene, cercai invano il maschio. Per una piena del Toce non potei più vederli, li cercai in fine maggio ma invano. Forse furono travolti dalle acque. Notai che i nidiacei avevano il tarso e le dita molto sviluppate in confronto del corpo; sebbene appena nati, al mio appressarsi, si rannichiavano tosto e rimanevano immobili, mentre di lontano li vedeva correre e rincorrersi, cadendo sovente sui fianchi. La madre li custodiva come fa la Chioccia. Questa al mio avvicinarla, si alzava a volo con molto rumore sbattendo le ali, e volgendo indietro la testa verso di me, ma stando io fermo e un po' discosto, subito ritornava presso i suoi cari piccini, emettendo un grido monosillabo quasi un *cree cree*, e tenendo le ali semiaperte. Era commovente!! (*Pertusi*). Non comune, di passaggio autunnale ed invernale nel distretto di Crodo, Novara (*Demorì*): eccezionalmente sverna e nidifica nel distretto di Piedimulera (*Danisi*).

Lombardia: Comune, ma non abbondante che nelle annate rigide; vive al piano ed in collina nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente in quella di Bergamo (*Stefanini*). Così nella prov. di Milano (*Brambilla*); di passaggio talvolta frequente nella prima metà di marzo e di ottobre. Nel distretto medio Milanese ha nidificato una volta nelle Brughiere, ma la femmina venne presa e le sue 5 uova distrutte da contadini (*Magretti*). Di doppio passaggio, dalla metà di ottobre alla metà di novembre e nel marzo, nella prov. di Cremona: qualcuna rimane l'inverno, e qualche coppia ha nidificato nei boschi di Roncaglia lungo il Po nel maggio 1879 (*Ferragni*). Frequente nella prov. di Mantova (*Pagliai*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Ho notizia di due casi dell'avvenuta nidificazione di questa specie nel Trentino: a Eppan (Bolzano) 5-10 aprile 1865 il signor G. Ferrari trovò il nido con 4 uova coperte di foglie; ed il signore L. Guetti ne scoprì un altro pure con 4 uova a Vigo di Lomaso (*A. Bonomi*). Comune in autunno nel distretto di Caprino, Verona: nel 1881 nel Comune di Grezzana Veronese, nella frazione di Lugo, venne trovato un nido (*Pellegrini*). Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*, *Ferrari*). Frequente e nidificante nel Cadore. Belluno; fa il nido nei boschi in montagna, depone 3 o 4 uova in maggio ed alleva una sola covata; fa passaggio in aprile ed ottobre (*Tissi*). Così nel distretto di Feltre, ove fa passaggio in marzo, aprile, settembre, ottobre e novembre; ha certamente nidificato nel bosco Posetta sul monte Avena, ove alla fine del luglio 1883 vennero presi colle mani due giovani (*Delaito*). Nel Friuli giungono in massa nell'ottobre e ripassano nell'aprile; i cacciatori distinguono una razza piccola dalle normali, le *Gialinàzze falcèzze*, assai frequenti (*Vallon*). Nel distretto di Cividale passa dal febbraio all'aprile e dal settembre al novembre: forse qualcuna nidifica ai monti (*Del Torre*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Usualmente scarsa in quella di Rovigo, fu abbondante nell'autunno 1873 (*Dal Fiume*).

Emilia: Nel distretto di Vergato. Bologna, giunge in

numero discreto in ottobre, non sverna e ripassa in primavera (*Lorenzini*). Comune, di passo, nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Autunnale ed invernale nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona dalla metà di ottobre a tutto novembre; molte vi svernano, partono o ripassano in marzo (*Piccone*); comune ed invernale in quello di Arenzano (*Luciani*). Abbastanza frequente da ottobre a marzo nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Nella prov. di Lucca giunge per lo più dopo il 20 ottobre, ma se ne vedono spesso alla fine di settembre: pochi individui svernano ed il passo primaverile è sempre meno copioso: dopo aprile è affatto casuale il vederne, diccsi però di casi della nidificazione di questa specie nella provincia (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Nei monti della Garfagnana la Beccaccia ha certamente nidificato, e nel 1850 il signor L. Bonaldi vide uno dei genitori che imbeccava il pulcino piccolissimo (*De Stefani*). Comune d'autunno e d'inverno, più in collina, nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarsa in quello di Lavajano, ove le prime giungono nella seconda metà di ottobre, la massa in novembre; in dicembre il passo è finito e solo nei rigidi inverni se ne vedono ancora; il ripasso in marzo è sempre scarso (*Papasogli*). Frequente in novembre e marzo nel distretto di Fucecchio (*Lenzi, Turchetti*); poche ed isolate si vedono in quello di Empoli (*Fucini*): frequente di passo 15-30 marzo e 25 ottobre-20 novembre, nei distretti di Fiesole, Sesto e Signa, Firenze; tutti distinguono una razza piccola detta « scopina » (*Gargioli, Fontebuoni*). Abbondante in novembre, scarsa in marzo nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*); ne fu trovata una nel settembre 1885 (*Beni*); vedesi anche in febbraio (*Fiorini*). Comune ai due passi; ne trovai una in estate, forse ferita, in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune nei primi mesi d'inverno per i boschi e presso i fossetti delle acque calde, quando gela, nel distretto di Sarteano, Siena; si distingue una razza piccola detta « scopina » (*Bargagli*). Invernale nel distretto di S. Gimignano (*Paulucci, Marri*).

Passa dalla metà di novembre alla metà di dicembre e ripassa in marzo ed aprile nelle prov. di Siena e di Grosseto: in questa rimane a tutto dicembre e qualcuna sverna (*Dei Ademollo, Cambi*). Passa abbondante tra la metà di febbraio e quella di marzo, e nella seconda quindicina di ottobre ed in novembre, all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune ai due passi in Toscana; sverna da noi e può anco dirsi sedentaria, giacchè qualche coppia vi ha nidificato (*Roster*).

Marche: Frequente; passa in ottobre-novembre ed in febbraio-aprile (*Paolucci*).

Lazio: Comune dagli ultimi di ottobre alla metà di marzo, nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Abruzzi: Frequente nel novembre e nel marzo, nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Passa dalla fine di ottobre al gennaio, nelle giornate fredde con venti settentrionali, all'isola di Capri (*Cerio*).

Puglie: Comincia a farsi vedere in ottobre e ai primi di novembre, rimane tutto l'inverno e parte in marzo (*De Romita*).

Calabrie: Comune ovunque nell'inverno, passa in novembre ed aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune dalla fine di novembre alla metà di marzo in quella di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune dal 20 ottobre al 15 dicembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*); negli ultimi di aprile e nella prima quindicina di maggio 1881 fu osservato un passaggio ben insolito di Beccacie a branchi: abbondarono in quei giorni sui colli intorno a Messina; il tempo era bello con brezza dal N. E., ma antecedentemente aveva soffiato un vento impetuoso di ponente (*Pistone*). Frequente, di passo in novembre e marzo nel distretto di Modica, ove nel luglio 1880 ne venne presa una (*Dellafonte, Garofalo*). Giunge in ottobre-novembre, si trattiene poco e ripassa in scarso numero in febbraio-marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Frequente in quello dello Madonie, Palermo; arriva in settembre e rimane sino ai primi di marzo, in

quel mese nel 1885 vi fu un passo straordinario, e nel piano di S. Paolo ne vennero uccise oltre a 500 (*Palumbo, Morici*). Giunge dalla fine di ottobre alla metà di dicembre, parte o ripassa dalla metà di gennaio a quella di marzo, nel distretto di Palermo (*Gianpattasio*).

Sardegna: Di passo abbondante ed invernale; giunge in novembre e parte in febbraio e marzo (*Bonomi*).

401. *Gallinago major* (J. F. Gmel.)

CROCCOLONE.

Sgnepòn, Sgnèpa, Méza beccassa (*Basso-Piem.*) — Sgnepù (*Berg.*) — Sgnepôun (*Mil.*) — Ciochetta (*Mantov.*) — Crochète (*Friuli*) — Becanóto (*Padova*) — Pzacara (*Bol.*) — Pizzaccherino (*Vergato*) — Beccassin marsenet (*Nizza*) — Sgnepa (*Spezia*) — Beccaccina (*Garf.*) — Starnotta (*Foggia*) — Starnotto imperiale (*Calabr.*) — Crocculuni, Beccaccinazza (*Reggio, Calabr.*) — Beccaccinu riali (*Mess.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo; di passaggio in maggio ed in agosto (*Abbr.*). Dalla seconda quindicina di agosto fino a quasi tutto ottobre del 1884, vi fu nella prov. di Torino un passaggio abbondante di questa specie, la quale pel solito nella stagione autunnale non si vede affatto od è ben scarsa, essendo invece usualmente frequente durante la primavera. Aggiungo una notizia interessante: il signor Eugenio Gozzani di Torino, bravo cacciatore e persona degna di fede, trovandosi anni addietro sul finire di maggio nella « landa » di S. Maurizio, a circa due ore da Torino, si vide portare dal suo braccio un Croccolone femmina che aveva le uova completamente formate, una delle quali col guscio (*Gasca*). Comune in prov. di Torino in marzo ed aprile (*Martorelli*). Vedesi di rado, solo in pianura e soltanto in primavera, nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Meno comune della specie precedente, vive

al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Scarso nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*); di passaggio talvolta frequente in marzo, aprile e settembre (*Magretti*). Di doppio passaggio non abbondante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Di doppio passaggio, più scarso in autunno, nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente comune in Lombardia (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarso passaggio al piano in aprile, maggio e settembre nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Scarso, ma di passaggio regolare in ottobre ed aprile nel Friuli (*Valloni*); passa in aprile e maggio, più scarso in agosto e settembre nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Abbastanza frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Di scarso passaggio nella prov. di Parma: 28-31 marzo (*Del Prato*).

Liguria: Di doppio passaggio nel Nizzardo (*Gal*). Frequente, specialmente in primavera, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune di passo in marzo ed aprile e anche in maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); ne uccisi uno il 24 novembre 1874 a Massaciuccoli (*Gragnani*). Di passo al piano, scarso in aprile e maggio, raro in autunno nel distretto di Fauglia e Lari, Pisa (*Off*, *Papasogli*). Frequente in aprile-maggio, scarso in settembre-ottobre-novembre nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fontebuoni*); avuto anche in marzo (*Giglioli*). Scarso in marzo ed ottobre nel Casentino, Arezzo (*Beni*); passa anche in maggio (*Fiorini*, *Pauer*). Comune in aprile-maggio, mai veduto nell'autunno in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo regolare in aprile-maggio, ed irregolare in ottobre-novembre, nella prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Raro di passo all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune ai due passi in Toscana; un individuo fu ucciso sull'Appennino il 20 agosto 1887 (*Roster*).

Marche: Comune al piano: passa in marzo-maggio ed in ottobre (*Paolucci*).

Campania: Frequente; passa in marzo nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale affatto: un individuo sarebbe stato preso a Taranto (*De Romita*).

Calabrie: Scarso assai: si vede in aprile e maggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Non raro in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Arriva in ottobre-novembre e parte in febbraio-marzo, nel distretto di Terranova. Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Comune di passo in primavera ed in settembre; alcuni svernano nell'isola (*Bonomi*).

402. *Gallinago caelestis* (Frenzel ex Rzac.)

BECCACCINO.

Beccassin, Sgnèp, Beccassin real (*Basso-Piem.*) — Sgnepa (*Berg.*) — Sgnèpa (*Mil.*) — Becanòtt (*Frinli*) — Pizzaccarin (*Vergato*) — Beccassin (*Arenzano*) — Beccassin reale, Beccassin (*Spezia*) — Beccaccino reale (*Pisa, Garf.*) — Seneppia (*Lucca*) — Beccacciola, Beccaccina (*Viterbo*) — Arceretzyn (*Albanesi italici*) — Beccaccinu, Arcigghiola (*Calabr.*) — Ceca, Beccaccinu (*Mess.*) — Scacciamargi (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Frequente al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio soltanto in aprile ed in settembre (*Abre*). Così in prov. di Torino (*Gasca*), ove la massa giunge ai primi di novembre. A proposito della credenza tra cacciatori che vi siano due passi di Beccaccini, uno in agosto di uccelli che non frullano ed uno più tardi e molto più copioso; dirò che più di una volta alla metà di agosto ho levato Beccaccini che non frullavano nei pressi di Torino; che siano giovani? (*Martorelli*). Abbastanza comune alle due

epoche della migrazione al piano nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Giunge nell'Ossola in marzo ed ottobre: non consta ci abbia nidificato (*Bazetta*). Raro di passo autunnale nel distretto di Crodo, Novara (*Demori*): eccezionalmente sverna e nidifica in quello di Piedimulera (*Danisi*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Frequente ovunque nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Così in quella di Milano (*Brambilla*): di passo talvolta in abbondanza in marzo, aprile e settembre (*Magretti*). Giunge nella prov. di Cremona alla fine di luglio e sino al novembre, pochi rimangono l'inverno, ed il ripasso ha luogo dal febbraio all'aprile (*Ferragui*). Comune in quella di Mantova (*Pagliari*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarsa ed accidentale comparsa al piano nel Cadore, Belluno (*Tissi*); frequente al piano da luglio a mezzo aprile nel distretto di Feltre, ove non nidifica (*Delaito*). Frequente specialmente durante il passo autunnale nel Friuli, ove, dicesi nidifichi (*Vallou*): nel distretto di Cividale trovasi in febbraio e marzo, e più comune in ottobre e novembre (*Del Torre*). Comune, e, pare, sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Comune in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarso nel distretto di Vergato (*Lorenzini*). Non raro, di passo, nella prov. di Parma; avuto il 26 dicembre (*Del Prato*).

Liguria: Di passo primaverile ed autunnale nel Nizardo (*Gal*). Piuttosto scarso nel distretto di Savona, ove passa in marzo ed aprile ed in settembre, ottobre e novembre (*Piccone*). Comune ed invernale in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente dall'agosto alla metà di marzo nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Nella prov. di Lucca giunge la massa ai primi di novembre, ma sin dall'agosto se ne vedono (*Martorelli, Fontebuoni*); ne vidi anche in luglio nel distretto di Massarosa (*Gragnani*). Invernale, più comune al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in quello di Lavajano

(*Papaisogli*). Frequente in agosto, settembre, ottobre, novembre e marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fontebuoni*), avuto anche in febbraio e aprile ed in dicembre (*Giglioli*). Non comune in marzo ed ottobre nel Casentino (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Comunissimo in novembre e marzo, ma, tranne in giugno, ne ho veduto in ogni stagione in Val di Chiana (*Griffoli*). Si vede in novembre e dicembre nel distretto di Sarteano, Siena (*Bargagli*); così in quello di S. Gimignano (*Paulucci*). Nel Senese ed in Maremma si vede dal luglio all'aprile (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Scarso di passo all'isola di Giglio (*Biunchi*). Comune ai due passi in Toscana; l'ho osservato in estate nei dintorni di Firenze (*Roster*).

Marche: Frequente al piano, passa in febbraio-aprile ed agosto-novembre (*Paolucci*).

Lazio: Comune dall'ottobre all'aprile nel distretto di Montefiascone, Viterbo (*Mimmi*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Giunge in autunno, rimane l'inverno e parte in aprile (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante d'inverno, passa in novembre ed aprile nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune specialmente in febbraio, in quella di Reggio (*Moschella*, *Morretti*).

Sicilia: Comune in novembre, dicembre e marzo nella prov. di Messina (*Ruggieri*, *Pistone*). Frequente da luglio ad aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte*, *Garofalo*). Giunge in ottobre e parte in febbraio-marzo, nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Frequente d'inverno in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Giunge in autunno e parte in primavera; credo che qualche coppia rimanga a nidificare; ne ebbi da Ardara e da Assemini in luglio ed agosto (*Bonomi*).

403. Gallinago Gallinula (Linn.)

FRULLINO.

Limnocryptes gallinula, Salvad.

Sgnepin, Beccassin sourd, Voenia borse, Becassin voulét (*Basso-Piem.*) — Sgnepi (*Berg.*) — Sgnepîn (*Mil.*) — Becanêlle (*Friuli*) — Beccassin, Foti borse (*Spezia*) — Vuota borse (*Lucca, Fir.*) — Beccaccino mezzano (*Sesto fiorentino*) — Vota borse (*Garf.*) — Beccaccineja mutu, Quartirolo (*Calabr.*) — Beccaccinu picciriddu, Beccaccineddu. Pigghiugghiu (*Mess.*) — Beccaccinu (*Modica*) — Scacciamargi picciulu (*Terran. Sicil.*) — Beccaccina (*Castellb.*)

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove è soltanto di passo in aprile ed in settembre (*Abre*). Frequente in quella di Torino (*Gasca*); alle stesse epoche della specie precedente, essendo usualmente meno numeroso; nel 1885 ve ne fu abbondanza straordinaria mentre scarseggiò il Beccaccino comune (*Martorelli*). Comune, ma soltanto di passaggio nella prov. di Alessandria, ove non isverna (*Camusso*). Giunge nell'Ossola, in marzo ed in ottobre (*Bazetta*); così nel Novarese (*Rodino*).

Lombardia: Comune al piano nella prov. di Sondrio (*Galli*). Così in quella di Bergamo (*Stefanini*). Ed in quella di Milano (*Brambilla*); di passo talvolta abbondante in marzo, aprile e settembre (*Magretti*). Nella prov. di Cremona arriva in settembre, sverna, e ripassa o parte in marzo ed aprile (*Ferragui*). Frequente in quella di Mantova (*Pagliai*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di passaggio nella prov. di Vicenza (*Molari*). Frequente al piano dalla metà di ottobre alla metà di aprile nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Frequente nel Friuli, specialmente in autunno e primavera (*Vallon*); nel distretto di Cividale è raro e si vede in aprile ed ottobre

Del Torre. Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Accidentale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio, specialmente primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto scarso nel distretto di Savona, ove si vede in settembre e ottobre e anche nell'inverno (*Piccone*). Comune ed invernale in quello di Arenzano (*Luciani*). Di doppio passo, ma poco abbondante nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Di doppio passo e comune nella prov. di Lucca (*Marcorelli*, *Fontebuoni*); di passo anco in settembre (*Graquani*). Comune di passo specialmente al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); scarso in quello di Lavajano, passa in ottobre-novembre e ripassa in febbraio-marzo; tanto nel passo come nel ripasso questa specie fa due mosse abbondanti, una anticipando ed una posticipando di qualche giorno il Beccaccino comune (*Papasogli*). Frequente in settembre, ottobre e marzo nella prov. di Firenze (*Lenzi*, *Turchetti*, *Fontebuoni*); avuto anco in aprile e dicembre (*Giglioli*). Non comune in autunno nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Fiorini*, *Pauer*). Comunissimo in primavera; meno nell'autunno, in Val di Chiana (*Griffoli*). Di doppio passo ed invernale nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*, *Cambi*). Invernale e comune in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune al piano (*Paolucci*).

Abruzzi: Frequente in novembre ed in marzo nel distretto di Ielsi, Campobasso (*D'Amico*).

Campania: Comune nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Invernale, meno frequente della specie precedente (*De Romita*).

Calabrie: Più scarso della specie precedente, ma comune d'inverno nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Comune d'inverno in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia: Comune di passo in novembre e marzo nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Frequente da settembre

ad aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Giunge in ottobre e parte in marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carcano*). Poco frequente in novembre nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Invernale e di passo in primavera e nell'autunno (*Bonomi*).

404. *Numenius Arquata* (Linn.) ex Gess.

CHIURLO.

Beccasson gross, Ciùrl, Ciurli, Poulin d'acqua (*Basso-Piem.*) — Segouroun (*Milano*) — Cor marin (*L. Maggiore*) — Arcàja (*Padova*) — Arcada (*Bell.*) — Pizzacra d' mar (*Parma*) — Beccamarina (*Nizza*) — Rounseza (*Arenzano*) — Boàre (*Spezia*) — Centossi (*Sarzana*) — Ciarluòttolo (*Nap.*) — Friscaluoru, Fischiaioi, Fischia-voi (*Calabr.*) — Ciulliu (*Mess.*) — Cirulli (*Modica*) — Cirriviù, Ciurluviu (*Terran. Sicil.*) — Zurruliota (*Sard.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove è di passaggio in maggio ed in ottobre (*Abbr.*). Il 15 ottobre 1886 trovandomi a caccia nelle vicinanze di Torino, poco dopo il levar del sole, osservai nel breve intervallo di un quarto d'ora tre grossissimi branchi di questa specie, ciascuno di oltre un centinaio d'individui, che passavano al volo diretti dall'O. al N.; è specie usualmente scarsa in provincia (*Gasca*); si vede da novembre ad aprile (*Martorelli*). Capita soltanto al piano e solo alle due epoche di passo nella prov. di Alessandria (*Canusso*). Di casuale comparsa nell'Ossola ove venne catturato un maschio nel 1876 (*Bazetta*).

Lombardia: Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Quasi in ogni stagione se ne vedono nella prov. di Cremona, ma specialmente dal marzo al maggio e dall'agosto al novembre (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borroni*).

Veneto: Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di casuale comparsa al piano nel Bellunese (*Soravia*). Frequente nel Friuli dal settembre all'aprile (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passo primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Raro nel distretto di Savona, ove ne ebbi un solo dopo una forte nevicata, il 29 dicembre 1886 (*Piccone*). Comune di doppio passo in quello di Arenzano (*Luciani*). Scarso, ma di passo regolare specialmente in novembre, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune da novembre ad aprile nella prov. di Lucca (*Martorelli*); vedesi anche in settembre (*Gragnani*). Di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Scarso nel marzo nella prov. di Firenze (*Turchetti*, *Fontebuoni*); avuto anche in aprile (*Giglioli*). Non comune, ma di doppio passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Non comune di passo nel Senese (*Dei*); giunge in Maremma in ottobre e parte alla metà di aprile (*Ademollo*). Comune in Toscana; nell'agosto 1886 ne vidi vari branchetti nella tenuta reale di S. Rossore (*Roster*).

Marche: Scarso, vedesi negli inverni rigidi (*Paolucci*).

Campania: Frequente, passa in ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Abbondante al passo autunnale, che incomincia in giugno, ed al passo primaverile, marzo-aprile, frequente anche nell'inverno; ed in tutti i mesi dell'anno si trova tranne nel maggio (*De Romita*).

Calabrie: Abbondante in ottobre ed in maggio nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Scarso nei dintorni di Reggio (*Moschella*); non infrequente nella « piana » di Palme (*Moretti*).

Sicilia: Comune di passo in marzo-aprile ed in ottobre-novembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri*, *Pistone*). Scarso in aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Della-fonte*, *Garofalo*). Giunge in branchi in novembre, sverna, fa

un passo abbondante in marzo e parte in aprile nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Invernale e comune, fors'anche nidificante nell'isola (*Bonomi*).

405. *Numenius tenuirostris*, Vieill.

CHIURLOTELLO.

Ciùrl, Ciurli, Poulin d'acqua (*Basso-Piem.*) — Arcàzuil (*Friuli*) — Arcazéta (*Padova*) — Beccamarina (*Nizza*) — Ciurlo a picche (*Lucca*) — Chiurlo (*Casentino*) — Ciarlottèlla (*Nap.*) — Zurruliota (*Sard.*).

Piemonte: Accidentale nella prov. di Torino (*Gasca*). Capita di rado e più specialmente durante il passo primaverile nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Di rarissima comparsa (*Turati*).

Veneto: Invernale e raro nel Friuli, giunge in settembre e parte in aprile (*Vallon*). Da notizie avute sarebbe molto raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di scarso passaggio in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Raro in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non comune di passo in aprile e maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Gragnani*). Di scarso passo al piano nel distretto di Fauglia. Pisa (*otti*). Scarso nell'inverno nella prov. di Firenze (*Giglioli*). Raro in marzo nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Piuttosto scarso, ma di doppio passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarso nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*: avuto in febbraio ed in aprile (*Dei*). Scarso nell'inverno ed in primavera in Toscana (*Rosti*).

Marche: Scarso (*Paolucci*).

Campania: Frequente, passa in ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie: Abbondante alle Saline da agosto a settembre, vedesi anche sino a tutto novembre e nel marzo (*De Romita*).

Calabrie: Ho potuto avere un solo esemplare nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune, di passo in marzo-aprile ed in novembre, nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*).

Sardegna: Non comune, passa in primavera e nell'autunno (*Bonomi*).

406. *Numenius Phæopus* (Linn. ex Gesn.)

CHIURLETTO.

Beccasonnot gris peit (*Basso-Piem.*) — Arcáza (*Padova*) — Beccamarina (*Nizza*) — Burgainotto, Rosëza barbaresca (*Savona*) — Boàre picenin (*Spezia*) — Ciurlottino (*Lucca*) — Gallozzèlla, Cagliozzèlla, Capammerèlla (*Nap.*) — Turriazzèddu, Turriazzolu di Jaddazzi (*Mess.*) — Vujarottu (*Terran. Sicil.*) — Zurruliota (*Sard.*)

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, di passaggio nella seconda metà del novembre (*Albre*).

Lombardia: Raro nella prov. di Milano (*Brambilla*). Accidentale in quella di Pavia (*Pavesi*). Poco comune nella prov. di Cremona, ove ne vidi il 26 aprile 1885 (*Ferragni*). Raro d'inverno in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Di passo primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarso nel distretto di Savona, ove ne ho avuto in aprile, maggio, luglio, agosto e settembre (*Piccone*). Poco frequente nel distretto di Spezia, ove si vede più facilmente in marzo (*Carazzi*).

Toscana: Comune in aprile e maggio nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni*; di passo anche in settembre (*Gragnani*). Di passo al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Off*). Scarso in marzo nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Turchetti*). Assai più raro della specie precedente in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarso nel Senese (*Dei*); giunge in ottobre

e parte alla metà di aprile nella Maremma (*Ademollo*). Invernale e scarso in Toscana (*Roster*).

Marche : Scarso (*Paolucci*).

Campania : Scarso, passa in ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Si trova dal luglio all'aprile, come il *N. Arquata*, ma è molto meno abbondante (*De Romita*).

Sicilia : Raro, passa in marzo-aprile ed in novembre nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Giunge in settembre-ottobre e parte in aprile, non è abbondante nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna : Non comune di passo in primavera e ai primi di agosto e nell'autunno (*Bonomi*).

GLAREOLIDÆ

(*Pernici di mare*).

407. Glareola Pratincola (Linn.) (ex Kramer)

PERNICE DI MARE.

Perdris de mer (*Nizza*) — Pernixe de ma (*Savona*) — Pernise de mae (*Spezia*) — Incarcabolda (*Lucca*) — Vincenza (*Nap.*) — Arcignola (*Bari*) — Cocamete, Cocamag-gese, Rondon di mare (*Foggia*) — Rindinuni di livanti, Beccu russu (*Mess.*) — Rinninuni di mari (*Modica*) — Rinninuni di maisa (*Terran. Sicil.*).

Lombardia : Di accidentale comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Rara, presa alla Virgiliana in quella di Mantova (*Paglia*). Accidentale nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Di casuale comparsa nel Friuli, ove ne vidi una sola, presa nell'aprile 1882 presso Codroipo (*Fallon*).

Rarissima nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Ho saputo che nel maggio 1888 il signor M. Gianese di Lonigo ebbe un maschio di questa specie da lui ucciso in quel distretto (*Giglioli*).

Liguria: Di passaggio primaverile, maggio, nel Nizzardo (*Gal.*). Alquanto scarsa nel distretto di Savona, ove si vede soltanto in aprile e maggio (*Piccone*). Rara in maggio, in quello di Arenzano (*Luciani*). Molto scarsa in maggio ed ottobre nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Si prende in buon numero alle reti in maggio a Massaciuccoli, Lucca (*Martorelli, Gragnani*). Scarsa nella prov. di Firenze; ne ebbi una da Peretola il 1^o giugno 1878 (*Giglioli*). Non rara in maggio nelle praterie presso i laghi in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo quasi regolare in maggio nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*); in Maremma è anche estiva e di passo autunnale (*Ademollo*). Frequente in primavera e fors'anche nidificante in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarsa (*Paolucci*).

Campania: Di scarso passaggio in ottobre nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Di passaggio regolare in piccoli branchi verso la fine dell'aprile ed in maggio, ma non frequente (*De Romita*).

Calabrie: Di passo in maggio nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Rara; passa in aprile-maggio nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Scarsa al litorale, giunge in aprile e parte in settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*De-la-fonte, Garofalo*). Si vede soltanto in aprile e maggio nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*). Rara, di passo in maggio, in quello delle Madonie, Palermo; nel 1841 una venne uccisa in Castelbuono (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Non comune; soltanto in primavera ne potei avere (*Bonomi*).

GAVIÆ.

STERNIDÆ

(Rondini di mare).

408. *Sylochelidon caspia* (Pall.)

BECCAPESCI MAGGIORE.

Thalasseus caspius, Salvad.

Beccapesci maggiore (*Aut. Ital.*) — Forbicione maggiore (*Lucca*) — Coipazza (*Modica*) — Maragan de mari mannu (*Sard.*).

Veneto : Rarissimo nella prov. di Padova; due maschi, uno in abito estivo e l'altro in veste invernale, uccisi nel 1835 nell'estuario padovano, erano nel Museo della R. Università (*V. Avif. ital.* p. 412); il secondo fa ora parte della mia raccolta (*Arrigoni*).

Liguria : Di accidentale comparsa in estate nel Nizzardo (*Gal*). Di rarissima comparsa (*Avif. Ital.* p. 412) nel distretto di Spezia e Sarzana (*Carazzi*).

Toscana : Raro nella prov. di Lucca: ne vidi due a Massaciuccoli nel maggio 1885 (*Gragnani*).

Puglie : Accidentale: uno fu ucciso nel porto di Trani (*De Romita*).

Sicilia : Accidentale nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna : Di rara comparsa; ne vidi soltanto nell'aprile 1888 verso S. Giagino. Cagliari, senza poterne cogliere (*Bonomi*).

409. *Thalasseus cantiacus* (J. F. Gmel.) (ex Lath.)

BECCAPESCI.

Actocheilodon sandvicensis, Salvad.

Marteu (*Nizza*) — Ocheta de mae (*Spezia*) — Maragan a peis nieddus (*Sard.*).

Piemonte : Il 5 settembre 1886 ne uccisi uno lungo il fiume Stura, nella prov. di Cuneo, ove è avventizio affatto (*Abre*).

Veneto : È raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria : Estivo nel Nizzardo, ove nidifica sulle sabbie del Varo (*Gal*). Scarso, ma non raro sul mare nel distretto di Savona; l'ho avuto in gennaio, aprile e novembre (*Picccone*). Non raro d'inverno nel distretto di Arenzano, ove fu un passo copioso assai il 25 aprile del 1882 (*Luciani*). Scarso d'inverno, più facile a vedersi in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : L'ebbi più volte in aprile e maggio dai paduli del litorale nella prov. di Lucca (*Martorelli*). Accidentale nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Turchetti*). Raro assai nelle prov. di Siena e di Grosseto; l'ebbi nell'inverno 1886 (*Dei*).

Marche : Frequente e sedentario (*Paolucci*).

Puglie : Frequente dal settembre all'aprile (*De Romita*).

Calabrie : Raro, ne ebbi uno a Reggio nel novembre 1886, dopo una burrasca (*Moschella*).

Sicilia : Accidentale nella prov. di Messina (*Ruggeri*); scarso, ma sedentario (*Pistone*).

Sardegna : Piuttosto scarso, invernale (*Bonomi*).

410. *Thalasseus medius* (Horsf.)

BECCAPESCI FORESTIERO.

Actochelidon media, Salvad.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie, di comparsa accidentalissima da noi.

411. *Gelochelidon anglica* (Montag.)

BECCAPESCI INGLESE.

Gelochelidon nilotica, Salvad.

Giagà, Giagà de mar (*Padova*) — Marteu (*Nizza*) — Rondone (*Valdich.*) — Maragan a peis nieddus (*Sard.*).

Veneto : Raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Il signor M. Gianese di Lonigo ebbe nel maggio 1888 in quel distretto un maschio adulto di questa specie (*Giglioli*).

Liguria : Di scarso passaggio in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Non comune nelle vicinanze di Genova, ove si vede più facilmente nel giugno; ne uccisi uno l' 11 e due il 21 giugno 1886 (*Queirolo*). Molto raro nel distretto di Spezia; ne ebbe uno il prof. Magni-Griffi nel maggio 1858 (*Carazzi*).

Toscana : Non comune in maggio nella prov. di Lucca: però nella primavera del 1888 se ne videro moltissimi sul padule di Massaciuccoli, e anche il 28 giugno ne vidi un branco (*Gragnani*). L' 8 maggio 1887 incontrai un branco di 20 individui sul lago di Massaciuccoli, ne uccisi tre (*Paspogli*). Raro assai in primavera sui laghi in Val di Chiana (*Griffoli*). Scarso assai in Maremma (*Ademollo*).

Marche : Scarso (*Paolucci*).

Puglie : Non raro, ma poco frequente; l'ho avuto in aprile, maggio e agosto (*De Romita*).

Sardegna : Raro, di passo in primavera; l'8 aprile 1886 ne uccisi un maschio a Ponte Corvo, Elnas, mentre dava la caccia alle lucertole (*Bonomi*).

412. *Onychoprion fuliginosum* (J. F. Gmel.) (ex Lath.)

BECCAPESCI OSCURO.

Rondine di mare scura (*Aut. Ital.*).

Non avrei nulla da aggiungere a quanto dissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno alla comparsa casuale e rimasta unica di questa specie da noi.

413. *Sterna fluviatilis*, Naum.

RONDINE DI MARE.

Sterna hirundo, Salvad.

Pescapèss, Pescamartin, Ochin, Coombo d'acqua (*Basso-Piem.*) — Sgarin, Sgolatrei, Spolatrelit (*Lecco, Como*) — Sgarin (*Milano*) — Crocalina (*Padova, Rovigo*) — Cocalina bianca (*Vicenza*) — Verrun (*Nizza*) — Ciumbin (*Savona*) — Beccapesci (*Pisa*) — Cucalina (*Marche*) — Marangan de mari a peis arrubius (*Sard.*).

Il nome linneano di questa specie ripescato dal Salvadori non è accettabile giacchè venne adoperato da Linneo per due specie almeno.

Piemonte : Scarsa al piano in prov. di Cuneo, e di solo passaggio nella seconda metà di agosto (*Abre*). Frequente in quella di Torino (*Gasca*); da aprile a settembre, vi nidifica (*Martorelli*). Comune dal principio della primavera a tutto settembre nella prov. di Alessandria (*Amusso*). Di casuale comparsa nell'Ossola (*Bazetta*).

Lombardia : Il 9 settembre 1888 una grossa colonna migrante e proveniente dal N. giunse sul lago di Pesca-

nico, Lecco, e vi rimase varî giorni, malgrado la strage che se ne fece: erano circa 400 (*Cermenati*). Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). Nella prov. di Cremona giunge verso il 20 marzo, nidifica in abbondanza sulle isolette del Po, e parte in settembre; talvolta per le piene del Po vengono distrutte in grande copia le uova; ciò appunto avvenne il 3 giugno 1886 (*Ferragni*). Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto: Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Comune nel Friuli; giunge in maggio, parte ai primi di settembre (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arri-goni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio in primavera e nell'autunno nel Nizzardo (*Gal*). Alquanto scarsa nel distretto di Savona; si vede in aprile e maggio (*Piccone*). Comune, di passo regolare in aprile ed in agosto e settembre nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Di passo regolare, ma scarso, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune in aprile, maggio e settembre nella prov. di Lucca, ove non nidifica (*Martorelli*, *Fontebuoni*; vedesi anche in agosto (*Graguani*). Comune al passo, specialmente al piano, nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*). Scarsa in primavera nella prov. di Firenze, distretto di Fucecchio (*Turchetti*). Non comune in primavera in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo, ma non comune, nel Senese ed in Maremma (*Dei*, *Ademollo*). Comune in primavera nella Toscana, specialmente nel Pisano (*Roster*).

Marche: Comune (*Paolucci*). Un individuo solitario venne ucciso sul fiume Marecchia a oltre 60 chilometri dal mare, nel distretto di Urbino (*Carpegna*).

Sicilia: Rara nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Rara nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Di passo in primavera e nell'autunno, e anche estiva e nidificante (*Bonomi*).

414. Sterna macrura, Naum.

RONDINE DI MARE ARTICA.

Lombardia : Di accidentale comparsa (*Turati*).

415. Sterna Dougalli (Montag.)

RONDINE DI MARE DEL MAC DOUGALL.

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa bella specie, rarissima per noi.

416. Sternula minuta (Linn.)

FRATICELLO.

Pescapéss, Pescamartin, Ochin, Coombo d'acqua, Sgarin (*Basso-Piem.*) — Sgarrin (*Nov.*) — Cocalina piccola (*Vicenza*) — Cisile di mar (*Friuli*) — Crocalina, Cocaléta (*Padova, Rovigo*) — Cūmbin piccin (*Savona*) — Anima de sbiro (*Spezia*) — Monachino (*Lucca*) — Rondine di mare (*Casentino*) — Rondone (*Valdich.*) — Guaràglio (*Nap.*) — Ala-longa di li picculi (*Mess.*) — Coipedda janca (*Modica*) — Runduledda marina (*Sard.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove nidifica nel maggio, allevando una sola covata (*Abre*). Abbanza frequente nella prov. di Torino (*Gasca*), nella buona stagione; nidifica talvolta in grande abbondanza sulle isole più grandi del Po (*Martorelli*). Non comune e di solo passo irregolare nella prov. di Alessandria (*'amusso*). Di comparsa irregolare nel Novarese (*Rodino*).

Lombardia : Frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). In quella di Cremona arriva nel maggio, nidifica in abbondanza sulle isolette del Po, e parte in settembre (*Ferragni*).

Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Non raro, ma qualche anno scarso nel Friuli, ove giunge in maggio e parte in settembre (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarso in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Scarso nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto raro nel distretto di Savona; l'ebbi adulto in maggio e giovane in agosto (*Piccone*). Di passo regolare, ma scarso nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune di passo in aprile-maggio ed in settembre nella prov. di Lucca, ove non nidifica (*Martorelli, Fontebuoni*); vedesi anche in agosto (*Gragnani*). Comune nel maggio al piano, nel distretto di Fauglia. Pisa (*Ott*). Scarso in aprile-maggio nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Turchetti*). Raro in aprile nel Casentino, Arezzo (*Beni, Pauer*). Talvolta è abbondantissimo in maggio in Val di Chiana, ma ogni anno passa (*Griffoli*). Di passo, ma non frequente, nel Senese ed in Maremma (*Dei, Ademollo*). Comunissimo al passo primaverile in Toscana (*Roster*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Accidentale: un solo individuo preso vicino a Bari nell'aprile 1877 (*De Romita*).

Sicilia: Scarso nella prov. di Messina (*Ruggieri*). Di scarso passaggio in aprile e settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna: Giunge in primavera, nidifica e parte (*Bonomi*).

417. Hydrochelidon hybrida (Pall.)

MIGNATTINO BIGIO.

Giagà foresto (*Padova*) — Crocalina (*Rovigo*) — Ciumbin (*Savona*) — Anima de sbiro (*Spezia*) — Beccapesce (*Lucca*) — Ala-longa a pedi russi (*Mess.*) — Caiteddu (*Sard.*).

Piemonte : Molto scarso nella prov. di Torino (*Gasca*). Di casuale comparsa nell'Ossola (*Bazetta*).

Lombardia : Accidentale nella prov. di Cremona, ove l'ebbi il 18 maggio 1884 (*Ferragni*). Due esemplari vennero presi nella prov. di Pavia, uno il 20 agosto 1885 a Pancarana sul Po (*Pavesi*). Di rara comparsa in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Di accidentale comparsa al piano in primavera nel distretto di Feltre, Belluno (*Delaito*). Lo credo rarissimo nella prov. di Padova; un individuo, che poi andò perduto, fu preso nel settembre 1884 a Piove di Sacco (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Vedesi raramente durante l'estate nel Nizardo (*Gal*). Accidentale nel distretto di Savona; ne ebbi un solo, giovane, preso ad Albissola il 28 agosto 1881 (*Piccone*). Di scarso passaggio in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Abbastanza comune nella prov. di Lucca, ove si prende vivo colle reti in maggio, mai in autunno (*Martorelli, Fontebuoni*); nel distretto di Massarosa non può però dirsi di regolare comparsa, lo vidi il 9 luglio 1887 a Massaciuccoli e per la prima volta in autunno il 23 settembre 1887 (*Gragnani*). Di scarso, ma quasi regolare passaggio in Val di Chiana (*Griffoli*). Di rara comparsa in primavera nella Maremma (*Ademollo*). Ne ebbi due dal padule di Massaciuccoli nella primavera 1886 (*Roster*).

Puglie : Scarsissimo e solo in estate (*De Romita*).

Sardegna : Ne ebbi per il primo tre giovani, nell'inverno e primavera del 1888 (*Bonomi*).

418. Hydrochelidon leucoptera (Schinz)

MIGNATTINO ALI-BIANCHE.

Coucai, Mounietta (*Basso-Piem.*) — Crocalina nera (*Padova*). — Ciumbin (*Savona*) — Moetto (*Arenzano*) — Anima de sbiro (*Spezia*) — Paolinaccio moro (*Lucca*) — Rondone (*Valdich.*) — Cucalina (*Marche*) — Quaràglio, Guaràglio (*Nap.*) — Rindine e mare (*Calabria*) — Ala-longa a pedi russi (*Mess.*) — Caitedda peis arrubius (*Sard.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo, di passo nella seconda metà d'aprile (*Albre.*). Frequente in quella di Torino (*Gasca*).

Lombardia : Nella prov. di Cremona giunge in maggio e non sempre è abbondante; non vi sosta (*Ferragni*). Non comune in primavera in quella di Mantova (*Pagliai*). Generalmente scarso in Lombardia (*Borromeo*).

Veneto : Poco frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria : Si vede durante l'estate nel Nizzardo; vi fu un passo straordinario nel maggio 1888 (*Gal.*). Comune in aprile e maggio e poi in settembre nel distretto di Savona (*Piccone*). Non raro di passo in quello di Arenzano: 15 aprile-10 maggio, fine agosto e settembre (*Luciani*). Scarso, ma di passaggio regolare nel distretto di Spezia in primavera (*Carazzi*).

Toscana : Nella prov. di Lucca è comune, ma solo di passo in maggio, quando colle congeneri si piglia in quantità colle reti (*Martorelli, Fontebuoni, Graupani*). Frequente in primavera nel distretto di Sesto fiorentino (*Fontebuoni*): ne ho veduto qualche anno in maggio sull'Arno entro Firenze (*Giglioli*). Frequente in aprile-maggio, scarso in settembre in Val di Chiana (*Griffoli*). Passa in maggio ed in agosto nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Adenolla, Cambi*). Comune in primavera in Toscana; quasi ogni anno nel maggio si vede volare sull'Arno in Firenze (*Roster*).

Marche : Scarso di passo (*Comizio agrario Fabriano*).

Puglie : Scarso, ma non raro, si vede nella buona stagione, giunge in aprile (*De Romita*).

Calabrie : Comune di passo nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*).

Sicilia : Scarso nella prov. di Messina (*Ruggeri*).

Sardegna : Raro di doppio passo; fui il primo ad averne (*Bonomi*).

419. *Hydrochelidon nigra* (Linn. ex Briss.)

MIGNATTINO.

Pescapèss peit, Pescamartin, Ochin (*Basso-Piem.*) — Sgarin, Sgazzin (*Nov.*) — Sgarin negher (*Mil.*) — Cocalina seura (*Vicenza*) — Crocalina (*Rovigo*) — Cisile di mar (*Friuli*) — Zhisilon de mar (*Feltre*) — Crocalèta negra, Crocalina negra (*Padova*) — Magnanen (*Parma*) — Moetto (*Arenzano*) — Ciumbin (*Savona*) — Anima de sbiro (*Spezia*) — Fottivento (*Pisa*) — Rondine di mare (*Casentino*) — Rondone (*Valdich.*) — Guaràglio (*Nap.*) — Ala-longa nira (*Mess.*) — Coipedda nira (*Modica*) — Caitedda peis nieddus (*Sard.*).

Piemonte : Scarso al piano in prov. di Cuneo; di passo soltanto nella seconda metà di aprile (*Abre*). Frequente in quella di Torino (*Gasca*); piuttosto scarso (*Martorelli*). Non raro, ma di solo passaggio nella prov. di Alessandria; nella primavera degli anni 1882 e 1883, lungo il Lemmo tra Gavi e Voltaggio, apparvero per pochi giorni branchi numerosi di questa specie (*Camusso*). Di comparsa irregolare in Valsesia (*Guarinoni*).

Lombardia : Poco frequente nella prov. di Milano (*Brambilla*). In quella di Cremona è specie estiva: vedesi di passo abbondante in aprile e maggio e dall'agosto all'ottobre ed ha certamente nidificato nella provincia (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro (*Turati*);

frequente in Lombardia (*Borromeo*). Nei pressi di Milano ebbi occasione di vedere una numerosa colonia di questa specie, che rimase casualmente a nidificare nel mezzo di estese risaie; questo fu alla fine di maggio: i nidi, molto piatti e fatti con poche erbe acquatiche erano collocati a terra su piccoli rialzi e quasi affatto allo scoperto: alla loro costruzione lavorano il maschio e la femmina, che pure si alternano nel covare le uova, in numero di 2 o 3; i pulcini nascono coperti di peluria nerastra (*Turati*).

Veneto: Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Di scarsa comparsa al piano nel maggio nella prov. di Belluno distretto di Feltre (*Delaito*). Estivo ed abbastanza frequente nel Friuli (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Comune nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio in primavera ed autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona in aprile e maggio ed in settembre (*Piccone*); così in quello di Arenzano (*Luciani*). Molto frequente specialmente in aprile e maggio, ma anche in autunno, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comunissimo dalla fine d'aprile al settembre nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*, *Gragnani*). Comune nell'aprile e maggio al piano nel distretto di Fauglia, Pisa (*Ott*); in quello di Lavajano le sue comparse sono irregolari (*Papasogli*). Comune assai al passo in primavera nel distretto di Sesto, Firenze (*Fontebuoni*); avuto in aprile e settembre (*Giglioli*). Non frequente in aprile e settembre e anche ottobre nel Casentino, Arezzo (*Beni*, *Pauer*). Abbondantissimo in aprile e maggio, assai meno nel settembre; ne ho veduto anche nel luglio in Val di Chiana (*Griffoli*). Di passo regolare in maggio ed agosto nel Senese ed in Maremma (*Dei*, *Ademollo*). Assai abbondante al passo primaverile in Toscana (*Roster*).

Marche: Comune di passo in aprile-maggio ed agosto-settembre (*Paolucci*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini*, *Monticelli*).

Puglie : Estivo e frequentissimo, di passo, in primavera ed autunno; nel giugno 1886 ebbi un nidiaceo non ancora atto al volo (*De Romita*).

Calabrie : Di passo in maggio nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Scarso nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Di scarso passaggio in aprile e settembre nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*).

Sardegna : Giunge in primavera; alcuni rimangono a nidificare e qualcuno anco a svernare (*Bonomi*).

LARIDÆ¹

(*Gabbiani*).

420. *Chroocephalus minutus* (Pall.)

GABBIANELLO.

Hydrocolæus minutus, Salvad.

Ochin, Ciumbin, Ochetta, Mulinè (*Basso-Piem.*) — Crocalina (*Rovigo*) — Ochin (*Arenzano*) — Ocheta de mae (*Spezia*) — Piccioncino (*Lucca*) — Guaguina peccerella (*Nap.*) — Pappanedda, Oca-marina di li picculi (*Mess.*).

Piemonte : Nel 1856 ne fu ucciso uno nella Stura, vicino a Bra (*Albre*). Accidentale nella prov. di Torino (*Gasca*).

Lombardia : Di casuale comparsa nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Raro (*Turati*): frequente in Lombardia (*Borromeo*).

¹ Il Vian (*Bull. Soc. Zool. France*, 1877, p. 32) ha menzionato un giovane esemplare dell' *Adelarus Hemprichi*, Bp., come ucciso presso Nizza nel settembre 1875; ma tale cattura, che sarebbe straordinaria trattandosi di specie confinata al mezzodì del Mar Rosso, non sembra essere ben stabilita secondo Saunders (*Proc. Zool. Soc.* 1878, p. 194) e Salvadori (*Ucc. ital.*, p. 282), dai quali tolgo questa notizia.

Veneto: Raro nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo; ne uccisi uno nelle Valli Veronesi nell'ottobre 1882 (*Dal Fiume*).

Liguria: Capita in primavera e nell'autunno nel Nizardo, talvolta in gran numero (*Gal*). Raro in primavera nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarso in primavera nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Abbastanza frequente in primavera nella prov. di Lucca (*Martorelli*); nel padule di Massaciuccoli ne vidi anche in luglio, settembre e dicembre (*Gragnani*). Qualche anno giunse assai numeroso in aprile sui laghi in Val di Chiana, per due o tre giorni soltanto (*Griffoli*). Invernale e piuttosto comune in Maremma (*Dei, Ademollo*). Piuttosto comune in primavera nella Toscana; nel 1884 ve ne fu una invasione (*Roster*).

Campania: Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Invernale abbondante, e di passo regolare in primavera e nell'autunno (*De Romita*).

Calabrie: Comune dal novembre all'aprile nella prov. di Reggio (*Moschella, Moretti*).

Sicilia: Comune in marzo ed ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri*).

Sardegna: Non comune, di passo irregolare; ne uccisi in luglio ed agosto (*Bonomi*).

421. *Chroocephalus melanocephalus* (Natt.)

GABBIANO CORALLINO.

Hydrocolaus melanocephalus, Salvad.

Crocal, Cocàl, Crocàl a la testa nera (*Padova*) — Ochìn (*Arenzano*) — Ciumbin (*Savona*) — Ocheto de mae (*Spezia*) — Ghella (*Lucca*) — Cucalina (*Marche*) — Guaguina capà-nera (*Nap.*) — Cìrru, Oca marina testa nira (*Mess.*) — Cau (*Sard.*).

Piemonte: Salvadori (*Ucc. ital.*, p. 283), menziona la cattura di tre esemplari adulti presso Sommariva del Bosco, Cuneo, il 4 novembre 1885 (*Giglioli*). Ne ebbi uno a Voltaggio, Alessandria, il 17 novembre 1882, dopo un forte temporale da S. a N.NO.; è però affatto accidentale la comparsa di questa specie nel Basso Piemonte (*Camusso*).

Lombardia: Comune nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente frequente in Lombardia (*Turati*); scarso (*Borromeo*).

Veneto: Piuttosto comune nel Friuli (*Vallon*). Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Più abbondante nella primavera e nell'autunno nel Nizzardo (*Gal*). Comune sul mare nel distretto di Savona, specialmente in marzo e novembre; vedesi anche in dicembre ed in gennaio (*Piccone*). Comune d'inverno e di passo in aprile ed agosto nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Comune d'inverno e durante il passo in aprile; qualcuno si vede anche in estate nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune nella prov. di Lucca; ne vidi anche nel luglio (*Gragani*). Non comune nella Maremma (*Ade-mollo*); avuto in maggio e dicembre da Orbetello (*Dei*).

Marche: Comune d'inverno (*Paolucci*).

Puglie: Sedentario e assai frequente, ma più abbondante nell'inverno ed in primavera (*De Romita*).

Calabrie: Scarso; avuto in gennaio nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune in marzo ed ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri*); sedentario (*Pistone*). Frequente al litorale di Cefalù nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Raro, di passo irregolare; ne uccisi uno nell'inverno 1880 (*Bonomi*).

422. Chroocephalus ridibundus (Linn.) (ex Briss.)

GABBIANO.

Hydrocolæus ridibundus, Salvad.

Cocàl (*Feltre, Friuli*) — Crocale (*Rovigo*) — Ochìn (*Arenzano*) — Ciumbin (*Savona*) — Ocheta de mae (*Spezia*) — Ghella (*Lucca*) — Nibbio, Bibbio (*Viareggio*) — Piccion di mare (*Sesto fiorentino*) — Francolo (*Maremma*) — Cucalina (*Marche*) — Guaguina, Gavina (*Nap.*) — Jannulu (*Calabr.*).

Piemonte: Scarso al piano in prov. di Cuneo, ove si mostra di passaggio in aprile ed in settembre (*Albre*). Frequente nella prov. di Torino (*Gasca*), da novembre al marzo (*Martorelli*).

Lombardia: Comunissimo sul lago di Mezzola e sul Lario nella prov. di Sondrio (*Galli*). Invernale e di passo copioso in marzo ed aprile ed in ottobre e novembre nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di accidentale o casuale comparsa durante l'inverno al piano nel distretto di Feltre, ove qualche coppia rimane forse a nidificare lungo la Piave (*Delaito*). Assai frequente al litorale nel Friuli (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Specialmente primaverile ed autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune nel distretto di Savona, ove è forse sedentario; ne ho veduto in marzo, aprile, luglio, ottobre e dicembre (*Piccone*). Raro in quello di Arenzano (*Luciani*). Frequente d'inverno e raro d'estate nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comunissimo sul litorale nella prov. di Lucca e sulle paludi (*Martorelli*); vedesi anche in luglio (*Gragnani*). Comune in primavera coi forti libeccii, in pian di

Sesto, Firenze (*Fontebuoni*). Accidentale nel febbraio 1888 nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Comune nell'inverno, primavera ed autunno in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune, sedentario, ma specialmente invernale, nella Maremma (*Dei, Ademollo*). Comune nell'inverno in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso d'inverno (*Paolucci*).

Campania: Di comparsa accidentale nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Frequente in autunno e molto più nell'inverno ed in primavera; ne ebbi uno il 21 luglio 1886 (*De Romita*).

Calabrie: Comune e sedentario sul litorale della prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Invernale in quella di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Comune in marzo ed ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri*); sedentario (*Pistone*). Frequente da agosto ad aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comune al litorale in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Invernale, ma anche nidificante in abbondanza (*Bonomi*).

423. *Gelastes Genei* (De Breme)

GABBIANO ROSEO.

Cau arrosa (*Sardegna*).

Liguria: Accidentale durante l'estate nel Nizzardo (*Gal*).

Sicilia: Raro, ma forse sedentario nella prov. di Messina (*Pistone*).

Sardegna: Non comune, nidificante e vagante: presso Cagliari l'ebbi più comunemente in primavera avanzata in perfetto abito di nozze; di rado ebbi i giovani (*Bonomi*).

424. Rissa tridactyla (Linn.)

GABBIANO TERRAGNOLO.

Ochetta (*Arenzano*) — Ochin, Ciumbin (*Savona*).

Lo Schiavuzzi ricorda un branco di oltre 100 individui, comparso sulla rada di Pirano (Istria) il 24 febbraio 1879 e che vi si trattenne fino ai primi del susseguente marzo. Il Salvadori (*Ucc. ital.*, p. 289) rammenta come in Liguria questa specie si fa vedere abbondante nel maggio: e spiega il caso dicendo che si tratta di individui sviati i quali invece di seguire le coste dell'Atlantico, nella loro migrazione a settentrione, seguono quelle del Mediterraneo e si affollano nel Golfo di Genova. È noto come questa specie artica e subartica, emigri a mezzogiorno nella stagione fredda giungendo sin sulle coste occidentali dell'Africa.

Piemonte: Nel 1872 ne fu ucciso uno nella R. tenuta di Pollenzo (*Abre*).

Lombardia: Due volte sarebbe stato preso nella prov. di Pavia; l'ultimo, un maschio, venne ucciso a Scarpone sul Ticino l'8 novembre 1879 (*Paresi*). Di comparsa accidentale nella Lombardia (*Turati*).

Liguria: Capita più frequentemente nell'autunno nel Nizzardo (*Gal*). Scarso nel distretto di Savona, ne ebbi un giovane preso in un branchetto di 5 o 6, il 30 dicembre 1876 (*Piccone*). Raro in primavera nel distretto di Arenzano (*Laciani*). Di scarso passo primaverile nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale in Val di Chiana, ove ne ebbi uno adulto nel febbraio 1879, *Acif. Ital.* p. 428 (*Griffoli*). Raro nel Senese e nel Grossetano (*Dei*). Il 30 dicembre 1888, un esemplare di questa specie venne ucciso dal signor Paolo Damiani a Portoferraio (Elba) e gentilmente donato alla Collezione italiana in Firenze dal signor Giacomo Damiani; è in abito giovanile (*Giglioli*).

Puglie : Accidentale, ma non molto raro; vedesi in aprile (*De Romita*).

Sicilia : Di comparsa irregolare in febbraio ed aprile nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Non rara alla riviera di Cefalù nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

425. *Larus canus*, Linn.

GAVINA.

Cocaline (*Friuli*) — Crocale, Gatto de mare (*Rovigo*) — Oca mezana (*Arenzano*) — Ghella (*Lucca*) — Cucale (*Marche*) — Aipa pedi niuri (*Mess.*) — Cau mannu (*Sard.*).

Il Salvadori mantiene sia comunissima in tutte le stagioni questa specie da noi; non sembra essere però così sicuro in quanto riguarda la sua nidificazione in Italia (*Ucc. ital.*, p. 286).

Piemonte : Ne conservo una presa il 26 novembre 1885 sul Po vicino a Gassina, Torino (*Pezzi*). Nella prov. di Torino si prende talvolta sul Po (*Martorelli*).

Lombardia : Avventizia nella prov. di Cremona (*Ferragui*). Comune in quella Mantova (*Paglia*). Non rara nella Lombardia in generale (*Turati*); scarsa (*Borromeo*).

Veneto : Frequente nel Friuli, al litorale (*Vallon*). Piuttosto frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Scarsa in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia : Accidentale nel distretto di Vergato, Bologna (*Lorenzini*). Di scarso passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Specialmente autunnale nel Nizzardo (*Gal*). Comune dall'agosto all'aprile nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Molto scarsa nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Non rara sul litorale nella prov. di Lucca

(*Martorelli*); si vede in novembre (*Gragnani*). Comune e sedentaria nella Maremma (*Dei, Ademollo*).

Marche: Comune e sedentaria (*Paolucci*).

Campania: Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Abbondante tutto l'inverno (*De Romita*).

Sicilia: Comune in marzo ed ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri*); sedentaria (*Pistone*).

Sardegna: Comune e nidificante (*Bonomi*).

426. *Larus Audouini*, Payr.

GABBIANO CÔRSO.

Cau de mari (*Sardegna*).

Nel maggio 1882, Lord Lilford potè raccogliere una dozzina di esemplari di questa bella specie, principalmente intorno all'isola della Maddalena; l'11 maggio sull'isolotto Spargi egli trovò una colonia di 25 a 30 individui di *L. Audouini*, ma senza poter trovare le uova.

Toscana: L'ho veduto sulle coste dell'Elba (*Rostri*).

Sardegna: Non comune, o meglio non facile ad aversi, perchè vagante per le coste. È però sedentario e nidificante; ne uccisi pure allo Stagno di Cagliari nel 1881 1882 e molti ne vidi nel porto di Porto Torres (*Bonomi*).

427. *Larus fuscus*, Linn.

ZAFFERANO.

Oca marina (*Calabr.*) — Cau brasciu (*Sard.*).

Lombardia: Raro nella prov. di Mantova (*Paglia*). Non comune nella Lombardia in generale (*Turati*).

Liguria: Specialmente primaverile nel Nizzardo (*Gali*).

Toscana: Sedentario e comune nel distretto di Massarosa, Lucca (*Gragnani*). Scarso nella Maremma (*Ademollo, Dei*).

Puglie : Non si vede tutti gli anni, ma non può dirsi raro; pare essere estivo e ne ebbi in maggio, giugno, agosto e settembre (*De Romita*).

Calabrie : Si vede in marzo nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Rarissimo; si vede in marzo ed ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri*); sedentario (*Pistone*). Il 18 maggio 1887 ho veduto a Porto Empedocle diversi esemplari adulti di questa specie, e nei giorni successivi ne vidi al Capo Passero, sulla costa orientale della Sicilia e nel porto di Messina (*Giglioli*).

Sardegna : Non raro, nidificante e vagante; ne ebbi due, il 25 ottobre e nel novembre 1886 (*Bonomi*).

428. *Larus cachinnans*, Pall.

GABBIANO REALE.

Gros Gabian (*Nizza*) — Oca de mâ (*Arenzano*) — Oca de mae, Gabian (*Spezia*) — Gabbiana (*Isola di Giglio*) — Gaffio (*Nap.*) — Oca marina (*Calabr.*).

Piemonte : Qualche rara volta si prende nella prov. di Torino (*Martorelli*).

Lombardia : Accidentale nel dicembre nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Non comune, specialmente gli adulti, nella prov. di Mantova (*Paglia*). Non raro nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto : Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissimo in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Liguria : Vedesi più frequente in primavera ed in autunno nel Nizzardo (*Gal*). Sedentario, ma alquanto scarso nel distretto di Savona (*Piccone*). Comune e forse sedentario in quello di Arenzano (*Luciani*). Sedentario, ma poco frequente nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Poco comune, ma sedentario sul litorale della prov. di Lucca (*Martorelli*); abbastanza frequente nel di-

stretto di Massarosa (*Gragnani*). Raro nel distretto di Sesto, Firenze, con forti venti di libeccio (*Fontebuoni*). Comune e sedentario nella prov. di Grosseto (*Dei, Ademollo, Cambi*). Non raro all'isola di Giglio (*Bianchi*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche : Comune d'inverno (*Paolucci*).

Campania : Scarso nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Sedentario all'isola di Capri; nidifica sui Faraglioni (*Cerio*).

Puglie : Frequente, ma non mai abbondante; si vede in autunno, inverno e primavera (*De Romita*).

Calabrie : Avuto in marzo ed aprile nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Comune in marzo ed ottobre nella prov. di Messina (*Ruggeri*); sedentario (*Pistone*).

Sardegna : Comune e sedentario (*Bonomi*).

429. *Larus glaucus*, O. Fabr. ex Brünn.

GABBIANO MAGGIORE.¹

Gabbiano glauco (*Aut. Ital.*).

Liguria : Di accidentale comparsa in primavera nel Nizzardo (*Gal*).

¹ Nella Collezione Contarini a Venezia si conservano due esemplari del *L. leucopterus*, Faber, specie artica; essi non hanno indicazione di provenienza, ma il Ninni crede che possano essere stati presi nel Veneto. Nel Museo Zoologico della R. Università di Genova col numero 2300 del Catalogo ornitologico vi è pure un individuo di quella specie privo di indicazione di luogo e senza data; è un antico esemplare (Cfr. SALVADORI, *Ucc. ital.* p. 287). Io ho veduto più volte questi tre esemplari, ma, trattandosi di individui adulti di una specie di cui i giovani soltanto sembrano allontanarsi casualmente dalle regioni artiche e subartiche, ho creduto prudente aspettare ulteriori conferme prima di annoverare questa specie tra le avventizie in Italia. Aggiungo che a mia conoscenza nessun Autore ne ha annunziato la cattura da noi. In apparenza il *L. leucopterus* è semplicemente un *L. glaucus* colle dimensioni del *L. fuscus* e, dicesi, con ali proporzionatamente più lunghe.

430. Larus marinus, Linn.

MUGNAIACCIO.

Gafio, Gafone, Gafrione (*Nap.*).

Il Salvadori ha poi trovato (*Ucc. ital.* p. 288) che il giovane Gabbiano ucciso nell'autunno 1883 nei pressi di Torino e che venne prima riferito a questa specie (*Avif. Ital.* p. 434) è invece un giovane del *L. cachinnans*; io lo ricordo benissimo avendolo esaminato nel 1884; sarebbe in ogni modo un ben grosso individuo del comune Gabbiano reale.

Liguria : Di comparsa accidentale in primavera nel Nizzardo (*Gal.*).

Campania : Di accidentale comparsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli.*).

Sardegna : Di comparsa accidentale (*Bonomi.*).

STERCORARIIDÆ

(*Labbi.*).

431. Megalestris Catarrhactes (Linn.) (ex Gesn.)

LABBO MAGGIORE.

Stercorario, Stercorario maggiore (*Aut. Ital.*).

Il Wright (« *Ibis*, » 1864, p. 150) è stato sin qui il solo Autore il quale ha menzionato la cattura di questa specie nella regione Italica; egli scrisse di averne avuto un individuo il 9 giugno 1860, ucciso in quei giorni a Salini (Malta). Sulla fede di quella asserzione io annoverai il *M. Catarrhactes* nell'elenco di uccelli italiani che pubblicai nel 1879, nel I Fascicolo della mia ICONOGRAFIA DELL'AVIFAUNA ITALICA.

Il Wright però si era già ravveduto, ed aveva anche scritto al Salvadori che quella sua asserzione era basata su di un errore di determinazione: seppi da lui infatti che si trattava invece di un esemplare dello *Stercorarius pomatorhinus* !

Ora però vengo nel modo il più positivo ad annoverare il *M. Catarrhactes* tra le specie che sono capitate in Italia. Difatti nell'agosto 1886 il signor Camillo Dal Fiume di Badia Polesine m'inviava un grosso uccello che egli non aveva potuto determinare, pregandomi di studiarlo. Nel riceverlo, fui non poco sorpreso al vedere che era un grosso Labbo, che trovai essere un giovane del *M. Catarrhactes* e che seppi poi essere un maschio. Chiesi tosto informazioni intorno alla cattura di questo esemplare interessante, ed ecco cosa mi scriveva in proposito il signor Dal Fiume in data del 25 agosto 1886: « Tutto quanto posso dirle intorno a questo uccello con sicurezza e precisione, è che fu ucciso da mio fratello il 1° ottobre 1882 nelle Valli Veronesi del Comune di Castagnaro quando queste erano tutte allagate in seguito alla rotta di Legnago (18 settembre). E esso nuotava tranquillo in un largo spazio allagato, e si manteneva sempre un centinaio di metri circa distante dalla barca colla quale, avendolo scoperto, mio fratello lo inseguiva. Non fu ucciso che dopo cinque o sei colpi di fucile: poco pauroso, quando sentiva una fucilata prendeva il volo e si posava di nuovo poco lontano. »

L'esemplare suddetto è poi stato gentilmente ceduto dal signor Dal Fiume alla Collezione centrale dei Vertebrati italiani nel R. Museo di Firenze, ove ora si trova. È, come dissi, un giovane, con tinte molto rossiccie sulle parti inferiori. Venne annunciata ultimamente nel « *Bollettino del Naturalista*, » dal signor Carlo Vercelloni di Lecco, la cattura di un individuo di questa specie, maschio giovane, ucciso a Damaso presso Colico sul lago di Como il 10 agosto 1887: ma ho saputo poi che si trattava invece di un *Larus cachinnans* in abito giovanile, e ciò dallo stesso egregio signor Vercelloni.

Il *M. Catarrhactes* è specie oceanica artica: nidifica nelle

Shetland, alle Faeroe, in Islanda e nell'America artica; ben di rado, durante l'inverno, giunge sulle coste dell'Europa media. È stato però veduto a Gibilterra e catturato a Tangeri: von Homeyer (*Journ. f. Orn.* 1862, p. 431), dice di averne veduto volare intorno alle isole Baleari e vicino a Barcellona; ciò renderebbe meno strana la sua comparsa in Italia.

432. *Stercorarius pomatorhinus* (Temm.)

GABBIANO NERO.

Piemonte: Casuale al piano in prov. di Cuneo (*Abre*).

Lombardia: Avventizio nella prov. di Cremona; uno fu veduto nel febbraio ed uno venne ucciso il 4 ottobre 1880 (*Ferragni*). Di comparsa accidentale in Lombardia (*Turati*).

Veneto: Di casuale comparsa nel Friuli; ne ebbi un maschio giovane il 2 ottobre 1882, colto colle reti alla marina (*Vallon*).

Liguria: Raro ed invernale nel Nizzardo (*Gal*). Raro nel distretto di Spezia; dieci anni fa tre esemplari di questa specie furono uccisi lungo la Magra mentre assalivano delle Anitre; uno lo conserva tuttora il signor Neri di Sarzana (*Carazzi*).

Toscana: Accidentale nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Raro in Toscana; ne vidi uno sul padule di Fucecchio nel marzo 1886 (*Roster*).

Puglie: Accidentale; due sole catture sono a me note (*De Romita*).

Sardegna: Di casuale comparsa; fui il primo ad ucciderne uno presso lo stagno di Cagliari nel marzo 1878 (*Bonomi*).

433. Stercorarius crepidatus J. F. Gmel. ex Banks.

LABBO.

Piemonte : Casuale al piano in prov. di Cuneo (*Abre*). Ne ebbi uno in carne, preso nella prov. di Torino, il 18 novembre 1868 (*Pezzi*).

Liguria : Di comparsa accidentale nel Nizzardo durante l'estate e l'autunno (*Gal*). Raro assai nel distretto di Spezia; una sola cattura è registrata, avvenuta agli Stagnoni di Spezia; era un giovane (*Carazzi*).

Toscana : Accidentale nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

Puglie : Accidentale (*Arif. ital.* p. 436): un solo caso di cattura (*De Romita*).

434. Stercorarius parasiticus Linn. ex Brünn.

LABBO CODA-LUNGA.

Cocál moro (*Padova*).

Piemonte : Accidentale al piano in prov. di Cuneo (*Abre*).

Lombardia : Casuale nella prov. di Cremona; ebbi un giovane ucciso sul Po il 23 settembre 1882 (*Ferragni*).

Veneto : Rarissimo nella prov. di Padova, ove, lungo il Brenta, venne colto nell'ottobre 1882 un giovane che si conserva nella mia raccolta (*Arrigoni*).

Liguria : Di comparsa accidentale nel Nizzardo durante l'estate e l'autunno (*Gal*).

TUBINARES.

PROCELLARIIDÆ

(*Procellariæ*).

435. *Puffinus anglorum* (Temm.) ex Willugh.

BERTA MINORE.

Puffinus yelkouan Salvad.

Picioun Marteu (*Nizza*) — Bertacco picin (*Arenzano*) —
Fallante (*Isola di Giglio*) — Bardante (*Mess.*).

Liguria : Stazionaria nel Nizzardo, ma al largo ; in mare è più facile vederne durante l'estate e l'autunno (*Gal*). Comune, ma non abbondante, sul mare nel circondario di Savona ; si getta sugli ami dei pescatori e n'ebbi varî presi in tal modo (*Piccone*). Comune, specialmente d'inverno, forse sedentaria, nel distretto di Arenzano: nel novembre 1880, e specialmente il giorno 15, immense frotte di questa specie si videro in mare (*Luciani*).

Toscana : Non comune nella prov. di Grosseto, sul mare (*Ademollo*); ne ebbi una giovane a Follonica il 17 agosto 1886 (*Cambi*) Sedentaria nell' Isola di Giglio (*Bianchi*). Non rara sul litorale Toscano; nell'agosto ne vidi diversi tra Viareggio e Forte dei Marmi (*Roster*).

Campania : Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Non rara in alto mare, accidentale sulla costa (*De Romita*).

Sicilia : Questa specie si vede in abbondanza straordinaria nello Stretto di Messina nel giugno specialmente e nei

giorni in cui spira vento di grecale; nel pomeriggio, dalle 2 in poi, incomincia a sfilare a branchi grossi od a branchetti, che dirigonsi verso il Faro; raramente vedonsi individui isolati. Dalle 5 sino al tramonto i branchi si succedono ad intervalli di poche centinaia di metri; non uno si vede tornare indietro; hanno un volo rapidissimo oscillante e sfiorano le onde: filano rapidamente senza fermarsi nell'acqua e senza tuffarsi; evitano le barche obliquando, ma non retrocedono mai. Con altri venti scarseggiano; quando lasciai Messina ai primi dell'agosto 1888 le scorrerie continuavano ancora, ma meno frequenti; i pescatori asseriscono che cessano in quel mese. Ho poi notato che qualche volta i branchi interrompono il loro viaggio per pescare in mezzo al canale; fui testimonio di ciò il 4 luglio 1888 poco prima del tramonto, e mi trovai in mezzo a più centinaia di questi uccelli che coprivano una estesa area dello Stretto ove per effetto delle correnti il mare girava a vortici: era una scena ed un brulichio indescrivibili: alcuni si tuffavano, altri emergevano dalle onde, altri nuotavano, altri si libravano volando sul mare. Colla mia barca mi spinsi in mezzo a loro e non si mostrarono per nulla timorosi: solo dopo varie fucilate l'enorme branco, al quale erano frammisti pochi *P. kuhli* si allontanò lentamente. Gli individui uccisi avevano il gozzo pieno di pesciolini; notai ancora che tutti avevano gli organi genitali poco sviluppati ¹ *Angelini*. Frequente al litorale nel distretto delle Madonie, Palermo (*Palumbo*, *Morici*).

Sardegna: Sedentaria lungo le coste e sulle isolette. Nel giugno 1882 a Capo Caccia, Alghero, e nell'aprile 1885 all'isola dei Cavoli ed al Capo Spartivento ne trovai una infinità in parte annegati in mare ed in parte putrefatti sulle scogliere, certo per effetto di forte burrasca (*Bonomi*).

¹ Il prof. Angelini riferisce queste interessanti osservazioni al *P. yelkowan*, non essendosi ancora persuaso che questo sia identico col *P. anglorum*.

436. Puffinus Kuhli (Boie)

BERTA MAGGIORE.

Gros Marteu (*Nizza*) — Bertacco (*Arenzano*) — Margìn (*Spezia*) — Berta (*Lucca*) — Fallante (*I. di Giglio*) — Vaetra (*Mess.*) — Aipa pizzu-tuortu (*Modica*).

Piemonte : Un esemplare di questa specie fu ucciso lungo il fiume Tanaro in prossimità di Ceva, Cuneo, nell'inverno 1872 (*Abre*).

Liguria : Stazionaria nel Nizzardo, ma in mare al largo; è più facile vederne nell'estate e nell'autunno (*Gal*). Comune sul mare nel circondario di Savona; spesso si getta sugli ami dei pescatori e n'ebbi diverse prese in tal modo (*Piccone*). Comune nell'estate, ma si vede anche d'inverno nel distretto di Arenzano, ove è forse sedentaria (*Luciani*). Comune e stazionaria nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Comune di passo in maggio nel distretto di Massarosa, Lucca (*Graguani*); mi fu detto che si vedono anche lungo il Serchio (*Fontebuoni*). Sedentaria nella prov. di Grosseto, ma ben di rado si scosta dal mare (*Ademollo*). Sedentaria all'isola di Giglio (*Bianchi*).

Marche : Scarsa (*Paolucci*).

Campania : Scarsa nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie : Non rara; forse si avvicina più spesso alla costa della specie precedente (*De Romita*).

Sicilia : Rarissima nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Non rara nello stretto di Messina, ma molto meno abbondante della specie precedente (*Angelini*). Frequente e sedentaria nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Frequente al litorale in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Sedentaria e nidificante sulle isolette, vagante per le coste; nell'estate si avvicina ai porti ed i pescatori ne prendono all'amo (*Bonomi*).

437. *Procellaria pelagica*, Linn.

UCCELLO DELLE TEMPESTE.

Frenguello de mâ (*Arenzano*) — Rindinuni di mari, Sardara (*Mess.*).

Lombardia : Accidentale nella prov. di Mantova. una venne presa a Viadana (*Paglia*).

Liguria : Durante l'estate se ne trovano sempre in alto mare di fronte a Nizza: accidentalmente in seguito a forti burrasche vedonsi sulla spiaggia o dentro terra (*Gal*). Si trova sempre in alto mare nel distretto di Arenzano e Cogoleto, Genova (*Luciani*). Scarso nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Campania : Raro intorno all'isola di Capri: più facilmente si vede in aprile (*Cerio*).

Calabrie : Raro nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia : Comune; si vede specialmente in marzo-aprile ed in ottobre-novembre nella prov. di Messina (*Ruggieri*): vi è sedentario (*Pistone*).

Sardegna : Potei catturarne un solo individuo (*Bonomi*).

438. *Cymochorea leucorrhoa* Vieill.

PROCELLARIA A CODA FORCUTA.

Uccello delle tempeste a coda forcuta (*Aut. Ital.*).

Non ho nulla da aggiungere a quanto scrissi nella mia AVIFAUNA ITALICA intorno a questa specie di comparsa accidentalissima da noi.

OCEANITIDÆ

(*Oceaniti*).

439. *Oceanites oceanicus* (Kuhl.)

PETRELLO.

Oceanites Wilsoni, Salvad.

Liguria: Di rarissima ed accidentale comparsa nel Nizzardo (*Gal*).

PYGOPODES.

ALCIDÆ

(*Alche*).

440. *Utamania Torda* (Linn.)

GAZZA MARINA.

Alca torda, Salvad.

Tuffetto (*Elba*) — Sottanello (*Isola di Giglio*) — Marguni (*Calabr.*) — Edera (*Siracusa, Augusta*) — Dottori (*Cagliari*).

Veneto: Il conte A. P. Ninni mi scrive in data del 17 dicembre 1887, che alcune Gazze Marine erano comparse sulla Laguna di Venezia; una l'ebbe poco prima il cav. Enrico F. Trois e questo sarebbe l'ottavo individuo registrato dal Golfo Veneto (*Giglioli*).

Liguria: Invernale e di passaggio primaverile nel Nizzardo; il 15 aprile 1887 ne ebbimo nove esemplari, tutti in abito nuziale completo; ne vennero presi diversi anche nella primavera del 1888 (*Gal.*). Nel distretto di Savona si vede in dicembre e gennaio, talvolta scarsa, talvolta numerosa; fu assai abbondante nel dicembre 1886 e nel gennaio 1887 (*Piccone*). Comune dal novembre al marzo quasi ogni anno nel distretto di Arenzano; nel 1886-87, fu abbondante assai (*Luciani*). Negli inverni 1883-86 questa specie è sempre stata abbondante nel Golfo di Genova: è però raro che vi restino sino a tutto marzo, ed allora hanno già o quasi assunto l'abito nuziale (*Queirolo*). Fino al 1885 era specie quasi sconosciuta nel distretto di Spezia; ma negli inverni 1885-86 e 1886-87, capitò in abbondanza nel Golfo, ove si vedevano adulti e giovani; il 23 maggio 1887, ebbi un maschio in perfetto abito nuziale, ucciso nella R. Darsena di Spezia (*Carazzi*). Nel febbraio 1887 furono uccisi vari individui di questa specie nel circondario di Sarzana, ove era sino allora quasi sconosciuta (*Lamotte*).

Toscana: Non comune d'inverno nel distretto di Viareggio, Lucca (*Graguani*). Accidentale nella prov. di Grosseto (*Ademollo*); quasi sconosciuta per lo innanzi, ma verso il Natale 1885, apparve in numero straordinario; lo stagno di Orbetello ed il mare intorno all'Argentario ne erano letteralmente coperti (*Dei*). Nel dicembre 1885 comparve per la prima volta a grandi stormi intorno all'isola di Giglio; si tuffano con moto celerissimo, e sempre adoperano le ali nel loro rapido nuoto subacqueo. Nel dicembre 1886 ritornarono numerosissime le Gazze marine e costatai che si nutrivano con preferenza di Aguglie; anzi dallo stomaco di una tolsi uno di quei pesci appena ingoiato e che vidi prendere del peso di 260 grammi (*Bianchi*). Il signor G. Damiani mi scrive che nel dicembre 1886 questa specie si vide abundantissima intorno all'isola d'Elba; non comparve nel 1887, ma fu ancora copiosa nel dicembre 1888 (*Giglioli*).

Campania: Di casuale comparsa d'inverno a Posillipo, Napoli (*Franceschini, Monticelli*). Questa specie nel passato

molto rara sul mare attorno all' isola di Capri, vi è stata notata più frequentemente in questi ultimi anni; parecchi individui furono presi, e nel dicembre 1886 ne vidi io stesso tre presso la spiaggia al nord dell'isola. La comparsa di questi uccelli è ritenuta foriera di freddi intensi o di temporali (*Cerio*).

Puglie : Accidentale: il 12 febbraio 1886 ne fu uccisa una a Taranto, il 24 dicembre seguente una venne presa a Bari; mentre a Taranto tra il 23 e il 24 dicembre 1886 tante ne apparvero, che la rada ne era popolata. Si trattennero oltre un mese e durante questo tempo se ne uccisero centinaia (*De Romita*).

Calabrie : Ne ebbi una presa tra gli scogli del porto di Otrone. Catanzaro, il 3 gennaio 1887 (*Lucifero*). Abbondarono sul litorale di Reggio nel novembre-dicembre 1886, e nel gennaio 1887. Comparvero agli ultimi del novembre 1886 e dal 13 dicembre il loro numero andò crescendo: volavano a branchi e ne vennero presi oltre un centinaio (*Moschella*).

Malta : Il 10 gennaio 1887 comparvero nel Gran Porto ed a Marsascirocco da 6 a 8 individui di questa specie, 3 vennero presi, uno da me con una rete (*Abela-Pulis*).

Sardegna : Di passo in primavera: negli anni 1887-88 vennero in gran numero, si vedevano nel porto di Cagliari tuffarsi tranquillamente tra le navi; ne vennero presi all'amo, colla fiocina, ed anco dai monelli a sassate (*Bonomi*).

441. *Fratercula arctica* (Linn.) (ex Clus.)

POLCINELLA DI MARE.

Macareu (*Nizza*) — **Sumbuzzaturi** (*Calabr.*) — **Pulcinella de mari**, **Dottori**, **Nasone** (*Sardegna*).

Veneto : Di comparsa affatto accidentale nella prov. di Padova; nella mia collezione conservo un individuo giovane che fu preso *colle mani* sul colle di Galgignano, Euganei, nel gennaio 1883 (*Arrigoni*).

Liguria: Invernale e di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto raro nel distretto di Savona; ne ebbi un giovane preso sulla spiaggia d' Albissola il 3 febbraio 1884 (*Piccone*). Nel marzo 1886 erano abbondanti nel Golfo di Genova (*Queirolo*). Di scarsa ed irregolare comparsa invernale nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Raro sul litorale della prov. di Lucca durante l'inverno (*Giragnani*). Accidentale sul litorale maremmano (*Ademollo*).

Campania: Accidentale nella prov. di Napoli; uno venne ucciso sul campo di Marte a 3 chilometri dal mare nel 1884 (*Franceschini, Monticelli*). Accidentale all'isola di Capri; ne ebbi una femmina l'8 gennaio 1887, presa vivente a poca distanza dalla spiaggia settentrionale (*Cerio*).

Calabrie: Uno venne ucciso nell'aprile alla foce del torrente Scacciati nella prov. di Reggio (*Moschella*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina, nell'inverno 1885-86 comparve però in numero straordinario nello Stretto, ove più di 20 individui vennero presi (*Ruggeri*); vi è accidentale, ma nel gennaio 1885 molti ne comparvero (*Pistone*). Venne preso a Cefalù nel distretto delle Madonie. Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Raro; ne acquistai diversi, alcuni in primavera, da pescatori di mare i quali li avevano presi coll'amo e nelle reti; ne ebbi uno nella primavera del 1888 (*Bonomi*).

442. *Lomvia Troile* (Linn.)

URIA.

Il 16 gennaio 1883 il signor Faustino Manzoni di Bra. uccise un individuo di questa specie a Pollenzo, alla confluenza del Tanaro e della Stura, ove da due o tre giorni quell'uccello era stato veduto; si tuffava cogliendo abilmente dei pesciolini. Mercè la cortesia del signor Manzoni, potetti esaminare questo interessante esemplare a Roma

il 20 marzo 1886, e convincermi che era proprio una *Lomvia Troile* in abito invernale. Fui così in tempo di porre questa specie tra le « Aggiunte » nella mia AVIFAUNA ITALICA (vedi p. 552).

Il caso aveva un interesse speciale per me, giacchè sebbene la specie in discorso fosse stata citata tra le italiane dal Buonaparte sin dal 1832,¹ nessuno tra coloro i quali si occuparono di Ornitologia italiana, tranne il Wright (*Ibis* 1864, p. 157) trattando degli uccelli di Malta e per erronea determinazione, ne aveva più fatta menzione ed in nessun Museo avevo veduto esemplari colti in Italia. Messò però così sull'intesa feci indagini nuove e più accurate e venni a sapere che nel Nizzardo durante l'inverno l'*Uria* si vede talvolta insieme colle Gazze marine ed ai Polcinella: sempre però individui isolati. Anzi, i signori fratelli Gal, i quali mi diedero queste notizie, aggiunsero che un bellissimo maschio in perfetto abito nuziale era stato ucciso l'11 maggio 1885, sotto il castello dell'Inglese tra Villafranca e Nizza, dal signor Bessi di questa città. Potei averlo in cambio dal Museo Civico di Nizza ed ora è nella Collezione italiana centrale a Firenze. Il 14 dicembre 1886 un maschio adulto, ma in abito invernale, venne ucciso nelle vicinanze di Nizza; ed infine il 15 aprile 1887 i fratelli Gal ebbero dieci *Lomvia Troile*, parte in veste nuziale, parte ancora in abito invernale; erano state uccise in mare presso Nizza insieme a nove *Utamania Torda* tutte in perfetto abito di nozze, ed io le ebbi a Firenze ancora fresche. Va però notato che nell'inverno 1886-87 vi fu sul nostro litorale una straordinaria comparsa di Gazze marine, le quali si fecero prendere in numero grandissimo nel Mare Jonio e persino a Malta.

¹ Il Buonaparte annovera pure tra le specie avventizie in Italia la *Lomvia Brünnichi*; ed il Risso cita il *Mergulus Alle* dal Nizzardo; asserzioni le quali sono tuttora infondate. Il *M. Alle* è pure citato dal Veneto e dal litorale istriano dal Vallon *Avif. del Friuli* p. 51 (estr.), ma ho potuto constatare a Gorizia nell'aprile 1884, che uno o due *M. Alle* detti provenienti dalla costa dalmata, venivano invece da Jan Mayen, portati da marinai della spedizione polare austriaca!

La *L. Troile* è specie sedentaria sul litorale delle isole Britanniche, sulle coste dell' Europa N.O. e su quelle orientali dell' America boreale; durante l' inverno essa viaggia, e giunge in fondo al Golfo di Guascogna; pare essere pure stata presa a Gibilterra od in quei pressi, onde la sua comparsa in Italia non è poi un fatto molto straordinario.

I tredici esemplari italiani da me esaminati appartengono tutti alla forma tipica; variano un poco nelle dimensioni del becco, all' infuori delle differenze sessuali che sono minime, ma nessuno mostra tracce della palpebra e della striscia postoculare bianche, caratteristiche di quella forma che ebbe il nome di *L. Ringvia* (Lath.) e che alcuni Autori considerano una mera varietà o razza della prima, essendo accertato il fatto che le due forme si accoppiano e nidificano insieme. Anche nella primavera del 1888 furono presi diversi di questi uccelli nel mare di Nizza, alcuni in abito nuziale.

COLYMBIDÆ

(*Strolaghe*).

443. *Colymbus glacialis*, Linn.

STROLAGA MAGGIORE.

Magrun grosso (*Savona*) — Marangone (*Lucca*).

Piemonte: Scarsa al piano nella prov. di Cuneo, e solo nei rigidi inverni (*Abre*).

Lombardia: Assai rara nella prov. di Mantova (*Paglia*). Accidentale in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Rara nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Rarissima in quella di Rovigo; nel dicembre 1878 venne ucciso un esemplare lungo l' Adige, non so di altre catture (*Dal Fiume*).

Emilia : Di comparsa accidentale nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria : Di rara comparsa nell'inverno ed in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Nella seconda quindicina di dicembre 1885 comparvero nel mare d'Albissola, Savona, per circa due settimane molte Strolaghe, e fra questi furono presi tre individui del *C. glacialis*, varii *C. septentrionalis* ed un *C. arcticus*; conservai uno dei primi (*Piccone*). Rarissima nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana : Non comune d'inverno nella prov. di Lucca; ne ebbi una il 20 dicembre 1886 che pesava 5 chilogrammi (*Gragnani*). Di rarissima comparsa invernale nella prov. di Grosseto (*Ademollo*).

Puglie : Accidentale a Taranto, ove una venne presa nell'inverno 1880 (*De Romita*).

Sardegna : Di rara ed accidentale comparsa nell'inverno (*Bonomi*).

444. *Colymbus arcticus*, Linn. ex Willugh.

STROLAGA MEZZANA.

Duca (*Lago Maggiore*) — Magrun (*Savona*) — Folaga (*Arenzano*) — Strolaga (*Lucca*).

Piemonte : Accidentale nella prov. di Torino (*Gasca*).

Lombardia : Rarissima nella prov. di Milano (*Brambilla*). Rara nel tardo autunno e nell'inverno in quella di Cremona (*Ferragni*). Di rarissima comparsa nella prov. di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati*, *Borromeo*).

Veneto : Rara ed invernale nel Friuli; un maschio adulto in abito nuziale completo trovai dal signor Pontotti in Udine; fu preso nel 1878 (*Vallon*). Frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria : Di rara comparsa nell'inverno ed in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Rara nel distretto di Savona, ma

meno della specie precedente; ne ebbi una il 25 dicembre 1875 ed una seconda, sempre in Albissola, il 17 dicembre 1878 (*Piccone*). Rara ed invernale in quella di Arenzano (*Luciani*).

Toscana: Comune nel novembre sul lago di Massaciucoli, Lucca (*Gragnani*). Scarsa d'inverno nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Turchetti*). Di rara comparsa invernale nella Maremma (*Ademollo*).

Marche: Rarissima, molte però comparvero nel porto di Ancona nell'inverno del 1886, una fu presa in abito nuziale (*Paolucci*).

Puglie: Non rara nell'inverno a cominciare dal novembre, e specialmente nel mare di Taranto (*De Romita*).

Sardegna: Di passo invernale irregolare e scarso; ebbi due individui uccisi nello stagno di S. Gilla, che sono ora nel R. Museo di Cagliari (*Bonomi*).

445. *Colymbus septentrionalis*, Linn.

STROLAGA MINORE.

Smergón macià (*Padova*) — Folaga (*Arenzano*) — Margùn (*Spezia*) — Tummalora di li rossi (*Mess.*).

Piemonte: Una fu uccisa a Casanova presso Carmagnola nel 1859 (*Abre*).

Lombardia: Di passaggio irregolare nell'autunno e nell'inverno nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Poco comune in quella di Mantova (*Pagliai*). Accidentale in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Rara assai ed invernale nel Friuli, ove so di una sola cattura il 3 dicembre 1885, presso Marano (*Vallet*). Piuttosto frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Liguria: Nel Nizzardo si vede raramente nell'inverno ed in primavera (*Gal*). Scarsa, ma non rara nel distretto di Savona, ove quasi ogni anno si fa vedere, sempre nel forte dell'inverno (*Piccone*). Rara ed invernale in quello di Aren-

zani (*Luciani*). Durante l'inverno sono piuttosto frequenti i giovani nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non comune d'inverno e di non regolare comparsa nella prov. di Lucca (*Gragnani*). Ne conservo una uccisa a Fucecchio, Firenze, il 10 gennaio 1879 (*Giglioli*). Accidentale nel Casentino, Arezzo (*Beni*). Non comune d'inverno in Val di Chiana (*Griffoli*). Invernale nelle prov. di Siena e di Grosseto, ma non comune (*Dei, Ademollo*). Non rara ed invernale in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarsa ed invernale (*Paolucci*).

Campania: Accidentale: una venne uccisa nel novembre 1865 sul lago di Patria, Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Piuttosto rara sulla costa barese, ne ebbi una nel dicembre 1877; non infrequente nel mare di Taranto, sempre d'inverno (*De Rómila*).

Sicilia: Rara nella prov. di Messina (*Ruggeri*).

Sardegna: Di irregolare comparsa nell'inverno, ma non meno rara della specie precedente (*Bonomi*).

PODICIPEDIDÆ

(*Svassi*).

446. *Podiceps cristatus* (Linn.) (ex Gesn.)

SVASSO MAGGIORE.

Podiceps cristatus, Salvad.¹

Suttacquin, Cassasut (*Basso-Piem.*) — Giver (*Lago Mag-*

¹ Sta bene che fosse un errore lo scrivere *Podiceps* invece di *Podicipes*, errore forse volontario e pudico; ma ormai il primo nome ha un secolo di uso universale, onde non vedo la utilità della innovazione, o correzione se vuolsi, proposta dal Gloger nel 1854 e adottata soltanto recentissimamente dal Salvadori (*Ucc. ital.* p. 300). È anche troppo instabile la nostra nomenclatura senza renderla ancora più incerta colle piccolezze filologiche! Eppoi chi accetterebbe dei *Podicipes*, quando può farne a meno!!

giore) — *Fisolo* (*Rovigo*) — *Crebe* (*Nizza*) — *Magrun* (*Arenzano*) — *Tufin* (*Spezia*) — *Ciuffina* (*Lucca*) — *Morta riàle*, *Parrinu* (*Terran. Sicil.*).

Piemonte: Qualche raro individuo, sempre però giovane, s'incontra nell'inverno lungo i fiumi della prov. di Cuneo (*Abre*). Si prende talvolta in prov. di Torino (*Martorelli*). Raro e di solo passo al piano nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Raro nella prov. di Milano (*Brambilla*). Scarso da settembre a maggio in quella di Cremona (*Ferragni*). Comune e nidificante sul lago di Mantova (*Paglia*). Frequente nella Lombardia in generale (*Turati*); scarso (*Borromeo*).

Veneto: Di scarso passaggio al piano in aprile ed agosto nel Bellunese (*Soravia*). Non tanto raro e forse nidificante nel Friuli (*Vallon*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Non raro nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Invernale nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto raro nel distretto di Savona: ne ebbi uno, preso a Savona, il 14 dicembre 1879 (*Piccone*). Non raro da novembre a marzo: talvolta in settembre si vedono i giovani, nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Raro nei rigidi inverni nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Invernale e scarso nella prov. di Lucca (*Martorelli*, *Fontebuoni*); passa anche in settembre (*Gragnani*). Non tanto raro nella prov. di Firenze: ne ebbi due dal padule di Fucecchio: 9 aprile 1885 e 14 aprile 1887, uno da Ugnano, Firenze, ucciso il 3 dicembre 1878 e ne vidi altri colti in provincia anco nell'autunno (*Giiglioli*). Comune in marzo sui laghi in Val di Chiana, vi nidifica in scarso numero (*Griffoli*). Comune nella prov. di Siena e di Grosseto (*Dei*, *Ademollo*); i giovani sarebbero stazionari in Maremma (*Ademollo*). Comune e sedentario in Toscana (*Roster*).

Marche: Scarso (*Paolucci*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Frequente d'inverno nel mare di Taranto e alle Saline; lo si vede in coppie od in piccoli branchi anche lungo la costa barese in autunno, inverno e primavera (*De Romita*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Arriva in novembre-dicembre e ripassa in marzo, ma non è abbondante nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carvana*).

Sardegna: Giunge di passo in autunno e sverna; è anco nidificante e sedentario, specialmente al Capo settentrionale, e ne vidi in ogni stagione nello stagno di Sorso (*Bonomi*).

447. *Podiceps griseigena* (Bodd.)

SVASSO COLLO-ROSSO.

Podiceps griseigena, Salvad.

Fisolett capussin (Mantova) — Smergo (Padova) — Magrunetto (Savona) — Strolaghina (Lucca).

Lombardia: Accidentale nella prov. di Cremona; uno venne ucciso sul Po il 7 dicembre 1886: era una femmina (*Ferragni*). Raro, capita d'inverno nella prov. di Mantova (*Paglia*). Accidentale nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Raro nel Friuli; un individuo giovane fu preso nel Natisone il 2 novembre 1885 (*Vallon*). Piuttosto frequente nella prov. di Padova (*Arrigoni*).

Emilia: Nella primavera (aprile?) del 1886 si è riscontrato un singolare passaggio di questa specie nel Modenese; 5 individui vennero uccisi a Novi ed altri in altre località; anche nella primavera del 1887 un esemplare fu colto alle basse (*Picaglia*).

Liguria: Di rara comparsa nell'autunno ed in primavera nel Nizzardo (*Gal*). Raro nel distretto di Savona, ove

ne ebbi un solo, preso a Savona il 14 novembre 1881 (*Piccone*). Raro assai (*Acq. Ital.* p. 453, nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non comune nella prov. di Lucca; ma nel 1887 se ne videro diversi sul lago di Massaciuccoli, ove compare anche in settembre; il 16 maggio 1888 vi furono uccise due femmine in completo abito nuziale (*Gragnani*).

Puglie: Accidentale; ebbi una femmina giovane dallo Saline nel dicembre 1874 (*De Romita*).

448. *Podiceps cornutus* (J. F. Gmel. ex Briss.)

SVASSO FORESTIERO.

Podiceps auritus, Salvad.¹

Sataròl (*Belluno*) — Magrunetto (*Savona*) — Gango-
redda (*Sardegna*).

Lombardia: Una femmina adulta di questa specie, in perfetto abito nuziale, venne uccisa a Como, sul lago, il 4 aprile 1878: è ora nella Collezione italiana Centrale nel R. Museo Zoologico di Firenze (*Giglioli*). Di rara comparsa in Lombardia (*Turati*).

Veneto: Di casuale passaggio in aprile ed agosto nel Bellunese (*Soravia*).

Emilia: Di accidentale comparsa nella prov. di Parma, i giovani soltanto (*Del Prato*).

Liguria: Di rarissima comparsa invernale nel Nizzardo (*Gal*). Raro nel distretto di Savona: ne ebbi due ad Albisola, uno il 25 dicembre 1875, l'altro il 10 novembre 1880 (*Piccone*).

Toscana: Non comune d'inverno nella prov. di Lucca, ma quasi ogni anno se ne vedono a Massaciuccoli a comin-

¹ Sotto il nome di *Colymbus auritus* il Linneo (*Syst. Nat.* I, p. 222, edit. XII) riuniva almeno tre specie; ecco perchè va scartato il nome specifico da lui proposto.

ciare dall'ottobre (*Gragnani*). L'8 dicembre 1887 uccisi quattro individui di questa specie nel padule di Massaciuccoli (*Papasogli*).

Sardegna: È sempre stato confuso colla specie seguente, ma ritengo sia di rara comparsa nell'isola (*Bonomi*).

449. *Podiceps nigricollis*, C. L. Brehm

SVASSO PICCOLO.

Podiceps nigricollis, Salvad.

Svasso dal collo nero (*Aut. Ital.*) — Suttacquin, Cassasut (*Basso-Piem.*) — Fisolo (*Rovigo*) — Magrun piccin, Magrunetto (*Arenzano*) — Tufin (*Spezia*) — Crocchiotto (*Maremma*) — Sbrisciolo mezzano (*Ancona*) — Occhi lucenti (*Terran. Sicil.*) — Gangoredda (*Sard.*).

Piemonte: Accidentale; il 3 dicembre 1876 ne trovai uno sul mercato di Cuneo, ucciso nello stagno di Beinette (*Abre*). Ne ebbi uno giovane sul mercato di Torino (*Martorelli*). Accidentale affatto nella prov. di Alessandria (*Camusso*).

Lombardia: Sedentario, ma non abbondante nella prov. di Cremona, ove sembra che abbia nidificato (*Ferragni*). Comune e nidificante nella prov. di Mantova (*Paglia*). Generalmente raro in Lombardia (*Turati, Borromeo*).

Veneto: Di scarso passaggio al piano in aprile ed agosto nel Bellunese (*Soravia*). Comune nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Raro in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Di scarso passaggio nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di scarso passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto raro nel distretto di Savona; ne ebbi uno ad Albissola il 2 dicembre 1876 (*Piccone*). Non raro da novembre a marzo in quello di Arenzano (*Luciani*). I giovani sono frequenti d'inverno nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Non comune, ma più assai della specie precedente nella prov. di Lucca; a Massaciuccoli si vede anche

in agosto (*Gragnani*). Scarso nel distretto di Fucecchio, Firenze (*Turchetti*); ne ebbi da quella località in aprile (*Giglioli*). Non comune, di passo ed anche invernale in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune ed invernale nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*).

Marche: Comune (*Paolucci*).

Campania: Frequente nella prov. di Napoli (*Franceschini, Monticelli*).

Puglie: Frequente in autunno. inverno e primavera (*De Romita*).

Sicilia: Raro nella prov. di Messina (*Ruggeri*). Arriva in novembre-dicembre e ripassa in marzo nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carcano*). Di casuale comparsa al piano in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna: Sverna in gran numero sui nostri stagni, e ritengo che qualche coppia vi rimanga a nidificare (*Bonomi*).

450. *Podiceps fluviatilis* (Tunst. ex Briss.

TUFFETTO.

Tachybaptus fluviatilis, Salvad.

Toumboulot, Sottacquain, Cassasut peit (*Basso-Piem.*) — Foùlireùf, Sottacquain (*Ossola*) — Sott'aqui (*Berg.*) — Sottacquain, Piombin (*Milano*) — Ral (*Belluno*) — Pit da acqua (*Feltre*) — Fisolo canariól, Fisoléto (*Padova*) — Babioun (*Nizza*) — Magrunetto, Magrun piccin (*Arenzano*) — Tufin (*Spezia*) — Sbrisciolo nero (ad.), Sbrisciolo bianco (giov.) (*Anconet*) — Morticella, Sommuazzariello (*Nap.*) — Sumbuzzaturi, Sumbuzzaturi picciulu (*Calabr.*) — Margumeddu (*Mess.*) — Tummalosoru (*Modica*) — Pitirri (*Terran. Sicil.*) — Cazzoleddu (*Sard.*).

Piemonte: Frequente o sedentario al piano in prov. di Cuneo; vi nidifica nel maggio allevando una sola covata di 4 a 5 pulcini (*Abre*). Così nella prov. di Torino (*Gasca*,

Pezzi, Martorelli. Non comune al piano nella prov. di Alessandria (*Camusso*). Nell'Ossola nidifica ed è sedentario, ma non comune (*Bazetta*).

Lombardia: Scarso al piano nella prov. di Bergamo (*Stefanini*). Frequente in quella di Milano (*Brambilla*). Stazionario e con quasi certezza nidificante nella prov. di Cremona (*Ferragni*). Comune e nidificante in quella di Mantova (*Paglia*). Così nella Lombardia in generale (*Turati, Borromeo*); il nido è sempre in mezzo alle acque, appoggiato ad un rialzo di terra nel folto dei canneti, oppure galleggiante sull'acqua tra le canne ed i giunchi; è voluminoso, concavo e basso, foggiato con larghe erbe acquatiche malamente intrecciate, talvolta però il materiale è più fine e la costruzione più solida; vi lavorano il maschio e la femmina. Le uova sono biancastre, in numero di 5 o 7, l'incubazione ha luogo in maggio e giugno e vi prendono parte i due genitori (*Turati*).

Veneto: Accidentale nella prov. di Vicenza (*Molari*). Scarso, ma sedentario al piano nel distretto di Feltre, Belluno, ove nidifica in maggio (*Delaito*). Comunissimo e nidificante in maggio nel Friuli (*Tallon*); scarso, ma sedentario nel distretto di Cividale (*Del Torre*). Comune e sedentario nella prov. di Padova (*Arrigoni*). Così in quella di Rovigo (*Dal Fiume*).

Emilia: Sedentario nella prov. di Parma (*Del Prato*).

Liguria: Di passaggio primaverile nel Nizzardo (*Gal*). Piuttosto raro nel distretto di Savona, ebbi un giovane ad Albissola il 26 ottobre 1876 (*Piccone*). Non raro da novembre a marzo nel distretto di Arenzano (*Luciani*). Scarso, ma non raro specialmente lungo la Magra nel distretto di Spezia (*Carazzi*).

Toscana: Comune e sedentario nella prov. di Lucca (*Martorelli, Fontebuoni, Gragnani*). Nel settembre 1878, ne ebbi uno nel distretto di Fauglia, Pisa, ucciso nella gora di un mulino (*Ott*). Scarso in aprile nel distretto di Fucecchio (*Turchetti*); non comune nel distretto di Sesto, Firenze, ma si vede in ogni stagione (*Fontebuoni*). Scarso in autunno

nel Casentino, Arezzo (*Beni, Fiorini, Pauer*). Sedentario e comunissimo di passo in Val di Chiana (*Griffoli*). Comune e sedentario nelle prov. di Siena e di Grosseto (*Dei, Ademollo*). Assai comune, specialmente d'inverno, in Toscana; si ferma anche nelle vasche dei Giardini pubblici, facendo strage dei pesci (*Roster*).

Marche : Comune (*Paolucci*).

Campania : Frequente nella prov. di Napoli (*Franco-schini, Monticelli*).

Puglie : Sedentario e abbondante (*De Romita*).

Calabrie : Sedentario, ma abbondante soltanto nell'inverno, nella prov. di Catanzaro (*De Fiore*). Raro in quella di Reggio (*Moretti*).

Sicilia : Comune e sedentario nella prov. di Messina (*Ruggeri, Pistone*). Così nel distretto di Modica, Siracusa (*Dellafonte, Garofalo*). Comunissimo e sedentario nel distretto di Terranova, Caltanissetta (*Carrara*). Al piano in quello delle Madonie, Palermo (*Palumbo, Morici*).

Sardegna : Di passo invernale copioso e anco comune, sedentario e nidificante (*Bonomi*).

AGGIUNTE.

- p. 9. l. 16, aggiungi: Fabani sac. Carlo. *Morbegno*
(*Sondrio*).
" 12. l. 19, » Damiani Giacomo. *Portoferraio*
(*Elba*).
" 15. l. 19, » Bertuccio Baldassarre. (*Catania*).

ERRATA-CORRIGE.

<i>Pagina</i>	<i>Linea</i>	<i>Errata</i>	<i>Corrige</i>
14	26	Simirlo	Simiele
167	2-3	Gogea pizzoverd (<i>Puglie</i>).	Tzògea (<i>Albanesi italici</i>).

INDICE DEI NOMI SCIENTIFICI.

A

- Accentor atrigularis* 258.
» *collaris* 258.
» *modularis* 255.
» *montanellus* 257.
Accipiter Nisus 417.
Acredula caudata 263.
» *Irbyi* 266.
» *rosea* 264.
Acrocephalus arundinaceus 238.
» *palustris* 236.
» *streperus* 237.
Actocheilidon medius 629.
» *sandvicensis* 628.
Actodromas fuscicollis 589.
» *minuta* 589.
» *Temmincki* 590.
Adelarus Hemprichi 638, nota.
Aedon familiaris 223.
» *galactodes* 223.
Aëdon Luscinia 187.
» *Philomela* 190.
Ægialitis asiatica 570.
» *cantiana* 571.
» *curonica* 572.
» *Geoffroyi* 570.
» *Hiaticula* 574.
Ægiothus Linarius 85.
» *linaria* 85.
» *rufescens* 86.
Ægithalus pendulinus 262.
Æsalon regulus 408.
Aethya ferina 483.
Agelæus phœniceus 51.
Agrobates familiaris 223.
» *galactodes* 223.
Agrodroma campestris 130.
Alauda arborea 122.
» *arvensis* 125.
Alca torda 656.
Alcedo Ispida 350.
Ammomanes cinctura 122.
Ampelis Garrulus 291.
Anas Boscas 467.
Ancylocheilus subarquata 586.
Anser albifrons 463.
» *cinereus* 460.
» *erythropus* 463.
» *segetum* 461.
Anthropoïdes Virgo 557.
Anthus campestris 130.
» *cervinus* 135.
» *obscurus* 141.
» *pratensis* 133.
» *Richardi* 132.
» *Spinoletta* 139.
» *Spipoletta* 139.
» *trivialis* 136.
Aquila bifasciata 390.
» *clanga* 390.
» *Chrysaëtus* 388.
» *maculata* 391.
» *mogilnik* 390.
» *nipalensis* 390.
» *orientalis* 390.
» *pomarina* 391.
Archibuteo lagopus 393.
Ardea cinerea 429.
» *egrettoïdes* 431.

Ardea purpurea 431.
Ardeola ralloides 438.
Ardetta minuta 440.
Arquatella maritima 585.
Asio accipitrinus 369.
 » *Otus* 367.
Astur palumbarius 416.
Athene Noctua 371.

B

Bartramia longicadda 595.
Bernicla brenta 459.
 » *leucopsis* 458.
 » *ruficollis* 459.
Biblis obsoleta 321.
 » *rupestris* 319.
Bonasa betulina 534.
Botaurus stellaris 442.
Branta bernicla 459.
 » *leucopsis* 458.
 » *ruficollis* 459.
Bubo ignavus 375.
 » *maximus* 375.
Bubulcus coromandus 438.
 » *lucidus* 437.
Bucanetes githagineus 89.
Bucephala Clangula 489.
Budytes borealis 145.
 » *campestris* 148.
 » *cinereocapillus* 143.
 » *Feldeggi* 146.
 » *flavus* 141.
 » *melanocephalus* 146.
 » *paradoxus* 147.
 » *xanthophrys* 147.
Butalis Grisola 307.
Buteo ferox 396.
 » *vulgaris* 394.

C

Caccabis petrosa 524.
 » *rufa* 521.
 » *saxatilis* 522.
Calamodus schœnobæus 240.
 » *aquaticus* 241.
Calandrella brachydactyla 120.

Calandrella minor 120.
 » *pispoletta* 120.
Calcarius lapponicus 114.
 » *nivalis* 115.
Calidris Arenaria 592.
Callichen rufinus 482.
Callope camtschatkensis 196.
Calobates melanope 152.
Cannabina flavirostris 84.
 » *Linota* 82.
Caprimulgus ægyptius 330.
 » *asiaticus* 331.
 » *europæus* 327.
 » *lacteam* 331, nota.
 » *ruficollis* 330.
Carduelis elegans 76.
Carine noctua 371.
Carpodacus erythrinus 88.
Casarea rutila 466.
Cerchneis Naumanni 412.
 » *Tinnunculus* 410.
 » *vespertinus* 413.
Certhia brachydactyla 283.
 » *familiaris* 282.
Cettia Cettii 245.
Charadrius fulvus 567.
 » *Pluvialis* 565.
Chaulelasmus streperus 470.
Chelidon cashmiriensis 316.
 » *urbica* 313.
Chettusia gregaria 576.
 » *leucura* 576.
 » *Villotæi* 576.
Chloroptila Citrinella 72.
Chrocephalus melanocephalus 639.
 » *minutus* 638.
 » *ridibundus* 641.
Chrysomitris Spinus 74.
Ciconia alba 446.
 » *nigra* 448.
Cinclus aquaticus 250.
 » *melanogaster* 250.
 » *merula* 250.
Circaëtus gallicus 385.
Circus æruginosus 378.
 » *cineraceus* 382.
 » *cyaneus* 380.
 » *Swainsoni* 331.
Cisticola cursitans 246.
Clangula glaucion 489.

Clivicola riparia 317.
Coccothraustes vulgaris 67.
Coccytes glandarius 348.
Coccyzus americanus 349.
 » *erythrophthalmus* 349.

Coloeus monedula 32.

Columba livia 505.

» *Oenas* 503.
 » *Palumbus* 499.
 » *turricola* 507, nota.

Colymbus arcticus 662.

» *auritus* 667, nota.
 » *glacialis* 661.
 » *septentrionalis* 663.

Coracias Garrula 352.

Corvus Corax 22.

» *Cornix* 27.
 » *Corone* 25.
 » *frugilegus* 29.

Corydalla Richardi 132.

Cotile obsoleta 321.

» *riparia* 317.
 » *rupestris* 319.

Coturnix communis 527.

Crex pratensis 546.

Cuculus canorus 345.

Cursorius gallicus 564.

Cyanecula suecica 195.

» *Wolffii* 193.

Cyanistes caeruleus 273.

» *cyanus* 273, nota.

Cygnus Bewicki 453.

» *musicus* 456.
 » *Olor* 456.

Cymochorea leucorrhoea 655.

Cypselus Apus 322.

» *Melba* 325.
 » *pallidus* 325.

D

Dafila acuta 473.

Dendrocopus leuconotus 335.

» *Lilfordi* 336.
 » *major* 333.
 » *medius* 336.
 » *minor* 337.

Dendrocyena javanica 465.

Dromolæa leucopyga 161.

Dromolæa leucura 161.

Dryocopus martius 332.

E

Egretta alba 433.

» *intermedia* 431.
 » *Garzetta* 435.

Emberiza caesia 106.

» *Cia* 106.
 » *Cirlus* 101.
 » *Citrinella* 99.
 » *Hortulana* 103.
 » *intermedia* 112.
 » *leucocephala* 108.
 » *palustris* 113.
 » *pusilla* 109.
 » *pyrrhuloides* 113.
 » *rustica* 109.
 » *Schoeniclus* 110.

Erismatura leucocephala 494.

Erithacus Rubecula 190.

Erythropus vespertinus 413.

Erythrosterina parva 306.

Eudromias Morinellus 569.

Euspiza aureola 97.

» *melanocephala* 96.

F

Falco islandicus 401, nota.

» *leucogenys* 403.
 » *minor* 405.
 » *Peregrinus* 403.
 » *punicus* 405.

Ficedula atricapilla 305.

» *collaris* 303.

Francolinus vulgaris 515.

Fratercula arctica 658.

Fringilla coelebs 52.

» *Montifringilla* 55.

Fulica atra 532.

» *cristata* 554.

Fuligula cristata 486.

» *marila* 485.
 » *rufina* 482.

Fulix ferina 483.

» *Fuligula* 486.

Fulix Marila 485.
» Nyroca 487.

G

Galerita cristata 127.
Gallinago caelestis 616.
» Gallinula 619.
» major 614.
Gallinula chloropus 548.
» Porzana 550.
Garrulus glandarius 38.
Gecinus canus 341.
» viridis 339.
Gelastes Genei 642.
Gelochelidon anglica 629.
» nilotica 629.
Gennaia Feldeggii 402.
» saker 401.
Glareola Pratincola 625.
Glaucidium passerinum 370.
Grus communis 555.
Gypaëtus barbatus 419.
Gyps fulvus 421.

H

Hæmatopus Ostralegus 580.
Haliaëtus Albicilla 387.
Harelda glacialis 490.
Helodromas ochropus 597.
Herodias alba 433.
» Garzetta 435.
Hieraetus pennatus 392.
Hierofalco Gyrfalco 401.
» islandus 401.
Himantopus candidus 582.
Hirundo rufula 312.
» rustica 309.
» Savignyi 321.
Hoplapterus spinosus 576.
Houbara Macqueeni 561.
» undulata 561.
Hydrochelidon hybrida 634.
» leucoptera 635.
» nigra 636.
Hydrocolæus melanocephalus 639.
» minutus 638.
» ridibundus 641.
Hydrornia Alleni 550.

Hypolais icterina 233.
» olivetorum 235.
» opaca 236.
» pallida 236.
» polyglotta 234.
Hypotriorchis Eleonoræ 405.
» Subbuteo 406.

I

Ianthia cyanura 197.
Iŷnx Torquilla 342.

J

Jomocicca Alleni 550.
Jonornis parva 550.

L

Lagopus albus 535.
» mutus 536.
Lanius auriculatus 300.
» Collurio 298.
» Excubitor 292.
» meridionalis 294.
» minor 295.
Larus Audouini 645.
» cachinnans 646.
» canus 644.
» fuscus 645.
» glaucus 647.
» leucopterus 647, nota.
» marinus 648.
Ligurinus Chloris 70.
Limicola platyrhyneha 585.
Limnocryptes gallinula 619.
Limosa belgica 607.
» lapponica 608.
» melanura 607.
» rufa 608.
Lobipes hyperboreus 584.
Locustella lanceolata 244, nota.
» nævia 243.
Lomvia Brünnichi 660, nota.
» Troile 659.
» Ringvia 661.
Lophophanes cristatus 278.
Loxia bifasciata 95.
» Curvirostra 92.

Loxia Pityopsittacus 92.
Lullula arborea 122.
Luscinia philomela 190.
 » *vera* 187.
Lusciniola melanopogon 242.
Lycos Monedula 32.
Lyrurus Tetrrix 533.

M

Machetes Pugnax 593.
Mareca Penelope 475.
Marmaronetta angustirostris 477.
Megalestris Catarrhactes 648.
Melanocorypha Calandra 116.
 » *yeltoniensis* 118.
Melizophilus sardus 222.
 » *undatus* 221.
Mergellus Albellus 497.
Mergulus Alle 660, nota.
Mergus Merganser 495.
 » *Serrator* 496.
Merops Apiaster 354.
 » *persicus* 357.
Merula alpestris 170.
 » *nigra* 166.
 » *torquata* 170.
Microcarbo pygmaeus 427.
Miliaria Projer 97.
Milvus Ictinus 398.
 » *migrans* 400.
Monachus Atricapillus 215.
 » *hortensis* 217.
Monticola Cyanus 161.
 » *saxatilis* 161.
Montifringilla nivalis 57.
Motacilla alba 149.
 » *lugubris* 151.
 » *sulphurea* 152.
Muscicapa Atricapilla 305.
 » *collaris* 303.
 » *grisola* 307.

N

Nemura cyanura 197.
Neophron Percnopterus 422.
Nettion Crecca 477.
 » *formosa* 479.
Nisaetus fasciatus 392.

Nisaetus pennatus 392.
Nucifraga Caryocatactes 34.
Numenius Arquata 621.
 » *Phaeopus* 624.
 » *tenuirostris* 623.
Nyctala Tengmalmi 366.
Nycticorax griseus 444.
Nyroca africana 487.

O

Oceanites oceanicus 656.
 » *Wilsoni* 656.
(Edemia fusca 491.
 » *nigra* 492.
(Edicnemus scolopax 562.
 » *senegalensis* 564.
Onychoprion fuliginosum 630.
Oreocincla dauma 187.
 » *varia* 186.
Oriolus Galbula 267.
Ortygometra Bailloni 542.
 » *parva* 544.
 » *Porzana* 540.
Otis Tarda 557.
 » *Tetrax* 559.
Otocorys alpestris 119.

P

Pallasia sibirica 119.
Pandion Haliaetus 334.
Panurus biarmicus 267.
Parus ater 270.
 » *borealis* 277.
 » *cæruleus* 273.
 » *lugubris* 277.
 » *major* 268.
 » *palustris* 275.
Passer domesticus 66.
 » *hispaniolensis* 63.
 » *Italiae* 64.
 » *montanus* 61.
 » *salicicola* 63.
Pastor roseus 48.
Pelecanus crispus 423.
 » *Onocrotalus* 424.
Pelidna alpina 537.
 » *maritima* 535.
 » *subarquata* 536.

Pardix chukar 523.
 » *cinerea* 525.
 » *Damascena* 525, nota.
 » *petrosa* 524.
 » *rufa* 521.
 » *saxatilis* 522.
Pernis apivorus 396.
Petronia stulta 58.
Phalacrocorax Carbo 425.
 » *Graculus* 427.
Phalaropus fulicarius 584.
 » *hyperboreus* 584.
Phasianus colchicus 515.
Phoenicopterus roseus 454.
Phylloscopus Bonellii 230.
 » *collybista* 231.
 » *rufus* 231.
 » *sibilator* 226.
 » *superciliosus* 224.
 » *Trochilus* 228.
Pica rustica 36.
Picoïdes tridactylus 339.
Picus leuconotus 335.
 » *Lilfordi* 336.
 » *major* 333.
 » *martius* 332.
 » *medius* 336.
 » *minor* 337.
Pinicola Enucleator 92.
Platalea Leucorodia 450.
Plectrophanes lapponicus 114.
Plectrophenax nivalis 115.
Plegadis Falcinellus 451.
Podager nacunda 331, nota.
Podiceps cornutus 667.
 » *cristatus* 664.
 » *fluvialis* 669.
 » *griseigena* 666.
 » *nigricollis* 668.
Podiceps auritus 667.
 » *cristatus* 664.
 » *griseigena* 666.
 » *nigricollis* 668.
Poecile borealis 227.
 » *lugubris* 277.
 » *palustris* 275.
Porphyrio cæruleus 551.
 » *smaragdonotus* 551.
Porzana Bailloni 542.
 » *fulicula* 540.

Porzana parva 544.
Potamodus fluvialis 242.
 » *luscinioides* 244.
Pratincola Rubetra 204.
 » *Rubicola* 202.
Procellaria pelagica 655.
Pterocles arenarius 512.
 » *Alchata* 511.
Pterocorys sibirica 119.
Puffinus anglorum 652.
 » *Kuhli* 654.
 » *yelkouan* 652.
Pyrophthalma melanocephala 220.
Pyrhocorax alpinus 41.
 » *Graculus* 42.
Pyrrhula europæa 89.
 » *major* 89.

Q

Querquedula Circia 479.
 » *crecca* 477.
 » *formosa* 479.

R

Rallus aquaticus 538.
Recurvirostra Avocetta 581.
Regulus cristatus 258.
 » *ignicapillus* 260.
 » *modestus* 225.
Rissa tridactyla 648.
Ruticilla Phœnicurus 197.
 » *titys* 200.

S

Saxicola albicollis 157.
 » *leucomela* 160.
 » *melanoleuca* 160.
 » *occidentalis* 158.
 » *Oenanthe* 154.
 » *Stapazina* 157, 158.
Scolopax Rusticula 609.
Scops Giu 373.
Serinus Canarius 81.
 » *canaria* 81.
 » *hortulanus* 79.
Sitta caesia 279.
 » *Neumayeri* 281.

Sitta Whiteheadi 281.
Somateria mollissima 492.
 » *spectabilis* 493.
Spatula clypeata 471.
Squatarola helvetica 567.
Sterna Perdix 525.
Stercorarius crepidatus 651.
 » *parasiticus* 651.
 » *pomatorhinus* 650.
Sterna Dougalli 632.
 » *fluviatilis* 630.
 » *hirundo* 630.
 » *macrura* 632.
Sternula minuta 632.
Streptopelia Interpres 579.
Strix flammea 361.
Sturnus unicolor 47.
 » *vulgaris* 43.
Sula Bassana 428.
Surnia ulula 366, nota.
Sylochelidon caspia 627.
Sylvia atricapilla 215.
 » *cinerea* 209.
 » *conspicillata* 214.
 » *Curruca* 211.
 » *melanocephala* 220.
 » *nana* 215.
 » *nisoria* 207.
 » *orphæa* 208.
 » *salicaria* 217.
 » *subalpina* 213.
Syncoicus Lodoisiae 528, nota.
Syrnium Aluco 363.
 » *uralense* 365.
Syrhaptes paradoxus 512.

T

Tachybaptus fluviatilis 669.
Tadorna cornuta 466.
Terekia cinerea 606.
Tetrao tetrix 533.
 » *Urogallus* 532.
Thalasseus cantianus 628.

Thalasseus caspius 627.
 » *medius* 629.
Tichodroma muraria 285.
Tinnunculus alaudarius 410.
 » *tinnunculoides* 412.
Totanus Calidris 602.
 » *fuscus* 604.
 » *Glareola* 599.
 » *glottis* 605.
 » *nebularius* 605.
 » *Ochropus* 597.
 » *stagnatilis* 601.
Tringa Canutus 591.
Tringoides Hypoleucus 595.
Troglodytes parvulus 247.
Turdus atrigularis 173.
 » *fuscatus* 174.
 » *iliacus* 178.
 » *musicus* 180.
 » *nanus* 183.
 » *obscurus* 174.
 » *Pallasi* 183.
 » *pilaris* 175.
 » *ruficollis* 173.
 » *Swainsoni* 183.
 » *viscivorus* 184.
Turnix sylvatica 537.
Turtur communis 503.
 » *douraca* 503, nota.
 » *tenera* 503.
 » *risorius* 503, nota.

U

Upupa Epops 357.
Urogallus vulgaris 522.
Utamania Torda 656.

V

Vanellus Capella 576.
Vultur monachus 420.

INDICE DEI NOMI VOLGARI.

A

Abatti-cuda giallina 152.
 » nigra 149.
 Abiargiu 355.
 Acchiappamuschi 305.
 Acciduzzu d'acqua 572.
 Aceddazzu 394.
 » jancu 380, 381.
 Aceddu giallu 288.
 Acedduzzu cu a testa janca 378.
 Achili de pisci 392.
 » piscadrixi 381.
 Achilioni 392.
 Aciddazzu biancu 446.
 Acidduzzu di fava 214.
 Aciedd salvaggio 581.
 Acquaiolo 351.
 Acquaroletto 572.
 Acquarolo 599, 605.
 Acule 388.
 Acula 391.
 » bianca 381.
 » d'la couva bianca 387.
 » roussa 387.
 Aculetta 392.
 Addinazza 552.
 Adduzzu d'acqua pedi viridi 540.
 Adorno 396.
 Adornu 396.
 Aggrappa filu 288.
 Agia 388.
 Agroi 555.
 Agugia 385.
 » foesteia 392.
 Agugiotto 396.
 Aigla 419.
 » de mar 387.
 Aigloun 385, 398, 400.
 Aipa pedi niuri 614.
 » pizzu tuortu 614.
 Airon biancu 433.
 » zenerin 429.
 Airon 429, 432.
 » biancu 435.
 » foresto 414.
 Airon 429, 414.

Airòn ross 431.
 Airone 429.
 » d' Italia 434.
 » maggiore 431.
 » rosso 431.
 Airoun 433.
 » giaun peit 438.
 Airuni 429.
 Aiula 288.
 Ajroùn 444.
 Aju l'aguggia cu lu filu 288.
 Ala longa a pedi russi 631, 635.
 » » di li picculi 632.
 » » nira 636.
 Albanella 380.
 » chiara 381.
 » minore 382.
 Albaro 470.
 Albastrello 601.
 Albéina 536.
 Albégua 536.
 Albeneddu de passa 380.
 Ale de fógo 285.
 Alèt 303.
 » neigher 305.
 Alett del col bianc 303.
 Alètù 307.
 Aliuzza 303, 305.
 Allodola 125.
 Allodolina 122.
 Allocco 363, 367, 369.
 » dell' Urale 365.
 Alócc 363.
 Aloco coi corni 367.
 » grande 375.
 Alóco de palù 363.
 Alóco salvadégo 363.
 Alócón 369.
 Alòdola 125.
 Alpigino 178.
 Alzagola 477.
 Alzavola 477.
 » asiatica 479.
 Ambra dila fioeca 115.
 Amer 99.
 Ammazza-cani 565.
 Amuraru 241.
 Anára turca 482.
 Anari a ulieras 489.
 » caparuccia 491.

Anari conc l'arrubia 475.
 » de Spagna 491.
 Anariera 466.
 Anatra arborea 465.
 » di mare 491.
 » furmintina 467.
 Anatrin 475.
 Anatrin 473.
 Anatrin 477, 479.
 Anera grossa 467.
 » medàna 475.
 Anerón 471.
 Anerón dal bèch sotil 495.
 Anétra 467.
 Anga salvadga 467, 475, 483, 487.
 » salvaga 470.
 Ania 475, 470.
 » cualonga 473.
 » matta 475.
 » neigra 486.
 » ncigra 483.
 » sarvaega 470, 475, 489.
 » sarvaiga 467.
 » sarvaja dila couva longa 473.
 Anima de sbiro 632, 631, 635, 636.
 Anitra 467.
 » bianca cu l'ali niuri 489.
 » cuduta 473.
 » friscalora 475.
 » maltisa 463, 489.
 » sirretta 496.
 » tuppata 482.
 Anitrella 477.
 Annia 475, 483, 486.
 » de due cile 473.
 » du collo russo 483.
 An-nia pescadura 495, 497.
 » pescareul 495.
 » pescareula 497.
 » salvaja 467, 470, 473, 475, 483, 487, 489.
 Antiola 122.
 Antón 70.
 Apaluoru 355.
 Aparuolo 351.
 Appappa-nuschi 307.
 Appegghia 378, 381, 382.

Appegghia janca 380.
 Aquila 387, 388.
 » anatraia 390.
 » » minore 391.
 » del Bonelli 392.
 » della steppa 390.
 » di mare 387.
 » maciada 390.
 » minore 392.
 » mora 388.
 » real 388.
 » reale 388.
 Aquiloto 381, 385, 387.
 Aquilott 398.
 Aquilotta 392.
 Aquilotto 422.
 Arancino 258, 260.
 Arbaneddu 403, 413.
 » di passa 406.
 Arcada 621.
 Arcaja 621.
 Arcasa americana 451.
 Arcasa 624.
 » verde 451.
 Arcazeta 623.
 Arcazuil 623.
 Arcera 609.
 Arceretzyn 616.
 Arcighiola 616.
 Arcignola 597, 625.
 Arcirotta imperiale 608.
 Arcistrello 412, 413.
 Arcón 325.
 Ardea 429, 431.
 » peita 440.
 Arena salvedega 467.
 Arendoula 513.
 Aretta biunna 438.
 Argàib 288.
 Argaión 181.
 Argaza 39.
 Argáza 36.
 Arghébul 288.
 Ariattin 248.
 Ariòne cenerina 429.
 » janca 434.
 Ariotto 436.
 Ariuncellu 436.
 Ariuni biancu 434.
 » cinnirinu 429.
 Arluròt 565.
 Arlurotin 569.
 Armentaresse 152.
 Armentarutt 202.
 Aroi jancu 434.
 Arpegghia 378, 381, 382.
 » janca 380.
 Arpezin 178.
 Arpia 419.
 Arpone 398.
 Arrundili de a' roca 319.
 Arsega 607.
 Arsgneu 187.
 Arzadega 479.
 Assiolo 373.
 Asta 205.
 Astór 385.
 Astore 378, 391, 416.
 Astorcla 408, 416.
 Asturi 416.
 Auberi 288.
 Auca fera 460, 461.
 Auco 363, 367, 369.
 Aucedduzzu di notti 375.

Aucedduzzu di paradisu 350.
 Aucidduzzu di macchia 214.
 » musca 218.
 Aurieu 288.
 Auzhel dalle pite 380.
 Avariul 421.
 Averla bigia 295.
 » capirossa 300.
 » cenerina 295.
 » gazzarina 295.
 » gazzina 295.
 » grossa 295.
 » forestiera 291.
 » maggiore 292.
 » meridionale 294.
 » piccola 298.
 Averlia bianca 295.
 » gazzarina 292.
 » rossa 298.
 Avión 394.
 Avocetta 581.
 Avoltojo 421.
 Avvoltoio 420.
 Avvoltoio degli agnelli 419.

B

Babbusso 133.
 Babioun 669.
 Baccalotto 385, 422.
 Balaina gianca 149.
 » zala 152.
 Balarin 413.
 Balarina 141, 149.
 Balarin-na 149.
 Balarotta 149.
 Bálén-na 149.
 Baléun-a giàna 141.
 Bálénn-a giàna 143, 152.
 Balerina 152.
 Balestruccio 313, 317.
 » del Cashmir 316.
 » bigio 317.
 Ballerina 146, 149.
 » gialla 141.
 » nera 151.
 Balia 303.
 » nera 305.
 Balico 361.
 Barazzuolo 477.
 Barbacerio 52.
 Barba Giuán 369.
 Barbairon 322.
 Barbagianni 361.
 Barbajanni 361.
 Barbazagn 361.
 Barbell de corna 285.
 Barbezuan grand 375.
 Bardante 652.
 Baréeh 546.
 Barletta 413.
 Barluato 122.
 Bartinon 208.
 Bartinón 217.
 Barvajanni 361.
 Basettino 267.
 Batiàle foresto 205.
 Bati-ale negrisol 305.
 Battiale 303.
 Batticla zala 152.
 Batticoda 141, 149.
 » bigia 149.

Batticoda di fosso 152.
 » di tetto 149.
 » gialla 152.
 Batticodola gialla 152.
 » nera 149.
 Bavarin-na 149.
 Bavarin-na gialla 141, 143.
 Bavarinna gialla 152.
 Bazanà 307.
 Bec in eros 92.
 » -stort 92.
 Becacopi 61.
 Beca foormighe 342.
 Becafic 217.
 Becafich 211.
 » bastard 209.
 Becafico 207, 217, 218, 228.
 » foresto 305.
 Becamure 211.
 Becamuri 285.
 Becanèlle 619.
 Becanóto 614.
 Becanótt 616.
 Becassa de mae 580.
 Becassin 597, 599.
 » gambe lounghes 601.
 » voulét 619.
 Becassot 593.
 Bec in crós 93.
 » » crús 92.
 Beccaccia 609.
 » de mari 580.
 » di mare 580.
 Beccaciu jammi longhi 601.
 Beccaccina 614, 616, 619.
 » differenti 588.
 » peis grogus 593.
 Beccacinazza 614.
 Beccacineddu 619.
 Beccacineja muti 619.
 Beccacino 248, 616.
 » mezzano 619.
 » reale 616.
 Beccacinu 616, 619.
 » differenti 599.
 » di sciumara 599.
 » picciriddu 619.
 » riali 614.
 Beccaaciola 616.
 Beccafichino 209, 213.
 Beccaficcone 208, 218.
 Beccafico 208, 209, 215, 217, 233, 234.
 » caunajolo 233, 234.
 » giallino 231.
 » giallo 233, 234.
 » passerino 210.
 Beccafico piccolo 213.
 » reale 218.
 » selvatico 233, 234.
 Beccaficu 212.
 » di cerza 231.
 » di margiu 241.
 » imperiali 162.
 Beccafic de risera 241.
 » zenerin 211, 208.
 Beccafich 208, 217.
 Beccafico 207, 209, 233.
 » de palù 238.
 » zelega 211.
 Beccafigon 208.
 Beccaficformig 342.
 Beccalegn 337.
 » curgiós 279.

Beccalegn medán 279.

- » negro 332.
- » piccolo 283.
- » pizhol 279.
- » rosso 333.

Beccalegn 282, 333, 336.
337, 339, 341.

Beccalegnét 282, 283.

Beccalegno 339.

- » verde 339.

Beccalegnón 332.

Beccalén 282.

Becc 'a lesina 581.

Beccamarina 623, 624.

Beccamoro 231.

Becca mosche 216, 305, 307.

Beccamoschino 216.

Beccamuschin 216.

Beccamur 285.

Beccamuschi 231.

Beccapesce 634.

Beccapesci 350, 628, 630.

- » forestiero 629.
- » inglese 629.
- » maggiore 627.
- » oscuro 630.

Beccaragni 283.

Beccarossa 538.

Beccassa d'acqua 607, 608.

- » d' ma 580, 607, 608.

Beccassin 616, 619.

- » marsenet 614.
- » real 616.
- » reale 616.
- » roux 607, 608.
- » sourd 619.

Beccassonnet gris peit 621.

Beccasson gross 621.

Beccazhóch 337, 339, 341.

Beccazhóch 336.

Beccazóch 333.

Beech in crout 92.

- » stort 92.

Beccociatto 471.

Becco-de-ferro 331.

Beccofrusone 291.

Becco-'ingrociato 93.

Becco-n'-croce 93.

- » storto 92.

Beccotorto 92.

Beccu grossu 67.

- » in cruci 93.

Beccu russu 625.

- » tortu 581.

Becogrosso 67.

Béco storto 93.

Becotto 89.

Beduina 268.

Beghé 279.

Belluato 122.

Bentruixu de anziom 419.

Berbexin de cua lunga 264.

Berluato 122.

Berluato 120.

Berna 536.

Bert 38.

Berta 651.

- » maggiore 651.
- » minore 652.

Bertaceo 651.

- » picin 652.

Bet 190.

Betarél 190.

Betúzh 190.

Bevi-ojo 58.

Bianchet da bosch 209.

Biancheta 209, 536.

Biancheton 207.

Bianchett 208.

Bianchin 57.

Biancone 385.

Bibbio 611.

Bicca-mortus 288.

Biccaligu 210, 212.

Bigia 220.

- » grossa 208.

- » padovana 207.

Bigiarella 211.

Bigino 317.

Bigio ferro 588.

Bigioncella 577.

Bigione 208.

- » piccola 212.

Bisbai 209.

Biseghin 586.

Bisighin 587.

Bittordu 412.

Bittornai 412.

Bluet 350.

Boain 226, 228, 231.

Boain 210.

Boare 621.

- » piccin 624.

Boari 141.

Boarina 141, 144, 145, 152.

- » zala 152.

Boarinato 145.

Boarola 145.

- » zhala 141.

Boaróla 149.

Böba 357.

Bobó 357.

Bocassa 327.

Bocassa 327.

Bochäsa 327.

Boen 226.

- » gianco 230.

Boén 226, 228.

Boenettin 258, 260.

Boenetto 230, 231.

Bo-gros 247.

Boin 228, 231.

- » de primaveja 226.

- » gianco 230.

Boneiard 209.

Bondassiera 209.

Bourv 375.

Bousearla 211.

- » testa roussa 215.

Bousearlassa 208.

Boin 577.

Bozzoletto 477.

Brancialoru 283.

Braviere 97.

Brescandalo 279.

Brubola 358.

Brunei 82.

Brusola 287.

Brüsola 287.

Buarcina 144.

Buarina 149.

Buarin-na 111, 149, 152.

Buarin-na 143.

Buarinn-a giana 143.

- » giána 141, 152.

Bubbola 357.

Büblon 375.

Bubo 375.

Bubu 357.

Bucazza 327.

Bufarla grossa 292.

Bufarla 298.

Bufarla grossa 295.

- » mezzana 390.

- » piccola 298.

Bufarlot 295.

Bufo 367.

Bufo 315.

Bulgaria 571, 572, 574, 586,

587, 591, 597, 599,

601, 603.

- » de gambe russe 602.

- » de sciunne 593.

Bulgarin 595.

Bumbola 357.

Burgainetto 589, 590.

Burgainotto 624.

Burubà 367.

Busaseze 247.

Buscarin 209, 211, 217, 228,

230, 231.

- » verd 226, 234.

Buscarin 207, 213.

Buschin 255.

Busion 471.

Busta d' fer 576.

Büsun 394.

Batura 420.

Baulin 571.

Bavaréna 144.

Bavarin-na 149.

- » giálta 152.

Bavreal 59.

C

Cà de sère 412.

Caca-sipala 213.

- » » cul'occh russi 220.

- » » nira 222.

- » » » » 221.

Cacapalu 211.

Cacaviola 121.

Cacciavento furasteri 408.

- » maltisi 412.

Caenano 580.

Cagiana 577.

Cagliera 528.

Cagliozzella 621.

Cagnass 416.

Cagnasse 416.

Cagne 385, 394, 416.

Caiazza 36.

Caiforno lombardo grosso

292.

Caiforno 298, 300.

- » lombardo 295.

Caitedda peis arrubius 635.

- » peis nieddus 636.

Caitedda 634.

Cajorno terragno 292.

Cajorno lombardo 292.

- » lombardo 295.

- » terragno 295.

Calandar 175.

Calandra 116, 122, 127, 175,

238.

- » col capéus 127.

- » nera 118.

- » nostrana 122.

- » siberiana 119.

Calandrella 122, 125, 128, 133.
 Calandria 116, 132.
 » manna 117.
 Calandriedda 121, 122, 125.
 » a bieu finu 132.
 Calandrin 120.
 Calandrina 120.
 Calandrino 120.
 » del Pallas 120.
 Calandro 116, 130.
 » forestiero 132.
 Calandron 125.
 Calandrón 130.
 Calandrón de Malaga 116.
 » de Sipro 116.
 » de Spagna 116.
 Calandrini svariù 119.
 Calannaruni 117.
 Calannira 117, 128.
 Calanniredda 121.
 Calcabodda 328.
 Calcapaglione 240, 241, 242.
 Calenzòlo 70.
 Calenzuolo 70.
 Calidra 592.
 Calliope 196.
 Caltaren 317.
 Canapiglia 470.
 Canapino opaco 236.
 Canarin d' montagna 72.
 Canarièddu de' monti 72.
 Canario 81.
 Canariù 72.
 Canaról 238.
 Canaróla 237.
 Canavirola 211.
 Caneboun 241, 246.
 Canebuon 240.
 Canapino 234.
 » chiaro ellenico 236.
 » chiaro iberico 236.
 » levantino 235.
 » maggiore 233.
 Canepino 234, 235.
 » maggiore 233.
 » pallido 236.
 Caneroncione 238.
 Caneto 226, 228, 230, 246.
 Canéto 209, 211, 237, 240, 307.
 Canéto 246.
 Canevarolón 238.
 Canevaról 234.
 Canevarola 233, 234, 237.
 Canevela rossa 211.
 Canivarola 211.
 Canivello 406.
 Cannaiola 237.
 » verdognola 236.
 Cannajola 238.
 » grossa 233.
 Cannajolino 237.
 Cannareccione 238.
 Canniciàra 205.
 Cantabari 97.
 Cantarèll 178.
 Canvaréu 234.
 Canvaról 231.
 Caodóro 258, 260.
 Caonero foresto 208.
 Capanera 215.
 Cap-neigro 215.
 Capannerella 624.

Capastr 416.
 Capellun -a 127.
 Capibigia 215.
 Capidoro 258, 260.
 Capigiallo 258, 260.
 Capignora 268.
 Capigrosso 298.
 Capilua 127.
 Capinegra 268.
 Capinèir 215.
 Capinera 215, 268, 220.
 » piccola 273.
 Capinero 215.
 » piccola 273.
 Capinero 215.
 Capirossa 300.
 Capitontova 342.
 Capitorsolo 342.
 Capitorza 342.
 Capliña 122.
 Capnègher 270.
 Capueir d' montagna 208.
 » gross 208.
 Capocchino 569.
 Capociecìola 210.
 Capon de padù 442.
 Capone schiavonisco 482.
 Capòne servaggio 442.
 Capone servateco 442.
 Caponera 215.
 Caponigher 215.
 Capotorto 58.
 Capovacciao 422.
 Capoverde 467.
 Capuvirdi 467.
 Cappellaccia 127.
 Cappellaccio 127.
 Capponaccio 394.
 Cappuccina 402.
 Cappurussu 481.
 Capriolo 313.
 Capurussu 481.
 Capussina 127.
 Capuzzieddu 128.
 Caracefalo 295, 301.
 Caragiau 39.
 Carannula 116.
 Carannulu 116.
 Carannuluni 117.
 Carcabábi 327.
 Carcabágg 327.
 Carcabaggio 327.
 Carcabaggiu 327.
 Carcaciatri 327.
 Carcarazza 36.
 » di mari 352.
 Carcarazzedda 307.
 Carcarazzeddu 301.
 Carcastico 221, 266.
 Carcatepe 154.
 Cardain 76.
 Cardainhã 76.
 Cardanin 76.
 Cardarugìolo 79.
 Cardellino 76.
 Cardello 76.
 Cardénn-a 76.
 Cardijuzzu 76.
 Cardillina groga 74.
 Cardillinu 76.
 Cardillo selvaggio 79.
 Cardilla 76.
 Cardinale 92.
 Cardinali 85.

Cardinaliello 258.
 Cardouniera 76.
 Carenzolo 70.
 Carenzuolo 70.
 Carici 475.
 Carnagiadu 39.
 Carnagiau 352.
 Caròsol 161.
 Carpinteri 334.
 Carrabaru 473.
 Carrubbeddu 246.
 Carrabedda 246.
 Carrabidduzzu 246.
 Carragiau 352.
 Carragiau 352.
 Carraru 352.
 Carroga 27.
 Carroggheda de' monti 41.
 Carrugheda gajulada 34.
 Carzin 76.
 Casarea 466.
 Cassalason 202.
 Cassasut 664, 668.
 » peit 669.
 Cassola 144.
 Cassù 471.
 Castagnetta 248.
 Castagnolo 242.
 Castrapalomba 295.
 Castrica 309.
 » asinina 298.
 » palombina 295.
 Castroecchia 295, 298.
 Catòr 522.
 Catiss 367.
 Cau 639.
 » arrosa 642.
 » brasciu 645.
 » de mari 645.
 » mannu 644.
 Cavaleri 582.
 Cavalier d' Italia 582.
 Cavalonghia 270.
 Cavazina 309.
 Cazzola 36.
 Cazzoleddu 669.
 Cazzulot 471.
 Ceca 616.
 Ceca 220.
 Cecciarin 86.
 Cech 85.
 » grande 86.
 Cecerina 210.
 Ceciora 220.
 Cedroun 503.
 Cegessa 175.
 Celestin 273.
 Cent-rub 258, 260.
 Centossi 621.
 Centrubb 247.
 Cepollaro 130.
 » grusso 132.
 Cerec 85.
 Cerecna 477.
 Cereer 247.
 Cesena 175.
 » fosca 174.
 Cevétola 37.
 Chacarùto 211.
 Checa 36.
 Chèca 36.
 Checca 36.
 Chècca 36.
 Chéca 36.
 Chéch 55.

Chepnegar 215.
 Chepnègher 215.
 Chèrso foresto 491.
 Chervela 410.
 Chervèla 411.
 Chettusia codabianca 576.
 Cheurv 23.
 Chianu 133.
 Chiappamosche 307.
 Chiappapesci 350.
 Chiaracurdaca 184.
 Chilandra 122.
 China 178.
 Chinsoun de li neo 57.
 Chiò 373.
 Chio-chio 602.
 Chiochiò 82.
 Chioco 605.
 Chiosso 482.
 Chirisi 190.
 Chirluchio 373.
 Chiu 373.
 Chiù 373.
 Chiuina 228.
 Chiuino 231.
 » bianco 230.
 » giallo 228.
 » verde 226.
 Chiumbino 413.
 Chiummino 413.
 Chiuppu 373.
 Chiurlo 373, 621, 623.
 » -in-Chiò 373.
 Chiurletto 624.
 Chiurletto 623.
 Chiuvettone 605.
 Choss 475.
 Cia 101.
 Cia-cià 245.
 Cià-Cià 279.
 Ciac-ciac 175.
 Ciach-ciach 170.
 Ciacia 220, 221.
 Ciaciarello 61.
 Ciane 354.
 Cianfruscola 548.
 Ciacula 30.
 Ciapamusch 303.
 Ciappa mosche 307.
 Ciapusso 200.
 Ciardoulina 76.
 Ciaret 268.
 Ciaretta 207, 209, 234.
 Ciaretta 207, 209, 214, 234.
 Ciaretta 226.
 Ciaretta 213.
 Ciaretta 623.
 Ciaretta 621.
 Ciataron 97.
 Ciato de palù 111.
 Ciattaron 97.
 Ciattarin 97, 125.
 Ciauin 233.
 Ciaula 50.
 » di campanaru 32.
 » malisa 27.
 » piamuntisa 30.
 Ciaula matisa 27.
 Ciavola 27.
 Ciavula 32.
 » cu pizzu russu 41.
 Ciavula 32.
 Ciavula 30.
 Ciben 275.

Cicarella 268, 273.
 Cicciarina 207.
 Cicchitedda 220.
 Ciccibeu 208.
 Cicerina 210.
 Cicheich 307.
 Ciciarune 128.
 Cicogna 429, 446, 451.
 » chiumbina 429.
 » janca 434.
 » 'imperiali 434.
 » nera 418.
 » mira 448.
 Cicogna negra 418.
 Cicogne 446.
 Cicognedda 440.
 » ianca 436, 438.
 Cicognella janca 436.
 Cicula 39.
 Cièuvi 602.
 Cifolot 89.
 Cifulon 89.
 Cifulotto 89.
 Cign 456.
 Cigne sauvage 456.
 Cigno 456.
 » minore 456.
 » selvatico 458.
 Cignu 456.
 Cilicchia greca 271.
 Cin 456.
 Cincia 268.
 » alpina 277.
 » bigia 275.
 » boreale 277.
 » col ciuffo 278.
 » dalmatina 277.
 » mora 270.
 » nera 271.
 » turchina 273.
 » verd 226.
 Cinciallegra 268.
 Cinciara 268.
 Cinciarella 273.
 Cinciaretta 268.
 Cinciguatto 410.
 Cincin 217.
 » de noie 217.
 Cincina 271, 273, 275.
 Cincinina 273.
 Cincino 273.
 Cinciribin 268, 270.
 » senarin 275.
 Cinciun 52.
 Cing salvadega 456.
 Cingallina 268.
 » piccola 273.
 » reale 268.
 Cini 82.
 Ciò 367, 371, 373.
 Ciò-Ciò 279.
 Ciocheta 236.
 Ciochetta 614.
 Ciodo 373.
 Cioja dal bech rous 42.
 » del bech giaun 41.
 Ciola 32.
 Cione 351.
 Cioni 52.
 Ciorlicon 562.
 Ciorlini 312.
 Ciprioto 313.
 Cipràn 70.
 Cirbiò 406.

Circiu 562.
 Circuredda a conca bianca 480.
 Cirincià 268.
 Cirrivi 572.
 Cirrivià 621.
 Cirru 639.
 Cirulli 621.
 Cirzotta 477.
 Ciseu 309.
 Cisile 309.
 Cisile di mar 632, 636.
 Cisilina 313.
 Cisini 460, 461.
 Cissa 39.
 Ciù 110.
 Ciu-ciàu 230.
 Ciu-ciàu 226.
 Ciucch 373.
 Ciucella 503.
 Cincin 233.
 » bianch 230.
 » giaun 228.
 Ciuffa 127.
 Ciuffetta 127.
 Ciuffina 665.
 Ciuffolotto 89.
 Ciui 226, 228.
 Ciui 228.
 Ciui-cin 52.
 Ciucin peit 231.
 Ciuga 577.
 Ciucina 270.
 Ciuit 226, 231.
 » giaun 226.
 » verdogn 226.
 Ciuite 361.
 Ciullin 621.
 Ciumbin 634, 638.
 Ciumbin 630, 635, 636, 639, 641, 643.
 Ciurl 621, 623.
 Ciurlèna 116.
 Ciurli 621, 623.
 Ciurlino 574.
 Ciurlo a picche 623.
 Ciurlodi 130.
 Ciurlottino 621.
 Ciurlavin 621.
 Cius 373.
 Ciusso 367.
 Ciqu 373.
 Ciucci 270.
 Ciuen 597.
 Civetta 371.
 » capo-grosso 366.
 » minore 370.
 Clàme ploè 562.
 Clumb favarz 499.
 Clumbarz 499.
 Cò-ross 475.
 Coabianca 155.
 Coacassola 144, 145.
 » bella 141.
 » brutta 149.
 » de montagna 152.
 » negra 149.
 » zhala 141.
 Coalóna 119.
 Coarella 122.
 Coaros 197.
 Coarossa della regina 193.
 » de monte 162.
 » foresta 193.

- Coarossa mora 200.
Coarossa de Svezia 193.
Coarosso foresto 193.
Coarossion 162.
Coaroussa 197.
Coatimon 263, 264.
Coatörn 522.
Cocál 639, 641.
» moro 651.
Cocalina bianca 630.
» picola 632.
» scura 636.
Cocaléta 632.
Cocaline 641.
Cocamaggese 625.
Cocameto 625.
Cocch 345.
Cocchiume 589.
Coccii di campa 350.
Cóccla 248.
Cöch 345.
Coda-bianco 155.
Coda janca 149.
Coda-janco 155.
Coda luònga 473.
Coda-russo grüosso 162.
Codabianca 155.
Codarós 197.
» dal petto turchino 193.
» de montagna 200.
» negro 200.
Codaross salvarego 162.
» spazzacamín 200.
Codarossion 161.
» de montagna 162.
Codarossón 162.
Codarussa 162.
Codarussióllo 197, 200.
Codarüsso bastardo 162.
Codascassola 141.
Codatremola bianca 149.
Codazhil 264.
Codazhin 264.
Codazinzera 141.
Codazinzola 149.
Codazzinzola 141, 144, 152.
Codazzola 264, 266.
Codazzurro 197.
Coddu-virdi 467.
Codetta 155, 221.
Codibianco 155, 157.
» pietrino 158, 160.
Codibugno 266.
Codibugnolo 266.
» grigio 266.
» roseo 264.
Codino 155.
Codirossa 197.
Codirossino 197.
Codirosso 197, 200.
» grosso 162.
» reale 162.
» spazzacamino 200.
Codirossola 197.
» di monte 200.
Codirossolo 197.
Codirossone 161, 162.
Coditremola 149.
» gialla 152.
Codoletto 266.
Codolo 266.
Codona 264.
Codona capo bianco 263.
Codoncino 262.
Codone 473.
Codonet 264.
Codorosso 197.
Codur 565.
Coéta 261.
» a testa bianca 263.
Coetón 371.
» de vále 369.
Coetta 144.
Coilongo 180.
Collero 180.
Coipazza 627.
Coipедda janca 632.
» nira 636.
Col ròss 487.
» rouss 475.
Cola 36.
Colásso 499.
Collaeto 122.
Collarone 499.
Collo-verde 471.
Collorosso 483.
Colloverde 467.
Colo-storto 342.
Colomb salvadi 503.
Colombaccio 499.
Colombazzo 503.
Colombella 175, 503.
Colombo 503.
» favaccio 499.
» salvadego 505.
» salvarégo 499.
» sassaiolo 505.
Columb de is arrocas 506.
Cómbea 522.
Conca d'oro 258, 260.
» niedda 215.
Conghlic 86.
Conghilit 85.
Congolit 85.
Contorecol 342.
Coombo 499, 503.
» d'acqua 630, 632.
Coon 473.
Coppulari 358.
Cor marin 621.
Corbo janco 27.
» reale 23.
Córbo 25.
Córdaru 328.
Çòre 25.
Corf del mantel 27.
Coridor 565.
Coridór 569.
Corridór cláme ploè 565.
Coridoréto 571, 572.
Coridorón 574.
Çorin 41.
Çorlich 572.
Corlicoréto 574.
Cornac 23.
Cornacchia 27.
» bigia 27.
» celeste 352.
» nera 25, 30.
Cornácia 27.
Cornacia de Tore 32.
Cornágg 23.
Cornágg 25, 27.
Cornaggia 27.
Cornaglia grisa 27.
» negra 29.
Cornaja 27.
» molinara 27.
Cornass bastone 27.
Cornazh 25.
Cornazha 25.
Cornila 27.
Cornile 27.
Corniolo 25.
Corriere 571, 574.
» asiatico 570.
» biondo 564.
» del Geoffroy 570.
» grosso 574.
» piccolo 572.
Corrierino 572.
Corsin 178.
Córso 175.
Corv 29.
» gross 23.
» neighbor 29.
Corvatt 29.
Corvestrun 25.
Corvett 32.
Corviellu 451.
Corvo 23, 29.
» biso 27.
» da bosch 27.
» da eroda 23.
» di notte 444.
» maggiore 23.
» marino 23, 34, 425.
» reale 25.
» rosa 41.
Córvo 25.
Corvón de montagna 23.
Corvu 25.
» cu i pedi russi 41.
» di passa 30.
» jauca 27.
» imperiali 23.
Corzh 23, 29.
Cosmeu 538.
Cotibugnolo 266.
Cotór 522.
Cotórnesa 522.
Cotornis 521.
Cotorno 521.
Coturnice 522.
Còu 562.
Còu rouss 475.
Còua-neira 175.
Coucal 635.
Couett 266.
Coulumb favè 499.
Coupada 127.
Courentin a pe rougie 602.
» queu blanc 597.
Courenton 602.
Courmorán 425.
Cournaja 32.
Cournajas real 23.
Couv 23.
Couvroussa 147, 200.
Cozzicaventulu 406.
Crástica 295.
Crástola 295.
Cravareul 361.
Cravea 361.
Craula 30.
Crè-Crè 479.
Crebe 665.
Creccola 479.
Crecola mora 486.
Crecoléta 479.
Crecoléta 477.

Crevèla 410, 412.
 Crifòne 421.
 Cristareddu 410.
 Crivèla 410, 412.
 Crivèla 406.
 » russa 410, 412.
 Crivedda 410.
 Cro 23, 29.
 Croas bianch 27.
 Croass 23.
 Croat 23.
 Crobu nieddu 25.
 Crocal 639.
 Crocàl a la testa nera 639.
 Crocale 641, 644.
 Crocalèta neigra 636.
 Crocalina 636.
 » negra 636.
 » nera 635.
 Crocalina 632, 631, 636, 638.
 Crocchiotto 668.
 Croccolone 614.
 Crocculuni 614.
 Crochète 614.
 Crociere 92.
 » fasciato 95.
 » maggiore 92.
 Croff 29.
 » gros 23.
 » negher 25.
 Cromb salvà 503.
 » sarvaig 503, 505.
 Crombera 522.
 Crombo salvà 505.
 » sarvaigo 499, 503, 505.
 Crosnobl 93.
 Crosnobel 93.
 » grando 92.
 » piccolo 92.
 Crotar 429, 431.
 Crouas 23.
 » negro 25.
 Crov 27.
 Cròv 25.
 » peit 30.
 Crovàs 25.
 Crovasc 23.
 Crovatt 29.
 Crovin 32.
 Crovo 23.
 » imperiale 23.
 » senecinn 27.
 Crovu 25.
 Cròvu 25.
 Cruase 29.
 Cruccione 351.
 Cruculeus 63.
 Crusulèo 288.
 Cruvacchiu 23, 30.
 Cu-ch 341.
 Cua de Roundaninna 473.
 » lunga 152.
 » russa 197.
 Cuarossa 197, 200.
 » cita 197.
 » da Madonna 193, 195.
 » de palide 193.
 Cuarossétta 197, 200.
 Cuarosson 162.
 Cuarussetta 197.
 Cubiane 154, 313.
 » d'riva 317, 319.
 » d'roca 319.
 Cubiane 154.

Cubianco 154.
 » de montagna 157.
 Cubianchin 313.
 Cuca 371.
 Cucale 614.
 Cucalina 630, 635 639, 641.
 Cucc 345.
 Cucca di main 345.
 Cuccazzu 367.
 Cucchiarune 472.
 Cuccia 128.
 Cucciaccannella 149.
 Cucciamanuella 149.
 Cucciarda 125.
 » monnezzàra 128.
 Cucco 345.
 Cuccovaio 345.
 Cuccu 345, 371.
 Cuccu di passa 363, 369.
 Cuccu 345.
 Cuccu 345.
 Cuccubè 345.
 Cuccuciuta 128.
 Cuccuni 375.
 » di passa 379.
 Cuccupè 345.
 Cuccustretiola 149, 152.
 Cuccuvella 371.
 Cuch 345.
 Cuchusc 345.
 Cùciaio 450.
 Cuciaronc 472.
 Cùcu-345.
 Cucù 345.
 Cucù 345.
 Cùcu 345.
 Cùcu 345.
 Cucugghiatula 122.
 Cucule 345.
 Cuculo 345.
 » africano 348.
 » americano 349.
 » americano oechio rosso 349.
 Cuculo americano dagli occhi rossi 349.
 Cuda di focu barbarisca 162.
 » » » di livanti 162.
 » » » pettu-niru 200.
 Cuda-russa a pettu blù 193.
 Cuda russu cinirusa 200.
 Cudazzèna 149.
 Cudune 473.
 Cuèrin 510.
 Cuèrin pizzul 541.
 Cuervo 23.
 Cugianco d' acqua 597.
 » d'Àia 313.
 » de bosco 154.
 » de riva 317.
 » de tèra 154.
 Cui 279.
 Cul bianch 313.
 » da ja jeni 363, 367.
 Cularrubiu 162.
 Culbianc 154.
 » d'acqua 572, 595, 597.
 Culbianch 597.
 » da acqua 597.
 » d'eva 317.
 Culbianco 154, 155, 595, 599.
 » acquatico 597.
 Culbiànc 157.
 » foresto 157.
 Culerciariu 342.

Culingioni de terra 569.
 Culisalida 141, 149.
 Culmastur 536.
 Culo bianco 155.
 Culorcia 378.
 Culorosso 334.
 Culrosso 197.
 Culubiancu 314.
 Cùmbin piccin 632.
 Cùmbu sarvaigo 499.
 » turraieu 505.
 Cùio gianco 313.
 Cuocciu di camula 350.
 Cuoddu-virdi 467.
 Cùogianco de monte 155, 157, 158.
 Cuorossùn 161.
 Cuorvi di mari 427.
 Cuorvo d' acqua 425.
 » de mare 425.
 » marino 425.
 Cuorvu 30.
 Curculeu de monti 58.
 Curdaru 328.
 Curentin 571, 572, 595, 599, 601.
 » d' acqua 601.
 Curentinin 571.
 Cureninon 574.
 Curetin 130.
 Curidda janca 157.
 » janca cu l' ali niuri 157.
 » russa 197, 200.
 Curintinu 130.
 Curisarida 141, 144.
 Curissola 141.
 Curnacchia 27.
 Curnacciu 27.
 Curnaj 25.
 Curnuteddu 367.
 Curoso 197.
 Curriddu 562.
 Curripraià 572.
 » granni 574.
 Currintina 122.
 Curroso 200.
 Curvèlla 451.
 Cutretola 152.
 » boreale 145.
 » capinera 146.
 » testa gialla 148.
 Cutti 141.
 » capo-nero 116.
 » caponero a sopracciglio bianco 147.
 » caponero a sopracciglio giallo 147.
 » testa gialla 148.
 Cuvarèlla 122.
 Cuvettu 30.
 » piemuntisi 30.
 Czin 246.

D

Dalin 230.
 Dama 361.
 Damigella 557.
 Damina 361.
 Daminn-a 361.
 Dardan 354.
 Dardanel 313.

Dardao 322.
 » da pansa gianca 325.
 Dardaro 313.
 Darden 313.
 Dardù 313.
 Dardù 322.
 Darnega sparviù 294.
 Dduccu 375.
 Derdar 354.
 Diavulicchiu 413.
 Dinzio salvàrego 559.
 Domenicanu 489.
 Dona 361.
 Dörde 180.
 Dordine 136.
 Dormiglione 328.
 Dottori 656, 658.
 Doubla macrusa 491.
 Dourin 291.
 Drèsa 184.
 Dressofin 184.
 Druutz 371.
 Duca 662.
 Dug 375.
 Dugo 375.
 Dugou 375.
 Duldra 508.
 Duraldi 103.
 Durd 180.
 » corsin 178.
 » spinard 178.
 Durdin 178.
 Durt 180.

E

Edera 656.
 Eider 492.
 Eleva 34.
 Erbolana 536.
 Eula 394.

F

Facedua gialletta 234.
 Facianotta 580.
 Facciòum 361.
 Facciomo 361.
 Facciòmmo jancu 361.
 Facuopu 373.
 Fafan 417.
 Faganel nostrar 82.
 Faganelo 82.
 » foresto 85.
 Fagiano 515.
 » di monte 533.
 Faguanazzu 375.
 Faguanu 367.
 Faguanu biancu 361.
 Falaropo a becco largo 584.
 » a becco sottile 584.
 Falchet 380, 382, 406, 413.
 » de Tör 410.
 » muliner 380.
 » paluder 378.
 Falchèt 403, 406.
 Falchèt de tore 410.
 Falchettin 417.
 Falcheto bianco 380.
 Falchèto foresto 403.
 Falchett 410, 417.
 » d' torr 410.

Falchett da passer 408.
 » da tourr 410.
 » de campanin 410.
 » de la manella longa 417.

Falchettin 412.
 Falchetto 406, 410, 417.
 » nero 408.
 Falco 378, 398, 410.
 » bianco 381.
 » cappone 396.
 » cenerino 417.
 » di padule 378.
 » di padule bianco 380, 381.

» gallinà 394.
 » gallinaio 394.
 » marino 378.
 » palombaro 416.
 » pecchiaiolo 396.
 » pellegrino 406.
 » pescatore 381.
 » reale 405.

Falcon 381, 385, 403, 416.

Falcón 419.

Falcona 378, 394, 403.

Falcone 403.
 » della Regina 405.
 » ianco 380.
 » minore 405.
 » tunisino 405.

Falconetto 382.

Falcunazzu 385.

Falcùzz 403, 408, 417.

» di ciampunil 410.

Fallante 652, 654.

Fanel 82.

Fanèll 82.

» d'la regenna 85.

Fanello nordico 81.

Fanellu 82.

Fanésso 82.

Fanétt 82.

Faneto 82.

Fauin d'la regina 86.

Faràsega 99.

Farc 378, 393, 394, 396, 406.

Farchèt 417.

Farchèto 406, 408, 410, 417.

» american 413.

Farchètt 408, 410, 412, 417.

Farchètt 413.

Farchettin 413.

Farchetto 406, 408, 413.

» da reginna 405.

Farchètto 413, 417.

Farchettu 406, 417.

Farchtoun 416.

Farciola d' montagna 197.

Farco 378, 394, 396.

» bison 385.

» būsùn 394.

» de padù 380.

» galinà 393, 394, 396.

» gianco 380.

» grosso 385.

» marsaiolo 385.

» pescao 381.

» reale 403.

Fàrco 406.

Farcón 393.

Farcón 394, 396.

Farcu 417.

Farcunazzu 378, 385, 394.

Farcuni 382, 391.
 » biancu 380.
 » di passa 413.
 » frusteri 413.
 » jancu 396.
 » raru 402.
 Fareunieddu jancu 380.
 Fareunieddu jancu rari 381.
 Faringuello 82.
 Farlotta buscaróla 298.
 » de la testa rossa 300.
 » duminicana 295.
 » grossa 292.
 Farnarone 382.
 Farsón 67.
 Fasan 533.
 Fasanello de montagna 533.
 Fascianu 551.
 Fassa 499.
 Favà 208.
 Favaràsso 499.
 Favarèto 204, 303, 305.
 Favàs 499.
 Favaz 499.
 Favazo 499, 503.
 Favazz 499.
 Favin 241.
 Favite 248.
 Favreto 158.
 Fenuggià 240.
 Fenuggià 241.
 Fenuggià 207.
 Féra 38.
 Ferain 255.
 Ferant 70.
 Ferao 255.
 Fermicularu 342.
 Ferrareddu 253, 255.
 Ferraru 253.
 Fialapp 327.
 Fiammante 454.
 Fiammingo 451.
 Fiaschetta 262, 266.
 Ficetola 136.
 Fiffina 133.
 Figarola 217.
 Filandrón de Spagna 116.
 Filinguello 52.
 Filunguello 52.
 Finch 52.
 » subìot 89.
 Finco 52.
 » foresto 253.
 Finett 82.
 Finfguon 268.
 Finicottiru 451.
 Fio 475.
 Fiocchin 260.
 Fiorancino 260.
 Fiorarancino 258, 260.
 Fiorino 258, 260.
 Fiotto 99.
 Fis-ciòn ròsai 586.
 Fisc-ciòn 567, 589, 593, 595, 601, 602.
 » grosso 605.
 » reale 607.
 » ròsai 588.
 Fischia-voi 621.
 Fischiaoi 621.
 Fischioncello 604.
 Fischione 178, 475, 605.
 » turco 482.
 Fisolèto 669.

Fisolett capussin 666.
 Fisolò 665, 668.
 Fisolò canuriol 669.
 Fista 135.
 » foresta 135.
 » granda 139.
 » piccola 133.
 Fistazza 139.
 Fistel 243.
 Fiston 97.
 Fiston foresto 132.
 Flabbettedda 218.
 Pocètola 218.
 » capa-nèra 215.
 Focetolone d'acqua 238.
 Fojana 394.
 Folaga 552, 662, 663.
 » africana 554.
 Folegòn 548.
 Polenga 538.
 » de marso 540.
 Folenghèta 542.
 Fòlighe 552.
 Folga 552.
 Follaca 548, 552.
 Forapaglie 210.
 » castagnolo 242.
 » macchiettato 243.
 Forbicione maggiore 627.
 Forfeson 398.
 Forgia 554.
 Formichiere 342.
 Formicòne 342.
 Formicolaru 342.
 » di voscu 339.
 Formiguin 342.
 Fornarò 200.
 Fossacchia 139.
 Foti borse 619.
 Fottivento 636.
 Foular 250.
 Fòllireuf 669.
 Fouloun 602.
 Fourmenten 209.
 Fournè 255.
 Fournera 149.
 Fourneron 200.
 Fradelin 72.
 Fraguannu 363.
 Francisottu 582.
 Francolin 536.
 » blanc 536.
 Francolin 534.
 Francolin 534.
 Francolino 515.
 » di monte 531.
 Francolo 641.
 Franceulin 536.
 Frangoul 52.
 Franguel 52.
 Franguel 52.
 » dla focca 57.
 » dla nev 57.
 » di al bianch 57.
 » d' montagna 253.
 Franguel montan 55.
 Franguello montanaro 55.
 Franguèto 52.
 Franguèto 52.
 » de montagna 55.
 » main 89.
 Frangùl 52.
 Frangvèll 52.
 Frarètta 238.

Fraselin 79.
 Fraticello 632.
 Fratino 475, 571.
 Frattin 317.
 Franèra 292, 295, 298, 309.
 Fravetta 218.
 Frèghèra 298, 300.
 Frenguello de mà 655.
 Freu 57.
 Fri-Fri 260.
 Fri-fri 258.
 Fricialase 202, 204.
 Fringeddone 67.
 Fringiddastra 67.
 Fringuell 52.
 Fringuell montaguin 55.
 Fringuello 52.
 » alpino 57.
 » marino 89.
 Fringuèlo 52.
 Fringuellu 52.
 » muzzolinu 52.
 Frisarin 79.
 Friscaluora 625.
 Frischiettu 475.
 Frischini 475.
 Friscuni 475.
 Frison 67.
 » di flochet 291.
 Frisù 67.
 Frisuni 67.
 Frixion 67.
 Frocione 67.
 Frongillo 52.
 » spagnuolo 55.
 Frosolone 67.
 Frosone 67, 70.
 Frullino 585, 619.
 Frungillo 52.
 Fruson 67.
 Frust' asino 202.
 Frusuleu 288.
 Fuannu 863.
 Fuànu 363.
 Fucètola cannavale 210.
 Futtignon 268.
 Fuin 228.
 Fujanazza 375.
 Fujanu 363.
 Fulaga 552.
 Fulega 548.
 Fuleghetta 548.
 Fulica 548.
 Fuliga 552.
 Furghèra 295, 298, 300.
 » grossa 292.
 Furghérión 292.
 Furmicularu 342.

G

Gabbiana 646.
 Gabbiano 641.
 » corallino 639.
 » corso 645.
 » glauco 647.
 » maggiore 617.
 » nero 650.
 » reale 646.
 » roseo 642.
 » terragnolo 643.
 Gabbianello 638.
 Gabian 646.

Gabiosna d'passage 292.
 » mesana 295.
 Gada 36.
 Gaddarann 451.
 Gaddina 467.
 Gaddinedda d'acqua 548.
 » » surcera 543, 544.
 » » di boscu 548.
 » » pizzu giannu 548.
 Gadduzzeddu d'acqua pe-
 di giarni 542.
 Gadduzzu ciurluvu 586.
 » d'acqua 250.
 » di mare 586.
 » di mari 591.
 » di montagna 334.
 Gafio 616, 618.
 Gafione 618.
 Gafione 618.
 Gaggi 175.
 Gaggia 36.
 Gaggiottola 295.
 Gaglia 36.
 Gai marin 352.
 Gaj 38.
 Gaja 38.
 » da noscle 34.
 » mata 34.
 » nosclera 34.
 Gajineja d'acqua 540.
 Gajola 38.
 Gal forzhel 533.
 » lauriot 533.
 Galanu 288.
 Galbedro 288.
 Galberi 288.
 Galet da montagna 357.
 » d'ra pupù 357.
 Galèt 357.
 » d'marz 357.
 Galetto de marso 357.
 Galètto inearòlo 357.
 Galett è marzo 358.
 Galetto 357.
 » d'marzo 357.
 Galina sarvaiga 559.
 Galinazha 609.
 Galinazhèta 248.
 Galinazin 248.
 Galinazza de mâr 580.
 Galinel 417.
 Galinèl 412.
 Galinel 382.
 Galinèta 536.
 Galinetta 538, 540, 544.
 » d'acqua 538, 548.
 » du becco russo 538.
 » neigra 548.
 » peita 542.
 Galinèta 576.
 Galinn-a sarvaiga 559.
 Galinu 288.
 Gall cedron 532.
 » d'montagna 533.
 » salvadegh 533.
 Gallonèlla riale 548.
 Gallina 533.
 » de montagna 533.
 » faggiana 559.
 » prataiola 559.
 Gallinaccio salvaggio 557.
 Gallinassa 609.
 Gallinella 338, 540, 548, 577.
 » de montagna 536.

Gallinetta 540.
 » grossa 548.
 » piccina 544.
 Gallo cedrone 532.
 » di selva 342, 358.
 » marino 533.
 Gallozzella 624.
 Galluzzo 577.
 Galzhedron 532.
 Gambalonga 132.
 Gambarossa 521.
 Gambarret 562.
 Gambe lunghe 607.
 Gambechio 589.
 » americano 589.
 » frullino 585.
 » nano 590.
 Gambeta 593.
 Gambeton 593.
 Gambett 589, 593, 595.
 Gambetta 538, 593.
 » americana 595.
 » fosca 604.
 Gambettino 542, 544, 589,
 590, 595.
 Gambetton 593, 607.
 Gambettone 593, 601, 604.
 Gambettoun 593.
 Gambetto nero 601.
 Gambinon 605.
 Ganavel de fau 369.
 Ganga 511.
 Gangoreda 667, 668.
 Ganiel de franguei 408.
 Garbé 287.
 Garbéo 288.
 Garbiero 288.
 Garganè 477, 479.
 Garganel 479.
 Garganella marmorizzata
 477.
 Garganella 477, 479.
 Garganello 477.
 Gargot 479.
 Garle 298.
 Garlutt 298.
 Garxixedda bianca 436.
 Garza 434.
 » bianca 434.
 Garzan-na 38.
 Garzann-a 38.
 Garzetta bianca 435.
 Garze 429.
 Garziero 70.
 Gascetta del co negher 295.
 » del col ross 300.
 Gascieton 292.
 Gasgetta 298.
 » mornera 292.
 Gastrica forestiera 160.
 Gatto de mare 644.
 Gavarello 477, 479.
 Gavazua 298.
 Gavina 641, 643.
 Gaviourna ajassera 292.
 » grossa 295.
 Gavitricola 342.
 Gaviurna 295, 298, 300.
 Gaviurna grossa 292.
 Gaza 36.
 » carnera 38.
 » de la coa longa 36.
 » dla coa longa 36.
 » ladra 36.

Gaza magiona 38.
 » maina 352.
 » mora 36.
 » nera 36.
 » nisölera 34.
 » zucona 38.
 Gáza checa 36.
 » da la coa longa 36.
 » féra 39.
 » rabiosa 39.
 Gazanella 175.
 Gazanetta 292, 295, 298, 300.
 Gazáro 181.
 Gazella 36.
 Gazeola 298.
 » frizunera 292.
 » » piccola 295.
 Gazha 36.
 Gazuella 292, 295.
 Gazuella 298, 300.
 Gazuclata 298.
 Gazza 36.
 » marina 656.
 Gazzera 36.
 Gazzina rossa 300.
 Gemon 89.
 Gentilom 287.
 Gerardelo 542, 544.
 Germana 467.
 Germanello 477, 480.
 Germano 467.
 » nero 552.
 » piccolo 477.
 » turco 482.
 Gesso 184.
 Ghè 38.
 Gheja 38.
 Ghella 639, 641, 644.
 Gheppio 410.
 Gherluda 184.
 Ghiandaia 38.
 » marina 352.
 Ghierla 298.
 Ghirlino 572, 599.
 » grande 574.
 Giaçou d'eva 429.
 Giaçu 571, 572.
 Giadule 184.
 Giagà 629.
 » de mar 629.
 » foresto 634.
 Gial 39.
 Giài 39.
 Giàle marine 352.
 Gialdirola 143, 152.
 Gialdón 70.
 Gialine forcèle 533.
 Gialinedda 141.
 » testa nira 146.
 Giall cedron 532.
 Gialletto 234.
 Giallino 79.
 Gianetta 143.
 Gianetta 141, 153.
 Giânetta 144.
 Gianna 429.
 Giaregule 538.
 Giaretta 214.
 Giarla 298.
 Giarle fajàne 298.
 Giau 39.
 Gianne 99.
 Giavanin 258, 260.
 Gilardina 540.

Gilardina gainèra 548.
 Gilardina 599.
 Gioppu 373.
 Giracollo 342.
 Girardela 510.
 Girardina 542, 544.
 Girbinu 480.
 Gireu 587.
 » de fiume 595.
 Giruni 348.
 Giù 373.
 Giugo 208.
 Giver 664.
 Go 39.
 Goa 29.
 Goba 552.
 Gobbo rugginoso 494.
 Gobulo 288.
 Gogo 253.
 Gogolo 288.
 Goitre 438, 442, 444.
 » blanc 433, 435.
 » gris 429.
 » rous 432.
 Goitroun 440.
 Gorgiu bleu 193, 195.
 Goro 288.
 Gorzbleu 193.
 Graccio 30.
 Gragallu 450.
 Gracchio 41.
 » corallino 42.
 Graiglia 25.
 Gran Airone d'Italia 434.
 » Bubo 375.
 » Duca 375.
 Granajolo 480.
 Grassetta 136.
 Grassottu 438.
 » biancu 436.
 » imperiali 444.
 Gratasas 285.
 Gravolo 288.
 Gravotól 595.
 Gregoli 480.
 Gregorio 288.
 Gricciaiola 210, 213, 214,
 218, 220.
 Grifone 421.
 Grillaio 412, 413.
 Gring 279.
 Griseto 307.
 Grisetta 470.
 Grison da croda 253.
 Grisite 202.
 Grisütt 202, 204.
 Griva 175, 180.
 » magnina 170.
 Grivea 130.
 » nostrà 134.
 Grivea 125.
 Grivein 120.
 Grixelan 442.
 Grixeloun 562.
 Grola zenerina 27.
 Gröla 25.
 Gröla 29.
 Gronouglie 378.
 Gros Courentin 592.
 » Gabian 616.
 » Marteu 654.
 Grotón 499.
 Grotón 532.
 Grottaione 354.

Grottaione egiziano 357.
Grottaione 253.
Gru 555.
Grù 555.
Griù 555.
Grua 446.
Grù 555.
Gruara 292.
Grue 555.
Gruga 555.
Grugnet 307, 508.
Grugnetton gainée 548.
Grugnetù 518.
Griù 446.
Gruòjo 555.
Gua 44.
Guà dal zufo 438.
Guaddaruni 255.
Guagghiarina 121.
Guaguina 641.
» capa nera 639.
» peccerella 638.
Guai 444.
Gualanella 226.
Guaràglio 632, 635, 636.
Guarda-buoi indiano 438.
Guardalepre 328.
Guardianina 149.
» gialla 152.
Guastésa 521.
Gueja scopajola 298.
» scopina 298.
Gufetto 373.
Gufo 361, 363, 367, 369, 375.
» degli Urali 365.
» di padule 369.
» grande 375.
» reale 375.
Gùfo 367, 369.
Guia 381.
Guina 136.
Guizzetta bastarda 135.
Gulasso 499.
Guléo 363.
Gulin 369.
Guzzettònn 139.

I

Ibi 451.
Ibis 451.
Icèt d'la steila 193.
Imperatorin 247.
Imperga 495, 496, 497.
Incarcabodda 625.
Inganna-cacciaturi 440.
Ingannapastore 328.
Ingolavento 328.
Irbalora 470.
Ittero a spalline rosse 51.
Ittero dalle ali rosse 51.
Iurmanaro 380, 381.

J

Jacobi 373.
Jaddina d' acqua 548.
Jaddinazza 552.
Jaddinazzu 552, 554.
Jaddinedda d' acqua cu li
piedi giarni 543.
» d' acqua surciera 544.

Jaddineddu a piedi gialli
542.
» di acqua 538, 540.
» surciera 544.
Jadduzzeddu d' acqua 542,
544, 574.
Jadduzzu 609.
» d' acqua 548, 595.
Jammi lunghi 582.
Jamminu 593.
» reali 605.
Jannulu 641.

L

L' Osel cavalaro 363.
Labbo 651.
» coda lunga 651.
» maggiore 648.
Laja 36.
Lajassa 36.
Lanario 402.
Lâr 378.
Lâr 393, 394, 396, 406, 408.
Larás 393, 394, 396.
Lardairoun 278.
Lardeiroun 264, 266.
» negre 270.
Lardiera 268.
Lauriddiu 288.
Lauvetta 120.
Lavarin 76.
Lecapertus 283, 285.
Lècura 74.
Legorot 562.
Leiroun 442.
» bianch 433.
Lengua lunga 342.
Lescarina 211.
Lesina 581.
Liabèu 103.
Librazinnu 562.
Lieur 74.
Liebbure d' acqua 442.
Lindaneja 309, 313.
» di montagna 319.
Linduni 322.
Lingua longa 342.
Linguinedda surda 122.
Lippun 593.
Loech 363.
Lochet 373.
Lodi chapelate 127.
Lodina 125.
Lodla 127.
Lòdla d' pré 122.
» russa 119.
Lodlón 116.
Lodoa 127.
Lodoin 122.
Lodola 120, 122, 125.
» buona panterana 125.
» cantarina 116.
» cappellana 127.
» col zhuf 127.
» del deserto 122.
» di passo 125.
» gola gialla 119.
» nostrale 127.
» reale 125.
» vera 125.
Lodolaio 406.

Lodoléta marina 587.
Lodoli 122.
Lodolichio 122, 130.
Lodolin 120.
Lodolin 122.
» foresto 120.
Lodolina 122.
Lodolino 122, 130.
Lodoula 125.
Lodra 125.
Lodra capussina 127.
Lodracchio 125.
Lodrin 122, 130.
Lodua 125.
Lodula 125.
» di mari 589.
Logheri 74.
Lok 367.
» de bosk 363.
Lolòch 363.
Lombardella minore 463.
Lonora 125.
Loudnin 122.
Lourouck 361.
Lourouk 363.
Lucarin 74.
Lucarino 74.
Lucherino 74, 228.
Lucro 70.
Lugaén 74.
Lügain 74.
Lugaó 74.
» còrso 72.
Lugarén 74.
Lugher 74.
Lugherin 74.
Lugherin 74.
» todesco 85.
Lui 226, 228, 230, 231, 234.
» bianco 230.
» forestiero 224.
» giallo 228.
» verde 226.
Luicchio 228.
Lujer 74.
Lumbarda 499.
Lunea 593, 595, 597, 599,
601.
Luparuolo 351.
Lupolo 358.
Luppa 358.
Luri 287.
Lurli 287.
Luròcc 367, 369.
Lusignol 187.

M

Macaren 658.
Machet 204.
Machèt 307.
Macheti di montagna 202.
Machett 202.
Maciotta 371, 373.
Macottu gianuu 101.
Macrusa 492.
Madiscèdda 144.
Magasso moro 486.
Magasséto 486.
» bianco 490.
Maggenghi 527.
Magnan 200.
Magnanen 636.

Magnanina 221.
 » sarda 222.
 Magonet 190.
 Magrun 662, 665.
 » grosso 661.
 » piccin 668, 669.
 Magrunetto 666, 667, 668, 669.
 Maisòlu 565.
 Majarda jauna 99.
 » neigra 101.
 Malaciedd 361.
 Mallardella 477.
 Mallardo 467.
 » romàno 472.
 » verdatero 473.
 Malvizzo 180.
 Malvizzu 180.
 Mancia-alivi 273.
 Mancia jaddini 417.
 Manciaiva 273.
 Mangia botte 133.
 » seechi 421.
 Maragan a peis nieddus 628, 629.
 » de mari a peis arrubius 630.
 » de mari mannu 627.
 Marangone 425, 661.
 » col ciuffo 427.
 » nano 427.
 Marènga 521.
 Margon 170.
 Margùn 651.
 Margùn 496, 663.
 Marguneddu 669.
 Margunt 425, 656.
 » svariù 427.
 Marigiano 470.
 Marinèdda 503, 506.
 Marioli boaròi 571, 572, 574.
 Marranganu 538, 540.
 Marra-piga 39.
 Marsola 480.
 Marteddu 565.
 Martellino 246.
 Marteu 628, 629.
 Martiduzzo 569.
 Martiduzzu 309, 313, 314, 319.
 Martin pescadù 350.
 » pescou 350.
 » piscaturi 350.
 Martinen 190.
 Martinèo 350.
 Martinet 190.
 Martinellone 562.
 Marvizza 180.
 » furestera 178.
 Marvizzaru 412.
 Marvizzu di passa 170.
 » imperiali 175.
 Marvizzuni 184.
 Marzaièu 473, 483, 486.
 Marzaiola 479.
 Marzeu 576.
 Marzola 480.
 Marzolo 385, 480.
 Marzunieddu 314.
 Mascolinu 421.
 Massucco 562.
 Massuccotto 565.
 Mataccinu niru 161.
 Mätan 97.

Matela 255.
 Matelù 253.
 Maton da eroda 58.
 Matona 253.
 Mattacchiano 253.
 Mattaccinu cu l'ali niri 159.
 Mattorella 270.
 Mattugia 61.
 Mattugino 61.
 Mazhorin 467.
 Mazzorin 467.
 Mbiula 577.
 Megiarola 61.
 Melesia 287.
 Mellardi 467.
 Menga bianca 431.
 Meral sassèll 162.
 Meral 166.
 Meral 167.
 Merdaiole 328.
 Merdara 127.
 Merel 167.
 » aquar 250.
 » sassar 162.
 Merga 496.
 Merisceda 141, 141.
 Merl 166.
 » acquà 250.
 » acquareu 250.
 » ciaperèu 164.
 » d'acqua 250.
 » de stomich bianch 170.
 » pescadeur 250.
 Merl-rouss 161.
 Merla 164.
 » acquareola 250.
 » du cullarit 170.
 » montana 170.
 » tettaiuola 164.
 Merlaquaccio 250.
 Merli 166.
 Merlino 597, 599.
 Merlo 166.
 » acquaiò 250.
 » acquaiolo 250.
 » casengo 164.
 » casuengo 164.
 » ciach 175.
 » ciapà 161, 164, 250.
 » ciapón 161.
 » col collare 170.
 » col vizzo 170.
 » col petto bianco 170.
 » d'acqua 250.
 » d'aigua 250.
 » da acqua 250.
 » da bosco 166.
 » da la colana 170.
 » da la piastra 170.
 » dal colaro 170.
 » de montagna 170.
 » de rocca 162.
 » forestiero 170.
 » foresto 164.
 » garbel 287.
 » main 48.
 » marin 48.
 » marino 164.
 » montagnolo 167.
 » pescou 250, 350.
 » rocaé 164.
 » russo 162.
 » terragnolo 166.
 Merlott 166.

Merlou 166.
 » ciappà da cua gianca 161.
 » d'aiga 250.
 » pescou 250.
 Merlu 167.
 » di sipala 167.
 » petrou 162.
 Merra 167.
 » d'acqua 250.
 Merru 167.
 » a collana 170.
 Merula gajulada 170.
 Meurra de arrocca 164.
 Meurru a cannacca 170.
 Mesdùch 367.
 Mestolone 471.
 Meza beccassa 614.
 Middarda 467.
 Mieddura d'acqua 350.
 Miedduru 167.
 » d'acqua 250.
 Mièrli 166.
 Mièrli di montagne 41.
 Mierlo d'acqua 250.
 Mièrolo rosa 48.
 Mièrri di sciàra 167.
 » niuru 167.
 » solitariu 164.
 Miettimponta d'està 205.
 Migliarina 61.
 Migliarino 110.
 Mignarda 125.
 Mignattaio 451.
 Mignattino 636.
 » ali-bianche 635.
 » bigio 634.
 Mijardoli 480.
 Mijardo 484, 486.
 Milièsa 287.
 Minutulu 253.
 Mitarda 477.
 Mnacia 29.
 Moetto 635, 636.
 Moetton 483.
 Moetton 483.
 Moja 484.
 Monaca 149.
 Monacedda 317, 319.
 Monacella 593.
 Monachedda 159, 212, 305.
 Monacheja 160.
 Monachella 157, 512, 544.
 » a dorso nero 160.
 » a collo nero 160.
 » a gola nera 158.
 » nera 161.
 » nera a testa bianca 161.
 » bianca e nera 160.
 » testa bianca 161.
 Monachina 597.
 Monachino 632.
 Monaghella 208.
 Monaghina 273.
 Montagino 202.
 Montagnola 270.
 Mantel 55.
 Montanella 82.
 Montanello 82.
 » forestiero 84.
 Montanèlo 55.
 Montarino 283.
 Montanin 55.

Monten 82.
Moracchiolo 322.
Morat 197, 255.
» carbuner 200.
» de la stela 193.
Moratùlòn 208.
Moretta 208, 486.
» codona 490.
» grigia 485.
» nera 485.
» tabaccata 487.
» turca 486.
Moretten 483.
Morettón 485.
Morettone 483, 485.
Morettoun 485.
Moreù 202, 204.
Moreùl 202, 204.
Morigiana 483.
Moriglione 483.
Morta riàle 665.
Morticella 669.
Moscardo 413.
Mosécca 253.
Mounega 361.
Mouneghetta 270.
Mounietta 635.
Mountán 55.
Mountanel 55.
Mozzetto 157.
Mucca-muschi 231.
» » jancu 230.
Muciatto minore 109.
Mugiatto 106.
Mugnaiaccio 648.
Muiniute 264.
Muja 213, 220.
Mulinaru picciolu 301.
Muliné 638.
Munachedda 157, 220.
» d'passa 303.
Munarasso 483.
Muneghéta da la colana 574.
Muntagnin 55.
Muntana 55.
Muntanin 55.
Muraiola 279.
Muraiolo 285.
Muretta 486.
Murguni 552.
Murtiddus 180.
Muscalureddu 307.
Mutuna 253.

N

Naccaluoru 288.
Nano 590.
Nasone 658.
Natra turea 482.
Nehiummata 486.
Nerocea-sipali 283.
Ndalandishia 309.
Nducu 375.
Necioula 367, 369.
Nedròt salvadek 467.
Neuciola 327.
Ngannapastore 367.
Ngroia 555.
Nia 422.
Nibi 394.
Nibbio 394, 398, 400, 641.
» nero 400.

Nibbio niro 400.
Nibbiu di passa 400.
Niciolera 34.
Niedduzzu 485.
Niggio 398.
Niggia 398.
Nigghiu 400.
» niru 400.
Nigliazzu 398.
Nigliu 398.
Ninfea 475.
Nivalora 319, 577.
Nivaloredda 319.
Nivaluoru 577.
Nizzola 101.
» cenerina 106.
» di padule 111.
Nocciolata 34.
Nociola 327.
Nociotto 67.
Nonna rossa 432.
Nonnotto 440.
Notoan de Provenza 96.
Nottaione 354.
Nottola 328.
Nottolaccio 328.
Nottolone 327.
» asiatico 331.
» a collare rosso 330.
» del decreto 330.
Nottuán 103.
Nugola 577.
Nuttuan 103.

O

Oca 460, 461, 463.
» a faccia bianca 458.
» collo rosso 459.
» colombaccio 459.
» da gran 461.
» de mã 646.
» de mae 646.
» faraóna 611.
» foresta 463.
» granda 460.
» granaiola 461.
» lombardella 463.
» » minore 463.
» marina 645, 646.
» » di li picculi 638.
» » testa nira 639.
» mezana 644.
» nana 463.
» negra 459.
» paa 461.
» paa 461.
» salvadega 461.
» salvaréga 460, 461.
» sarvaega 461.
» sarvaja 461.
» selvatica 460.
Ocanell 82.
Oce e d'bo 202.
Occhi-bianchi 487.
» di Pulce 317.
» lucenti 668.
Ochialuneddu 574.
Ochialuni 571, 572.
Ochiddi russi 220.
Ochijanchi 214.
Oocchio di bove 571.
» rosso 220, 512, 511.

Occhione 562.
» del Senegal 564.
Occhiorosso 221.
Occhipisciati 220.
Occhirossi 221.
Och 460, 461.
» margón 433.
Oche 461.
Ocheta de mae 628, 638, 641.
Ochetta 638, 643.
Ocheto de mae 639.
Ochin 630, 632, 636, 638, 639, 641, 643.
Ocie 460, 461.
Ocieto de Bo 264.
Ocio de bo 263, 261.
» de Bô 228.
» d'oro 574.
Ociò de bo 263.
Odola 125.
Odolin de crap 122.
Oggiuon 562.
Ogli 388.
Ogu de boi 220.
Olivedda de margi 567.
Olocco 363.
Olouch di bosch 367.
Oocco 363.
» grosso 375.
Orale 444.
Orbarolo 243.
Orchietto marino 492.
Orco marino 491.
Organeto de la China 267.
Organetto 85.
» minore 86.
Organin 85.
Orgiali de is cannas 111.
» » cannissonis 111.
» » mustassus 111.
» grogu 101.
Ornu 396.
Orro 396.
Orru 396.
Ortolá 103.
Ortolan 103.
» de nev 115.
» spajardaa 101.
» zalo 99.
Ortolán 103.
Ortolanel 103.
Ortolano 103.
» grigio 106.
Ortrán 103.
Ortranin 103.
Osel dall' ojo 285.
» dei sas 202, 201.
» della Madonna 285.
» della neve 115.
» tedesco 92.
Oselaz 403.
Oseláz 403.
Oselét del bosch 248.
Oseló cavaláro 412.
Otardinn-a 559.
Otarde 537.
Oubara 561.
Oucoun 461.
Ourtoulan 103.
» bianch 115.
Outarda 557, 559.
Ouvina 133, 136.
Ovivá 571, 572.

Ovivà du testun 574.
Oxelo da sexi 220.

P

Pacéch 141.
Pachedu 345.
Padulén 268.
» de la manella longa 266.
Padvana 207.
Pagéa 99.
Paggiaetta 149.
Paghionica 157.
Pagiaissa 136.
Pagliarolo 241.
Paglierino 241.
Paglinculo 266.
Paiarzin 237, 240, 241.
Paisòla 268.
Pajainculo 266.
Pajarana 99.
Pajarina 99.
Pajariz 99.
Pajarola 244.
Palaccia 394.
Palandra 116.
Palidda 450.
Palomba 499.
Palombaccio 499.
Palpagnà 527.
Palton 471.
Palugàna 255.
Palugàna 238.
Palughin 240.
Palumba collata 499.
» » marina 503, 505.
» roccalora 503.
Palumba servaggia 499, 503.
Palumella de la cava 505.
Palumma roccalora 505.
» sarvaggia 503, 505.
» servaggia 506.
Pampua 261.
Panegas da montagna 61.
» nostran 66.
Panegassa 64.
Panegasseta 61.
Panegasot 64.
Panigaèu 139.
Pantana 605.
Pantiera 127.
Paola 41.
Paolinaccio moro 634.
Paonzhin 577.
Paonieddu 577.
Papà d'la pizzacra 248.
Papa formigas 334, 342.
» muschitu 231, 246.
Papagnedda 638.
Papamoschin 246.
Pappamusca 303, 307.
Papanzicu 268.
Paparagno 285.
Paparedda 480.
Paparo a castagne 460.
Paparune 461.
Paparuni 461.
Papefig 233.
Papiòla beccu sturtu 586.
Papiola 'mperiali 602.
» nira 604.
Papiuledda 588.

Pappaiaddiscu 93.
Pappamuschi 213.
Papunceddu 579.
Parauzin piccol 273.
Paranzino 268.
Pardir 97.
Parisceua 268.
Parisseua 268.
» da a cua lunga 264.
Parisseua 270, 273.
Parissuin 264, 270.
» celeste 273.
» cua lunga 261.
Parissurin 270, 273.
Parisùan-a 268.
Parisuetta 275.
Parnigia 522.
Parnis grisa 525.
» rossa 521, 525.
Parpaiol 307.
Parrella blu 273.
Parrelluccia a coda longa 266.
Parrinu 665.
Parusciola molinera 273.
» quarantina 273.
Parusciolin 275.
Parusciolina 275.
» grisa 275.
Parusin 268.
Parüssola foresta 275.
» montagnòla 273, 275.
» mora 275.
Parussolèta 273.
Parussolin foresto 278.
Parüssule de còde lunge 263.
Pasara 64.
» crautina 61.
Pasera 61.
» merder 64.
Pasqualinu 422.
Passante 396.
Passara dal becc grues 61.
» muta 58.
» palugana 238.
Pássara 164.
» d'stopia 255.
Passaràino 58.
Passare çharandine 255.
» minude 61.
Pássare 66.
Pássare taliàno 64.
Pássareddu 52.
Passarièddu 58, 63.
» di passa 58.
Pássariello 64.
Passarin 64.
Passaro solitario 164.
Passarot colombera 64.
Passarót 64.
» muntagnin 61.
Passarót 66.
Passarótu muntagnin 61.
Passaru 64.
» di acqua 113.
» di boscù 122.
» di campagna 61.
» di vuocu 58.
» du Distrettu 61.
» sbirru 63.
» solitariu 164.
Passegua 582.
Passer solitari 253.
Passér solitári 164.

Passera 64, 161.
» bastarda 58.
» canzirro 61.
» casolina 64.
» di macechia 255.
» di padule 113.
» di tètto 64.
» europea 66.
» forestiera 58.
» fura-siepo 255.
» grossaia 61.
» lácera 58.
» lagia 58.
» matta 255.
» macchiaiola 255.
» mattea 255.
» mattugia 61.
» montanara 58.
» oltremontana 66.
» ragia 58.
» sarda 63.
» scopaiola 255.
» scopaiola asiatica 257.
» scoparina 255.
» scapajola 255.
» siepajola 209.
» solitaria 164.
» stipaiola 255.
» strega 61.
Passeraca 61.
Passeretto 61.
Passerin 152.
Passerina 255.
» stipajola 255.
Passerino 61.
Passero 64.
Passerotto 64.
Passeru solitariu 162.
Passerucchia 61.
Passiru 63.
» solitario 164.
Passra 64.
» d'macia 255.
» d'montagna 253.
» d'mountagna 58.
» salutia 164.
» soulitaria bleu 161.
» soulitaria roussa 161.
» sulitèria 164.
Pávua 64.
» molinàa 61.
Pávua teracina 61.
Pávua 66.
Passuèta 61.
Passuèta 61.
Passuun 58.
Passurèta 61.
Paturi 442.
Paula 30.
Pausi 576.
Pavoncella 576, 577.
» a coda bianca 576.
» armata 576.
» gregaria 576.
Pavoncin 577.
Pavone africano 348.
Pavonetta 577.
Pavonzhin 577.
Pavoni africani 348.
Pavonzina 576.
Pavuncellu 577.
Pavunzin 576.
Pazzetto 477.
Pecc gardlèin 334.
Peccetto da sorch 193.

- Pecétto 190.
 Pechecrots 442.
 Pelicàn 424.
 Peliere 585.
 Pellicano 421.
 » riccio 423.
 Pendolin 262.
 Pendolino 262.
 Penninculo 266.
 Peppola 55.
 Peracia 152.
 » gianna 141, 143.
 Percia-ruvettu 248.
 » -sepe 248.
 Perciabadi picciulu 544.
 Perciaruvetti 228.
 Perdigjorni 444.
 » bianco 438.
 » grosso 429.
 » piccin 440.
 Perdigjorno rosso 431.
 Perdis couloubana 522.
 Perdris de mer 625.
 Perisséa 268, 270.
 Perisseta 273.
 Perissuin 273.
 Perlina 268.
 Perlunza capinera 268.
 Perlunzina 273.
 Pernice 521, 522.
 » sarda 524.
 » di mare 625.
 Pernici 522.
 Pernis 525.
 » di pràd 574.
 » grisa 525.
 » marencia 521.
 » rossa 521.
 » sterna 521.
 Pernisa bianca 536.
 Pernise 521, 525.
 » de mae 625.
 » piccola 525.
 » rossa 521.
 Perniseta 525.
 Pernisoto 525.
 Perniss 525.
 Pernixe còmbéa 522.
 » de ma 625.
 » rossa 521.
 Perticòla 429.
 Perticòlin 438, 440.
 Perussola bianchizza 277.
 » col zhuf 278.
 » de cheba 270.
 Perissola dalla coda longa 261.
 » col zhuf o fuò 278.
 » granda 268.
 » moscona bianchizza 277.
 » piccola 277.
 » turehignola 273.
 Peruzhola montagnazha 270.
 » negra 270.
 » todesca 290.
 Peruzholin 273.
 Perruza 101.
 Perruzzola todesca 270.
 Pescariolla 579, 585, 587, 595, 605.
 » picouna 589, 590.
 » rougia 586.
 Pescamartin 250, 350, 630, 632, 636.
 Pescápess 497.
 Pescápess 630, 632.
 » peit 636.
 Pescarén 497.
 » gròs 495.
 Pesciaila 497.
 Pescaròn 495.
 Pescina 497, 597.
 Pessa-nos 67.
 Petarélo 190.
 Pêto bleu 193.
 Petouva 248.
 Petrisso 190.
 Petrit 388, 417.
 Petroneila 122.
 Petronilla 122.
 Petross 190.
 Pett'arruviu 190.
 Pett'azur 193.
 Pett'azzurro a macchia
 bianca 193.
 » a macchia rossa 195.
 » occidentale 193.
 » orientale 195.
 Pettaro 190.
 Pettegola 602.
 Pettiross 190.
 Pettiroso 190.
 Pettiruscio 586.
 Petto-bianco 325.
 Pettoross 190.
 Pettorosso 190.
 Petrello 656.
 Pettu azzurru 193.
 » blu 193.
 » brù 193.
 Petusséto 190.
 Peuca 111.
 Pevion salvadegh 503.
 » sarvâ 499, 503, 505.
 Pia 577.
 Piacaràn 327.
 Piagnucolone 205.
 Piattajone 328.
 Pic di mur 285.
 » quen rougie 334.
 » ros cito 337.
 Pica 36.
 » comune 39.
 » marina 352.
 Picasceta 342.
 Picatin 282.
 » di bauss 285.
 Picatoun 279.
 Picazo 279, 334.
 Picc 339.
 » de coròne 333.
 » gris 341.
 » mezzan 336.
 » verd 341.
 Picc-ross 190.
 Picchiaccio 334, 339.
 Picchiechiera 122.
 Picchieri 190.
 Picchio 279.
 » a dorso bianco 335.
 » a tre dita 339.
 » arancino 337.
 » bigio 279.
 » cardinale 336.
 » cenerino 341.
 » dalmatico 336.
 » di Lilford 336.
 » focaro 334.
 Picchio gallinaccio 339.
 » giallone 339.
 » maggiore 333.
 » marino femmina 352.
 » mezzano 336.
 » minore 337.
 » muraiolo 279.
 » muratore corso 281.
 » » dalmatino 281.
 » nero 332.
 » piccolo 337.
 » pollastro 339.
 » rampichino 283.
 » rosso 334.
 » » minore 337.
 » scorzolino 283.
 » verde 339.
 Picchiotto 279.
 » corso 281.
 » rupestre 281.
 Piccion di mare 641.
 Piccioncino 638.
 Piccione 449.
 » selvatico 505.
 Piccioun Marten 652.
 Picciuròss 190.
 Picèto 190.
 Picett 202.
 Picétt 190.
 Picetto 190.
 Pich peit 333.
 » picit 337.
 Pichet d'la rusca 282.
 » fiórâ 337.
 » pantoulon 279.
 Picial 190.
 Piciona 120.
 Picion dugo 367, 369.
 Piciusa 371.
 Picons 339.
 » rouss 333.
 Piconso 339.
 » gazanâ 339.
 Picot 279.
 » ross 333.
 » verd 339.
 Picott 339, 341.
 Piccozzin senerin 279.
 Picun 334, 339.
 Picunsin 279, 333, 337.
 Picunsu 339.
 Picunzét 333.
 Picúnzetta senein 279.
 Picunzetto 339.
 Picunzin 337.
 Picunzo gallinâ 339.
 Piedi-luoghi 582.
 Pettirussu 190.
 Pigazet 337.
 Pigh gross 339.
 Pigghiuggiu 669.
 Pigion 41.
 Pigliamosche 307.
 » pettirosso 306.
 Pigoséla 336.
 Pigoséta 333.
 Pigosét 337.
 Pigoson 339.
 Pigosetto 336, 337.
 Pigosso verde 339.
 Pigossón 341.
 Pigot 333, 341.
 » moro 332.
 » verdo 339.

- Pigozh 333, 336, 337.
 » negro 332.
 » verde 339.
 Pigózh 341.
 Pigozhét 337.
 Pigozzo 333.
 » rosso 336.
 » verde 311, 339.
 Pigala 371.
 Pilloni de S. Maria 350.
 Pilusa 307.
 Pilucani 424.
 Pincion 52.
 Pinnazzola 268, 271.
 » euda longa 266.
 Pintin 263.
 Pinzuni 52.
 Pio-pio 571, 572, 574, 595,
 597, 599, 601, 604.
 » gross 602.
 Pioch 97.
 Piombin 58, 350, 669.
 Piombino 350.
 Piombon 381.
 Pionsa mora 101.
 Pionza 106, 113.
 Pioulin 135.
 Piouravela 597.
 Piouraves 597.
 Piovanela 597.
 Piovanello 586, 588, 590, 592.
 » maggiore 591.
 » pancia nera 587.
 » piccolo 588.
 » violetto 585.
 Piovanello 589, 590.
 Pipituna 338.
 Pipitune 358.
 Pipituni 358.
 Pirnicaru 522.
 Pirnizzola 268, 271.
 Piro-piro 595, 597, 599, 601.
 » boscareccio 599.
 » cubbianco 597.
 » piccolo 595.
 Piroulet 200.
 Pirruzzedda 268.
 Pirulino 597, 599.
 Pirullino 595, 597, 599.
 Pisagrù 497.
 Pisoca 512.
 Pispanta de riu 139.
 Pispicia di frischia 152.
 » gialla 152.
 » janca 149.
 » svariata 151.
 Pispisa 143.
 Pispola 133, 135.
 » gola rossa 135.
 Pispoledda 130.
 Pispoletta 130.
 Pispolino 133.
 Pispolo 133.
 Pispolone 136.
 Piss-piss 143.
 Pissa mue 209.
 Pit da acqua 669.
 Pita bianca 536.
 » da giara 536.
 Pitanelà 255.
 Pitarán 190.
 Pitarel 190.
 Pitarola 136.
 Pitarra 557.
 Piter 205.
 Pitigrussa 292, 298, 301.
 Pitilongu 298, 301.
 Pitirri 669.
 Pitta agni 285.
 » formighe 342.
 » furnighe 283.
 » muin 285.
 Pittafigo 217.
 Pittamon 285.
 Pittamuscín 246.
 Pitte 527.
 Pittiero 190.
 Pittima 607.
 » minore 608.
 » nana 606.
 Pittiros 190.
 Pittirosso 190.
 Pittirussu 190.
 Pittuzzurussu 190.
 Piturlo 122.
 Piu-piu 597.
 Piula 361.
 Piumbén 350.
 Piumbin 350.
 Piuns galinè 339.
 Piunzetto 337.
 Piunzo 334.
 » torsicollu 342.
 Pivaréto 574.
 Pivarina 597.
 Pivè 565.
 » d'està 569.
 » d'cutúra 569.
 » dorè 565.
 Pivi di baus 325.
 Piviè 567.
 » dorè 567.
 Pivièto 565.
 Piviere 565, 572.
 » di scoglio 567.
 » minore 567.
 » orientale 567.
 » reale 562.
 » tortolino 569.
 Pivieressa 567.
 Pivieri 569.
 Piviero 565.
 Pivion sarvaigh 499, 503,
 505.
 Pivir 565.
 Pivuce pizzul 599.
 Pivula 577.
 Piza-formighe 337.
 Piza re 350.
 Pizzaccarin 616.
 Pizzaccherino 614.
 Pizzacra d'mar 621.
 Pizzafainu 354.
 Pizzaferru svariù 357.
 Pizzafigh 217.
 Pizzamei 202.
 Pizzica ferru 279.
 » -ferro testa russa 336.
 » -ferro 334.
 » nicu 337.
 » ferru niru 332.
 » -ferro viri 339.
 Pizzicaferru 67.
 Pizzicamuru 285.
 Pizzifainu 354.
 Pizziferru 354.
 Pizzoferru 355.
 Pizzu a cucchiareddu 450.
 Pizzu-tortu 93.
 Pizzua formica 342.
 Plech pzen 337.
 Plaviè 567.
 Po-pò 357.
 Pochèta 357.
 Pogianelo 417.
 Poiana 391.
 » a coda bianca 396.
 » calzata 393.
 Pogiana 378.
 Poja 378, 394.
 Pója 396.
 » bianca 311, 380.
 » » de vale 381.
 » foresta 398.
 » imbragada 393.
 Pojana 378, 393, 391, 396.
 » dalla coda bianca 396.
 Pojane 393.
 Pojane col claf blanc 378.
 Pojava 391.
 Pola 32, 609.
 Polastra d'inverno 538.
 Polastrela 540.
 Pollo sultano 551.
 » a schiena verde 551.
 » dal dorso verde 551.
 » di Allen 550.
 Polcinella di mare 658.
 Pópa 357.
 » de vale 378.
 Porghiarute 202.
 Potazzina 268.
 Poulin d'acqua 621, 623.
 Poundrà 396.
 Pravoun 97.
 Predixi 524.
 Predixis 524.
 Pretino 571, 572, 574.
 Prillo 571, 572, 574, 586, 588,
 595, 597, 599, 601.
 Proscunculo 205.
 Prisèura 268.
 Prisola 273.
 Prispola 133, 139, 141, 143,
 152.
 Prispolino 133.
 Proregolo 224.
 Priviere 565.
 Procellaria a coda forcuta
 655.
 Puasèt 264.
 Puaza 593.
 Pudaalén da la manèlla lon-
 ga 264.
 Pudda de mata 524.
 Puddicinu di mari 597.
 Pujen 394.
 Pula d'acqua 540.
 Pulcinella di mari 652.
 Puletta 540, 542.
 » d'acqua 538, 542, 544.
 Puliga a chighirista 554.
 » inchighiristada 554.
 Pulin salvadigh 557.
 Pulzon 264.
 Punta canna 246.
 » de canna 202.
 Puntireu 202, 204.
 Pupa 357.
 Puppla 357.
 Pùppla 357.
 Puppola 357.

Purpuredda 477.
 » tabacchina 487.
 Puticchia 273.
 » grossa 263.
 Puzzonei birdi 355.
 Pzacara 614.

Q

Quagghia 528.
 Quagghiarina 121.
 Quaggia 528.
 Quaggiu 210.
 Quagia 528.
 Quágia 527.
 Quagio 528.
 Quaglia 527.
 » di mare 544.
 » marina 538, 595.
 » tre unghie 537.
 Quagliari 528.
 Quagliastro 527.
 Quagnà 29.
 Quak 444.
 Quata 527.
 Quàta 527.
 Quaiat 527.
 Quaija 528.
 Quajastróni 528.
 Quajna 540.
 Quajo 528.
 Quajót 528.
 Quaráglio 635.
 Quartirolo 619.
 Quattroceci 149.
 Quattr' oeuggi 489.
 Quattr' occhi 489.
 Quèrola 295, 298.
 » caparossa 301.
 » cenerina 298.
 » palommara 295.
 » passerègna 298.
 Querula 292.
 Querula cestaregna 298.
 Quèrula passerègna 301.
 Queu-blanc pignatié 161.
 Quinsoun 52.

R

Raari 76.
 Radaicchio 258.
 Ragion 181.
 Ragnar 285.
 Ital 540, 669.
 Ralét 540.
 Ramaci 76.
 Rampeghin 279, 283.
 » de muaggia 285.
 » piccolo 282.
 » ross 285.
 Rampghin 283.
 Rampichino 258, 260, 283.
 » alpestre 282.
 Rampighet 282.
 Rampighi 283.
 Rampighin 282, 283.
 Rampigin 283.
 Rampignet 282.
 Rampinello 283.
 » coll' ali rosse 285.
 Rampju 279, 283.

Ransigneul dle cane peit 236.
 Rapalin 79.
 Raparèn 283.
 Raperino 79.
 Rapineddu di loco 410.
 Rapparello 79.
 Rattouner 394.
 Ravolo 288.
 Ree 248.
 » cacco 248.
 Re cacchino 248.
 » d' i usei 247.
 » da quaje 546.
 » de quae 546.
 » de quai 546.
 » dee quagie 546.
 » degli Eider 493.
 » der ian-ni 350.
 » der quāj 546.
 » di beuce 247.
 » di Giaregule 548.
 » di Lodole 130.
 » di macchia 247.
 » di Quaglie 546.
 » di Ransigneul 238.
 » di Turdi 175.
 » di uccelli 248.
 » dle caje 546.
 » peit 247.
 » quaglio 546.
 Ré-Ré 247.
 Realat 540.
 Reatel 247.
 Reatin 228, 248.
 Reatin 247, 258, 260.
 Recaurin 313.
 Redestól 299, 300.
 Redestól Falconier 292.
 Redestola 292.
 Redestolón 292, 295.
 Regaggiun 184.
 Regaiùn 184.
 Regestola Falcona 295.
 » Falconiera 292.
 » lóra 292.
 » piccola 298.
 » rossa 300.
 Regéstola bianca 300.
 » foresta 300.
 Regestolon 292.
 Regina 260.
 Regino 562.
 Regolo 258.
 Regúz 248.
 Reicaglieri 546.
 Reiestola 292.
 Rennenòlla 317.
 » tagliafuórfece 309.
 Renninella 309.
 Reottin 247.
 Repipin 260.
 Requaggio 546.
 Requagio rosso 546.
 Requaio rosso 546.
 Requaio 546.
 » negro 540.
 Resclucié 422.
 Resegott 495, 496.
 Resestola 298.
 » da la testa rossa 300.
 » falconiera 292.
 Renz 248.
 Reverzino 562.
 Revest da campagna 298.

Revest da montagna 295.
 Rey 258, 260.
 Riàle 467.
 Ribobolo 288.
 Rieignuolo di fiumi 245.
 Rieignolu 187.
 Riddena 480.
 Rigau 130.
 Riggitanu 582.
 Riginèllo 258.
 Rigocoli 288.
 Rigogolo 287.
 Rigolin 74.
 Rignorin 74.
 Riiddu 231.
 » tuppuntu 258.
 Rindine e mare 635.
 Rindinneu 322.
 Rindinuni 325.
 » di livanti 625.
 » di mari 655.
 » di petto jancu 322.
 Rindune 322.
 Rinnedda 312, 314.
 Rinnua 314.
 » d' inviernu 319.
 » furestera 312.
 » monica 312.
 » suricina 317.
 » svaraia 312.
 Rinnedda 309.
 Rinninone 322.
 Rinninuni americanu 325.
 » di lu piettu jancu 325.
 » di maisa 625.
 Rinninuni di mari 625.
 » petto jancu 322.
 Riserà 240, 241.
 Risarolo 243.
 Risarólo 240, 307.
 Risignolu 187.
 Risignuolo 187.
 Riulo 408, 417.
 Rivarén 317.
 Rivaról 317.
 Rivelin 587.
 Riversinieddu 565.
 Riversino 562.
 Riversinu 562, 565.
 » rande 562.
 Rocareù 319.
 Rocchelle 477, 480.
 Roccantin 279.
 » macià 283.
 Romaniello 586.
 Rompanos 34.
 Roncasso 536.
 Roncass 536.
 Rondanin 309.
 Rondanina 309.
 Rondaninn-a 309.
 Rondena 309.
 Rondeni 317.
 Rondenina 309.
 Rondie 312.
 Rondin 319.
 » d' acqua 317.
 » de monte 319.
 Rondina 309.
 » dal cu bianch 312.
 Rondinaccio 322.
 Rondine 309, 313, 319.
 » bianca 312.
 » collo giallo 312.

Rondine di mare 630, 632, 636.
 » di mare artica 632.
 » di mare secura 630.
 » del Mac Dougall 632.
 » d' inverno 319.
 » forestiera 312.
 » grottara 319.
 » montana 319.
 » montana minore 321.
 » reale 309.
 » rossa 309.
 » vera 309.
 Rondinèla 309.
 Rondinella 309, 313.
 Rondinino 312.
 Rondol 322.
 » da croda 319.
 » de montagna 325.
 Róndol 319.
 Róndola 309.
 Rondolét 312.
 » da croda 319.
 » dal cul bianch 312.
 » griso 319.
 Rondolon 322.
 Rondolón de zhima 325.
 Rondon 322, 325.
 » biano 325.
 » di mare 625.
 » gianco 325.
 » marin 325.
 Rondón de zhima 325.
 » marin 325.
 » sassaró 312.
 Rondón 322.
 Rondone 325, 332, 629, 632, 635, 636.
 » alpino 325.
 » bianco 325.
 » chiaro 325.
 » marino 325.
 » pallido 325.
 Rondul 312.
 Rosciuz 248.
 Roseza barbaresca 624.
 Rosëza 586.
 Rösëza 588, 591.
 Rosigneol 187.
 » bastardo 207.
 » di padule 244, 245.
 Rosseto 213.
 Rossiello 432.
 Rossignèl 187.
 Rossigneu 187.
 Rostabò 562.
 Rondanina 312.
 Roundon dourè 325.
 » sassareu 312.
 Roundofin 322.
 Rounseza 621.
 Rousenento 255.
 Roussigneu aigaglié 238.
 Roussigneul 161.
 Roussignouloun 237.
 Rovegantín 279.
 Rre d' acejji 483.
 » di quagghi 546.
 Rubbiolo 288.
 Rugnetta 120.
 Rumfun 361.
 Rundanéna d' fion 317.
 Rundanéna 312.

Rundanéna da la furzella 309.
 Rundil de a' riu 317.
 Rundini murinica 355.
 Rondoni bianca 325.
 Rondonis 322.
 Runduledda marina 632.
 Ruoci 540.
 Ruocio 542.
 Ruòjo 555.
 Ruscigneu 187.
 » cannaieu 238.
 » d' egua 245.
 » foesté 238.
 » lombardou 238.
 Ruscignuolo d' acqua 238.
 Rusèto 248.
 Rusetto 247.
 Rusgneu 187.
 » gross 238.
 Rusignolo 187.
 » africano 223.
 » d' Africa 223.
 » di fiume 245.
 » di padule 245.
 » levantino 223.
 » orientale 190.
 Rusignolu 187.
 » di margiu 238.
 Rusignuluni 238.
 » di canniti 245.
 Rusignuolo 187.
 Russa 607, 608.
 Russeddu 432.
 » iancu 431.
 Russetta 487.
 Russiddazzu 432.
 Russied 432.
 Russieddu cinniruso 429.
 » » cula pinnacera 444.
 » giarnu 438.
 » jancu 436.
 » picciulu 440.
 » russu 432.
 Russiella 432.
 Russignolo 187.
 Russignuolo 187.

S

Sacro 401.
 Salciaioli 241.
 Saïen 79.
 Salimpunta 202.
 » di poggio 205.
 Saltabastoni 202.
 Saltampalo 202.
 Saltanselce 202.
 Saltanvette 202.
 Saltasecce 202.
 Saltimpalo 205.
 Saltimpunta 202.
 Saltinpalo 202.
 Santa Maria 350.
 Sarchianaccio 303.
 Sardara 655.
 Sarlodi 130.
 Sartagnola 209.
 Sarsacolo 298.
 » dalla testa rossa 300.
 Sarségna 479.
 Sarsegnòla 477.
 Sarsella 477.
 Sarsellune 470.

Saslot 479.
 Sassaruel d' montagna 319.
 Sassellara 175.
 Sassero 202, 204.
 Sataròl 667.
 Sauta-beucc 247.
 Sbattiae 305.
 Sbaregol 363.
 Sbereggh 363.
 Sbi-sbi 133, 139.
 Sbirro 322.
 Sbrisciolo bianco 669.
 » mezzano 668.
 » nero 669.
 Sbruttùn 89.
 S-ciarnuzol 248.
 Seacc 442.
 Scaccia miennuli 67.
 Scacciamargi 616.
 » picciulu 619.
 Scanalèrre 385.
 Scappaxin 157, 158.
 Scarabaggio 327.
 Searza bianca 436.
 » bigia 429.
 » cappona 442.
 » col ciuffo 438.
 » rossa 432.
 Searzetta 438, 440.
 Searzotto 441.
 Seavuzzu 486.
 Seazzetta de cardinale 258.
 Scellavàtto 303, 305.
 Scellavattolo 303, 305.
 Scépita 548.
 Scerante 70.
 Scerco 497.
 Scéveton 367.
 Scibica 548.
 Schassèalis 307.
 Schiaccino 205.
 Schiarante 70.
 Schiattione 97.
 Schieccia 210.
 » listata 208.
 Schiribilla 540, 544.
 » grigiata 542.
 Sciabica 548.
 Sciabocheddu 440.
 Sciabocchi 438, 440.
 Sciguun 89.
 Seimareül 202, 204.
 Scingherna 268.
 Scisceu 373.
 Seosci 264.
 Scouasson 266.
 Scopaiola 235.
 » asiatica 257.
 Scopajola 252.
 Scopina 255.
 Scoralon 562.
 Scoralot 29.
 Scorbettin dal becch giald 41.
 Scossa nuci 67.
 Scosson 67.
 Scoterzolo 202.
 Serochetto 202.
 Serochino 202.
 Seropiu 373.
 Scupiu 373.
 Seuratagéri 572.
 Scurbat 23.
 Sdordi 178.

Secariello 497, 595.
 Secone 496.
 Seenna 354.
 Seenun 352.
 Segheta 495, 496.
 Seghettone 496.
 Segouroun 621.
 Selega da la macia zala 58.
 » foresta 58.
 » megiarola 61.
 Sèlega palugana 255.
 Selèga grossa 64.
 Selegón 64.
 Semenzarul 70.
 Senepia 616.
 Sennella 255.
 Senrina 209.
 Sepajola 208, 213, 215.
 Sera corsa 354.
 Serena 350, 354.
 Serèna 350.
 Serénón 352.
 Serin 79.
 Sermollo 97.
 Serra 496.
 Sérule 495, 496.
 Sñalápp 327.
 Sfegio 548.
 Sforceoñ 473.
 Sforzana 548.
 Sforzhana 538.
 Sforzhanèla 544.
 Sforzhanòn 538.
 Sfranzel 52.
 Sfrisarín 79.
 Sfrison 67.
 Sfrisott 67.
 Sgalbeder 288.
 Sgambirio 582.
 Sganziin 76.
 Sgarbè 287.
 Sgarbèo 288.
 Sgardo zenerin 429.
 Sguardule 184.
 Sgarcla 247.
 Sgarin 630, 632.
 » negher 636.
 Sgarrin 632, 636.
 Sgarz ross 431.
 Sgarza 429, 433.
 » ciuffetto 438.
 » guarda-buoi 437.
 Sgarze 429.
 Sgarzett 298, 300.
 Sgarzètt 438.
 » pizzul 440.
 Sgarzetta 298, 300, 435, 438,
 441.
 » d'la coa 438.
 Sgarzorin 79.
 Sgavazua 300.
 Sgazzin 636.
 Sgherbè 287.
 Sgiorz 475.
 Sgnèp 616.
 Sgnèpa 614, 616.
 Sgnèpa 614, 616.
 Sgnèpi 619.
 Sgnèpin 619.
 Sgnèpin 619.
 Sgnèpón 614.
 Sgnèpoun 614.
 Sgnèppoun de mâr 607.
 Sgnèpù 614.

Sgolacchio 305.
 Sgolatrei 630.
 Sgolgia 429.
 » peita 440.
 » roussa 431.
 Sgolgin 440.
 Sgolgin 438.
 Sgolgion 429.
 Sguiseta 133.
 Sguisetù 130.
 Sguiseta 133.
 Sguiseton 139.
 Shapüctöre 609.
 Shkittetza 456.
 Si-si de monte 133.
 Si-Sietta 139.
 Sia 101, 106.
 » d' Africa 96.
 » da coi 253.
 » giana 99.
 » montagninna 106.
 » muntagninn-a 101, 106,
 110.
 » nostrà 101, 106.
 » pagèa 99.
 » pajèra 99.
 » russa 106.
 Siccio 307.
 Sieta del co gros 366.
 Sietta 412.
 Siettua roussa 410.
 Siga cendrova 106.
 Sigheugna 416.
 Siglot 89.
 Sigoeugna 446.
 Sigogna 446.
 » nera 448.
 Siguettra 371.
 Sigugna 446.
 Siice 205.
 Silo 99, 101.
 » d' inverno 106.
 » testa nera 96.
 Silun de montagna 97.
 Simabuschì 202, 204.
 Simacousti 202, 205.
 Simacusti 202, 201.
 Simmacusti 202.
 » de primaveja 205.
 Sióto 106.
 Sipa 178.
 Sirena 350, 354.
 Sirenón 352.
 Sirin 79.
 Sirou 101.
 Sirratte 512.
 Siseol 373.
 Sisi 133, 226, 228, 230, 231,
 258, 260.
 » d' acqua 139.
 » d' aegua 139.
 » da pra 133.
 » da prou 133.
 Sisicula 149.
 Sisicula gialla 152.
 Sisila 309.
 Sitolo montagnuolo 132.
 Sitolone 132.
 Siven 373.
 Sivetoa 371.
 Siveton 363.
 Sivétta 371.
 Sivettin 373.
 Sivettua gianca 380, 381, 382.

Sivettua grossa 403.
 » negra 406.
 » roussa 410.
 Sizin 246.
 Smergo 496, 497, 666.
 » maggiore 495.
 Smergón macià 663.
 Smeriglio 408.
 Snoseléra 31.
 Soeta 371.
 Solo 582.
 Sommuazzariello 669.
 Sordone 253.
 Sott' aqui 669.
 Sottacquin 669.
 Sottanello 656.
 Sottaquin 669.
 Spagèa 99.
 Sparacannelle 237.
 Sparviere 417.
 Sparviero 417.
 Spatola 450, 471.
 Spátola 450.
 Spatula 450.
 Specchio 472.
 Spéppula 133.
 Spèciaruvettu 228.
 Spèrga 496.
 Spèrnacin 486.
 Spèrnisa 525.
 » foresta 521.
 Spezzafierr 67.
 Spia da nottuan 136.
 » dee quaglie 133.
 » di ortuàn 130.
 Spigosón 339.
 Spigozzon 339.
 Spilorso 505, 588, 597.
 Spingiuini 52.
 » montagnola 57.
 Spinso 52.
 » imperiale 67.
 Spinzu 52.
 Spioncello 139.
 » marino 141.
 Spions 106.
 » de la larga 110.
 Spiplina 139.
 Spipola 136.
 Spippoletta 130.
 Spippulon 139.
 Spiritiechin 590.
 Spiune 599, 602.
 Spolatrelit 630.
 Spollica-vojo 138.
 Sporca painoni 266.
 Sporcighiune 538.
 Sporciglione 538.
 » piccolo 544.
 Sprucavoi 437.
 Spuntacalocchie 202.
 Spuntasebi niuru 222.
 » russo 221.
 Spuntasièbi 212, 213, 220.
 Spunzun barbarisun 55.
 » imperiali 67.
 Sputamaruggiu 202.
 Squaiandola 99.
 Squajardola 99.
 Squartasatt 327.
 Squarussola 197.
 Squarussolon de montagna
 162.
 Squarussolón foresto 162.

Squassacò 152.
 Squasseròto 149.
 Squatarola 567.
 Squerussolo 197.
 Srdunàl 97.
 Ssciuce 371.
 Stacola 41.
 Staccola de' monti a peis-
 arrubius 42.
 Stagnotta 597.
 Starlaca 125.
 Starna 525.
 » d' acqua 494.
 Starnotta 614.
 Starnotto imperiale 614.
 Steila d' or 260.
 Stélin 258, 260.
 Stelin piccolo 260.
 Stelin 258.
 Stercorario 648.
 Stercorario maggiore 648.
 Sterla 525.
 Sterlaca 125.
 Sterlea 533.
 Stérletta 525.
 Stérliùs 525.
 Stérna 525.
 Sterpazzola 209, 221.
 » del deserto 215.
 » nana 215.
 » sarda 214.
 Sterpazzolina 213.
 Stiaacino 204.
 Stiaccione 97.
 Stipaiuola 255.
 Stipajola 255.
 Stién 258.
 Stomi bléu 193.
 Stóran 43.
 Stóran 43.
 Storan marén 48.
 Stóràzh 419.
 Storicicollu 342.
 Stordeola 175, 186.
 Stordesca 184.
 Stórèla 408, 413.
 Stórèla 408, 413.
 » de campanil 410.
 Storgicollu 312.
 Stori biancu 380, 382.
 » de pisci 384.
 » de sa puliga 378.
 Storin 43.
 Storlacchio 97.
 Stórlo color de rosa 48.
 Stórittu biancu 381.
 Storn réusa 48.
 Stornélo 43.
 Stornéllu 43.
 Storneo 43.
 Stornin de tor 43.
 Storno 43.
 » nero 47.
 » roseo 48.
 Stornùn 572.
 Stortacheul 342.
 Stortacoll 342.
 Storzacheul 342.
 Stournal 43.
 Stournin 253.
 Stourneu 43.
 Strábuso 442.
 Straccacaccia 582.
 Stragasa 300.

Stragasa peita 298.
 Stragass 295.
 Stragazza 295.
 Stragazzetta 298.
 Stragazzùn 292.
 Strallera bianca 497.
 Strapassua 109.
 Strapássua 110.
 Strellacchino 130.
 Stria bianca 361.
 » groga 369.
 Stridula 97.
 Strillin 589, 590.
 Strillozzo 97.
 Strilózo 97.
 Striolo 43.
 Striolo 43.
 Strisciaiola 143.
 » capo-scuo 145.
 Strisciaiuola 141.
 Strisciajola 141.
 Striveri 417.
 Strolaga 662.
 » maggiore 661.
 » mezzana 662.
 » minore 663.
 Strolaghina 666.
 Stronello 43.
 Struacchio 97.
 Struneddu 44.
 » niuru 47.
 » paisanu cu pizzu giar-
 nu 47.
 Strùlo 43.
 Strapparella di monte 221.
 Struzzet 248.
 Stufiótt 89.
 Stùran 43.
 Sturlacchio 97.
 Sturlenga 175.
 Stur 388.
 Sturn 43.
 Sturnejo 43.
 Sturnell maren 48.
 Sturnieddu 44.
 » di passa 44.
 » niru 47.
 Sturniellu 43.
 Sturno 43.
 Sturnu di passa 44.
 Stureddu 44.
 Sturru giapulau 44.
 » nieddu 47.
 Subiot 89.
 Succiacapre isabellino 330.
 Suétta 371.
 Suetin 373.
 Suguettra 371.
 Sugretta 371.
 Sula 428.
 Salitariu 58, 164.
 » coa de fogu 162.
 Sumbuzzaturi 658, 669.
 » picciulu 669.
 Sarciteddu 542, 544.
 Susinell 178.
 Susinello 178.
 Susino 178.
 Suttaquin 661, 663.
 Svasso dal collo nero 668.
 » collo rosso 666.
 » forestiero 667.
 » grosso 496.
 » maggiore 664.

Svasso piccolo 668.
 Sverzellino 79.
 Sverzeri 79.
 Sverzul 86.
 Svit-Svit 139.

T

Taccola 32.
 Tagliaferro 601.
 Taloch bianco 115.
 » rosso 58.
 Talóch 253.
 Tanabús 442.
 Tarabus 440.
 Tarabúsét 440.
 Tarabúsino 440.
 Tarabusu 442.
 » zhenerin 414.
 Tarabuso dalle ongie col
 péton 444.
 Taranguel 255.
 Tartagin 319.
 Tartau 396.
 Tartavela 209.
 Tarin 85.
 » d' nar peit 86.
 Taureddu 537.
 Telytza 522.
 Terechia 606.
 Terénna 130.
 Terrajola 121.
 Terreina 130.
 Terzetola vernile 477.
 Terzina 477.
 Testa di tureu 482.
 » gatto 367, 369.
 » grossa 292, 298.
 » » cinnirina 295.
 » neigra 215.
 » neira 275.
 » niura 215.
 Testa nera d' inverno 220.
 » nira 215.
 » niviredda 215.
 » rossa 300, 477, 483.
 » » picciridda 298.
 Testanegra 215.
 Testanigra 215.
 Testin d' oo 258, 260.
 » d' or 258, 260.
 » d' ou 258, 260.
 Testón 482.
 Testonotto 565.
 Tètā-raiss 97.
 Tetavache 327.
 Tettavacce 327.
 Tídiri 499.
 Tignusu 422.
 Tiliou 572, 595.
 Tirabus 412.
 Tirolì-Tirolì 595.
 Tirolino 591, 592, 602, 604.
 605.
 Tiruli 595, 597.
 Tiruni 499.
 Tistazza cinnirina 295.
 » rossa 295.
 Tistuni 67, 292.
 Titro 136.
 Todeschin 267.
 Tofanáchio 471.
 Tofèlla 593.

Tognin 471.
 Tomio 205.
 Tomireula 486.
 Tonion 226, 228, 231.
 Topino 317.
 Tord 180.
 Tordea 181.
 Tordeca 175.
 Tordeja 184.
 Tordela 175, 184.
 » forestiera 175.
 Tordella 184.
 Tordèna 184.
 Tordene 184.
 Tordeuia corsesca 175.
 Tordessa 181.
 Tordin 180.
 Tordina 133, 136.
 Tordina foresta 130.
 Tordinò 136, 180.
 Tordo 175, 178, 180, 184.
 » bottaio 180.
 » chach 175.
 » chiaro 174.
 » colombin 181.
 » corsin 178.
 » cua rossa 162.
 » d' acqua 250.
 » dal petto nero 173.
 » dalla coa nera 175.
 » » collana 170.
 » de Russia 354.
 » del Pallas 183.
 » dello Swainson 183.
 » di gola nera 173.
 » dorato 186.
 » dorato odiano 187.
 » fassan 170.
 » gaggiaro 178.
 » gaion 184.
 » gajér 184.
 » gazan 184.
 » gazher 184.
 » gazzina 175.
 » grosso 180.
 » guazzaio 184.
 » main 351.
 » marin 354.
 » marino 178.
 » negro 175.
 » oscuro 174.
 » piccolo 178.
 » reale 180.
 » sassello 178.
 » siselin 178.
 » zheselin 178.
 » zhisilót 178.
 » zhit 180.
 Tordol 170, 175, 178, 180, 184.
 Torciello 342.
 Torgicello 342.
 Torod 180.
 Torolino de vierno 583.
 » gammelonghe 601.
 » pedocchiello de Romanello 589.
 » » Secariello 585.
 » riàle 597.
 » romano 586.
 » secariello 595.
 » sichilo 599.
 Torsacól 342.
 Torsicollò 342.

Tortacol 342.
 Tortóa 508.
 Tortoèla 508.
 Tortoin ròsai 586.
 Tortoin 597.
 Tortoin 599, 601.
 Tortola 508.
 Tortora 508.
 Tortorèle 508.
 Tortorella 508.
 Tortorelle 508.
 Tortorina 508.
 Totanin 586, 597.
 Totano 599, 601.
 » moro 604.
 Totanón 602.
 Tottavilla 122.
 Toamboulot 669.
 Tourd chilons 178.
 Tourdeuia 184.
 Tourdou montagné 175.
 Tourdorelle 508.
 Tourtorta 508.
 Tourtorella 508.
 Trabucchella 440.
 Trabucco 442.
 Tramentano 55.
 Trasola grisa 101.
 Travacola 597.
 Tre-Tre 248.
 Tremacua 149.
 » dal cap neigro 149.
 » giana 152.
 Trementin 79.
 Trentacino 268.
 Trentacincgilris 97.
 Trentarola 270.
 Trentin 599.
 Tretari 562.
 Triorva 369.
 Triungnia 537.
 Trombettièr 89.
 Trozzu 202.
 Trudu 180.
 » culumbinu 181.
 Trudus 180.
 Trummitèda 410.
 Tuffetto 656, 669.
 Tufin 665, 668, 669.
 Tui 228, 230, 231.
 » bianc 230.
 » verd 226.
 » zald 228.
 Tuiccin 270.
 Tuit 228.
 » Tuit 231.
 Tuina 205.
 Tuinot 233.
 Tuio 228, 230.
 Tupputa 128.
 Tummalora di li rossi 663.
 Tummalosori 669.
 Turchiato 499.
 Turd 180.
 » cursin 178.
 Turda 184.
 Turdèna 136.
 Turdin 136, 178.
 Turduinna 508.
 Turdo 180, 567.
 » còrso 178.
 Turdou sarvaegu 253.
 Tundra 508.
 Turdu colori de cenisciu 175.

Turdu culambinu 175.
 Túrdra 508.
 Turdulicia 184.
 Turlà 562.
 Turlurò 562.
 Turriazzeddu 624.
 Turriazzolu di Jaddazzi 624.
 Turrottu 559.
 Turtra 508.
 Turtura 508.
 Túrtru 508.
 Turturaru 345.
 » tupputu 348.
 Turturéna 508.
 Turturi de mari 579.
 Turzopica 334.
 Tutone 503.
 Tuvittula 122.
 Tzòga 167.

U

Ubara africana 561.
 » asiatica 561.
 Ucel d'jeux coulourciel 255.
 Uccello 396.
 » bello 350.
 » del diavolo 149.
 » delle tempeste 655.
 » delle tempeste a coda forcuta 655.
 » muratore 285.
 » turco 352.
 Ugìu 258, 260.
 Uitt 230.
 Uitt 234.
 Ungaresin 267.
 Uocchie de voje 228.
 Upa 357.
 Uppola 358.
 Upupa 357.
 Urgananti 454.
 Uria 659.
 Urócc 363.
 Urócc 367, 369.
 Ursgneu 187.
 Ursgnò 187.
 Usel dla Madonna 258.
 » vespee 354.
 Usell de la nef 57.
 Useo santa-Maria 350.
 » smenièò 350.
 Usignuolo 187.
 Uslein dal fredd 248.
 Uslein da neiv 247.
 » dal fred 260.
 Uslein dal fred 258.
 Uslein del testin giald 258.
 Ussarin 267.
 Uvaredda de margi 567.

V

Vaccherina 141.
 Vaddaranu 451.
 Vaetra 654.
 Vainetta 133, 136, 139.
 Vanetta 576.
 Vaneu 577.
 Vardén 228.
 » d' invèran 231.
 Vardón 70.

Varzia de monti 325.
 Varzlén 79.
 Varzlén 79.
 Varvajanni 361.
 Vastrica 295.
 » a capo rosso 300.
 Vecchia 557.
 Vedidore 408, 413, 417.
 Velia 295.
 » comune 298.
 » gazzina 295.
 Venturone 72.
 Verda bella 99.
 » brutta 101.
 Verdatero 605.
 Verdér 70.
 Verderame 351.
 Verdón 70.
 Verdone 70.
 » bastardo 88.
 Verdosin 79.
 Verla biancona 295.
 » marina 292.
 » rossa 298.
 Verrou 51.
 Verrun 630.
 Verzellino 79.
 Vi-Vi 577.
 Viatara 538.
 Viduetta 595.
 Vidul 410, 413, 417.
 Vignignuolo 355.
 Villano 288.
 Vinaccina 106.
 Vincenza 625.
 Virdeddu 226, 231.
 » jancu 230.
 Virdejuzzu 79.
 Virdidduni 226.
 Viridune 70.
 Virduni 70.
 Viscarda 175.
 » negra 170.
 Viscera 175.
 Vispisa 149, 152.
 » di primavera 141.
 » di sciumi 146.
 » giarna 141.
 Vispisedda 133.
 Vitaruolo 70.
 Vitt-Vitt 139.
 Voenia borse 619.
 Vol di notte 328.
 Volanaro 233, 234.
 Vollaro 288.
 Volpoca 466.
 Voltapière 579.
 Voltaprie 579.
 Voltapietre 579.
 Voltolino 540.

Voltolino piccolo 542, 544.
 Vota borse 619.
 Votour 421.
 Vuota borse 619.
 Vujarottu 565, 624.
 Varzittulu 262.
 Vuturazzu 421.
 Vuturu 419, 420.

Z

Zafferano 645.
 Zaléto 226, 228.
 Zaléto 228, 231, 234.
 Zélega 61.
 » grossa 64.
 » piccola 66.
 Zeleghetta meggiarola 61.
 Zélléchia 197.
 Zenevon 175.
 Zharant 70.
 Zhavatol 52.
 Zhédron 532.
 Zhelega 64.
 Zheléga 64.
 Zherant 70.
 Zherpignola 268.
 Zhicogna 446.
 Zhiliga 64, 309.
 » de razha granda 64.
 Zhiligheta 61.
 Zhilgnóch 106.
 Zhiligót 64.
 Zhimal 202.
 Zhimalét 202.
 Zhiria 309.
 Zhisila 309.
 Zhisilon de mar 636.
 Zhit 138.
 Zhitón 139.
 Zhiveta da eroda 366.
 Zhivita 371.
 Zhocta 371.
 Zhorla 42.
 » dal bech zal 41.
 Zhnit 226.
 Zhuita 371.
 » da bosch 370.
 » da campagna 366.
 Zhurla 41.
 Zhus 373.
 Zi 101.
 Zia 101, 106.
 Zieco d' inverno 255.
 Zigolino 101.
 Zigolo 101, 103.
 » boschereccio 109.
 » capinero 96.

Zigolo dal collare 97.
 » della neve 115.
 » di Lapponia 114.
 » giallo 99.
 » golarossa 108.
 » minore 109.
 » muciatto 106.
 » mugiatto 106.
 » nero 101.
 » rugginoso 106.
 Ziinu 82.
 » d' erba janca 82.
 Ziò 99.
 Ziot 110.
 Zioin 101.
 Zip 61.
 Zipp 106.
 Zirla 101, 106.
 » gialla 99.
 » muciatto 106.
 » nera 101.
 Zirlone 178.
 Ziulu 106.
 » cinnirinu 106.
 » di pantanu 111.
 » gialinu 99.
 » giallu 99.
 » niru 106.
 » svariù 96.
 » testa-nira 96.
 Ziv 178.
 Zivedda 133.
 Ziveta 371.
 Zivetta 371.
 Zivineddu 231.
 Zivittula 373.
 Zivola 101.
 Zivulu di pantanu 111.
 Zizésca 175.
 Zizi 99.
 Zoeta 371.
 Zol 111.
 Zuflót 89.
 Zufolotto 89.
 Zuinu 101.
 Zuit 228, 231.
 Zuit-Zuit 226.
 Zul 111.
 » maren 101.
 Zurla dal bech ross 42.
 Zurlichét 572.
 Zurruliot 621, 623, 624.
 Zurruliu conca molenti 572.
 » de mari 592.
 » » a camracca 574.
 » di l' spiaggia 595.
 » di molenti 574.
 Zurrulietteda 601.
 Zuvinu 82.
 Zvetta 371.

